



د تنفسي ستیتم اناټومي او فزیولوژی

د افغانستان اسلامي جمهوریت
د عامې روغتیا وزارت
ننګرهار د عاميې روغتیا ریاست
اما غزالي دطبي علومو انستیتیوت

ترتیب کوونکی: شهاب ژمن
www.ketabona.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



د افغانستان اسلامي جمهوریت

د عامې روغتیا وزارت




ننګرهار د عامې روغتیا ریاست

امام غزالي د طبي علومو انستيتوت

څانګه : عالي نرسنګ

موضوع: ↓

د تنفسي سیستم اناتومي او فزيولوژي



شهاب (ژمن)

محمد نسيم (برسات)

ترتیب کوونکی:

لارښود استاد:

۱۳۹۹ هـ ش

کال: -

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۱- فهرست	۳
۲- ډالۍ	۴
۳- سريزه	۵
۴- تنفسي سيستم	6
۵- دتنفسي سيستم دندۍ	۷
۶- دتنفسي سيستم غړي	۹
۷- (Nose)بوزه	۹
۸- دپوزۍ غټ جوړښتونه	۱۰
۹- دپوزي فزيولوژي	۱۱
۱۰- بلعوم، حلق، ستونې	۱۳
11- حنجره	۱۶
۱۲- دحنجرې دندۍ او فزيولوژي	۱۸
۱۳- شن، وچه غاړه، وچه مړۍ	۲۱
14- Tracheobronchial Tree	۲۳
۱۵- هدايتي ساحه	۲۳
۱۶- تنفسي ساحه	۲۷
۱۷- سږي	۳۱
۱۸- صدري جدار او تنفسي عضلي	۳۳
۱۹- پلورا Pleura	۳۵
۲۰- دسږو اروا Lung's Blood Supply	۳۷
۲۱- لمفاوي تقويه Lymphatic Supply	۳۸
۲۲- ماخذونه	۳۹

ډالۍ

ترټولو مخکې زما گرانې او زړه ته نږدې مور جانې او خواږو ورونو ته ډالۍ کوم چې په سختو شرايطو او تنگ لاسۍ کې يې زما دتعليم لپاره هرې ستونزې ته لېږک ويلی دی

او دوهم ډيره زياته مننه کووم د مولوي صاحب حميدالله او مولوي صاحب گل نبي څخه چې زه يې تعليم ته وهڅوولم او ماته يې په خپله غيږ کې ځای راکړ تر څو خپل تعليم بشپړ کړم .

سريزه

دسترخالق حمداوئنا وایم چې دعلم اوپوهی څخه یی برخمن کړم اوبیا په علم کې دعالي نرسنگ دعلم محصیل یم،دعلم نړۍ تل عالي نرسنگ ته خاص ارزښت ورکړی اودپوهې دنوروڅانگوسره یی برابر گڼلی .

بل دا چې زما موضوع د تنفسي سیستم اناتومي او فزیولوژي ده، نو ما هم له بیلابیلو ماخذونو څخه استفاده کړی ده او تاسو سره په دغه برخه کې مرسته کولی شي .

د سا اخیستل یوه ضروري پروسه ده ځکه چې د بدن حجری د دی لیواله دي چې اکسیجن واخلي او کاربن ډای اکساید له ځان څخه لری کړي، چې اکسیجن دتنفس پواسطه اخیستل کیږي او وینی ته ورکول کیږي او بیا دزړه او رگونو سیستم له لاري دسږو څخه حجرو ته لیږدول کیږي .

بل هر شخص باید ځانته هدف وټاکي : الله (ج) انسان داسي مخلوق خلق کړي دي چي بي له هدف څخه خپل ژوند په سمه توگه پرمخ نشي بیولای. څرگنده ده چي هدف ته درسیدوپه لاره کي زیات خنډونه شته لکه : ناپوهي ، دتجربې نه لرل اونور... داټول هغه څه دي چي که یوانسان وغواړي هدف ته ورسېږي ، باید مشکلات له مخي څخه ليري کړي اويا ورسره مبارزه وکړي ترڅوپه خپل هدف کي بریالی شي. زما له اهدافوڅخه یوههدف داهم وو چي د پایلیک موضوع په ښه ډول سرته ورسوم خولکه څنگه چي ما غوښتل هغه سي ونه شول، ولي دزیاتومشکلاتوسره مخامخ شوم لکه : دتجربې نه لرل ، دلیکوالۍ داصولوسره نابلد تیا ، په موضوع کي دموادوکمی ، اود امکاناتونه لرل پر دی هرڅه الله ج ماناتوانه ته د دي توان راکړي، چي داسي یوڅه ولیکم چي دلوستونکو تنده مي څه ناڅه په ماته کړې وي .

Respiratory System تنفسي سيستم

تنفس او ساه اخیستل داسی یو عمل ده چې ددی عمل کړنه او فریکونسي د ژوند په بهیر کې دبل هیڅ عمل سره پرتله کیدای نه شي، که څه هم مونږ دتنفس په کولو اونه کولو کې واکمن یو خو په دی به لاس بری نه شو چې تر ډیره خپل تنفس بند کړو.

له بلی خوا څخه تنفس دژوند ځانگړنه ده او د plus سره یوځای دیو شخص دمرگ او ژوند په معلومولو کې ټاکونکې رول لري .

د سا اخیستل یوه ضروري پروسه ده ځکه چې د بدن خجری د دی لیواله دي چې اکسیجن واخلي او کاربن ډای اکساید له ځان څخه لری کړي، چې اکسیجن دتنفس پواسطه اخیستل کیږي او وینی ته ورکول کیږي او بیا دزړه او رگونو سیستم له لاري دسږو څخه حجرو ته لیږدول کیږي . نو ځکه ویلای شو چې حجرو ته داکسجن رسول او دکاربن ډای بهر ته ویستل دتنفس، زړه او رگونو دواړو سیستمونو یو گډه دنده ده.

تنفسي سيستم خپله دنده په لاندي څلورو پړاوونو کې ترسره کوي

- (1 Ventilation سږو ته د هوا داخلیدل او ویستلو څخه عبارت ده.
- (2 External Respiration دغازونو تبادله دسږو او ویني ترمنځ.
- (3 دویني پواسطه د اکسیجن او کاربن ډای اکساید تبادله.
- (4 د حجرو او ویني ترمنځ د اکسیجن او کاربن ډای اکساید تبادله.

اوس په ترتيب سره دتنفسي سيستم عمومي دندې اوبيا دهر غړي اناتومي او فزيولوژي څيرو

✓ دتنفسي سيم دندې (Function of Respiratory System)

(a) (دغازونو تبادله) Gases Exchange

(b) (دويني Ph. كنټرول) Regulation of Blood Ph.

(c) (داواز توليد) Vocalization

(d) (دبوي كول) Olfaction

(e) (ژغورنه او دفاع) Defense

(f) (دبدن دحرارت كنټرول) Regulation Of Body Temperature

(g) (دبدن د اوبو دتوازن ساتنه) maintenance of Body Water Balance

(h) (د وينې پرېن كيدلو څخه مخنيوي) Anticoagulant Function

(i) (دهورمونونو مواد جوړول) Syntheses Of Hormonal Substance

✓ تشرېح

✓ (دغازونو تبادله) Gases Exchange مخكي مو يادونه تری كړی

✓ (دويني Ph. كنټرول) Regulation of Blood Ph. دا عمل دسږو پواسطه په وينه كې د كاربن

ډای اكساید داندازی د تغير پواسطه ترسره كيږي، داچې كاربن ډای اكساید دنسجونو دمخلفو

استقلابي تعاملاتو په پايله كي منځته راځي او بيا وينې ته دداخليدو وروسته د اوبو سره تعامل كوي


اوبو بي ثباته مركب د كاربونيك اسيد پنامه جوړوي چي دامركب ډير ژر په هايډروجن ايون او بيا

- کاربونیټ باندې بدلېږي او پدې ترتیب د ویني pH ښکته ځي خودبلي خوا په سږو کې دغه تعامل معکوس کېږي او د هایدروجن ایون سویه کمیږي او په پایله کې د ویني pH لوړیږي.
- ✓ (داواز تولید) Vocalization دغه دنده د تنفسي سیستم د شن (Trachea) پواسطه ترسره کېږي
- ✓ (دبوی کول Olfaction دا دنده د پوزي تشي- (Nasal Cavity) څخه د هوا دمغلقو مالیکولونو د تیریدو په وخت کې ترسره کېږي.
- ✓ (ژغورنه او دفاع) Defense د تنفسي سیستم پواسطه نه یوازي اکسیجن ترقلبي وعايوې سیستم پوري لېږدول کې بلکې ددې لاري په اوږدو کې د هوا څخه بیګانه توکي هم ليري کېږي او بدن دانتان د مداخلې څخه د امکان تر حده پوري ژغوري، همدارنګه په سږو او سنخونو (Bronchi) کې د Leukocytes, Mast cells, Macrophage, Natural Killer Cells شتون ددې سیستم د دفاعي دندې ښکارندوي دي.
- ✓ (د بدن د حرارت کنټرول) Regulation Of Body Temperature د بدن څخه د ساه ویستلو (Expiration) په وخت کې داوبو د مالیکولونو سره یو ځای حرارت هم ضایع کېږي. نو پدې ترتیب تنفسي سیستم د بدن د حرارت په کنټرول کې هم ونډه لري.
- ✓ (د بدن د اوبو د توازن ساتنه) تنفسي سیستم د بدن داوبو په توازن کې برخه لري، چې د ساه ویستلو په وخت کې یو اندازه اوبه تبخیر کېږي او پدې ترتیب د بدن څخه یو اندازه اوبه ضایع کېږي.
- ✓ (د وینې پرن کیدلو څخه مخنیوی) په سږو کې Mast cell شتون لري چې لدې حجرو څخه هیپارین افرازیږي کوم چې د وینې د پرن کیدو څخه مخنیوي کوي او نه پرېږدي چې وینه درګونو په داخل کې پرن شي.
- ✓ (د هورمونونو مواد جوړول) اوس دا جوته شوي ده چې د سږو نسج دیو شمیر هورموني موادو لکه Serotonin, Acetylcholine او Prostaglandins جوړوي کوم چې په بدن کې غوره فزیولوژیکي دندې ترسره کوي.

د تنفسي سیستم غړي

د تنفسي سیستم غړي په دوو لویو برخو باندي ویشل شوي چې یو یې پورتنی تنفسي- لاره (Upper Respiratory Tract) دي چه پدې برخه کې پوزه (Nose) حنجره (Larynx) او نور مرستندونه جوړېستونه شامل دي او بله برخه یې ښکتنی تنفسي لاره (Lower Respiratory Tract) دي چه پدې برخه کې شرن (Trachea)، ښځي (Bronchi) او دسږي شاملې دي. چه دهر غړي دجوړښت او دندې څخه په لاندې ډول یادونه کوو: همدارنگه دیادوني ورده چه (Diaphragm)، سینې صندوقچه او د بطن جدارونه دتنفسي- حرکت مسولیت په غاړه لري

شکل ۱



شکل ۱

۱ (Nose) پوزه:

د جوړښت له پلوه د دوو برخو لرونکي ده چې یو یې خارجي برخه ده چې دا برخه په ډیره اندازه دغضروفونو څخه جوړه شوي ده، ددې برخې پوله (Bridge) د Nasal هډوکي او د Frontal او Maxillary هډوکو دیوې برخې څخه جوړه شوي ده او بله برخه د پوزي دخالیکا (Nasal Cavity) څخه عبارت ده

✓ دپوزی غټ جوړښتونه په لاندې ډول دي:

1. دپوزي سوري (Nostrils / Nares): دپوزي سوري چې دپوزي دخالیگا خارجي فوټه ده او پوزه دبهرسره

وصلوي اوپه مقابل کي يي Choanae داخلي فوټه ده جي پوزي جوف دستوني سره وصلوي.

2. Vestibule : د پوزي دسوريو په خلف کي موقعيت لري او د Stratified Squamous Epithelium

پواسطه پوښل شوي چې دا اپیتلیوم د جلد د پوستکي د Stratified Squamous Epithelium سره

تماس لرونکي دي Hard Plate. چې هډوکين پليټ دي او دمخاطي غشا پواسطه پوښل شوي د پوزي

دجوف ځمکه جوړوي او همدا پليټ دي چې د خولي او پوزي جوفونو يي سره بيل کړي دي Nasal.

Septum چې قدامي برخه يي دغضروفو پواسطه او خلفي برخه يي د Vomer هډوکي او Ethmoid

هډوکي د Perpendicular plate پواسطه جوړه شوي ده،

✓ دپوزي جوف پردوو برخو ويشي يو يي چپ او بل يي ښي برخه شکل ۲

3. Conchae : دا جوړښت د Vestibule شاته دپوزي په وحشي جدارکي شتون لري د ماهي د غوړ يا

کلي (کونجی) (پشان شکل لري او دري ډوله دي). شکل ۲

Superior Conchae (a)

Middle Conchae (b)

Inferior Conchae (c)

4. Meatus : دانل ته ورته جوړښت دی چې د Conchae شاته موقعيت لري په دري ډوله دي

Superior Meatus (a)


Middle Meatus (b)

Inferior Meatus (c)

چي لږي ډلي څخه Sup. Meatus او Mid. Meatus ته دمختلفو Paranasal sinuses فوټي

راخلاصیږي خو Inf. Meatus ته Nasolacrimal duct فوټه راخلایږي. شکل ۲

شکل ۲



دپوزي فزيولوژي:

- 1) هرکله چه دخولي خاليگا د غذا څخه ډک وي نو پدې وخت کې د هوا تيريدو يواځيني لاره پوزه ده.
- 2) د هوا تصفيه کول: لکه څنگه مو چه مخکي يادونه وکړه چې Vestibule دويستانونلرونکي دي نو دا ويستان د هوا څخه غټي ذري ايساروي دبلي خوا د Nasal Septum او Nasal Conchae په واسطه چې دى جوف کې کومې کړې وېرې لاري جوړې شوي دي دا ددې لامل گرځي چه هوا د Conchae او Septum په سطحه ولگيږي اودا چه دا دواړه سطحې د Columnar Epithelium کاډبه سلياوې او Goblet Cells لري اوددې حجروپواسطه مخاط افرازيږي، نوځکه دزيات شمير

غیراپینو توکو دنیولو او ددوي دوراندي تگ څخه مخنیوي کوي چه دا توکی بیا دیو قشر- په ډول دمخاط سره یوځای بلعوم ته انتقالیږي او بیا به یا تو شي اویا به بلع شي.

3) د هوا گرمول او مرطوبول:

دپوزي دجوف دا دنده د Nasal Septum او Nasal Conchae دهغه پراخه برخي پواسطه چه مساحت يي 160 cm² دي په لاندي ډول ترسره کیږي:

داوښکو هغه نم او رطوبت چه د Nasolacrimal Duct لاري دپوزي جوف ته راځي د هوا په مرطوبوالي کي رول لري او هغه گرمه وینه چه په مخاطي غشاد شعريه رگونو په منځ کي بهیږي د هوا د گرمیدو سبب گرځي، نوځکه دتنفسي سیستم پاتي برخي ته گرمه، مرطوبه او فلتر شوي هوا داخلېږي. اوددي سیستم دیادي برخي د خرابیدو مخه نیسي.

دیادوني وږده چه دپوزي دجوف دا دري دندي چه د هوا گرمیدل، مرطوبول او فلتر کولو څخه عبارت دي د Air Conditioning پنامه یادېږي.

4) د بوی حس (Olfaction): دا دنده دپوزي د Olfactory Epithelium پواسطه چه دپوزي دجو په پورتنی برخه کي شتون لري تر سره کیږي.

5) د خبرو د Resonance ټاکنه: خبري دوه د Resonance جوفونه لري چي یو یي Paranasal

Sinuses او بل یي همدا دپوزي جوف دي، چه دپوزي د جوف کړنه دخبرو په Resonance ټاکنه کي هغه وخت ښه جوتیږي چه د لاس اویا کوم بل شي پواسطه پوزه بنده کړو اویا خبري وکړو.

(2) بلعوم، حلق، ستوني (Pharynx):

بلعوم داسي يو غړي دي چه د تنفسي او هضمي دواړو سيستمونوپه ډله کي راځي، دغه غړي پورته خواکي دپوزي او دخولي سره اړيکي لري، چه دپوزي څخه هوا او دخولي څخه هوا، مايعات او غذا ور داخلېږي او بيا ئي اړونده غړو ته يي چي په ښکتنې برخه کي ورسره اړيکي لري انتقالوي، بلعوم په ښکتنې برخه کي دتنفسي سيستم دحنجري اودهضمي سيستم دمري سره اړيکي لري.

✓ بلعوم دري برخي لري چي عبارت دي له:

1. دپزي برخه Nasopharynx

2. دخولي برخه Oropharynx

3. دحنجري برخه Laryngopharynx

تشرېح

• دپزي برخه Nasopharynx: دبلعوم پورتنې برخه ده چي Choanae څخه تر

Soft plate دايو نابشپړ او منظم نسج دي چي Nasopharynx او Oropharynx دواړه سره

بيلوي. ددغه پليټ په خلفي برخه کي انگورداني ته ورته يوه بارزه راوتلي جوړښت د Uvula پنامه

شتون لري. ددي پليټ دنده داده چي د بلع شوي مواد نه پرېږدي چي Nasopharynx اودپوزي

جوف ته داخل شي بېکاره او فاضله مواد د Nasopharynx څخه تيرېږي او ستوني ته راځي چي

لدي وروسته بلع او يا داچه بهر ته خارجېږي Nasopharynx ته دمنځني غوړ څخه دوه

Auditory تيوبونه راخلاصېږي کوم چي دمنځني غوړ او اتموسفير ترمنځ فشار يو شان کوي.

د **Nasopharynx** په خلفي سطحه کې یو تانسِل د **Pharyngeal Tonsil** یا **Adenoid** په نامه

شتون لري چې دا تانسِل دانتان په مقابل کې د بدن څخه دفاع کوي.

دبلعوم **Oropharynx** برخه د **Uvula** څخه تر **Epiglottis** پورې غزیدلې دي چې دخولې جوف سره د

Fauces پواسطه ارتباط لري نو ځکه هوا، مایعات او غذا ورڅخه تیرېږي. داچې دا برخه د مخاط لرونکې

Stratified Squamous Epithelium پواسطه پوښل شوي نوځکه ددې موادو د تیریدو په وخت کې نه

درول کېږي. د یادونې وړده چې دوه عدده نور تانسِلونه د **Lingual** او **Palatine** پنامه د **Fauces** سره

نژدې شتون لري. دبلعوم **Laryngopharynx** برخه د **Epiglottis** دڅوکي څخه شروع او د ښکتنې برخې

په قدام کې د مري سره او په خلف کې دحنجري سره وصلېږي چه بلعوم دا برخه هم د **Oropharynx** پشان د

مخاط لرونکې **Stratified Squamous Epithelium** پواسطه پوښل شوي ده. شکل ۳



(3) حنجره (Larynx)


حنجره دبلعوم اوشن ترمنځ ځاي لري. دحنجرې غضروفې چوکاټ د دريو طاق اودريو جفتو چه شپړدانی کيږي څخه جوړ شويدي چه ټول نهه غضروفې پوښ لرونکي دي. چه تر ټولو لوي غضروف ئي د **Thyroid** څخه عبارت ده. په طاق ډول پروت دي اودا غضروف د **Adam's Apple** پنامه هم ياديږي.

دوهم طاق غضروف د **Cricoid Cartilage** څخه عبارت دي کوم چي د حنجري قاعده جوړه وي او دحنجرې پاتی ټول غضروفونه ددي غضروف له پاسه واقع دي.

دريم طاق غضروف **Epiglottis Cartilage** څخه عبارت دي. دا غضروف د **Thyroid** غضروف دپاسه واقع او دژبي خواته امتداد لري د جوړښت له پلوه دنورو غضروفونو سره توپير لري پدي معني چي دا غضروف د **Hyaline Cartilage** پرځاي **Elastic Cartilage** لري.

او غضروف دنده داده چي دبلع دعمل په وخت کي حنجره بندوي اونه پريږدي چي مواد ورته داخل شي.

لومړی جفت غضروف چي د قاشوعې پشان شکل لري علوي او خلفي برخو کي د **Cricoid Cartilage** سره وصل دي د **Arthynoid Cartilage** پنامه ياديږي. اوهغه غضروف چي په علوي کي د **Arthynoid** غضروف سره څوکو سره وصل دي او دښکر پشان شکل لري د **Corniculate** غضروف پنامه ياديږي او دريمه جوړه غضروف **Cuneiform** غضروف څخه عبارت دي چي د **Corniculate** غضروف په قدام کي په **Mucous Membrane** کي امتداد لري. شکل ۴



شکل ۴

دوه جوړه رباطونه (Ligaments) د Arthyroid غضروف دقدامي برخي څخه نيولي تر خلفي برخي د

Thyroid غضروف پوري غزیدلي دي، چي علوي رباط يي ديوې مخاطي غشا پواسطه چي د Vestibular

Folds اويا False Vocal Cords پنامه ياديږي پوښل شوي دي، دا Vestibular Folds کله چي دبلع

عمل صورت نيسي نو حنجره بندوي اونه پرېږدي چي غذا او مايعات حنجري ته داخل شي او همدارنگه دسږو

څخه دهوا خارجيدل هم يوڅه وخت دځنډسره مخامخوي. شکل ۵

اوسفلي رباط يي هم دمخاطي غشا پواسطه احاطه شوي دي چي دامخاطی غشاد Vocal Folds يا True

Vocal Cords په نامه ياديږي. Vocal Folds او د دوی ترمنځ سوريک مجموعاً د Glottis په نامه ياديږي.

Vestibular Folds او Vocal Folds داوړه د Stratified Squamous Epithelium پواسطه او

دحنجري نوري برخي د Pseudostratified Squamous Epithelium پواسطه پوښل شوي دي.

↩ د يادوني وړده چي هرکله Vocal Folds په التهاب اخته شي نو دغه حالت ته Laryngitis وايي.

❖ دحنجری دندی او فزيولوژي

✓ د Thyroid او Cricoid غصروفونه دواړه دهوا دتيريدولو لپاره يو خلاصه لاره جوړوي.

✓ EpiGlottis او Vestibular Folds دواړه حنجري ته دبلع شوو موادو له داخلیدو څخه مخنيوي

کوي.

✓ Vocal Folds د اواز د توليد لمرني منبع ده.

• دا چې Vocal Folds په کوم مکانيزم سره اواز توليدوي په لاندي ډول تري يادونه کوو:

➤ هغه هوا چې د Vocal Folds څخه تيريږي د Vocal Folds د اهتزاز سبب گرځي او ددي اهتزاز

په نتيجه کي اواز توليديږي. همدارنگه هغه هوا چې د Vocal Folds څخه تيريږي د اهتزاز

امپليتود هم تعينوي نوکه چيرته زياته هوا تيره شي نو امپليتود به لوړ او اواز به هم لوړ وي او برعکس

که چيرته داهتزاز امپليتود وړوکی وي نو اواز به هم ټيټ وي. د اواز زير او بم کيدل د اهتزاز





دفریکونسي پوري اړه لري که چيرته داهتزاز فریکونسي لوړه وي نو Pitch داهتزاز دغو. اوفريکونسي

لوړوالي به هم لوړ وي او اواز به زير نوعيت ولري، خوکه فریکونسي ټيټه وي نو Pitch به يي هم

ټيټ وي او اواز به بم نوعيت ولري، همدارنگه د Vocal Folds داهتزاز کونکومساقو تغير هم د

اهتزاز په فريکونسي باندې اغيزه لري که چيرته د **Vocal Folds** قدامي برخه اهتزاز وکړي نو لوړ **Pitch** لرونکي اواز به توليد شي نو اوس چي د **Vocal Folds** هر څومره ښکته برخه په اهتزاز راځي نو په هماغه اندازه به اواز **Pitch** کم وي. داچي د نارينو **Vocal Folds** نسبت ښځوته اوږد دي نوځکه دکمي فريکونسي کم **Pitch** لرونکي اواز لري. هرکله چي اواز د **Vocal Folds** څخه راتير شي نو دا اواز بيا د ژبي، شونډو، غاښونو او نورو جوړښتونو پواسطه تغيرپکي راځي (**Modified** کيږي).

- همدارنگه غضروفونه د **Vocal Folds** دطول په تغيرسره په غيرمستقيم ډول د فريکونسي په ټاکنې باندې اغيزه لري، کله چي يوازي دتنفس عمل صورت ونيسي نو **Arthynoid** غضروفونه وحشي خواته تدور کوي او **Vocal Folds** يوله بل څخه ليري کيږي او په نتيجه کي زياته هوا ورڅخه تيريږي، خو که چيرته همدا غضروفونه انسي خواته تدور وکړي نو **Vocal Folds** يو بل سره نژدي کيږي او کمه هوا د **Vocal Folds** څخه تيريږي د غضروفونو قدامي اوخلفي حرکتونه هم د **Vocal Folds** په کشش او طول باندې اغيزه کوي. شکل ۵
- د يادوني وړده که چيرته يو شخص حنجره د سرطان (**Carcinoma**) له وجي ليري کړاي شي نو بيا اواز دمري د اهتزاز پواسطه توليدلای شي.



شکل ۵


(4) شزن، وچه غاړه، وچه مری (Trachea)

شزن یو غشايي تیوب دی چې د **Dense Regular Connective Tissue** او دملسا عضلاتو څخه جوړ شوي دي دا جوړښت د 15-20 عددې پوري دانگلسي د C توري ته ورته غصروفونوپواسطه تقویه کيږي. داغصروفونه دشزن قدامي او وحشي جدارونوکي موقعیت لري او د هوا د تیریدلو لپاره یې یو خلاصه لاره جوړه کړې ده، چه ددغه غصروفونو داخلي سطحه مخاطي غشا پواسطه پوښل شوي. د شزن خلفي جدار چې غصروف نلري بلکي **Elastic Ligamentous Membrane** او د **Trachealis Muscles** په نامه یو بڼډل دملسا عضلاتو لري

شکل ۶

ددې عضلاتو دتقلص په نتیجه کي دشزن قطر کمیږي چې دتوخي په وخت کي دا عمل د هوا د ډیري چټکي تیریدني سبب گرځي او د بلعوم څخه مخاط او ناغوښتي مواد ليري کوي.

دشزن داخلي قطر 12 mm او طول یې 10-12 cm پوري دي چې د حنجري څخه ترپنځمي صدري فقري پوري غزیدلي دي. شزن په سفلي برخه کي د دوو کوچنیو تیوبونو باندي چې **Primary Bronchi** نومېږي ویشل شوي دي. د شزن ترټولو ښکتنی غصروف یوتیفه ماننده جوړښت جوړوي چې د **Carina** په نامه یادېږي، چې دا جوړښت د **Primary Bronchi** فوهي یوله بل څخه بیلوي. د بلي خوا **Carina** د راډیولوژي له مخي هم خاص اهمیت څخه برخمنه ساحه ده او همدارنگه دمیخانیکي تنبي په مقابل کي ډیر حساس جوړښت دی پدې معني چې هرکله بیگانه مواد دغه ساحي ته ورسېږي نو د توخي یو قوي عکسه تولیدېږي او تر هغه دوام کوي ترڅو دغه بیگانه مواد له **Carina** څخه ليري شي.



شکل ۶

Tracheobronchial Tree (5)

لکه څنگه مو چي مخي ووايل چي شرن په سفلي برخه کي په دوو برخو ویشل کیږي چي هره برخه یي د Primary Bronchi په نامه یادېږي. دا Primary Bronchi بیا په خپل وار سره په مسلسل ډول په ځانگو ویشل کیږي ترډي چي دا تیوبونه دومره واړه شي چي د مایکروسکوپ پرته یي لیدل شوني نه وي. د شرن څخه تر اخره پوري ټوله تنفسي لاره د Tracheobronchial Tree پنامه یادېږي.

او Tracheobronchial Tree د فزیولوژي له نظره په دوه برخو ویشل کیږي:

(1) Conducting Zone هدایتی ساحه

(2) Respiratory Zone تنفسي ساحه ده.

❖ هدایتی ساحه (Conducting Zone):

هدایتی ساحه د شرن څخه شروع او تر Terminal Bronchioles پوري دوام لري چي پدې لړکي شرن 16 ځلي په ځانگو ویشل کیږي. دا هدایتی ساحه د هوا تیریدلو لپاره لاره جوړه وي، داچي دا ساحه د اپیتیل نسج پواسطه پوښل شوي ده نوځکه امکان تر حده پري ناغوبستی ذري ليري کوي اوبیا یي Tracheobronchial Tree څخه بهر اوباسي.

☆ د یادونې وړده چې ځني ډيري وړي ذري چي قطري له یو مایکرون څخه کم وي د سږو تر جدار پوري ځان رسوي او هلته له سنجي مایع (Pleural Fluid) سره نښلي او مخکي نشي تلای


☆ خو هغه ذري چي د 0.5μ څخه هم کم قطر لري د سږو په جوفونو کي له هوا سره گډېږي چي بیرته د ساه ویستلو (Expiration) په وخت کي بهرته وځي.

☆ داچي د سږو د ذرو جسامت د 0.3μ سره سمون خوري نو د تنفسي لاري په یوي برخه کي هم نه بندېږي او ځان سږو ته رسوي چي له بده مرغه په سږو کي د دریمي برخي نه زیات یي د Diffusion د عملیي په اساس تر سب کوي او پاتي دوه برخي یي بیا د ضفيري هوا (Expired Air) سره یوځای بیرته بهرته اوځي.

په سږو کې دا ترسب شوي ذري په زیاته اندازه د **Alveolar Macrophage** پواسطه له منځه ځي او پاتې برخه یې د سږود لمفاوي چینل پواسطه له ساحې څخه وړل کیږي او هغه څه چې ددې ټولو میخانیکونو څخه بیا هم پاتې شول نو هغه بیا د **Alveolar Septum** په برخه کې د فبروزي نسج درامنځته کیدو سبب ګرځي چې دا بیا په یو دومداره تضعف باندې بدلېږي.

✓ د **Tracheobronchial Tree** جوړښت او دندې:

شڼ په ښي او چپ **Primary Bronchi** باندې کوم چې په سږو کې غزیدلي دي ویشل کیږي، دښي خوا سږي **Primary Bronchi** لند او پراخه دي خو د چپ خوا سږي **Primary Bronchi** بیا اوږده او نري وي نو ځکه دچپ سږي په نسبت په ښي سږي کې زیات مرضونه تر سترگو کیږي. شکل ۷



لکه څنگه چې په پورته شکل کې گورو چې ښي خواکي **Primary Bronchi** په دریو او چپ سږي کې په دوو **Secondary (Lobar) Bronchi** باندې ویشل شوي دي، چې دا **Lobar Bronchi** بیا هریو یې په **Tertiary (Segmental) Bronchi** باندې ویشل کېږي چې په ځانگو باندې د ویشني دا لږي همداسې دوام کوي ترڅو چې قطر یې **1 mm** څخه هم کم شي چې دا بیا د **Bronchioles** پنامه یادېږي، **Bronchioles** بیا هم په ځانگو ویشل کېږي او **Terminal Bronchioles** رامنځته کوي.

هرڅومره چې د هوا د انتقال لاره کوچنۍ کېږي په هماغه اندازه ددې لارو په جدارونو په جوړښت کې هم تغیر او بدلون رامنځته کېږي.

څومره چې د **Bronchi** قطر کمېږي په هماغه اندازه دغضروفونو مقدار کم او دملسا عضلاتو مقدار زیاتېږي ان تردې چې په **Terminal Bronchioles** په جدار کې غضروف هیڅ نه تر سترگو کېږي او په جدار کې یې ملسا عضلاتو مقدار په زیاته اندازه ترسترگو کېږي.




په **Bronchi** او **Bronchioles** کې دملسا عضلاتو استرخا او تقلص په نتیجه کې د دویو په قطر کې تغیر منځته راځي، دمثال په ډول د تمرین په وخت کې د زیاتې هوا تیریدو ته ضرورت وي نو دا عضلات استرخا کوي او دتنفسي-لاري قطر لویېږي، خو دساه بندې په حمل (**Asthma attack**) کې بیا د **Terminal Bronchioles** ملسا عضلات تقلص کوي چې دا ددغو **Bronchioles** د قطر د کمیدو سبب ګرځي او په نتیجه کې د هوا په مقابل کې مقاومت زیات او د هوا مقدار بیخي کمېږي او حتی د مرګ سبب هم ګرځي.

❖ تنفسي ساحه Respiratory Zone:

د **Trachio bronchial Tree** دوهمه ساحه د تنفسي- ساحي پنامه يادېږي کوم چې د **Terminal Bronchioles** څخه شروع او تر هوایي کڅوړو (**Alveoli**) پوري چې دهوا او ويني ترمنځ د غازونو تبادلي ځای دي رسېږي، چې تر هوایي کڅوړو پوري په تنفسي ساحه کې په ځانګړو ویشنه صورت نيسي، **Terminal Bronchioles** په ځانګړو ویشل کېږي او **Respiratory Bronchioles** جوړوي کوم چې په کمه اندازه د غازونو د تبادلې وړتیا لري او دا ځکه چې لدې سره د وصلو هوایي کڅوړو تعداد کم دي، لدې وروسته **Respiratory Bronchioles** په سنخي مجرا (**Alveolar Duct**) باندې ویشل کېږي چې هره سنخي مجرا بیا د دوو یا دریو سنخي کڅوړو (**Alveolar Sac**) لرونکي ده چې بالاخره بیا هر **Alveolar Sac** د دوه یا زیاتو هوایي کڅوړو (**Alveoli**) لرونکي دي.

هره هوایي کڅوړه د داسې نسج پواسطه احاطه شوي چې الاستیکي الیاف لري کوم چې د ساه اخستني او یا د ساه ویستلو په وخت کې هوایي کڅوړې ته ددې وړتیا ورکوي چې پراخه او یا تنګه شي. سږي خپل ذات کې ډیر الاستیکي خاصیت لري، هرکله چې دویو د هوا څخه ډکي شي نو پراخېږي او دهواد ویستلو وروسته بیرته خپل اصلي شکل ته راګرځي که چیرته سږي دهوا څخه ډکي هم نه وي بیا هم دومره هوا لري چې دویو ته اسنځې خاصیت وروبښي. **Primary Bronchioles** د ملسا عضلاتو د بندېدلو سره یو ځای د کولاجن او الاستیک منظم نسجونو لرونکي هم دي. هغه اپیتلیوم چې په **Respiratory Bronchioles** کې شتون لري د **Simple Cuboidal Epithelium** په شکل او هغه چې په هوایي مجراؤ (**Alveolar Duct**) او هوایي کڅوړو (**Alveoli**) کې شتون لري د **Simple Squamous Epithelium** په شکل سره دي. که څه په تنفسي ساحه کې سیلیا نشته خو بیا هم ناخوښي مواد لکه څنګه مو چې مخکې وایېل د **Macrophages** او لمفوي جینلونو پواسطه د ساحي څخه ليري کېږي. شکل ۸


شکل ۸



په دواړو سږو کې تقریباً 300 میلیونو پوري هوايي کڅوړي شتون لري چې په اوسط ډول يې قطر تر 250μ پوري رسېږي. د هوايي کڅوړو جدارونه ډیر نري دي چې له دوه ډوله حجرو څخه شوي دي، یو یی **Type I Pneumocytes** دي کوم چې د **Epithelium Squamous** حجرو په ډله کې راځي او د هوايي کڅوړو جدار تر 90% پوري د همدې حجرو څخه جوړ شويدي او بل ډول حجري یی د **Type II Pneumocytes** پنامه یادېږي کوم چې معکبي شکل لري او د **Surfactant** پنامه ماده افرازوي چې دا ماده د ساه اخستلو په وخت کې د هوايي کڅوړو پراخیدل اسانوي.

په هغه ځای کې چې د هوا او وینې ترمنځ د غازونو تبادله صورت نیسي پدغه ځای کې د سږو تنفسي غشا (**Respiratory Membrane**) هم شتون لري چې دا غشا د هوايي کڅوړو پواسطه جوړه شوي چې ریوي شعریه رگونه (**Pulmonary Capillaries**) یی رانغاړلي دي. دا غشا ډیره نري ده چې د غازونو تبادلې کې مرسته کوي اولاندي جوړښتونو لرونکي ده. شکل ۹

- د مایعاتو هغه نري طبقه چې هوايي کڅوړي یې پوښلي دي.
- **Alveoli Epithelium** چې د **Simple Squamous Epithelium** څخه جوړ شوي دي.
- **Alveolar Epithelium** قاعدوي غشا.
- نري بین البیني خلا (**Interstitial Space**).
- **Capillary Endothelium** قاعدوي غشا.
- **Capillary Endothelium** چې د **Simple Squamous Epithelium** څخه جوړ شوي دي.



شکل ۹

سږي Lungs

سږي چې د تنفس اساسي عضوي دي چې د حجم له نظره په بدن کې تر ټولو نور غړو لوي غړي شميرل کېږي .

هره سږه مخروطي شکل لرونکي ده چې قاعده يې په حجاب عجز (Diaphragm) او څوکه يې د Clavicle

هډوکي څخه تقريباً 2.5 cm پورته ده. چپه سږه چې 560 gr وزن لري د ښي سږي په نسبت کوچني ده

پداسي حال کې چې ښي سږه تر 620 gr پوري وزن لري.

Hilum د سږي انسي سطحه ده چې لدې سطحي څخه يوزيات شمير جوړښتونه لکه Primary Bronchi،

دويني او لمفاوي رگونه او اعصاب سږو ته داخل او هم د سږو څخه خارجېږي. ټول جوړښتونه چې سږو ته د

Hilum له لارې داخلېږي مجموعاً د سږو د جذر (Lung's Root) پنامه ياديږي.

د ښي خوا سږي د دريو او د چپ خوا سږي د دوو لوبونو (Lobes) باندې ويشل شوي چې دا لوبونه يو له بل

څخه د سږي په سطحه د يو ژور او متبارز درز (Fissure) پواسطه بيل شوي دي شکل ۱۰

او هر Lobe د Lobar Bronchioles پواسطه تقويه کېږي، هر Lobe په خپل وار په

Bronchopulmonary Segments باندې چې د Segmental Bronchioles لرونکي دي ويشل شوي

دي، نو پدې حساب سره ښي سږي کې 10 عدده او په چپ سږي کې 9 عدده Bronchopulmonary

Segments شتون لري، چې هر يو Bronchopulmonary Segment بيا د منضم نسج پواسطه په


څو برخو ويشل شوي دي. که چيرته په انفرادي توگه کوم Bronchopulmonary Segment د جراحي

عمل په نتيجه کې ليري کړاي شي نو په پاتي سږي به بيا هم سالمې وي دا ځکه چې هيڅ يو لوي رگ او


Bronchi لدې منضم نسج څخه ندي تيري شوي.

Bronchopulmonary Segments بيا په خپل وار د هغه جدار پواسطه چې په بشپړ ډول د منضم نسج

جوړښت نلري په Lobules باندې ويشل کېږي چې هر Lobules د Bronchioles پواسطه تقويه کېږي.



شکل ۱۰




صدری جدار او تنفسي عضلي

صدری جدار د صدری فقره، پښتو، Costal Cartilages، سترونوم هډوکي او یو تعداد عضلو څخه تشکیل شوي دي او هغه جوف چې د صدری جدار او دیاپراگم ترمنځ شتون لري. د صدری جوف (Pleural Cavity) پنامه یادېږي، چې دا جوف د بطن څخه د Diaphragm پواسطه بیل شوي دي Diaphragm. دنورو اسکليتي عضلو سره یو ځای د تنفس سرته رسولو مسولیت په غاړه لري شکل ۱۱


هغه عضلي چې په ساه اخستلو (Inspiration) کې رول لري عبارت دي له Diaphragm, External Intercostal Muscles، Pectoralis Minor Muscles او Scalene Muscles څخه، چې لدې جملې څخه د ساه اخستلو په وخت کې دیاپراگم د تقلص په وخت کې تقریباً ۲/۳ برخه پراخېږي او د Ext Intercostal، Pectoralis Minor او Scalene عضلو د تقلص په نتیجه کې پښتې اوچېږي او صدری جوف پراخوالي سبب گرځي.

Diaphragm چې د گومبزي پشان شکل لري قاعده یې د Inner Circumference سره وصله ده او پورتنی برخه یې د منضم نسج هموار شپټ لرونکې ده چې داسپټ د Central Tendon پنامه یادېږي، په نورمال او عادي ساه اخستنه کې د Diaphragm په شکل کې ډیر کم تغیر تر سترگو کېږي پدې معنی چې د بطني عضلو د استرخا په نتیجه کې د بطن غړي د Diaphragm څخه لیري ځي او دا ددې سبب گرځي چې Central Tendon ښکته شي، خو که چیرته د ساه اخستلو شدت ډیر زیات شي نو بیا د Central Tendon ډیر زیات ښکته کیدل د بطني غړو پواسطه نهې کېږي.

برعلاوه لدې چې ښکتنې پښتې د یو شمیر نورو عضلاتو پواسطه هم پورته ځي د Diaphragm د مسلسل تقلص هم ددې سبب گرځي چې Diaphragm هموار شکل اختیار او ښکتنې پښتې او چټي کړي. نو هرکله چې پښتې اوچتي شوي نو د Costal Cartilage پواسطه د پښتو وحشي حرکت هم صورت نیسي او په نتیجه کې صدری جوف جنبي پراخوالي هم پیدا کوي. شکل ۱۱



شکل ۱۱



پلورا Pleura

که څه هم سږي په صدري جوف کې قرار لري خو که لږ څه بڼه زیر شوو نو جوته به شي چې هر سږي بیا په یو

بل جوف کې چې **Pleural Serous Membranes** څخه جوړ او د **Pleural Cavity** پنامه یادېږي ځای

پر ځای شوي دي. شکل ۱۲

Mediastinum د **Midline** هغه ساحه ده چې د زړه، شږن، مري او نورو پیوسته جوړښتونو پواسطه جوړ

شوی ده. او یا په بل عبارت هغه ساحه ده چې د سږو د انسي سطحو ترمنځ واقع ده، چې دغه **Mediastinum**

پواسطه د هري سږي پلورال جوف یو له بل څخه بیل شوي دي. پلورال جوف د دوو غشاو پواسطه احاطه شوي

دي چې یوه یې جداري پلورا (**Parietal Pleura**) پنامه او بل یې د حشوي پلورا (**Visceral Pleura**) پنامه

یادېږي. جداري پلورا کوم چې د صدري جدار داخلي سطحه، د حجاب عجز علوي برخه او **Mediastinum**

احاطه کوي د **Hilum** په برخه کې د حشوي پلورا سره چې د سږو سطحه یې احاطه کړې ده اړیکه لري.

☆ د پلورا جوف د **Pleural Fluid** پنامه دیوي مایع پواسطه چې د حشوي پلورا څخه افرازیږي ډک شوي دي

او دا مایع لاندې درې دندې ترسره کوي.

1. دا مایع د ښویه کونکي مادي (**Lubricant**) پشان عمل کوي یعنې کله چې د سږو او صدري جوف

شکل تغیر کوي نو نه پریږدي چې جداري پلورا او حشوي پلورا یو له بل سره وموښل شي.



2. دا مایع حشوي او جداري پلورا یو له بل سره ټینګي ساتي او نه پریږدي چې د صدري جوف او سږو د

تغیر شکل په وخت کې یو له بل څخه جدا شي.

3. ددې لپاره چې سږي باید کولپس نشي نو **4 mmHg**-فشار ته ضرورت دي خو له نیکه مرغه د پلورا

داخلي فشار **7 mmHg**-دي، چې دا ډیر منفي فشار ددې باعث ګرځي چې نارمل سږي د پلورا

خوانه کش شوي شکل باندې پاتې شي.



شکل ۱۲

د سږو اروا Lung's Blood Supply

سږو ته دوه ډوله وینه ورځي یوهغه وینه ده چې **Deoxygenated Blood** یې بولی چې د ښي بطن څخه په **Pulmonary Artery** کې ورځي او په سږو کې په **Oxygenated Blood** باندې بدلیږي او بیرته د **Pulmonary Vein** له لارې چپ اړین ته راگرځي، چې دا ډول د وینې جریان د سږو دنده بلل کیږي او بل هغه ډول وینه سږو ته ورځي چې ددې دندې د سر ته رسولو لپاره یې استعمالوي چې دا بیا **Oxygenated** وینه ده او په سږو کې په **Deoxygenated** وینې باندې بدلیږي، دا وینه د **Bronchial Vein** او **Azygos Vein** له لارې بیرته زړه ته رادرمي.

❖ دریوي رگونو خصوصیات:

- (a) ریوي شریان د **Systemic Aorta** په نسبت نري جدار لري.
- (b) ریوي رگونه ډیر الاستیکي خاصیت لري.
- (c) په ریوي رگونو کې ملسا عضلاتو کم انکشاف کړي دي.
- (d) په **Arterioles** کې ملسا عضلي الیاف کم ترسترگو کیږي.
- (e) ریوي شعریه رگونه (**Pulmonary Capillaries**) د **Systemic Capillaries** په نسبت لوي دي.

❖ دریوي وینې جریان کنترول:

سږو ته د وینې جریان کنترول د لاندې فکتورونو پورې اړه لري:

- (a) قلبي دهرانه (**Cardiac Output**)
- (b) وعایوي مقاومت (**Vascular Resistance**)
- (c) عصبي فکتورونه (**Nervous Factors**)
- (d) کیمیاوي فکتورونه (**Chemical Factors**)

لمفاوي تقويه Lymphatic Supply

سږو ته دوه ډوله لمفاوي رگونه تللي دي چي يو يي سطحي لمفاوي رگونه (Superficial Lymphatic Vessels) دي کوم تر حشوي پلورا پوري رسېږي او دسږو سطحي نسج او حشوي پلورا څخه لمفاوي مايع راوړي، او بل ډول يي رانتقالوي، چي دا دواړه ډوله لمفاوي رگونه د Hilum له لاري د سږو څخه خارجېږي. Phagocytic حجري د کاربن ذري او نور ناغوبستي مواد د تنفس شوي هوا څخه راټولوي او لمفاوي رگونه ته يي انتقالوي. خو له بده مرغه همدا لمفاوي رگونه دي چي له سږو څخه سرطانې حجري د بدن نورو برخو ته انتقالوي. په زړو خلکو کې خصوصاً هغه کسانو کې چي سگريټ څکوي او يا په گرد او غبار کې ژوند تير کړاي، وي نو د کاربن د ذراتو د تجمع په اثر يي د سږو رنگ د خاکستري څخه تر تور رنگ پوري تغير کوي.

ماخذونه

1. Anatomy of Urogenital & Respiratory Systems Dr. M Nasir Nasraty
2. Physiology of Respiratory System Dr. Ihsanullah Ihsan
3. General Anatomy Pashto& English Spinghar Medical Faculty
4. Physiology of Respiratory System Dr. Hamid
5. The Respiratory System & Heart Rheumatic Diseases Dr. sypullah Hade

Get more e-books from www.ketabton.com
Ketabton.com: The Digital Library