



د افغانستان اسلامي جمهوریت
د عامې روغتیا وزارت
د فارمسی د چارو لوی ریاست



د درملنې ملي معیاري لارښود د لومړنیو روغتیايي خدمتونو مرکز نو لپاره

د ۱۳۹۲ لمریز کال د غبرگولي میاشت

دغه لارښود دافغانستان د اسلامي جمهوريت د عامي روغتيا وزارت له خوا د امريکا د متحده ايالاتو د نړيوالي پرمختيايي پروگرام په مالي او تخنيکي مرسته د -00-00532-11-00-306 A- تړون په بنسټ چمتو او چاپ شوي. پدی لارښودکی نظريات د لسټ شوی ليکوالانو اړوند دی او د امريکا د متحده ايالاتو نظريات نه منعکسوي.

دفارمسي د پياوړتيا سيستمونه(SPS)په اړه:

دفارمسي د پياوړتيا سيستمونه کوبښن کوی تر څوکارۍ ظرفيتونه د موثر مدیریت لپاره د سيستم په ټولواړ خونوکی او د فارمسي خدمتونه په هغه هيوادونو کی چه مخ په پرمختگ وی لوړوالی ورکوی. SPS د فارمسي سکټور د ادارۍ د ښه والی، د درملود مدیریت او د مالی ميکانيزمونو پياوړي کول او د میکروب ضد درملو په مقابل کی د مقاومت شتون د مسایلو په گډون، درملوته د لاس رسی زیاتوالی او د درملو څخه په مناسبه توگه د گټی اخيستنې باندی تمرکزیت لری.

د مطالبو لړلیک

مطالب	مخ
پیلیزه.....	ix.....
سرریزه.....	xi.....
د منځې څرگندونه.....	xiii.....
دا لارښود څه ډول و کارول شی؟.....	xvii.....
مخففات او لنډیزونه.....	xix.....
د طبي اصطلاحاتو د الفباء لړلیک.....	xxi.....
لومړۍ څپرکۍ: د خولې د جوف او د غاښونو ناروغۍ.....	۲۹.....
دویم څپرکۍ: د هاضمې د سیستم ناروغۍ.....	۳۳.....
۲.۱ نس ناستی او ډیپهایدریشن.....	۳۳.....
۲.۱.۱ حاد نس ناستی، له وینې پرته، په هغو ماشومانو کې چې تر پنځو کلونو عمر لری.....	۳۳.....
۲.۱.۲ حاد نس ناستی، له وینې پرته، له پنځو کلونو څخه په لویو ماشومانو او لویانو کې.....	۳۸.....
۲.۱.۳ مزمن نس ناستی، له وینې پرته، په هغو ماشومانو کې چې تر پنځو کلونو عمر لري.....	۳۹.....
۲.۱.۴ مزمن نس ناستی، له وینې پرته، له پنځو کلونو څخه په لویو ماشومانو او لویانو کې.....	۴۰.....
۲.۱.۵ د بزاتري (پیچش).....	۴۰.....
۲.۱.۵.۱ باسیلری دیزانتری (باسیلری پیچش).....	۴۱.....
۲.۱.۵.۲ آمیبیک دیزانتری (امیبیک پیچش).....	۴۲.....
۲.۱.۶ جیار دیازس.....	۴۳.....
۲.۱.۷ کولرا.....	۴۴.....
۲.۲ د پیتیک قرحې ناروغي.....	۴۴.....
درېیم څپرکۍ: د تنفسي سیستم ناروغۍ.....	۴۷.....
۳.۱ استما (ساه لنډۍ).....	۴۷.....
۳.۱.۱ په ماشومانو کې استما (ساه لنډۍ).....	۴۷.....
۳.۱.۲ په لویانو کې استما (ساه لنډۍ).....	۴۹.....
۳.۲ والکۍ.....	۵۱.....
۳.۳ په ماشومانو او لویانو کې سینه بغل.....	۵۲.....
۳.۳.۱ په هغو ماشومانو کې سینه بغل چې تر پنځو کلونو عمر لري.....	۵۳.....
۳.۳.۲ له پنځو کلونو څخه په لویو ماشومانو او لویانو کې سینه بغل.....	۵۶.....
۳.۴ د سرو مزمنې انسدادې ناروغۍ یا COPD.....	۵۸.....
څلورم څپرکۍ: د غوړ، پږې او ستوني ناروغۍ.....	۶۱.....
۴.۱ د بهرني غوړ التهاب.....	۶۱.....
۴.۲ د غوړ د منځنۍ برخې حاد التهاب.....	۶۳.....
۴.۲.۱ په هغو ماشومانو کې چې تر پنځو کلونو عمر لري د غوړ د منځنۍ برخې حاد التهاب.....	۶۳.....
۴.۲.۲ له پنځو کلونو څخه په لویو ماشومانو او لویانو کې د غوړ د منځنۍ برخې حاد التهاب.....	۶۵.....
۴.۳ د غوړ د منځنۍ برخې مزمن التهاب.....	۶۵.....

۴.۴	د سینوسونو حاد التهاب	۶۶
۴.۵	د ستوني درد	۶۸
۴.۵.۱	وایرسې فرینجیت	۹۶
۴.۵.۲	باکتریايي تانسلیت	۶۹
۴.۶	رینایټس	۷۰
پنځم څپرکی: د سترگو ناروغۍ	۷۳	
۵.۱	دمنظمې التهاب	۷۳
۵.۲	تراخم	۷۵
۵.۳	گلو کوما	۷۶
شپږم څپرکی: د قلبي وعایي سیستم ناروغۍ	۷۹	
۶.۱	د وینې سیستمیک فشار	۷۹
۶.۱.۱	د وینې مزمن لوړ فشار	۷۹
۶.۱.۶	د لوړ فشار بېرني پېښې	۸۳
۶.۲	د زړه عدم کفایه	۸۴
۶.۳	روماتیکه تبه	۸۶
۶.۴	صدری خناق	۸۸
۶.۵	د میو کارد حاده احتشا	۹۰
اوم څپرکی: د مرکزي عصبي سیستم اختلالات	۹۳	
۷.۱	مرکزي (صرع)	۹۳
۷.۲	انسفالیت او مننژیت	۹۵
اتم څپرکی: د رواني روغتیا ناروغۍ	۹۹	
نهم څپرکی: ولادي او نسایي ناروغۍ	۱۰۵	
۹.۱	امیندواري او د امیدواری پرمهال څارنه	۱۰۵
۹.۲	د امیندواری په دوران کې د وینې کموالی	۱۰۹
۹.۳	د امیندواری پرمهال د وینې لوړ فشار	۱۱۱
۹.۴	د زیږون څخه د مخه وینه راتلل	۱۱۳
۹.۵	زبان (د امیندواری په لومړنیو پړاوونو کې مهلي وینه راتلنه)	۱۱۴
۹.۶	له رحم څخه بهر امیندواری	۱۱۸
۹.۷	له وخت څخه مخکې زیږون	۱۱۹
۹.۸	زیږون او له زیږون څخه وروسته څارنه	۱۲۱
۹.۹	له زیږون څخه وروسته وینه راتلنه	۱۲۴
۹.۱۰	د نویو زیږیدلو ماشومانو څارنه	۱۲۷
۹.۱۱	د شیدو ورکولو پرمهال د ټي د څوکې چاودل	۱۳۳
۹.۱۲	د ټي التهاب او دانۍ	۱۳۵
۹.۱۲.۱	د ټي التهاب	۱۳۵
۹.۱۲.۲	د ټي اېسې (دانۍ)	۱۳۶

۹.۱۳	درد لرونکي مياشتني ناروغي	۱۳۶
۹.۱۴	غیر نورماله مهلي وینه راتلنه	۱۳۸
۹.۱۵	د حیض دریدو له دورې (انقطاع طمث) وروسته د وینې راتلل (Postmenopausal Bleeding)	۱۳۹
۹.۱۶	د حوصلې التهابي ناروغي	۱۴۱
۹.۱۷	شندوالی/عقامت	۱۴۳
لسم څپرکی: تغذیه او د وینې ناروغي		
۱۰.۱	د وینې کموالی	۱۴۵
۱۰.۲	تلاسمیا	۱۴۹
۱۰.۳	خوارځواکي او ناکافي تغذیه	۱۵۰
۱۰.۴	د ویتامین A کموالی	۱۵۳
۱۰.۵	د ویتامین D کموالی او ریکتس	۱۵۶
۱۰.۶	د آیودین کموالی	۱۵۸
یوولسم څپرکی: د پښتورگو او بولي لاری ناروغي		
۱۱.۱	د بولي لارو انتانات	۱۵۹
۱۱.۱.۱	د پیلونفریت حاد التهاب	۱۵۹
۱۱.۱.۲	د مثاني او احليل التهاب	۱۶۰
۱۱.۲	حاد گلوبمرولونفریت	۱۶۲
دولسم څپرکی: د اندوکرین د سیستم اختلالات		
۱۲.۱	د شکر ناروغي	۱۶۵
۱۲.۲	هایپر گلايسيميا او کیتواسیدوزس	۱۶۸
دیارلسم څپرکی: جلدي ناروغي		
۱۳.۱	امپټیگو (مردار دانه)	۱۷۱
۱۳.۲	د جلد فنگسي ناروغي اود Napkin اندفاعات	۱۷۲
۱۳.۳	فرانکل (کوردمبله)	۱۷۴
۱۳.۴	Sycosis	۱۷۵
۱۳.۵	پټ يا ارتیکاریا	۱۷۷
۱۳.۶	Pediculosis يا سپړې کول	۱۷۸
۱۳.۷	اسکا بیس	۱۸۰
څوارلسم څپرکی: عضلي اسکليتي ناروغي		
۱۴.۱	د مفصلونو التهاب او درد	۱۸۳
۱۴.۲	اوستيومیالیت يا د هډوکو التهاب	۱۸۶
پنځلسم څپرکی: انتاني، پرازیتي او د چينجیو ناروغي		
۱۵.۱	توره ټوخله (Pertusis)	۱۸۹
۱۵.۲	دیفتري يا خراسک	۱۹۰
۱۵.۳	ټیتانوس	۱۹۱

۱۹۴	د ماشومانو ګوزې يا پولیو	۱۵.۴
۱۹۵	شری	۱۵.۵
۱۹۸	سپس	۱۵.۶
۱۹۹	ملاریا	۱۵.۷
۲۰۱	د لومړۍ کرښې درملنه	۱۵.۷.۱
۲۰۵	د دویمې کرښې درملنه	۱۵.۷.۲
۲۰۶	دځگر التهاب	۱۵.۸
۲۰۸	وچکۍ یا محرقه	۱۵.۹
۲۱۰	نری رنځ	۱۵.۱۰
۲۱۷	کوي	۱۵.۱۱
۲۱۸	لېوني سپي ناروغي	۱۵.۱۲
۲۲۰	لشمانیا یا کالډانه	۱۵.۱۳
۲۲۱	اسکریس (round-worm)	۱۵.۱۴
۲۲۲	تینا ساجیناتا (کډو دانه چینجی) او هایمینولیس - نانا	۱۵.۱۵
۲۲۳	انتراکس (تور پپ)	۱۵.۱۶
۲۲۴	بروسیلوزس	۱۵.۱۷
۲۲۶	Mumps (بغټ)	۱۵.۱۸
۲۲۷	مقاربتې ساري ناروغۍ	۱۵.۱۹
۲۳۱	شپاړسم څپرکي: بیرني پېښې او ضربه (تراوما)	
۲۳۱	د سړي حاده اذیمه	۱۶.۱
۲۳۲	د نس حاد درد	۱۶.۲
۲۳۶	د پریټوان حاد التهاب	۱۶.۲.۱
۲۳۷	د اپنډکس حاد التهاب	۱۶.۲.۲
۲۳۷	د صفرا کڅوړې حاد التهاب	۱۶.۲.۳
۲۳۸	د پیټیک قرځې سوری کیدل	۱۶.۲.۴
۲۳۸	د کولمو بندښت	۱۶.۲.۵
۲۳۹	د جنین د بیخایه غرس کیدو له امله د رحم څیرې کیدل یا Ruptured Ectopic Gestation	۱۶.۲.۶
۲۴۰	د حالب کلنځ	۱۶.۲.۷
۲۴۰	د حیواناتو یا انسان په وسیله خوله لگول	۱۶.۳
۲۴۵	د حشراتو چیچل یا نیش وهل	۱۶.۴
۲۴۵	د غومبې چیچل	۱۶.۴.۱
۲۴۶	د لږم چیچل	۱۶.۴.۲
۲۴۷	د غونډل چیچل	۱۶.۴.۳
۲۴۹	د مار چیچل	۱۶.۵
۲۵۰	سوزیدنې	۱۶.۱۶
۲۵۵	د سترگو ټپونه (ترضیضات، اجنبي اجسام او سوزیدل)	۱۶.۷
۲۵۸	د وینې د گلوکوز د کچې ټیډل	۱۶.۸
۲۶۱	شاک	۱۶.۹
۲۶۸	د هډوکو بې خایه کیدل	۱۶.۱۰
۲۶۹	ابسي (دانی)	۱۶.۱۱

۱۶.۱۲	مسمومیتونه	۲۷۱
اوولسم څپرکی: اعراض او نښې	۲۸۱	
۱۷.۱	د تېې له امله اختلاج	۲۸۱
۱۷.۲	توخی	۲۸۳
۱۷.۳	تبه	۲۸۵
۱۷.۴	د سر درد او نیم سری	۲۸۸
۱۷.۴.۱	د سر درد	۲۸۸
۱۷.۴.۲	میګرن (نیم سری)	۲۸۹
۱۷.۵	زیرې (یرقان)	۲۹۰
۱۷.۶	د سینې درد	۲۹۲
۱۷.۷	قبضیت	۲۹۴
۱۷.۸	زړه بدوالی او کانګې	۲۹۶
اتلسم څپرکی: د ولادتونو ترمنځ د وقفې لپاره کورنی تنظیم	۲۹۹	
۱۸.۱	د کورني پلان جوړونې د تګلارو څخه د ګټې اخیستنې چمتووالی	۲۹۹
۱۸.۲	په افغانستان کې د کورني تنظیم موجودې لارې	۳۰۲
۱۸.۲.۱	کانډم (پوښ)	۳۰۲
۱۸.۲.۲	د خولې له لارې د امیندواری ضد ګولی (د استروجن او پروجسترون ترکیب)	۳۰۳
۱۸.۲.۳	پروجسترون لرونکې ګولی	۳۰۵
۱۸.۲.۴	زرقې پروجسترون	۳۰۶
۱۸.۲.۵	لوپ یا IUD	۳۰۸
۱۸.۲.۶	د شیدو ورکولو پرمهال امینوري تګلاره	۳۰۸
۱۸.۲.۷	د شنډوالي د پوهاوي میتودونه	۳۰۹
۱۸.۲.۸	عزل یا د احتیاط میتود	۳۱۰
۱۸.۲.۹	سپرم وژونکي	۳۱۱
نولسم څپرکی: واکسینونه (معافیت)	۳۱۳	
شلم څپرکی: د HIV انتان او AIDS	۳۱۷	
الف مل پانه: د درملو دوزونه او رژیمونه	۳۱۹	
ب مل پانه: د نوي زیږیدلی ماشوم بیا احیا	۳۳۹	
ج مل پانه: پورتو ګراف (د زیږون پرمهال یادښتونه)	۳۴۱	
د مل پانه: ماخذ	۳۴۴	
ه مل پانه: د معیاري درملنې د لارښود د تعدیلولو د کړنلارې فورمه	۳۴۷	
انډکس	۱	
درملو انډکس	6	

پيليزه

د افغانستان د اسلامي جمهوريت د عامې روغتيا وزارت ډيرخوښ دى چې د لومړنيو روغتيايي څارنو د وړاندې كوكونكو لپاره د درملنې د معياري لارښود لومړنى چاپ وړاندې كوي (۱۳۹۱/۲۰۱۳). د درملنې ملي معياري لارښود د هغه شمير متداولو او خپرو شويو ناروغيو د توصيه شوي درملنې د مهارتونو غبرگونكى دى چې د بنسټيزو روغتيايي خدمتونو په ټولگه (BPHS) كې هغوى ته اشاره شوې ده.

د بنسټيزو روغتيايي خدمتونو ټولگه په افغانستان كې د روغتيايي خدمتونو په وړاندې كولو كې كارول شوې ده او د يوې كليدي وسيلې په توگه يې د روغتيايي مهمو او اغيزمنو اقداماتو او څارنو په تامينولو كې عمل كړى او د ټولو افغانانو لپاره بنسټيز روغتيايي خدمتونه د لاسرسى وړ گرځوي.

افغانستان د محدودو زيرمو لرونكى يو هيواد دى او د عامې روغتيا وزارت باور لري چې د بنسټيزو روغتيايي خدمتونو ټولگې ته په كلكې پاملرنې سره دا زيرمې د ټولې د زيانمنونكو قشرونو په ځانگړې توگه په ښځو او له ښځو كلونو څخه په كوچنيو ماشومانو كې د مړينې د كچې د ټيټولو لپاره متمرکز كړى.

د بنسټيزو درملو برابرول د بنسټيزو روغتيايي خدمتونو د ټولگې د بنسټ ډبره ده او دا (د معياري درملنې لارښود) د درج شوو خپرو ناروغيو لپاره د درملنې د اغيز لرونكي استعمال په موخه په لومړنيو روغتيايي څارنو كې د ټولو روغتيايي كاروونكو د لارښوونې لپاره كليدي وسيله ده، نو له دې امله له درملو څخه په سمه توگه د كارونې لامل كيږي. د شونتيا په صورت كې د معياري ملي درملنې دا لارښود د معياري درملنې له پروتوكولونو څخه چې مخكې د عامې روغتيا وزارت د پروگرامونو په مرسته پرمخ تللي وو، گټه اخلي.

د معياري ملي درملنې د لارښود لومړى چاپ د ډيرو وگړو د هڅو او هلو ځلو پايله ده. د عامې روغتيا وزارت په ۲۰۰۹ ميلادي كال كې د فارمسي د لوى رياست (GDPA) په وسيله د درملو د استعمال په برخه كې يوه سروې وكړه او د هغې د پايلو پر بنسټ يې د فارمسي او طب د ساحو له متخصصينو څخه غوښتنه وكړه چې د معياري درملنې د لارښود كاري ډله جوړه كړي. د معياري درملنې د لارښود كاري ډلې د پخواني تجربې پر بنسټ چې د اساسي درملو د لسټ د جوړولو په هكله وه د عامې روغتيا وزارت له ديارنتمننونو او د ملي او نړيوالو متخصصينوسره پراخې مشورې وكړې، چې له وخت څخه په گټه اخيستې غواړم له ټولو ليكوالو، تخنيكي وگړو، كتونكو، گډون كوونكو او صحيح كوونكو څخه چې د معياري ملي درملنې د لارښود د تدوين او جوړولو په برخه كې هڅې كړي دي، مننه وكړم. همدا راز د ځانگړې مننې مراتب د SPS د پروژې د مالي او تخنيكي ملاتړ په مناسبت چې د امريكا د نړيوالې پرمختيا يې ادارې له لوري يې ملاتړ كيږي او د نړيوال روغتيايي سازمان (WHO) له ملاتړ څخه وړاندې كوم.

دا لارښود يو تغير منونكى (ډيناميك) سند دى چې د پر له پسې او منظمې بيا كتنې غوښتنه كوي ترڅو په لومړنيو روغتيايي څارنو كې دښې درملنې منعكس كوونكى اوسى، له همدې امله د ټولو درنو لوستونكو جوړونكو نظرياتو ته د دې ټولگې د اغيزمنتوب او منلو په برخه كې ښه راغلاست وايو او دا نظرونه د دې لارښود په بيا كتنه كې د روغتيايي څارنو د نويو پرمختياو په رڼا كې مونږ ته لارښونه كوي. دغوره روغتيايي خدمتونو ته د افغانستان د خلكو د لاسرسى د زياتولو په موخه، د دې لارښود كارول په عامه او خصوصي سكتور كې د روغتيايي څارنو ټولو كاركوونكو ته توصيه كوم.

ډاكټره ثريا دليل
د عامې روغتيا وزيره
كابل - افغانستان

سريزه

دا د معياري ملي درملنې لارښود د هغه شمير لومړنيو روغتيايي مرکزونو د ګټې اخيستنې لپاره چې د بنسټيزو روغتيايي خدمتونو ټولګه تطبيقي، طرحه او تدوين شوی دی. برسيره پر دې دا لارښود د معا لګو ډاکټرانو له لوري د هغوی په شخصي پراکتس کې هم کارول کيدای شي.

په دې ټولګه کې شاملې ناروغۍ په جزئياتو د ټولو ناروغيو رانغاړونکي نه دي مګر په STG کې درج شوې ناروغۍ د بنسټيزو روغتيايي خدمتونو د ټولګې په وسيله د توصيه شويو خبرو ناروغيو پر بنسټ دي همدا راز د درملو په وسيله توصيه شوې درملنې د ۲۰۱۰ د بنسټيزو روغتيايي خدمتونو په ټولګه کې په توصيه شويو درملو او د ۲۰۰۷ د بنسټيزو درملو په لسټ پورې محدود دي.

د دې ټولګې محتوا او جزئيات د STG د کاري ډلې او د طبي مسلکي او پارامديکل و ګروکډې هڅې دي چې په داوطلبانه توګه يې خپل وخت او تخصص په دې لاره کې لګولي دي.

په دې ټولګه کې په ډيره عملي ممکنه توګه هغو ستونزو ته چې روغتيايي کارکوونکي د لومړنيو څارنو په مرکزونو کې له هغوی سره مخ کيږي پاملرنه شوې ده.

په دې ټولګه کې د ځانګړو ناروغيو لپاره د عامې روغتيا وزارت د موجودو لارښودونو له ماخذ او په هغو حالاتو کې چې د عامې روغتيا وزارت منابع ناکافي وې د نړيوال روغتيايي سازمان له منابعو څخه او يا هم په نورو اختصاصي فعاليتونو کې په هغو حالاتو کې چې ورته اړتيا وه، ګټه اخيستل شوې ده.

د ممکنو ټولو هغو سره سره که ځينې غلطې وليدل شي او يا د درملنې ځينې ميتودونه نيمګړي وي د دې ټولګې ليکونکي هيله من دي خو د دې ډول غلطيو او نيمګړتياو راپور ورکړل شي، په دې موخه د دې ټولګې په پای کې د E مل پاڼې په بڼه د STG په اړه د اصلاحي نظرونو په خاطر يوه فورمه ستاسو د وړاندیزو لپاره شتون لري.

سره له دې چې مونږ هيله من يو چې دا ټولګه د درملو د ډيرو تجويزونکو لپاره ګټوره وي بيا هم اړينه ده چې په ياد ولرو چې د شک د پيدا کيدو په صورت کې د درملو د مسلکي تجويزونکي مسووليت دی خو د تجويز شوي درملو د اغيز لرونکي مادې او مقدار څخه د ناروغ د اړتيا سره سم ډاډ تر لاسه کړي او وېې مني چې تجويز شوي درمل د درملو د توليدونکو ځانګړتياو سره سم دي.

د مهرباني له مخې خپل هر ډول اصلاحي نظرونه په راتلونکي کې د دې ټولګې د راتلونکو چاپونو د بڼه والی او اصلاح په خاطر په لاندې پته واستوئ.

د عامې روغتيا وزارت - د فارمسي د چارو لوی رياست
د STG کاري ګروپ، کابل - افغانستان

د اصلاحي نظرونو د فورمې الکترونیکه کاپي په لاندې پته استولی شی:

برېښنالیک: rafi_rahmani2003@yahoo.com

موبایل: ۰۰۹۳ ۷۹۹۳۰۳۰۰۸ (۰) ۰۰۹۳

يا

برېښنالیک: zsiddiqui@msh.org

موبایل: ۰۰۹۳ ۷۰۷۳۶۹۴۰۸ (۰) ۰۰۹۳

دا ټولګه همدا راز د عامې روغتيا وزارت په ويب پاڼه کې شتون لري: <http://www.moph.gov.af>
همدا راز کاروونکي هڅول کيږي خو د دې ټولګې کاپي د نوي چاپ لپاره په ويب سايټ کې چک کړي.



فارمست عبدالحفيظ قريشي
د عامې روغتيا وزارت
د فارمسي د چارو لوی رئيس

د منځني څرگندونه

په افغانستان کې د لومړنيو روغتيايي څارنو لپاره د معياري ملي درملنې لومړنی لارښود د ملي او نړيوالو هڅو پايله ده چې د معياري ملي درملنې د لارښود د کاري گروپ د غړو په وسيله همغږی شوی دی دا گروپ د عامې روغتيا وزارت، د کابل د طبي پوهنتون، د فارمسي د پوهنځي، د افغانستان ډاکټرانو ټولنه، د فارمسي د سيستمونو تقويت (SPS) پروژه چې بوديجه يی USAID ورکوي، دروغتيايي خدمتونو مرستندويه پروژه (HSSP) چې بوديجه يی USAID ورکوي او د WHO له استازو څخه تشکيل شوی دی.

د معياري درملنې د دې ډول لارښود تدوين او پرمختيا د افغان روغتيايي مقاماتو او افغاني روغتيايي متخصصينو د همکارۍ او ملاتړ د نشتوالي په صورت کې شونې نه دی.

د معياري ملي درملنې د لارښود د کاري گروپ غړي د عامې روغتيا وزارت، د کابل د طبي پوهنتون، د فارمسي له پوهنځي، WHO، د افغانستان د ډاکټرانو ټولنه، ټولو ليکوالو، کتونکو او نورو گډون کوونکو څخه چې په فعاله توگه يې د معياري ملي درملنې د لارښود په جوړولو کې يې رول لوبولی دی مننه کوي. همدا راز د SPS/USAID د پروژې له مالي او تخنیکي مرستو څخه چې د دې مهمې ټولگې د پرمختيا په موخه يی کړې دی ځانگړې مننه کوي.

د معياري درملنې د لارښود کاري گروپ غړي:

- پروفیسور ډاکټر محمد رفيع رحمانی د کابل په طبي پوهنتون کې د فارمکولوژۍ د پيارتمېنې استاد، د کمېټې رئيس
- عبدالظاهر صديقي د SPS د پروژې د فارمسي خدمتونو د ساحوي همغږيز پروگرام مسئول
- پوهندوی ډاکټر عبدالصمد عمر د علي آباد تدریسي روغتون د جراحي متخصص
- ډاکټر محمد امين اصغری د داخلي ناروغیو پروفیسور او د وزیر اکبر خان روغتون د داخلي د سرویس شف
- ډاکټر پاول-اکس، سترخنيکی سلاکار، د SPS پروژې څخه
- الحاج ډاکټر محمد فياض صافي د کوچنيانو د داخلي پروفیسور او د افغانستان د ډاکټرانو د سراسري ټولنې نماينده
- پوهنوال محمد حسن فروتن پروفیسور او د کابل پوهنتون د فارمسي د پوهنځي استاد
- پوهنوال حاجی محمد نعيمی پروفیسور او د کابل پوهنتون د فارمسي پوهنځي استاد
- ډاکټر محمد توفيق مشال د عامې روغتيا وزارت د وقایوي طب او روغتيايي مراقبتونو عمومي رئيس
- ډاکټر احمد شاه پردیس د WHO استازی
- ډاکټر صفی الله ندیب د WHO استازی
- ډاکټر محمد عالم عاصم د عامې روغتيا دامبولانسی بیړنی روغتيايي څارنو مشر
- ډاکټر احمد شاه نورزاده د HSSP د پروژې د روزنې او اجرايوي مدیر

ليکونکي:

- ډاکټر کتاوین سادات د ملالی روغتون د ولادي نسايي ترينر متخصصه
- ډاکټر هما کبیری د ملالی روغتون د ولادي نسايي ترينر متخصصه
- رنخورمل ډاکټر سلطان نجيب ديبري په درماتولوژۍ کې اسوشيت پروفیسور او د ابن سینا عاجل روغتون د جلدی ناروغیو ترينر متخصص
- پوهندوی ډاکټر محمد نظير شیرزوی MS، د ارتوپدی-اسوشيت پروفیسور او د سردار محمد داود خان د روغتون عمومي رئيس
- پوهندوی ډاکټر محمد يعقوب نورزی MS.PGD، د یورولوژۍ پروفیسور او د عمومي جراحي متخصص، Attestation de Formation Spécialisée Approfondie-Paris (AFSA Paris)، د سردار محمد داود خان ملي او نظامی روغتون سرجراح

- ډاکټر احمد شاه وزير د استقلال روغتون د سوزيدني او پلاستيک جراحي د سرويس شف
- ډاکټر ماللي علمي د رابعه بلخي روغتون د ولادي نسايي ترينر متخصصه اود نسايي سرويس شف
- ډاکټر بشير احمد سروري رواني متخصص او د عامې روغتيا وزارت د نشه يي توکو د ناوړې استفادې او رواني روغتيا د څانگې آمر
- ډاکټر متولي يونس د عامې روغتيا وزارت د ماشومانو او تنکيو ځوانانو د روغتيا څانگه (IMCI)
- رنځورمل ډاکټر نجيب الله توحيدوال د ابن سينا عاجل روغتون، د غوړ، ستوني او پوزې ترينر متخصص
- ډاکټر سهيلا ضيائي د عامې روغتيا وزارت د Reproductive health ډيپارټمنټ استازی
- ډاکټر نوريه عطا د کابل طبي پوهنتون د ولادي - نسايي ډيپارټمنټ استاده
- ډاکټر حبيب الله محمدي د وزير اکبرخان روغتون د داخلي د ناروغيو متخصص
- ډاکټر حميده حميد د عامې روغتيا وزارت د ملاريا او لشماتيا د کنټرول ملي پروگرام استازی
- ډاکټر رنځوريار خليل همدرد د استقلال روغتون داخله سرويس ترينر تخصص
- ډاکټر عتيق الله حليمي د اندراگاندي د ماشومانو روغتون، د ماشومانو متخصص
- ډاکټر ميرويس صالح PGD.DO، د سترگو متخصص اود کابل پوهنتون د کدري روغتون استاد
- ډاکټر رقيه ناصر د عامې روغتيا وزارت د کتلوي معافيت ډيپارټمنټ استازی
- ډاکټر محمد نجيب روشن د نور روغتون د سترگو متخصص
- ډاکټر انيسه عزت د ستوماتولوژي روغتون، د وجه و فک د جراحي متخصصه
- ډاکټر اجمل يادگاري د عامې روغتيا وزارت د نري رنځ د کنټرول ملي پروگرام استازی
- الحاج رنځوريار ډاکټر اسدالله صافي د ابن سينا عاجل روغتون، د اعصابو د جراحي ترينر متخصص
- پوهنمل ډاکټر عبدالولي ولي د ميوند تدريسي روغتون، د ماشومانو د ډيپارټمنټ اسوشيت پروفيسور
- ډاکټر محمد ولي کريمي د ميوند تدريسي روغتون، د غوړ، ستوني او پوزې متخصص
- پوهندوی ډاکټر عبدالحی ولي د ميوند تدريسي روغتون جلدی متخصص او د جلدی ډيپارټمنټ استاد
- ډاکټر ثمرالدين د عامې روغتيا وزارت د ايدز ملی پروگرام د اچ-آی-وی ډيپارټمنټ استازی
- ډاکټر شايسته کوشان د عامې روغتيا وزارت د تغذيي ډيپارټمنټ استازی
- الحاج رنځوريار ډاکټر روح الله ظهير د استقلال روغتون، پروفيسور او د داخله ناروغيو متخصص
- ډاکټر ذبيح الله عزيزي د سردار محمد داود خان روغتون پروفيسور او د انتاني ناروغيو متخصص
- رنځورمل ډاکټر سلطان محمد ناجي د ابن سينا صديري روغتون د سينې د جراحي ترينر متخصص
- ډاکټر بسم الله نجرابي د کابل طبي پوهنتون استاد او د اورنويدي جراحي پروفيسور
- ډاکټر گل آقا ودير د ابن سينا عاجل روغتون، د عمومي داخله ترينر متخصص
- ډاکټر محمد صادق نعيمی د انتاني روغتون د داخلي ترينر متخصص
- ډاکټر حبيب الله رغبت، د ابن سينا صديري روغتون، د داخلي ترينر تخصص
- ډاکټر صديق فيضي د اندراگاندي د ماشوم د روغتيا روغتون، د ماشومانو ترينر تخصص
- ډاکټر ميرويس نوراني صافي د وزير اکبر خان روغتون د جراحي متخصص
- ډاکټر عبدالحق قيام DCH او د اتاترک ماشومانو ملی روغتون د ماشومانو داخلي ترينر تخصص
- ډاکټر محمد جاويد شهاب د جمهوريت روغتون، د جراحي او پورولوژي ترينر تخصص
- ډاکټر رفيع الله احمدزی د اندراگاندي د ماشوم د روغتيا روغتون، د ماشومانو متخصص

د مونوگراف تخنيکي کتونکي:

- پروفيسور ډاکټر محمدرفع رحمانی د کابل په طبي پوهنتون کې د فارماکولوژي ډيپارټمنټ استاد، د کميټې رئيس

- پوهندوی ډاکټر عبدالصمد عمر د علي آباد تدریسي روغتون د جراحي متخصص
- ډاکټر محمد امین اصغری دداخلي ناروغيو پروفیسور او د وزیر اکبر خان روغتون د داخلي د سرویس شف
- ډاکټر پاول-اکس، ستر تخنیکي سلاکار، د SPS پروژې څخه
- دوکتور ویلیام هولمز، د SPS سلاکار
- د مسودی تخنیکي کټوونکي:
- ډاکټر محمد نوروز حقمل MSC.MBA، د عامې روغتیا وزارت، دولسوالیو د روغتیا یی سیستم د تقویه د دیپارتمنت مسئول
- ډاکټر حمیدالله حبیبی د عامې روغتیا وزارت، د ولایتي اړیکو د ریاست سلاکار
- ډاکټر محمد یاسین رحیمیار له افغان کورنیو څخه د مواظبت موسسه، تخنیکي مرستیال
- ډاکټر احمد جاوید عمر د GCMU / PCH لوی سلاکار
- ډاکټر لورانس - اکس، تخنیکي سلاکار، د SPS د پروژې څخه
- یعقوب عدن عابدی د WHO استازی
- پروفیسور ډاکټر احمد فرید دانش د کابل د طبي پوهنتون د فارماکولوژۍ د ډیپارتمنت استاد

ملاټې کوونکي:

- محمد ظفر عمری، د SPS د پروژې رئیس
- فارمست عایشه نورزایی د فارمسي د چارو د لوی ریاست څخه
- پوهیالی جاوید احمد انیب د کابل پوهنتون د فارمسي پوهنځي، اسوشیت پروفیسور
- مارک موريس، د SPS پروژې څخه
- فارمست لطف الله احساس، د SPS د پروژې څخه
- نیرانجان کندوری تخنیکي سلاکار، د SPS د پروژې څخه
- ډاکټر نادر عرب د عامې روغتیا وزارت څخه
- فارمست ذکيه عادل د فارمسي د چارو د لوی ریاست څخه
- فارمست فهمه حبیبی د فارمسي د چارو د لوی ریاست څخه
- رنځور یار ډاکټر بهرام سادات د ستوماتولوژۍ روغتون، د ستوماتولوژۍ ترینر متخصص
- فارمست عزیزه حبیب د WHO څخه
- تری گرین تخنیکي سلاکار، د SPS د پروژې څخه
- ډاکټر ابن امین خالد د عامې روغتیا وزارت څخه
- فارمست ناهید ایوبی، د SPS د پروژې څخه
- ډاکټر نور صافی د عامې روغتیا وزارت څخه
- ډاکټر حبیب الله حبیب عامې روغتیا وزارت د نري رنځ د کنترول ملي پروگرام څخه
- ډاکټر فریدالله عمری د عامې روغتیا وزارت د ملازما ملي پروگرام، دارزیا یی دیپارتمنت آمر
- ډاکټر فیض محمد دلاور، د عامې روغتیا وزارت د نري رنځ د کنترول ملي پروگرام، د تحقیق آمر
- ډاکټر ناصر اوریا، د SPS د پروژې څخه
- فارمست خان آقا کریم غازی د فارمسي د چارو د لوی ریاست څخه
- ډاکټر ویلیام هولمز، تخنیکي سلاکار، د SPS د پروژې څخه
- ډاکټر عبدالخالده امینی، تخنیکي سلاکار، د SPS د پروژې څخه
- فارمست شکیلا امرخیل د فارمسي د چارو د لوی ریاست څخه
- فارمست عبدالخلیل خاکزاد د فارمسي د چارو د لوی ریاست څخه
- فارمست محمد نذیر حیدرزاد د فارمسي د چارو د لوی ریاست څخه

د تصحيح کمیټه / د پښتو د نسخې تصحيح کوونکي:

- ډاکټر محمد زبير خادم، د SPS د پروژې څخه
- ډاکټر مجيب الرحمن مخلص، د SPS د پروژې څخه
- ډاکټر محمد طاهر قاري زاده، د SPS د پروژې څخه

د پښتو د نسخې آخري تصحيح کوونکي پوهاند ډاکټر محمد همايون آريا د کابل د طبي پوهنتون د قلبي او تنفسي داخلي دپارتمنت غړی او د علي آباد تدريسي روغتون د داخلي پروفیسور

دا لارښود څه ډول وکارول شي

د روغتيايي لومړنيو څارنو لپاره د معياري درملنې ملي لارښود په افغانستان کې د لومړنيو روغتيايي څارنوپه مرکزونو کې د بنسټيزو روغتيايي خدمتونو د ټولګې (BPHS) د وړاندې کولو لپاره د درملنې ملي لارښود د يو ماخذ په توګه کارول کيږي. مهمه ده چې تاسو د دې لارښود له محتوا او پيزاين سره بلدتيا پيدا کړئ خو دا لارښود په اغيزمنه توګه وکاروئ. په دې لارښود کې موجودې ناروغۍ په BPHS کې له درج شويو او په افغانستان کې د هغو خبرو ناروغيو څخه انتخاب شوي دي چې په لومړنيو روغتيايي مرکزونو کې د فرعي صحي مرکزونو څخه ترولسواليو تر روغتونونو پورې ليدل کيږي. په دې ټولګه کې توصیه شوې درمل د لومړنيو روغتيايي مرکزونو د استفادې لپاره د بنسټيزو درملوپه لست کې شامل دي. دا لارښود په شلو څپرکو کې د بدن د غړو سيستم ته په پاملرنې سره وړاندې شوی، د هرې ناروغۍ لپاره يوه ګډه بڼه (فورمات) جوړه شوې ده چې په هغه کې يوه لنډه تشرېح، د ناروغۍ تشخيص سره له اعراضو او علايمو، درملنه (د درملنې موخې، پرته له درملو درملنه او د درملو په وسيله درملنه)، وقايه او ناروغ ته لارښوونې شاملې دي. ناروغ ته لارښوونې په ځانګړې توګه په دوامدارو او مزمنو ناروغيو کې، د روغتيايي خدمتونو وړاندې کوونکو سره مرسته کوي چې د ناروغ په روغتيا کې ښه والی راشي.

د اړتيا په صورت کې، روغتيايي پورته مرکزونو ته د ناروغانو د ليد لپاره يوه مناسبه لارښوونه هغه وخت چې وسايل او تجهيزات، موجود درمل او روغتيايي کارکوونکي په لومړني مرکز کې د مناسبې درملنې اجازه ونلري وړاندې کيږي. د refer يا ليد او refer urgently يا ژر ليد د اصطلاح ترمنځ توپير شته، refer يا ليد د ناروغ معمول يا روټين ليد بڼې په داسې حال کې چې urgent refer يا ژر ليد د ناروغ د سملاسي ليدلو څرګندونه کوي او د ناروغ لپاره د سملاسي اهتماماتو او اقداماتو غوښتونکی دی چې په دې حالت کې ناروغ لومړی stabilized او بيا سملاسي دې د هغه د خوندي ليدونې زمينه برابره شي.

د بيلايلو برخو او اوږندو ناروغيو د اسانه پيدا کولو لپاره تاسو کولای شئ د دې لارښود په پای کې مل پانه د يوې ځانګړې ناروغۍ او يا د درملو د نوم د پيدا کولو لپاره د الفبا په ترتيب وکاروئ. په دې لارښود کې د کاريدونکو مخففاتو لست او د طبي اصطلاحاتو له لنډ تعريف سره يوه لغت نامه شتون لري.

په دې STG کې پنځه مل پانې شاملې دي

- د الف مل پانه، د مروجو بنسټيزو (اساسي) درملو لست چې په STG کې کارول کيږي سره د درملو د معمول دوز د ماشومانو او لويانو لپاره راټاغی. په جدولونو کې د بدن د هر کيلو ګرام وزن او يا د عمر پر بنسټ د دوز آسانه محاسبه، د درملو د تطبيق د لارو، د دوز دفعات، د درملنې د مودې، درملو مستحضرات او د درملو د برابرولو لپاره لارښوونې شاملې دي.
- ب مل پانه د نوي زيږيدلي ماشوم بيا احيا (رغونه) تشرېح کړې ده.
- ج مل پانه، په زيږونونو کې د کارولو په موخه د ولادي يادښتونو پارتو ګراف ښيي.
- د مل پانه، د پاليسيو، کتابونو، نشراتو او د عامې روغتيا د وزارت د مقالو ريفرنسونه په کې شامل دي چې د STG د جوړولو لپاره ترې استفاده شوې ده.

- ه مل پانه، د STG د تعديل او اصلاح د غوښتنې لپاره کړنلارې په کې شاملې دي.

STG د درملو معقول استعمال او په لومړنيو روغتيايي څارنو کې د روغتيايي خدمتونو د وړاندې کولو کيفيت لوړوي. د معياري ملي درملنې لارښود له موجودو ملي پروګرامونو د درملنې د پرتو کولو نوسره سمون لري. دا مهمه ده په ياد ولرو چې توصیه شوې درملنه په دې لارښود کې د دې فرضيې پر بنسټ چې تجويزونکي په خپلو روغتيايي مرکزونو کې د ناروغانو د درملنې ځواکمنتيا لري وړاندې شوی دی. دا به نور د روغتيايي کارکوونکو مسوليت وي چې د ناروغانو لپاره تر ټولو مناسبه توصیه په ځانګړې توګه و ارزوي.

هغه نظرونه چې د دې STG د ښه کولو او اصلاح په موخه استول کيږي مننه به يې وشي. د اصلاح فورمه د ه په مل پانه کې شتون لري. د STG د اصلاح فورمه بايد د پوستي او يا ايميل له لارې واستول شي. د اصلاحي نظرونو د فورمې الکترونیکه کاپي د عامې روغتيا وزارت په ويب پانه کې تر لاسه کولای شئ: www.moph.gov.af

دا لارښود څه ډول وکارول شی

چاپي فورمې دې په لاندې پته واستول شي:
د عامې روغتیا وزارت - د فارمسی د چارو لوی ریاست
د STG کاري ډله، کابل - افغانستان

د اصلاحي نظرونو د فورمې الکترونیکه کاپي په لاندې پته استولی شی:
برېښنالیک: rafi_rahmani2003@yahoo.com
موبایل: ۰۰۹۳ (۰) ۷۹۹ ۳۰۳ ۸۰۰
او یا

برېښنالیک: Zsiddiqui@msh.org
موبایل: ۰۰۹۳ (۰) ۷۰۷ ۳۶۹ ۴۰۸ ۰۰

مخففات اولنڊيزونه

<	Less than	لږ له
≤	Less than or equal to	لږ يا برابر
>	More than	زيات له
≥	More than or equal to	زيات يا برابر
ACE	Angiotensine-converting enzyme	دانجيو تنسين بدلونکي انزايم
AIDS	Acquired immunodeficiency syndrome	د معافيتي سيستم د کموالي کسبي سندروم
AMI	Acute myocardial infarction	د ميوکارد حاده احتشا
ANC	Ante natal care	د زيرون څخه مخکې څارنه
APH	Antepartum hemorrhage	له زيرون څخه مخکې وينه راتله
BP	Blood pressure	د وينې فشار
BPHS	Basic Package of Health Services	د روغتيايي خدمتونو بنسټيزه ټولگه
C	Celsius	سانتي گريد يا سلسيوس
CHC	Comprehensive health center	جامع روغتيايي مرکز
CHS	Centre for health services	د روغتيايي خدمتونو مرکز
CNS	Central nervous system	مرکزي عصبي سيستم
COC	Combined oral contraception	د خولې له لارې ترکبي کانتراسپټيونه
COPD	Chronic obstructive pulmonary disease	مزمنه ريوې انسدادې ناروغۍ
DH	District Hospital	د ولسوالۍ روغتون
DMPA	MedroxyProgesterone acetate	ميدروکسي پروجيسټرون استيت
DPT	Diphtheria-Pertussis-Tetanus	ديفټري-توره ټوخله-ټيتانوس
DOTS		تر مستقيمي کتنې لاندې د لنډ مهاله درملنې تگلاره
E	Ethambutol	ايتامبوتول
ECG	Electrocardiogram	د زړه برقي گراف
EDL	Essential drugs list	د بنسټيزو درملو لست
EPHS	Essential Package of Hospital Services	د روغتونو د خدمتونو بنسټيزه ټولگه
EPI	Expanded Programme on Immunization	د معافيت پراختيايي پروگرام
FAM	Fertility awareness methods	د اميندواري د پوهاوي تگلارې
FDC	Fixed-dose combination	د ثابت دوز تر کيب
FP	Family planning	کورنۍ پلان
g/d	Grams per deciliter	گرام پر يو ډيسي ليتر
GDPA	General Directorate of Pharmaceutical Affairs	د درملو (فارمسي) د چارو عمومي رياست
H	Isoniazide	ايزونيازيد
Hib	Haemophilus Influenzae type b vaccine	ډول واکسين B د انفلونزا د هيمافيلوس
HIV	Human immunodeficiency virus	د انساني معافيت د کمولو وېروس
HPV	Human papilloma virus	انساني پېپلوما وېروس
HSSP	Health Sector Support Project	د روغتيايي خدمتونو مرستندويه پروژه
HTN	Hypertension	د وينې لوړ فشار
IM	Intramuscular	د عضلي دننه
IMCI	Integrated management of childhood illnesses	د ماشومتوب د دورې د ناروغيو جامع اداره

IV	Intravenous.....	د وريد دننه
IU	International units.....	نړيوال واحد
IUD	Intrauterine device.....	په رحم کې داخلي آله
Kg	Kilogram.....	کيلو گرام
LAM	Lactational amenorrhea method.....	د شېدو ورکولو په امينوري کې د کنټراسپشن ټکلاره
mg	Milligram.....	ميلي گرام
ml	Milliliter.....	ميلي ليتر
mmHg	Millimeters of mercury.....	د سيماب د ستنې ملي متر
MOPH	Ministry of Public Health.....	د عامې روغتيا وزارت
MSH	Management Sciences for Health.....	د روغتيا لپاره د علومو اداره
NaCl	Sodium chloride.....	سوديم کلورايډ يا د خوړلو مالګه
NSAID	Nonsteroidal anti-inflammatory drug.....	د التهاب ضد غير سټروئيډي درمل
STG-PL	National standard treatment guidelines for primary level.....	د روغتيايي بنسټيزو څارنو لپاره د درملنې معيارى لارښود
OPV	Oral polio vaccine.....	د پوليو لپاره د خولې له لارې واکسين
ORS	Oral rehydration solution/salt.....	د خولې له لارې د مايعاتو د اعاده کولو مالګين محلولونه
PID	Pelvic inflammatory disease.....	د حوصلي التهابي ناروغي
PF	Plasmodium falciparum.....	پلازموډيم فالسيپارم
PMB	Postmenopausal bleeding.....	د حيض له بندېدو وروسته (انقطاع طمث) وينه راتلنه
POP	Progesterone-only pills.....	هغه کوټراسټيفونه چه يوازی پروجسټرون لری
PPH	Postpartum hemorrhage.....	له ولادت څخه وروسته وينه راتلنه
PPHO	Provincial public health office.....	د عامې روغتيا ولايتي دفتر
PUD	Peptic ulcer disease.....	د پېپټيک قرحې ناروغي
PV	Plasmodium vivax.....	پلازموډيم ويواکس
R	Rifampicin.....	ريفامپيسين
RBC	Red blood cell/count.....	د ويني سري حجرې
S	Streptomycin.....	سټرپټومايسين
SPS	Strengthening Pharmaceutical Sytems.....	د فارمسي د سيسټمونو پياوړي کوونکي پروژه
STG	Standard treatment guideline.....	د درملنې معيارى لارښود
STI	Sexually transmitted infection.....	مقاربتې ليردونکى انتان
TB	Tuberculosis.....	نړى رنځ
TT	Tetanus toxoid.....	د ټټانوس ټوکسويډ
UK	United Kingdom.....	انګلستان
USAID	United States Agency for International Development.....	د امريکې د متحده ايالتونو نړيواله پرمختيايي اداره
WAKH	Wazir Akbar Khan Hospital.....	د وزير اکبر خان روغتون
WHO	World Health Organization.....	نړيوال روغتيايي سازمان
Z	Pyrazinamide.....	پيرازينامايډ

لغات نامه

د پلاستنا جلا کېدل:	د امیندواری یو اختلاط دی چې هغه پلاستنا چه په نورماله موقعیت کې وي د ماشوم له زیریدو مخکې جلا کیږي.
د صفرا کڅوړی حاد التهاب:	د صفرا کڅوړی حاد یا ناڅاپي التهاب چې د حاد بطني درد لامل کیږي.
Adnexa یا ملحقات:	توب یا نفیرونو او تخمداني ته ویل کیږي.
انافیلاکسی:	د ژوند ګواښونکي، ناڅاپه (آني) او سخت الرژیک غبرګون دی.
Angina pectoris:	د سینې درد (صدری خناق) چې د زړه د یوه یا څو شریانونو د تنګېدلو یا قسمی بندیدلو له امله رامنځته کیږي اود اسکیمیا په نوم هم یادېږي.
Anicteric:	له زیري څخه پرته حالت ته وايي
Anorexia یا بې اشتهايي:	د اشتها له منځه تللو ته وايي.
Antenatal:	د ماشوم له زیږیدو مخکې حالت
Anterior chamber:	د سترګې په داخل کې له مایع څخه یوه ډکه ساحه ده، چې په مخکیني برخه کې یې قرنيه اوپه خلفی برخه کې یې آیرس او حذقه موقعیت لري.
اپني:	د ساه بندیدو ته ویل کیږي چې د ژوند ګواښونکي حالت دی.
اپنډیسیت:	د اپنډکس التهاب ته وايي چې د یو کوچني پایپ ډوله جوړښت په بڼه وي چې د لویو کولمو په پیل کې واقع دی.
ارېتمیا:	د زړه د ضربان په نظم او چټکتیا کې ستونزه.
Arthralgia:	د مفصلونو درد
ارتریت:	د مفصلونو التهاب
Ascites:	د ګیډی په جوف یا پریټوان کې د پروټیني مایع راټولیدل
د ولادت ترمنځ واټن:	د لومړۍ امیندواری څنډیدل تر ۱۸ کلنۍ او د امیندواریو ترمنځ لږ تر لږه د ۳۶ میاشتو واټن رامنځته کېدل.
Booster dose:	د معافیت د فعالونکو توکو یو دوز دی لکه واکسین یا توکسویډ چې له لومړني یا اصلي دوز څخه لږ وي او د معافیت د دوام لپاره ورکول کیږي.
Breech Presentation:	(حوصلي اعتلان) هغه حالت ته وايي چې له ولادي کانال څخه لومړی د جنین حوصله، زنگونه یا پښې وځي.
Bronchiectasis:	د لویو هوايي لارودایمۍ تخریب او پراخیدل.
Brudziski نښه:	د سحابا د التهاب یوه نښه ده چې د ناروغ د غاړې د سختې شخیدنې له امله، کله چې د ناروغ غاړه قبض شي، د ناروغ hip او زنگونه هم قبض کیږي.
د زړه شاک:	د زړه ناڅاپه ناتواني ده چې نشي کولای په کافي کچه وینه د بدن د اړتیا لپاره پمپ کړي. داشاک معمولاً د زړه د سختې حملې وروسته رامنځ ته کیږي.
Cellulites:	د پوستکي انتان او تر هغه لاندې نرمو نسجونو التهاب ته وايي.
سرویکس یا د رحم غاړه:	د رحم ښکتنی ناحیه ده چې د مهبل په لوري خلاصیږي.
Indrawing Chest یا د سینې ننوتنه:	د سینې ښکتنې برخې (ښکتنی اضلاع) داخل لوري ته حرکت کولو ته وايي، چې د تنفس یا شہیق پرمهال پیښیږي.
مزمّن برانشیت:	د قصبو مزمّن التهاب دی، قصبې هوا سړو ته لیرېږوي.
Compromised Immunity:	هغه حالت دی چه په هغه کې بدن خپل طبیعي قابلیت د انتاناتوپه مقابل کې د لاسه ورکودۍ د معافیت کموالي یا نشتوالي ته وايي
اختلاج:	د ارادي عضلاتو چټک او نه کنټرولیدونکي تقلص ته وايي چې د صرعې یا میرګي یو عرض دی.

- د قرنيې ټپ: د قرنيې قرحه يا خلاص ټپ دی (قرنيه د سترګې مخکينۍ برخه ده)، چې معمولاً د انتان، وچوالی يا د سترګې د نورو ستونزو له امله پيدا کيږي.
- Cushing سندروم: هورموني ستونزه ده چې د کورټيزول سره د اوږدمهالې مواجهه کيدو له امله راپيدا کيږي چې اعراض يې د بدن د پورتنۍ برخې چاغوالی، د هډوکو او جلد کمزوري، اضطراب او ژور خفګان او د مېرمنو په بدن کې د ويښتو زياتوالي دی.
- سيانوز: هغه حالت دی چې شونې، او د لاسو او پښو ګوتې ابي رنگه ښکاري چې دا حالت په وينه کې د اکسيجن د تېټې کچې له امله ليدل کيږي.
- Cystitis: د مثانې التهاب دی. زيات وخت (مګر نه تل) د انتان په وسيله رامنځته کيږي. د تخریب شوو، انتاني شوو او مرو نسجونو د لرې کولو پروسه ده.
- ديهايدريشن: هغه حالت دی چې عضويت د خپلو نورماله فعاليتونو لپاره په کافي اندازه مايعات ونلري.
- د اثنا عشر لوپ: د کوچنيو کولمو پورتنۍ برخې ته وايي.
- Dyslipidemia: په وينه کې د شحمياتو لکه کلسترول او يا تراى ګلايسرايد په ډيره زياته او يا ډيره کمه اندازه وي.
- Dysmonorhea: درد لرونکي مياشتني عادت ته وايي.
- Dyspnea: له سالتلۍ سره تنفسي ستونزو ته وايي.
- Eclampsia: په اميدواره ميرمنه کې اختلاج دی چې د pre-eclampsia په تعقيب را مينځ ته کيږي او د اميداورۍ د دورې يو جدي اختلاط دی چې په هغه کې د وينې لوړ فشار او د وزن چټک او له حده ډير زياتوالی شامل دي.
- خارج رحمى حمل Ectopic pregnancy: هغه اميدواري چې له رحم څخه بهر پېښه شي.
- اډيما: د بدن په نسجونو کې د ډيرې مايع د راټوليدو له امله پړسوب ته ويل کيږي.
- امبوليزم: دعلقې انتقال له هغه ځايه چې پيدا شوې د بدن بل ځای ته ويل کيږي.
- افزېما: په سږو کې د هوايي کڅوړو (الويول) تخريبيدو ته وايي.
- انسفاليت: د دماغ التهاب د باکټريايي يا وېروسي انتاناتو له امله ته ويل کيږي.
- انډيميک: يوه ناروغي چې په متکرر ډول او د وړاندوينې په تناسب سره په يوه ځانګړي موقعيت او خلکو کې راپيدا کيږي.
- اندو کارديت: د زړه د داخلي پردې التهاب دی او ډير معمول ډول يې باکټريايي اندو کارديت دی او هغه وخت چې انتان په زړه کې داخل شي رامنځته کيږي.
- اندومتريوم: د رحم مخاطي پردې ته وايي چې د رحم جوف يې پوښلی دی.
- اټيوريزس: د ادرار غير ارادي وتل دي او ځينې وخت دا اصطلاح د شپې له مخې د غير ارادي ادرار لپاره کارول شوې ده (د بسترې خيستول) چې ادرار د خوب پرمهال له ارادي پرته خارجيږي.
- Envenomation: د زهرو په وسيله د عمومي او کتلوي مسموميت يو اختلاط ته وايي.
- د خيټې پورتنۍ برخه يا
- Epigastric region: د خيټې مرکزي پورتنۍ برخه ده (لکه ابې ګستريم)
- Epithelialization: هغه پروسه ده چې جلد له ټپ او زيان رسيدنې وروسته بيا راغاونه پيلوي.
- اړيټما يا احمرار: د جلد سوروالی چې د شعريو د هايپريمي له امله د جلد په لاندنيو طبقو کې راپيدا کيږي.
- Fallopiian يا نفيری ټيوبونه: ډير نازکه ټيوبونه دي چې له تخمدانونو څخه پيليږي تر رحم غزيري اود
- Salpinges په نوم هم ياديږي.

فولیکولونه:	د حجرو یو کوچنی او کوروي گروپ چې یو جوف لري
گلوکوما:	هغه حالت دی چه په هغه کې د سترگو د مایع فشار په کړاۍ سره ډیریری
	او د بصری عصب د تخریدو لامل کیږي.
گلو میرولونفریت:	د پښتورگو یوه ناروغي ده چې د پښتورگو هغه برخه چې له وینې څخه اضافي مواد او مایعات فلتر او تصفیه کوي، تخریبیږي.
نقرص:	په مفصلونو کې د کریستل ترسب دی چې د ناڅاپي پړسوب، درد، سوروالي او په زیانمن مفصل کې د حرارت د لوړیدو لامل کیږي.
هیما توما:	د وینې موضعی تولیدل د رگونو څخه بهرچه معمولاً د مایع په بڼه د انساجو په دننه کې لیدل کیږی.
هیماچوری:	په ادرار کې د وینې د سرو کرویاتو شتون.
هیمولایتیک:	د وینې د سرو حجرو تخریبیدل او د هغوی د محتویاتو ازادیدل د وینې په پلازما کې.
Hepatitis:	د ځگر یا بڼی التهاب ته وایي.
هیپاتومیگالی (د ځگر لویدل یا غټېدل):	د ځگر د لویدو ناڅانګړې (غیر وصفی) نښې ته وایي.
Hirschsprung ناروغي:	د لویو کولمو (لکه کولون او یا رکت) یوه ناروغي ده چې ټولې لویې کولمې یا یوه برخه یې عصب ونلري چې په پایله کې دنده مختلیریږي او د سخت قبضیت یا د کولمو د بندیدو لامل کیږي.
هایدروفوبیا:	د خټلو پرمهال د حنجرې درد لرونکي سیزم ته وایي
هایپرګلاسیمیا:	هغه حالت چې په هغه کې زیاته اندازه گلوکوز په وینه کې دوران کوي.
هایپرګستروم:	د ګېډې تر نامه (ټره) لاندې برخې ته ویل کیږي او د تحت معدی، سفلی بطن او یا د عاڼې ناحیې په نومونو هم یادیریږي.
هایپوګلاسیمیا:	د وینې په دوران کې د گلوکوز غیر نورماله کمښت ته وایي.
هایپوترمیا:	د بدن د مرکزي تودوخه چې د بدن د نورماله دندو او ثبات لپاره اړینه ده، کمښت ته هایپوترمیا ویل کیږي او کله چې د بدن تودوخه د سانتي ګراد ۳۵ درجې (د فارنهایت ۹۵ درجې) یا کمه شي هایپوترمیا منځ ته راځي.
هایپو ولیمیا:	د وینې د پلازما په حجم کې کموالی دی چې د وینې د ضایع کیدو او یا دیهایدریشن په پایله کې رامنځته کیږي.
هایپوکسیا:	یو پټا لوژیک حالت دی چې بدن یا د بدن یوه ناحیه د اکسیجن د کموالي یا نشتوالي له امله زیانمنیږي.
Icteric:	زیرې پورې اړوند (یرقاني)
leus:	د کولمو انسداد دی چې د کولمو د محتویاتو د تیریدو د مخنیوي لامل کیږي.
Infant:	له یو کلن څه کوچني ماشوم ته وایي
انسولین:	یو پیپټیدی هورمون دی چې د پانکراس د بیتا د حجرو په وسیله تولیدیږي او د کاربوهایدریت او شحم انقلاب تنظیموي. دشکرې د ناروغی درمل ده.
Iritis:	د قزحیې التهاب ته وایي (قزحیه د رنگه کړۍ یو نسج دی چه د سترګې د کسي پر شاوخوا څرګندیږي).
اسکیمیا:	د شریانونو د قسمي یا بشپړ بندښت له امله د وینې د جریان کموالی دی او نسجونو ته د اکسیجن د رسیدو د نیمګړتیا لامل کیږي.
جیجنوم:	د کوچنیو کولمو منځنی برخه ده چې د duodenum او ترمنځ قرار لري.
Keratitis:	د سترګې د قرنې التهاب دی (د سترګې مخکینې ناحیه)
Kernig نښه:	د سحایا د التهاب یو فزیکي عرض دی. هغه وخت چې د ناروغ سیرین یا hip

- مفصل په ۹۰ درجو قبض وي، ناروغ خپل زنگون نشي سیده (بسټ) کولای.
- د کین بطن هاپر تروفي: د زړه د اصلی پمپ کونکي بطن (کین بطن) دعضلي نسج لوییدل دي.
- Lethargy یا بې مېلي: ستوماني د ستړیا له احساس سره، سستوالی او د انرژۍ د کموالي حالت دی
- لمفاوي عقدات: د معافیت سیستم بیضوي ډوله جوړښتونه دي چې په پراخه توګه په ټول بدن کې خپاره دي.
- Lymphangitis: د لمفاوي اوعیو التهاب یا متن کېدل دي چې د ځینو باکتریايي انتاناتو یو معمولي اختلاط دی.
- مانیا: د چلند، پارونې او د انرژۍ د کچې غیر نورمال لوړ حالت ته وايي.
- Mastitis: د تي د نسج التهاب یا متن کېدو ته وايي.
- Mastoiditis: دسرد حلیموي هډوکي متښودو ته وايي چې د غوړ تر شا قرار لري.
- Meckel's diverticulation: د کولمو په ښکتنی برخه کې یوې کوچنۍ کڅوړې ته وايي چې د زیریدلو پرمهال (په ولادي بڼه) شتون لري او په دوه سلنه نفوس کې لیدل کیږي.
- میګونیم: د ماشوم د لومړنیو غایطه موادو دفع کېدل دي او سملاسي له زیریدو وروسته له نوي پیدا شوي ماشوم څخه خارجيږي، مخکې له دې چې ماشوم له شپږو او یا فورمولا څخه استفاده وکړي.
- مننژیت: د نازک نسج التهاب دی چې دماغ او شوکي نخاع یې پوښلي دي او د سحایا په نوم یادېږي.
- Metrorrhagia: له غېرو منظمو وقفو څخه له رحم څخه وینې راتلې ته وايي چې په ځانګړې توګه د میاشتنيو عادتونو ترمنځ په متوقع واټن کې رامنځته کیږي.
- Micronutrients: هره ماده لکه ویتامینونه او یا Trace element چې د سالمې روغتیا او ودې لپاره اړینه وي او بدن هغه ته په ډیره کمه کچه اړتیا لري.
- Morbidity rate: د یوې ناروغۍ یا روغتیايي حالت د خپریدو یا پېښیدو شمېر ته وايي.
- Mortality rate د وفیاتو اندازه: په یو معلوم نفوس کې د مړینو د شمېر اندازه ته وايي
- Multipara: یوې مېرمنې چې دوه یا څو ځله زیږون کړی وي.
- Myocardial Infarction یا دزړه احتشا: په عامه اصطلاح د زړه د حملې په نوم یادېږي او د وینې د جریان د بندیدو په پایله کې د زړه په یوه برخه کې رامنځته کیږي او د زړه د حجرو د مړینې لامل کیږي او د زړه د حاد حملې (AMI) په نوم یادېږي.
- میوکارډیت: د زړه د عضلي التهاب ته وايي.
- میوکارډیوم: د زړه عضلي ته وايي.
- انفی معدوي تیوب (NGT): یو ارتجاعی رابري یا پلاستيکي تیوب دی چې د پوزې له لارې معدې ته د غذا او غذايي موادو د لیریدلو لامل کیږي.
- Neonate: د زیریدو لومړیو ۲۸ ورځو ته د نوې پیداکېدو دوره وايي.
- Nocturia: په شپه کې لږ تر لږه دوه ځله ادرار کولو ته وايي
- اولیګوریا: د ادرار کمېدلو ته وايي (یعنې په ۲۴ ساعتونو کې له ۵۰۰ میلی لیټرو څخه کم ادرار)
- Ophthalmologic: په سترګې پورې اړوند.
- اورتوپیدیک: په عضلي-اسکلتي سیستم پورې اړوند.
- اوستیو میالیت: د هډوکي یو جدی انتان دی چې د باکتریا په وسیله راپیدا کیږي.
- otitis: د غوړ التهاب یا انتان ته وايي.
- Otitis externa: د بهرنی غوړ یا د غوړ د کانال التهاب ته وايي چې د بهرنی غوړ د انتان په نوم هم یادېږي.

Otitis media:	د منځني غوړ اثنان ته وايي.
د درد ارامونکي:	يا انالژيکونه، هغه درمل دي چې درد کموي يا يې اراموي.
Pancreatitis:	د پانکراس التهاب ته وايي.
Parenteral:	د درملو، غذايي موادو او يا نورو موادو له هضمي لارې څخه پرته په عضویت کې په ځانگړې توگه د انفوزن، زرقولو او يا د اينودلو له لارې تطبيق او تجويزولو ته وايي.
پراسټيزيا:	يو سوزونکي احساس دی چې په لاسونو، مټو، پښو کې احساسیږي مگر د بدن په نورو ځايونو کې هم رامنځته کېدای شي.
Pepsin:	يو انزایم دی چې له معدې څخه افرايزيږي چې په خوړو کې موجود پروتين په پيپتايند بدلولي.
Pericardial tamponade:	يو بهرني حالت دی چې پر زړه د فشار له امله رامنځته کيږي او هغه وخته پېښيږي چې وينه يا مايع د زړه د عضلې (ميوکارد) او د هغې کڅوړې چې زړه يې پوښلی (پريکارډ) په منځ کې راټوليږي.
د Perinatal دوره:	هغې دورې ته وايي چې له زيږون څخه ۲۸ ورځې مخکې او ۲۸ ورځې وروسته راوغاړي.
پريټونیت:	يو حاد او د ژوند گواښونکی حالت دی چې د پريټون جوف د کيمياوي موادو يا له باکټريا د ککړتيا له امله رامنځته کيږي.
Phonophobia:	له لوړو غږونو څخه وېرې ته وايي.
Photophobia:	د ليدو وړ رڼا پر وړاندې په غير نورماله توگه د زغم نشتوالي ته وايي (له نور څخه وېره)
Placenta Praevia:	يو ولادي نسايي اختلاط دی چې پلاستا په قسمي يا بشپړه توگه د رحم په بښکني سگمنت کې داخلېږي او په قسمي يا بشپړه توگه د رحم د عنق مجرا بندوي.
پنوموتورکس:	د پلورا په فضا کې د گاز يا هوا غير نورماله توليدنه ده چې کېدای شي نورماله تنفس مختل کړي، پلورا سږي د سينې له ديوال څخه جلا کوي.
پولی يوريا:	د ادرار د حجم زياتوالي ته وايي (چې په ورځ کې له ۲.۵ ليترو څخه زيات وي)
د Postnatal دوره:	هغه دوره ده چې د يو ماشوم له زيږيدو وروسته سملاسي پيلېږي او د شپږو اونيو لپاره دوام کوي. دا دوره د نوي پيدا شوي ماشوم اوونډ دوره ده.
د Postpartum دوره:	هغه دوره ده چې له زيږون سملاسي پيلېږي او د شپږو اونيو لپاره دوام کوي او له مور سره تړاو لري او د puerperium په نوم هم ياديږي.
د دوگلاس جوف:	په ميرمنو کې د رحم د خلفي جدار او مقعد ترمنځ د پريټون د جوف پراخوالی دی.
Pre-eclampsia:	د اميدواری له شلمې اونۍ څخه وروسته د يوې اميدواری ميرمنې د فشار ناڅاپي لوړوالی دی چې کېدای شي د مور او نازيروول شوي ماشوم د ژوند لپاره گواښونکی وي.
Prevalence يا خپرېدل:	د يوې ناروغۍ د تناسب څرگندونکی دی چې په يو نفوس يا ټولنه کې ليدل کيږي.
Primipara:	يو ميرمن چې يو ځل يې ولادت کړی وي.
د Prodromal سندروم:	د يوې ناروغۍ د پيليدو لومړني او مقدماتي يو عرض (اویا د اعراضو يوه ټولگه) ده چې د يوې ناروغۍ د وصفې يا ځانگړو اعراضو له پيليدو څخه مخکې منځ ته راځي.

پروفیلاکسی:	یوه عامه طبي يا روغتيايي پروسه ده چې لویه موخه یې د ناروغی درملنې په پرته، د ناروغی مخنیوی دی.
پروتین یوریا:	په ادرار کې د سیروم د پروتینونو د وېرې اندازې شتوالي ته وايي.
Pruritus:	هغه احساس ته وايي چې د گډولو يا د خارش د غبرگون لامل کيږي.
سایکوزس:	د عصبي ناروغیو لپاره یوه عمومي رواني اصطلاح ده چې زیاتره "له واقعیتونو سره د تماس له لاسه ورکول یا د حقیقتونو نا لیدلي گڼلو" په توگه تعریف شوی دی.
د سیري اذیما:	د ژوند یو بېړنی گواښونکی حالت دی چې په سږو کې د مایع د غیر نورماله تولیدو په وسیله منځ ته راځي او د شدید تنفسي عسرت په وسیله تشخیصيږي.
پیلونفریت:	د بولي لارو له صاعده انتان څخه عبارت ده چې د پښتورگو تر حویضې پورې رسیږي.
پایلوریک کانال:	د معدې او کوچنیو کولمو ترمنځ مجرا ته وايي.
ریتینوپاتی:	د سترگې یوه ستونزه ده چې د سترگې د شبکې د حاد یا دوامداره آفت له امله راپیدا کيږي.
د Reye سندروم:	یوه دماغي ناڅاپي او ځینې وخت وژونکې ناروغی ده چې د ځگر له استحالې سره یوځای وي، لامل یې معلوم نه دی، مطالعاتو ښودلې چې د اسپرین اخیستل د هغه پېښیدل زیاتوي او کولای شي د کوما او د دماغي مړینې لامل شي.
رېنیت:	د پوزې د داخل د مخاطي پردې تخریش او التهاب ته وايي.
رانکای:	یو خشن موزیکال آواز دی لکه خره هاری چی معمولا د قصبو په هوایی لارو کی د افرازاتو له امله رامنځ ته کیږی
Salpingitis:	د نفیري ټیوبونو انتان او التهاب ته وايي.
شیزوفرنی:	یوه رواني ستونزه ده چې د استدلال او تفکر د پروسو له منځه تللو او د وصفی هیجاني غبرگون نیمگړتیا ته وايي.
میرگي:	د دماغي نورمال الکتریکي فعالیتونو یوه ناڅاپي اختلال دی چې د شعور او یا د عصبي او سلوکي بدلونو سره یوځای وي. یو عرض یې هم اختلاج دي. (د مهربانی له مخې د اختلاج برخه دې مطالعه شي)
Sepsis:	په وینه، غړو او یا د عضویت په نورو طبیعي معقم ناحیو کې د میکروبونو او یا د هغوی د توکسینونو یرغل ته وايي.
شاک:	د ژوند گواښونکی حالت دی چې د دوراني عدم کفایي له امله د وینې جریان نسجونو ته ناکافي دی او په نتیجه کی نسجونو ته د اړتیا وړ اکسیجن او غذايي توکو رسول او د سمي متابولیتونو له منځه وړل مختل کیږی.
سینوزیت:	د جیوب التهاب او متن کېدو ته وايي.
Still birth:	هغې زیریدنې ته وايي چې د رحم په داخل کې د جنین له مړینې وروسته پیښیږي (د مړه جنین زیریدنه).
ستوماتیت:	د خولې د مخاطي پردې چې د خولې د جوف د داخلې جوړښتونه یې پوښلي دي، التهاب ته وايي، چې رخسار، وری، شونډې، ستوني، د خولې د جوف د لاندنۍ یا پورتنۍ برخې پکې شاملې دي.
Stridor:	په لوړه اواز غیر نورماله تنفس ته وايي چې د تنفسي تنگې مجرا له لارې څخه د هوا د تیریدلو پر مهال اوریدل کیږی. معمولا هغه وخت چی ناروغ ساه اخلي د اوریدو وړ ده.
Strokes:	د دماغي دندې د چټک له منځه تلل دي چې دماغ ته د وینې په رسیدلو

- کې د اختلال له امله راپیدا کیږي.
 تحت لسانی (تر ژبې لاندې): د درملو د تجویزولو فارماکولوژیکه لاره ده چې په دې وسیله د ژبې دلاندې نسجونو له لارې درمل وینه ته جذبیږي.
 سیستمیک: پر ټول بدن یا لږ تر لږه د بدن پر څو غړو یا سیستم اغیزې.
 ټکی کاردیا: دزړه دحرکتونو د سرعت زیاتوالی دی چې دنورماله حالت په پرتله زیات وي.
 ټکی پښا: چېک تنفس
 تانسلیت: د تانسلونو التهاب ته وایي چې د وېروسی یا باکتریايي انتاناتو له امله راپیدا کیږي.
 موضعی درمل: هغه درمل چې د بدن پر سطحو یعنې جلد او مخاطي پردو کې کارول کیږي.
 د غوړپرده یا Tympanic Membrane: د غوړ پردې ته وایي (طلبل ډوله یوه نازکه پرده چې د غوړ مجرا له منځني غوړ څخه جلا کوي)
 Urethral meatus: د احلیل د مجرا خړوجي فوچه، هغه نقطه چې د هغې لارې ادرار او په نارینه و کې مني یا سپرم خارجيږي.
 یورتريت: د احلیل پېرسوب یا تخریش او التهاب ته وایي، (احلیل هغه ټوب دی چې ادرار له بدن څخه خارجوي)
 Uveitis: د Uvea پېرسوب او تخریش دی (هغه جوړښت چې د سترګې منځنۍ برخه یې جوړه کړې او د سترګې شبکې ته تر ټولو ډېره وینه رسوي)
 Extraction vacuum: یوه پروسه ده چې ځینې وخت له مهبلي کانال څخه د ماشوم د خارجولو لپاره ترسره کیږي. او د ولادت په جریان کې له ولادي کانال څخه د ماشوم د سر له ویستلو سره مرسته کوي.
 Vaginitis یا د مهبلي التهاب: په میرمنو کې د مهبلي التهاب او منتن کېدو ته وایي.
 د زړه دسامي ناروغۍ: د ناروغۍ یوه پروسه ده چې د زړه یو یا څو والونه پرې اخته کیږي.
 Valvulus: د کولمو تاویدلو ته وایي چې د کولمو د بندیدو یا انسداد لامل کیږي او کېدای شي د وینې د جریان د بندیدو او د کولمو د یوې برخې د تخریبیدو لامل شي.
 vulva: د میرمنو بهرني تناسلي غړو ته وایي.
 Wheezing: شپیلې ته ورته یو لوړ تنفسی آواز دی چې د تنفس پر مهال او معمولاً د هوا د وتلو (ذفیر) په حالت کې اوریدل کیږي او د هوا په تنګو لارو کې د هوا د جریان له امله راپیدا کیږي.
 Xerophthalmia: یو حالت دی چې سترګې د اوبنکو د تولیدولو وړتیا نلري او کېدای شي د ویتامین A د کموالي له امله رامنځته شي.
 Zollinger-Ellison سندروم: یو پیچلی حالت دی چې یو یا څو تومورونه او غیر نورماله غدې په پانقرانس یا د وړو کولمو په پورتنۍ ناحیه (اثنا عشر) کې تشکیلیږي، نوموړي تومورونه په زیاته کچه ګیسترین تولیدوي او د دې لامل کیږي څو معده ډېر اسید تولید کړي او د معدې ډیراسید په خپل نوبت سره د پپټیک پې لامل کیږي

لومړۍ څپرکۍ د خولې د جوف او غاښونو ناروغي DENTAL AND ORAL CONDITIONS

د خولې د جوف او غاښونو د پنځو ناروغيو په اړه چې په دې څپرکي کې بحث شوی په هغو کې کريس (چينجي خورل) د وري التهاب، د پيريودونتيت، آبه او د خولې کانديديازيس شامل دي.

تشرېح

د خولې جوف د ځانگړو نسجونو لکه د خولې مخاطي پوښ، د وري مخاطي پوښ، هډوکي، غاښونو او د غاښونو د چاپېره جوړښتونو څخه جوړ شوی دی. د دې نسجونو التهاب او انتان کېدای شي د سلوليت، اېسه د موضعي يا پراخ تخريب او د هډوکو او غاښونو له منځه تللو لامل شي.

- د غاښونو کريس (Dental caries): د غاښ د عاج يا مينا موضعي تخريب دی چې کېدای شي د موضعي انتان او د غاښ د له منځه تللو لامل شي.
- د وري التهاب (Gingivitis): د وري التهاب يوه مزمنه پروسه ده چې کېدای شي د غاښونو له شاوخوا څخه د وريو د جلا کېدو لامل شي. د وري نکرورزي حاد التهاب يو غيرساري انتان دی چې د سخت درد او د وري او د هغه د شا اوخوا نسجونو د چټک تخريب لامل کيږي.
- د غاښ د محيط التهاب (Periodontitis): يو انتاني ناروغي ده چې د غاښونو د تقويتي نسجونو د التهاب لامل کيږي چې په پرمختللي بڼه کېدای شي د هډوکو له منځه تلو او د غاښو د خوریدلو اويا له منځه تللو لامل شي.
- آبه Abscess: د قيح توليد چې موضعي يا خپريدونکی وي چې کېدای شي سره يا پرته له Cellulitis څخه وي. زياتره موضعي اېسه د غاښونو د ورسيدو او د وري د ناروغيو له امله پيدا کيږي. ځينې وخت انتان په چټکۍ محيطي نسجونو او د علق او وجهې صفاق ته خپور شي چې کېدای شي د ژوند گواښونکی وي.
- د خولې کانديد يا زس Oral Candidiasis: يو فنگسي انتان دی چې اکثراً د کانديدالبيکانس په واسطه رامنځ ته کيږي او ژبه او دخولې د جوف مخاطي پوښ مصابولای شي. زياتره په هغو ناروغانو کې ليدل کيږي چې د لاندینيو ناروغيو (لکه د شکرې ناروغي، ايدز او نورې مزمنې ناروغي) خوارخواکي او د درملو د کارولو (لکه د انټي بيوتيکونو او سيستمیکو سټروئيډونو اخيستل) له امله ټيټ معافيت لري.

تشخيص

- د غاښونو کريس (Dental Caries)
 - د غاښونو کريس زياتره له يوه حساس سپين داغ سره پيليږي چې وروسته د يو تور ړنگه سوري په بڼه د غاښ په سطحه کې پرمختگ کوي چې له سرو او تودو خوړو سره د مستقيم تماس پر وړاندې درد کوي.
 - د غاښ تخريب کولای شي چې له اختلاطي محيطي اېسي او انتان سره وي چې ناروغ کېدای شي دوامداره درد ولري او د وري له موضعي پړسوب او قيح سره يوځای وي.
- د وري التهاب (Gingivitis)
 - د وري مزمن او غير اختلاطي التهاب
 - ورو پيل
 - کېدای شي د وري په ساحه کې خفيف موضعي او يا په ساحه کې په پراخه بڼه درد شتون ولري.
 - ممکن له وري څخه وينه راتلنه شتون ولري (په ځانگړې توگه د غاښونو له برسولو وروسته)
 - وري په روښانه سره بڼه ښکاري (نورماله وري په روښانه گلابي بڼه ښکاري) او کېدای شي له غاښونو څخه جلا شي.
 - حاد اويا تحت حاد:
 - ناڅاپه پيل

- درد لرونکې وری
- کېدای شي وینه راتلنه په خپل سر په وریو کې شتون ولري.
- کېدای شي ایری رنگه پرده وری وپوښوي.
- کېدای شي د ځولې له بد بوی سره یوځای وي.
- د غاښ د محیط التهاب (Periodontitis):
- کېدای شي موضعي یا عمومي وي.
- د وری رنگ سور یا ارغواني وي.
- له وری څخه د غاښ جلا کېدل د غاښونو له ښوریدو یا سستوالی سره.
- کېدای شي د غاښ د له منځه تلو او د هډوکي د موضعي تخریب لامل شي.
- آبه: (Abscess)
- د ژورې ساحې انتان چې کېدای شي موضعي وي، پړسوب، قبح یا دواړه غاښونه زیا نمنوی او د وری موضعي درد او پړسوب شتون لري.
- کېدای شي چې اېسی عمومي او خپورېدونکي وي.
- خپرېدونکي یا منتشر درد
- د جلد او نرم نسجونو پړسوب، کېدای شي Cellulitis هم زیات وي.
- که ناروغ پراخه انتان ولري چې ژورو نسجونو ته یې نفوذ کړی وي په دې صورت کې کېدای شي یوه عاجله جراحي پېښه وي چې باید ناروغ سمبال روغتيايي مرکز ته واستول شي.
- د ځولې کانډیډیا زس: (Oral Candidiasis)
- د شېډو په سپین رنگ لکي (Patches) چې په ژبه او د ځولې په مخاطي پردو نښتی وي چې کېدای شي د متوسط فشار په وسیله وتول شي چې قاعده یې سوروالی لري.
- کېدای شي په خوله کې د سوزیدو احساس یا د خفیف درد لامل شي.
- کېدای شي په خوړو او د مور په شیدو سره په تغذیه کې د ستونزو لامل شي.

درملنه

- د دې پورته پنځو ناروغیو د درملنې تر ټولو مهم اړخ د انتان د خپریدو پېژندنه ده چې کېدای شي یوه عاجله جراحي پېښه تشکیل کړي. د درملنې موخې، د درد او انتان له منځه وړل او د مل ناروغیو او لاملونو درملنه ده.
- د ځولې د جوف مینځل د ورځې څلور ځله د پنځو ورځو لپاره د پنځو پورته ټولو ناروغیو لپاره تجویز او لارښونه وکړئ.
 - دوه قاشغي مالګه (یا د مالګې ډیره کمه اندازه) په یو گیلایس تودو اوبو کې چې مخکې جوش ورکړل شوی وي.
 - ۰.۲٪ Chlorhexidin، ۱۵ میلی لیتره محلول تر پنځو ورځو لپاره دې وکارول شی ځکه کېدای شي د غاښونو د رنگ د توردو لامل شي.
 - یو ارامونکې یا د درد ضد درمل تجویز کړئ
 - پراستامول ټابلیټ
 - د انتاناتو د له منځه وړلو لپاره لکه د غاښ اېسه، Cellulitis او د وری حاد التهاب، انټي بیوټیک تجویز کړئ.
 - Phenoxymethyl Penicillin (Pencillin) د اوو ورځو لپاره (د سټنډرډ دوز د مطالعې لپاره د الف مل پاتې د الف ۱۶ جدول ته مراجعه وکړئ).
 - ماشومان: د بدن د وزن پر هر کیلو گرام ۱۵-۱۰ میلی گرامه پر دوز په هرو شپږو ساعتونو کې +
 - لویان: ۵۰۰ میلی گرامه له هر شپږو ساعتونو وروسته.
 - د هغو ناروغانو لپاره چې د Penicillin پر وړاندې حساسیت لري، Erythromycin او Metronidazole یو ځای تجویز کړئ. (د سټنډرډ دوز د مطالعې لپاره د الف مل پاتې الف-۱۲ او الف-۱۴ جدول وگورئ)
 - ماشومان: Erythromycin ۱۰-۱۵ میلی گرامه د بدن پر هر کیلو گرام وزن یو دوز هر شپږ ساعته وروسته

- یوځای له ۷.۵ میلی گرامه د بدن پر یو کیلو گرام وزن Metronidazole سره هر ۸ ساعته وروسته د اوو ورځو لپاره.
- Erythromycin ۵۰۰ میلی گرامه ټابلیټونه هر شپږ ساعته وروسته له ۴۰۰ میلی گرامه Metronidazole ټابلیټونو سره هر اته ساعته وروسته د اوو ورځو لپاره.
- د فنگسي ضد یو مینځونکی درمل د خولې د کانډیدایزس (thrush) لپاره تجویز کړئ.
- ماشومان: Nystatin قطره (۱۰۰۰۰ IU/ml) ۰.۵ میلی لیتره په موضعي توګه له هر ځل د تغذیې وروسته د لس ورځو لپاره.
- لویان: د Nystatin هر شپږ ساعته وروسته د لس ورځو لپاره، هره ورځ دې یو ټابلیټ وزیښل شي. د هغه د بدیل په توګه ناروغ کولای شي له Nystatin قطرې (۱۰۰۰۰ IU/ml) د ۳ ml په مقدار په موضعي توګه د خولې د پردې له پاسه هر شپږ ساعته وروسته د لسو ساعتونو لپاره وکاروي.
- که چېرې Nystatin شتون نه درلود، ناروغ کولای شي Gentian violet ۰.۵٪ محلول په موضعي توګه د اوو ورځو لپاره، هره ورځ هر اته ساعته وروسته وکاروي.

لیږدول

- د موضعي او خپریدونکي اېسې د شتون د شواهدو د ارزونې درېناز لپاره، د غاښ ویستلو او یا دواړو لپاره.
- د غاښونو د کریس د شتوالي شواهد، د غاښ د ډک کولو یا ویستلو لپاره.
- د ښه کېدو نشتوالی، نا مشخصه تشخیص یا دواړه.
- خپریدونکي اېسه او د غاړې او مخ Cellulitis یوه عاجله جراحي پیښه ده ځکه کېدای شي د هوایی لارو د خطر سره د مواجهه کېدو او د Sepsis لامل شي چې په دې صورت کې د ناروغ سملاسي رجعت ورکولو ته اړتیا ده.

وقایه:

- د خولې د جوف د ښې روغتیا ساتنې په موخه له مسواک او د غاښونو له بورس، د غاښونو د فولوراید لرونکي کریم او نرمو بورسونو څخه استفاده وکړئ، که شونې وي، له غذا خوړولو وروسته یی وکاروي.
- د امکان په صورت کې غوره ده د غاښ له تار یا floss څخه استفاده وکړئ.
- ډیرې میوې او سابه وخورئ.
- که شونې وي د غاښ رویتنه څارنه دې اجرا شي.
- د وری یا غاښ د درد په صورت کې لومړنی ارزونه وکړئ.
- د نسوارو او تنباکو له کارولو څخه ډډه وکړئ.
- له بورې، خوړو خوړو او نورو خوړو شیانو کارونه محدوده کړئ.

د ناروغ لپاره لارښونې

- په خپلو غاښونو د سختو خوړو یا د نورو سختو شیانو له ماتولو مخنیوی وکړئ (لکه بادام او غوځان)
- د ډیرو تودو یا ډیرو سرو مایعاتو له څښلو څخه مخنیوی وکړئ
- د قندي موادو یا د خوړو خوړو له استفادې څخه وروسته لږ څه تاوده مایعات له شکرې پرته وڅښئ.

دویم څپرکی د هضمي جهاز ناروغۍ DIGESTIVE SYSTEM CONDITION

۲.۱ نس ناستی او دیهایدریشن (Diarrhea and Dehydration)

احتیاط: د نس ناستي ضد درمل باید د حادثې نس ناستې د درملنې لپاره و نه کارول شي.

۲.۱.۱ له وینې پرته حاد نس ناستی له پنځو کلونو څخه په کوچنیو ماشومانو کې (Acute Diarrhea, without Blood, in Children Younger Than 5 Years)

د IMCI فلپ چارټ دی هم وکتل شي "په نس ناستي اخته ماشوم".
نوټ: که چیرې د IMCI فلپ چارټ په روغتیايي مرکز کې شتون و نلري، فلپ چارټ کولای شئ د عامې روغتیا وزارت د ماشومانو او تنکیو ځوانانو د روغتیا له څانګې څخه تر لاسه کړئ.

د ناروغۍ تعریف او شرحه:

حاد اسهال د غایطه مواد د قوام او دفعاتو له ناڅاپي بدلون څخه عبارت ده. معمولا د ویروسونو په وسیله رامنځ ته کیږي، مګر همدا راز شونې ده چې د باکټریا او یا فنگسونو په وسیله هم رامنځته شي او کولای شي په چټکۍ سره په نویو زیږیدلو ماشومانو، په خواړخواکو کوچنیانو او په هغو ماشومانو کې چې د خطر علایم شتون لري، وژونکي وي (د مهرباني له مخې لاندې متن او همدا راز د IMCI فلپ چارټ وګورئ).

تشخیص

- د لاندې مواردو په اړه پوښتنې وکړئ
 - د تعوط د فعل شمېر
 - د نس ناستي موده؛ که چیرې له دوه اونیو څخه زیاته وه د "مزمې نس ناستې" ۲.۱.۳ برخه دې مطالعه شي.
 - په غایطه موادو کې د وینې شتوالی؛ که چیرې په غایطه موادو کې وینې شتون درلود، د "وینې لرونکې نس ناستې" ۲.۱.۵ برخه دې مطالعه شي.
 - په سیمه کې د کولرا پیښې؛ که چیرې ځواب مثبت دی، باید په کولرا شکمن شئ. د "کولرا" ۲.۱.۷ برخه دې مطالعه شي.
- د خطر او د سختې ناروغۍ علایم دی وارزول شي.

یادښت: په ټولو لاندې مواردو کې باید انټی بیوټیک د عضلي زرق یا IM له لارې تطبیق او ناروغ روغتون ته ولیدودول شي.

 - له دوه اونیو څخه کوچني ماشومان
 - هغه ماشومان چې خټل نشي کولای او یا چې شیدې نشي رودلی
 - دوامدارې کانګې
 - اختلاجات
 - د شعور په حالت کې بدلون
 - حاد بطن
 - شديده خواړخواکي
- د دیهایدریشن او د هغه د تصنیفولو د درجې ارزونه، "همدا راز (۲.۱.۱ الف) جدول دې مطالعه شي"
 - شديده دیهایدریشن (ج)

- لړ دیهایدریشن (ب)
○ نه دیهایدریشن (الف)

د ۲۰۱۱ الف جدول. د دیهایدریشن تصنیفول

الف = پرته له دیهایدریشن	ب = لړ دیهایدریشن (لړ تر لږه دوه نښې)	ج = شدید دیهایدریشن (لړ تر لږه دوه نښې)	هغه نښې چې باید معاینه او ولیدل شي
بنه او بیداره	نا کراره، مخرش او یا دواړه	خوځېدن، په سختی له خوبه وښیدل او یا بې هوښه	شعوري حالت
سترګې نه دي ژورې شوي	سترګې ژورې شوې	سترګې ژورې شوي	د سترګو ژور والی
نورماله خښل او رودل	تنده او خښلو او رودلو ته لېوالتیا	خښل او رودل ډیر کم او ډیر کمزوري او یا هیڅ نشته	د خښلو او رودلو وړتیا
د Pinch وروسته جلد سم لاسي عادي حالت غوره کوي	له Pinch وروسته جلد په ورو توګه عادي حالت ته اوږي مګر له دوه ثانیو څخه لږ وخت کې	له Pinch وروسته جلد په دوه ثانیو او یا له هغه څخه زیات وخت کې نورماله حالت ته راګرځي.	جلدي Pinch (یا په ګوتو کې د پوستکي نیول د هغه د قوام د کتنې لپاره)

درملنه:

- په ماشومانو کې اصلی موخه د دیهایدریشن مخنیوی یا درملنه او د سببی مترافقه انتاناتو (د مثال په توګه، ملاریا، سینه و بغل، د منځني غوړ التهاب، د بولي لارو انتانات) او خوارځواکي ردول دی.
- د درملو نه پرته اهمات
- په هغو ماشومانو کې چې د مور د شېدو په وسیله تغذیه کیږي، د مور د شېدو په وسیله د تغذیې دوام تر هغې اندازې چې ماشوم یې غواړي او تر هغه وخته چې نس ناستی بند شي.
 - په هغو ماشومانو کې چې نور د مور د شېدو په وسیله نه تغذیه کیږي، د هغو نورمالې تغذیې نه دې دوام ورکړل شي برسیره پردې اضافي مایعات تر هغه وخته چې نس ناستی ودریږي، ماشوم ته دې تطبیق شي.

فارمکولوژیک اهمات

د دیهایدریشن درجې ته په پاملرنې سره دې له لاندې پلانونو څخه د ۲۰۱۱ الف جدول مطابق تطبیق شي.

- د ج پلان. هغه ماشوم چې شدید دیهایدریشن لري، سملاسي یې درملنه وکړئ.
- د ج ۱ پلان. که چیرې تاسو وریدي تجهیزات او محلولونه په واک کې لرئ:
 - په چټکۍ سره وریدي د Ringer lactate محلول (Hartmann's) محلول، که چیرې شتون یې نه درلود، نورمال Saline ۰.۹ %، سلنه تطبیق کړئ) د ۱۰.۲ ب جدول مطابق ورکړئ.
 - ماشوم په کلینیک کې وساتئ او هر یوه ساعت وروسته یې چک کړئ.
 - هر څومره ژر چې ماشوم د خښلو وړتیا پیدا کوي ژر تر ژره ماشوم ته د ORS محلول د ۵ میلی لیتر/کیلو ګرام/په هر ساعت کې تطبیق کړئ.
 - د دیهایدریشن بیا ارزونه او تصنیف وکړئ.

- کوچني ماشومان (له ١٢ میاشتو څخه کم عمره) له شیر ساعتونو وروسته
- ماشوم (١٢ کلن یا تر هغه لوی) له درې ساعتونو وروسته
- تصنیف یا د دیهایدریشن درجه بندی ته په پاملرنې د مناسبې درملنې پلان وټاکئ (یعنې ب یا الف)
- که چیرې لا هم ماشوم د ج په پلان کې درجه بندي شوي، ناروغ په داسې حال کې چې د IV څاڅکي یې د تطبیق په حال کې دي (د سیروم له تطبیقولو سره) روغتون ته ولیدول شي.
- د ج ٢ پلان. که چیرې تاسو وریدي تجهیزات او محلولونه په واک کې نلرئ، مگر وریدي درملنه له ٣٠ دقیقو څخه په کم واټن کې د لاسرسي وړ ده:

٢.١.١ ب جدول. په شدید دیهایدریشن اخته ماشوم: د زرقي محلولونو تجویزول

د ماشوم عمر	٣٠ ملي لیتره/کیلو ګرام دې تجویز شي په	بیا دي، د ٧٠ ملي لیتر في کیلو ګرام په اندازه تجویز شي.
د ١٢ میاشتو کوچني ماشومان	یو ساعت ^a	٥ ساعته
له ١٢ میاشتو څخه تر پنځو کلونو	٣٠ دقیقې ^a	دو نیم ساعته

a که چیرې د پورته مقدار له تطبیق وروسته بیا هم رادیال نبض کمزوری یا د لمس یا جس وړ نه وي، دا اندازه یوځل بیا تکرار کړئ.

- سملاسي ماشوم د وریدي درملنې لپاره راجع کړئ.
- که چیرې ماشوم د څښلو توان لري، د ORS محلول د هغه پایواز یا سرپرست ته ورکړئ او وښایست چې څه ډول په تکراري توګه دا محلول ګوټ ګوټ د سفر په اوږدو کې (پورته روغتیايي مرکز ته) ماشوم ته تطبیق شي.
- د ج ٣ پلان: که چیرې وریدي درملنه په لرې واټن (له ٣٠ دقیقو څخه په کم وخت کې) د لاسرسي وړ نه ده، او تاسو د انفي-معدوي تیوب (Nasogastric tube) په تطبیقولو پوهیږئ:
- انفي-معدوي تیوب تطبیق کړئ، او ORS د ٢٠ ملي لیتره/کیلو ګرام/ساعت په اندازه د شیر ساعتونو لپاره تجویز کړئ.
- هر ساعت وروسته بیا ارزونه وکړئ.
- که چیرې کانګې په تکراري توګه او یا بطن پړسوب درلود، ORS ورو تطبیق کړئ
- د نه روغیدو په صورت کې له درې ساعتونو وروسته، ماشوم د ورید په داخل کې د زرقي درملنې لپاره راجع کړئ.
- له شیر ساعتونو وروسته د ماشوم ارزونه او دیهایدریشن د درجې بیا ټاکل چې د هغه له مخې د درملنې پلان برابر شي.
- د ج ٤ پلان: که چیرې وریدي درملنه په لرې واټن (له ٣٠ دقیقو څخه په کم وخت کې) د لاسرسي وړ نه ده او تاسو د انفي-معدوي تیوب (Nasogastric tube) په تطبیقولو هم نه پوهیږئ، مګر ماشوم کولای شي څه شی وڅښي:
- ORS دې د ٢٠ ملي لیتره/کیلو ګرام/ساعت په اندازه د شیر ساعتونو لپاره د څښلو په وقفي بڼه په تکراري توګه تطبیق شي.
- هر ساعت وروسته بیا ارزونه وکړئ.
- که چیرې کانګې په تکراري توګه او یا بطن پړسوب او پراختیا لرله، ORS ورو تطبیق کړئ
- له درې ساعتونو وروسته د نه روغیدو په صورت کې، ماشوم د وریدي درملنې لپاره راجع کړئ.
- له شیر ساعتونو وروسته د ماشوم دیهایدریشن بیا ارزایي او تصنیف کړئ چې د هغه له مخې د درملنې پلان برابر شي.

- د ج ۵ پلان: که چیرې وړیدي درملنه په لرې واټن (له ۳۰ دقیقو څخه په کم وخت کې) د لاسرسي وړ نه وي او تاسو د انفي - معدوي تیوب (Nasogastric tube) په تطبیقولو هم نه پوهیږئ، او ماشوم نشي کولای څه شي وڅښي په هغه صورت کې:
 - ماشوم دې سملاسي نږدې روغتون ته راجع شي
- د ب پلان. د ORS په وسیله په لږ دیهایدریشن د اخته ماشوم درملنه
 - د ب-۱ پلان: ماشوم په روغتیايي مرکز کې د ORS په وسیله د څلورو ساعتونو لپاره تر درملنې لاندې ونیسي:
 - ری-هایدریشن د ORS په وسیله د ماشوم د وزن او عمر ته په پاملرنې سره چې په ۲.۱.۱ ج جدول کې ښودل شوی دی، اجرا شي؛
 - که چیرې ماشوم د ۲.۱.۱ ج جدول پرتله زیات ORS غواړي، په دې صورت کې په زیاته اندازه ORS هغه ته ورکړئ.
 - مور او یا هغه شخص چې له ماشوم څخه څارنه کوي، ته دې وښودل شي چې څه ډول باید ORS ماشوم ته ورکړل شي.
 - تکراري واړه غږونه د قاشغې او یا د پیالې په وسیله ماشوم ته ورکړئ.
 - که چیرې ماشوم کانکې کوي، لس دقیقې صبر وکړئ، بیا د ORS تطبیق ته د پخواني ځل په پرتله، لږ څه ورو دوام ورکړئ.
 - د ماشوم د غوښتنې په وخت کې، تغذیې ته دې دموږ د شیدو په وسیله دوام ورکړئ.
 - له څلورو ساعتونو وروسته د ماشوم دیهایدریشن بیا و ارزوی او تصنیف کړئ
 - د درملنې مناسب پلان وټاکئ (یعنې ج، ب، ا، لف).
 - کور ته د ماشوم له استولو مخکې، تغذیه دموږ د شیدو په وسیله پیل کړئ.
- د ب ۲ پلان. که چیرې مور یا د ماشوم پایواز نشي کولای د څلورو ساعتونو لپاره په کلینیک کې پاتې شي په هغه صورت کې:
 - مور (او یا هغه شخص چې د ماشوم څارنه کوي - پایواز) ته دې وښودل شي چې څه ډول ORS په کور کې برابر او باید ماشوم ته ورکړي (ب-۱ پلان کورئ)
 - تشریح کړئ چې په لومړیو څلورو ساعتونو کې ماشوم ته څومره ORS ورکړل شي.
 - د ماشوم د څلورو لومړیو ساعتونو لپاره د ORS د کافي پاکټونو اندازه د ماشوم پایواز ته ورکړئ.
 - د ORS دوه اضافي پاکټونه د له څلورو لومړیو ساعتونو څخه وروسته د الف پلان د دوام لپاره ورکړل شي.
 - د زنک Zinc (۲۰ میلی گرام) ټابلیټونه دې په لاندې توگه تجویز شي.
 - تر شپږو میاشتنيو کم عمره ماشومان: په ورځ کې نیم ټابلیټ دې په لږو پاکو اوبو کې حل شي، د ۱۰ ورځو لپاره.

۲.۱.۱ ج جدول. په لږ دیهایدریشن اخته ماشوم: د خولې له لارې ریهایدریشن

دوز	عمر (که چیرې وزن معلوم نه وي) ^a			
	۲ تر > ۵ کلونو	۱ تر > ۲ کاله	۴ تر > ۱۲ میاشتو	۴ میاشتي >
	وزن			
	۱۹-۱۲ کیلوگرامه	۱۰ تر > ۱۲ کیلوگرامه	۶ تر > ۱۰ کیلوگرامه	> ۶ کیلو گرام
	۹۰۰-۱۴۰۰ میلی لیتره	۷۰۰-۹۰۰ میلی لیتره	۴۰۰-۷۰۰ میلی لیتره	۲۰۰-۴۰۰ میلی لیتره
	په ۴ ساعتونو کې ټول په ملي لیتر			

a د ماشوم له عمر نه یوازې هغه وخت چې تا سو په وزن نه پوهیږئ، استفاده وکړئ. د ORS د اړتیا وړ اندازه په (میلی لیتر) کیدای شي د ماشوم د وزن (په کیلو گرام) ضرب په ٧٥ کې محاسبه شي.

- شیر میاشتی یا تر هغه لوی ماشومان: په ورځ کې یو ټابلېټ دې په لږو پاکو اوبو کې حل شي، د ١٠ ورځو لپاره دی تطبیق شي.
- د ماشوم مور یا د ماشوم پایواز دې وپوهول شي خو د ماشوم تغذیې ته په نورماله توگه دوام ورکړي.
- د ماشوم مور یا د ماشوم پایواز دې وپوهول شي خو په لاندې حالاتو کې ماشوم بیرته کلینیک ته راوړي:
 - د نه روغېدو په صورت کې
 - د خطر د نښو رامنځته کېدل (پورته "تشخیص" ته پاملرنه وکړئ)
 - په غایظه موادو کې وینه

الف پلان. هغه ماشوم چې له دیهایدریشن پرته نس ناستی لري په کور کې درملنه وکړئ. په کور کې د نس ناستي د درملنې د څلورو اصولو یا پرنسپونو په اړه له مور او یا پایواز سره چې د ماشوم څارنه کوي، مشوره وکړئ:

- لومړی پرنسپ (تگلاره): تر هغه وخته چې نس ناستی ودریږی ماشوم ته دې اضافي مایعات ورکړل شي.
 - د ماشوم مور ته دوه پاکټه ORS ورکړئ او د ORS د جوړولو په اړه دې د ماشوم مور یا پایواز ته لارښونه وشي.
 - د ماشوم مور ته لارښونه وکړئ خو ماشوم ته په هره اندازه چې شیدې غواړي، شیدې ورکړي.
 - که ماشوم یوازې د مور په شیدو تغذیه کيږي (یعنې تر شیر میاشتنیو کم عمره ماشومان) مور ته لارښونه وکړي خو د شیدو په وسیله هر ځل تغذیې وروسته ماشوم ته ORS په هره اندازه چې غواړي، ورکړي.
 - که چیرې ماشوم یوازې د مور په شیدو نه تغذیه کيږي، د ماشوم مور ته و ویاست چې ماشوم ته ORS او نور مایعات (د مثال په توگه، سوپ، د وریجو اوبه، یخې جوش شوې اوبه) ورکړي.
 - د ماشوم مور یا پایواز ته توصیه وکړئ خو ماشوم ته په تکراري توگه، وایړه وایړه غږپونه د قاشغې او یا د پیالې په وسیله مایعات ورکړئ.
 - که چیرې ماشوم کانگې وکړئ، د ماشوم مور ته و وایاست څو لس دقیقې صبر وکړي او بیا دې ماشوم ته د مایعاتو د کوچنیو غږپونو په ورکولو سره بیرته دوام ورکړي.
 - د ماشوم مور او یا پایواز ته چې د هغه څارنه کوي توصیه وکړئ خو د غوط له هر فعل څخه وروسته ماشوم ته ORS ورکړي (١٠ میلی لیتره/کیلو گرام):
 - له ٥٠-١٠٠ میلی لیتره، که چیرې ماشوم له دوه کلونو څه کوچنی وي
 - له ١٠٠-٢٠٠ میلی لیتره که چیرې ماشوم له دوه کلونو څخه لوی وي
 - د ماشوم مور باید ماشوم ته اضافي مایعات تر هغه وخته چې د ماشوم نس ناستی ودریږي، ورکړي
 - دویم پرنسپ (تگلاره): د تغذیې دوام
 - د ماشوم مور ته لارښونه وکړئ خو ماشوم ته په هره اندازه چې غواړي، شیدې ورکړي.
 - که چیرې ماشوم له شیرو میاشتنو څخه لوی وي د ماشوم مور ته سپارښتنه وکړئ څو نور غذايي توکي په عادي توگه ورکړي او د دې ترڅنګ هغه وهڅو چې ماشوم ته مایع غذايي توکي په هره اندازه چې ماشوم غواړي، ورکړي.
 - دریم پرنسپ (تگلاره): ماشوم ته دې د لس ورځو لپاره Zinc تابلیت تطبیق شي، ان تر هغه وخته چې د ماشوم نس ناستی ودریږي:
 - له شیرو میاشتنو څخه کوچنیو ماشومانو ته، پنځه ٢٠ میلی گرامه Zinc ټابلېټونه ورکړئ:
 - هره ورځ نیم ټابلېټ په لږو پاکو اوبو کې حل او ماشوم ته دې ورکړل شي
 - له شیرو میاشتنو څخه لویو ماشومانو ته ١٠ ټابلېټه ٢٠ میلی گرامه ورکړئ
 - هره ورځ یو ټابلېټ په لږو پاکو اوبو کې حل او ماشوم ته ورکړل شي.
 - مور یا هغه کس چې د ماشوم څارنه کوي وپوهول شي چې زنګ د ORS بدیل نه دی، بلکې Zinc دې له

ORS څخه برسیره ناروغ ته تجویز شي.

- څلورم پرنسپ (تگلاره): په لاندې حالاتو کې دې ماشوم سملاسي روغتيايي مرکز ته بیرته راوستل شي
 - نه روغیدل او یا د ماشوم د وضعیت خرابیدل
 - په غایطه موادو کې د وینې شتوالی
 - د تې پیدا کیدل
 - په غذا خوړلو او څښلو کې کمزورتیا او ضعف
 - د سترگو ژوروالی او یا عادي حالت ته د جلد ورو بیرته راستنیدل

لیردول:

- دیهایدریشن له نورو اختلاطاتو سره یوځای
- له ١٢ میاشتو څخه کوچني ماشومان په غایطه موادو کې د وینې له شتون سره
- په خوار خواکي اخته ماشومان
- د عمومي خطر له نښو سره ماشومان (د مثال په توګه، د شعور د حالت بدلون، اختلاج، په خوراک او څښاک کې کمزورتیا، د هر څه کانګې کول)
- د حاد بطن احتمال چې کېدای شي جراحي ته اړتیا وي

وقایه:

- د فردي روغتیا ساتنه (یعنې په خوړو له لاس وهلو څخه مخکې او تشاب ته له تلو وروسته د صابون په وسیله د لاس مینځل)
- خوندي تشنا بونه
- د مور د شیدو په وسیله تغذیه په ځانګړې توګه د ژوند په لومړیو شپږو میاشتو کې.

٢٠١٢ له وینې پرته حاد نس ناستی، له پنځو کلونو څخه په لویو ماشومانو او لویانو کې (Acute Diarrhea, without Blood, in Children Older Than 5 Years and Adults)

تشریح

حاد نس ناستی له دوه اونیو څخه په کمه موده کې د اوښلو غایطه موادو د دفعاتو له زیاتوالي څخه عبارت ده. دا حالت په خپله د بڼه کېدو یا Self-limiting وړ ده او درملنه یې د بدن د مایعاتو مناسبه اعاده ده.

درملنه

- ناروغ ته دې توصیه وشي خو په نورماله توګه خپلې تغذیې ته دوام ورکړي او د مایعاتو اخیستل زیات کړي او له مایعاتو خوړو څخه ډیره استفاده وکړي.
- ناروغ یا د ناروغ پایواز ته چې د ناروغ څارنه کوي، د ORS جوړول او برابرول وښودل شي او هغه ته دې توصیه وشي خو له هر ځل تغوط څخه وروسته په منظمه توګه یو ګیلاس اوبه وڅښي.

لیردول

- د نورو ناروغیو شتون چې له شدید دیهایدریشن یا د الکترولیتونو له ستونزې سره مل وي.
- د حاد بطن احتمال چې کېدای شي جراحي ته اړتیا وي

۲.۱.۳ له پنځو کلونو څخه په کوچنیو ماشومانو کې له وینې پرته دوامداره یا معنده نس ناستی (Persistent Diarrhea, Without Blood, in Children Younger Than 5 Years)

تشریح

دوامداره نس ناستی له هغه نس ناستي څخه عبارت ده چې په حاده بڼه پیل شوی او ۱۴ ورځې یا تر هغه زیات دوام وکړي. د دیهایدریشن د علایمو یا د خطر د عمومي علایمو د پیدا کېدو په صورت کې په روغتون کې د ماشوم بسترولو ته اړتیا وي. (۲.۱.۱ برخه له وینې پرته شدیدې نس ناسته، له پنځو کلونو څخه په کوچنیو ماشومانو کې دې وکتل شي)

تشخیص

ماشومان دې د دیهایدریشن، خوارخواکي او د خطر د نښو له پلوه و ارزول شي.

درملنه

- که چیرې ماشوم له دوه میاشتني څخه کوچنی وي، ریهایدریشن دی د دیهایدریشن د درجې مطابق پیل شي (یعنې په ۲.۱.۱ الف کې د ج، ب، یا الف پلان) او بیا ناروغ روغتون ته ولیږدوئ.
- که چیرې دیهایدریشن او یا د خطر نښې شتون ولري، ریهایدریشن دی د دیهایدریشن د درجې مطابق پیل شي (یعنې په ۲.۱.۱ الف کې د ج، ب، یا پلان) او بیا ناروغ روغتون ته ولیږدوئ.
- که چیرې ماشوم دیهایدریشن نه درلود:
 - د ماشوم تغذیه دې په لاندې توګه تطبیق شي:
 - که چیرې ماشوم یوازې د مور د شیدو په وسیله تغذیه کيږي، مور ته دې توصیه وشي څو ډیر ځله او د اوږد مهال لپاره ماشوم ته شیدې ورکړي.
 - که چیرې ماشوم د نورو (پوډري) شیدو په وسیله تغذیه کيږي او مرستندویه غذا نه اخلي په دې صورت کې - د نورو شیدو د تغذیې پر ځای دې د مور د شیدو په وسیله تغذیه شي.
 - یا -
 - د نورو شیدو (پوډري شیدو) په وسیله د تغذیې پر ځای دې مستې ماشوم ته ورکړل شي.
 - او یا -
 - د نورو شیدو (پوډري شیدو) نیمایي له نیمه جامدو مرستندویو خوړو سره (مثال په توګه، د چرګې هګۍ، حبوبات، غلې او شحمي توکي) یوځای ماشوم ته ورکړل شي.
 - که چیرې ماشوم له نورو خوړو څخه استفاده کوي په دې صورت کې:
 - مناسب خواړه دې د ماشوم د عمر مطابق برابر شي (لکه شوله، سر سر، پیرني او آش)
 - ماشوم ته دې په ورځ کې دوه ځله اضافي خواړه ورکړل شي.
 - پورته غذايي رژیم ته دې څلور اونۍ دوام ورکړل شي.
 - ماشوم ته بشپړ یا مرستندویه خواړه په لاندې شرحه ورکړئ:
 - د لس ورځو لپاره د خوړلي له لارې Zinc تابلېت:
 - تر شپږو میاشتو کم عمره ماشومان: نیم ۲۰ میلی ګرامه تابلېت هره ورځ په لږو پاکو اوبو او یا له شپږو کې حل شي ماشوم ته تجویز شي.
 - شپږ میاشتني یا تر هغه لوی ماشومان: یو تابلېت ۲۰ میلی ګرامه هره ورځ، په لږ څه پاکو اوبو کې حل او ماشوم ته تجویز شي.
 - د خوړلي له لارې د Folic acid تجویز، یو ملي ګرام تابلېت په ورځ کې یو ځل د ۱۴ ورځو لپاره.
 - ویتامین A د ۲.۱.۳ جدول مطابق یو دوز
 - د ماشوم مور ته دې لارښوونه وشي څو ماشوم پنځه ورځې وروسته بیا راولي مګر د ماشوم د وضعیت د خرابیدو په صورت کې دې ژر مراجعه وشي.

٢.١.٣ جدول: د ویتامین A مرستندویه

عمر	د ویتامین A کپسولونه		
	٥٠٠٠٠ IU	١٠٠٠٠٠ IU	٢٠٠٠٠٠ IU
٦ تر ١٢ < میاشتو	دوه کپسوله	یو کپسول	نیم کپسول
١ - ٥ کلونو	څلور کپسوله	دوه کپسوله	یو کپسول

لیردول

- له دوه میاشتنی څخه ټول کوچني ماشومان چې له ١٤ ورځو څخه زیات نس ناستی لري.
- ټول ماشومان چې له ١٤ ورځو څخه د زیاتې مودې لپاره له دیهایدریشن او د خطر له عمومي نېټو سره په نس ناستي اخته دي.
- ټول هغه ماشومان چې له پنځو ورځو درملنې څخه وروسته مراجعه کوي او بیا هم نس ناستی لري.

٢.١.٤ له پنځو کلونو څخه په لویو ماشومانو او لویانو کې دوامداره یا معنده نس ناستی
(Persistent Diarrhea, in Children Older Than 5 Years and in Adults)

تشریح

هغه نس ناستي چې له ١٤ ورځو څخه د زیاتې مودې لپاره له پنځو کلونو څخه په لویو ماشومانو او یا په لویانو کې دوام پیدا کړي، کېدای شي د جدي لاملونو څرگندویه وي.

درملنه

که چېرې د غایطه موادو مستقیمه معاینه (په دریو بیلگو کې) شونې وي آفت دې وټاکل شي او د هغه درملنه دې وشي.

لیردول

ټول هغه حالات چه د غایطه موادو معاینه شونې نه وی یا د غایطه موادو د معاینې ټول موارد (د دریو بیلگو له معاینې څخه وروسته) که منفي وي.

٢.١.٥ دیزانټري (وینه لرونکې نس ناستې) یا پیچش (Dysentery)

تشریح

دیزانټري هغه نس ناستی ده چی پکې له اوبلنو او زیاتو دفعاتو غایطه موادو سره وینه او مخاط یو ځای وی.. د دې حالت لامل اکثرا شیکلا ده او نژدې ټولې دا پېښې د انټي بیوتیک په وسیله درملنې ته اړتیا لري. په هغه صورت کې چې لابراتوار ته لاسرسی نه وي، د باسیلر دیزانټري درملنه دې پیل شي (٢.١.٥.١ برخه "باسیلر دیزانټري" وکتل شي). که چېرې ناروغ له ٤٨ ساعتونو څخه وروسته بڼه نشي، د امیبې دیزانټري درملنه دې پیل شي، (٢.١.٥.٢ برخه "امیبې دیزانټري" دې وکتل شي)، او یا د زیاتې ارزونې لپاره دې لابراتوار ته راجع شي.

لیردول

په هغه حالانو کې چې ناروغ امپریکال (تجربوي) درملنې ته ځواب ور نه کړي.

۲.۱.۵.۱ با سیلیری دیزانتی (Bacillary Dysentery)

تشریح

د با سیلر دیزانتی زیات شمیر واقعات د شیکایلا په وسیله رامنځته ته کیږي.

تشخیص

- د نس ناستي ناڅاپه پیل دې د لاندې موضوعاتو سره چک شي:
 - وینه لرونکي غایطه مواد
 - په غایطه موادو کې مخاط
 - تبه
 - اکثراً د نس نیول یا کرامپونه
 - احتمالي عمومي اعراض: سمی (یا Toxic) حالت، اختلاجات، بی مېلي او ضعفیت.
- د خطر د عمومي نښو او دیهایدریشن ارزونه او څېړنه، په ځانګړې توګه له پنځو کلونو څخه په کوچنیو ماشومانو کې (د IMCI فلپ چارټ وګورئ)
- د ماشوم د تغذیې وضعیت او د دیهایدریشن ارزونه او درجه بندي (۲.۱.۱ الف جدول وګورئ)

درملنه

- د دیهایدریشن درملنه او مخنیوی. (۲.۱.۱ برخه "له وینې پرته شدید نس ناسته، له پنځو کلونو څخه په کوچنیو ماشومانو کې او ۲.۱.۲ برخه "له وینې پرته نس ناسته، له پنځو کلونو څخه په لویو ماشومانو او لویانو کې وګورئ").
- له پنځو کلونو څخه په کوچنیو ماشومانو کې د خولې له لارې د Zinc تابلیت تجویز د لسو ورځو لپاره:
 - تر شپږ میاشتو کم عمره ماشومان: نیم ۲۰ میلی ګرامه ټابلیټ هره ورځ په لږو پاکو اوبو یا شېدو کې حل شیاو ماشوم ته تجویز شي.
 - شپږ میاشتني یا تر هغه لوی ماشومان: یو ټابلیټ ۲۰ میلی ګرامه هره ورځ، په لږ څه پاکو اوبو کې حل او ماشوم ته تجویز شي.
- ټولو ماشومانو او لویانو ته دې، انټي بیوټیک د پنځو ورځو لپاره تجویز شي.
 - لومړۍ کړبڼه:
 - Ciprofloxacin ټابلیټ: د ۱۰ mg/kg/dose په اندازه هر ۱۲ ساعته وروسته (د IMCI د فلپ چارټ "د خولې له لارې د یو مناسب انټي بیوټیک تجویز" برخه وګورئ).
 - احتیاط: Ciprofloxacin په امیدوارو میرمنو کې مضاد استطباب دي او د امکان تر بریده دې په ماشومانو کې د هغه له کارولو څخه ډډه وشي.
 - یا-
 - Co-trimoxazole. د الف په مل پانه کې دې د الف ۸ جدول ته د ستندردو دوزونو لپاره مراجعه وشي.
 - یا-
 - دویمه کړبڼه:
 - Motronidazole د الف په مل پانه کې دې د الف ۱۴ جدول ته د ستندردو دوزونو لپاره مراجعه وشي.

د ناروغ تعقیبول

ناروغ دې له ۴۸ ساعتونو وروسته و ارزول شي او وڅېړل شي. که چیرې ناروغ هېڅ بڼه والی و نه ښود (یعنې د غایطه موادو د دفعاتو او یا په غایطه موادو کې د وینو کمېدل او یا دواړه نلري او ناروغ لا اوس هم تبه لري او بڼه اشتهای نلري)، د لومړۍ کړبڼې انټي بیوټیک نورو انټي بیوټیکونو او یا Metronidazole بدل کړئ.

لیردول

- له وینه لرونکې اسهال سره له دوه میاشتنې ټول کوچني ماشومان.
- احتیاط: سملاسي دې (روغتون ته) ولیردول شي.
- له پنځو کلونو څخه ټول کوچني ماشومان له وینه لرونکې نس ناستي او د خطر له عمومي نښو، سختې خوارخواکۍ او یا شدید دیهایدریشن سره.
- ټولې پېښې چې په ناروغ کې سخت او جدي عمومي اعراض او نښې شتون ولري او یا له ۴۸ ساعتونو درملنې څخه وروسته د ناروغ درملنې خواب نه ورکول.

مخنیوی

- د انفرادي او عمومي روغتیا ساتنې توصیه کول.
- په خوړو له لاس وهلو مخکې او د تشاب له کارولو څخه وروسته په صابون د لاسونو مینځل
- په ناروغو نوو زیریدلو ماشومانو او کوچنیانو له لاس وهلو وروسته په صابون لاس مینځل
- د صابون په وسیله د خیرنې روجایي او جامو مینځل
- له خوندي تشنابونو څخه ګټه اخیستل
- د ژوند په لومړیو شپږو میاشتو کې یوازې د مور د شیدو په وسیله تغذیه

۲۰۱۵.۲ آمیبی دیزانتری یا آمیبی پیچش (Amebic Dysentery)

تشریح

امیبی دیزانتری د *Entamoeba Histolytica* پرازیت په وسیله راپیدا کیږي.

تشخیص

- په نس ناستي کې دې لاندې شیان چک شي
 - وینه او مخاط
 - خراب بوي
 - د تې نشتون (معمولا)
- متناوب قبضیت، نفخ او باد او یا دواړه دې چک شي
- د دیهایدریشن ارزونه او درجه بندي (۱ ۲۰۱۱ الف جدول دې وکتل شي)
- د شونتیا په صورت کې، د تازه غایطه موادو معاینه دې (په دریو سمپلونو یا بیلګو) کې اجرا شي، چې کېدای شي د امیب ژوندۍ بڼه یا سیست تائید کړي.

درملنه

- د غذا او مایعاتو تجویز او تامینول
- د *Metronidazole* تجویز: د الف په مل پاته کې د الف ۱۴ جدول ته د ستندردو دوزونو لپاره مراجعه.

لیردول

- درملنې ته د خواب د نه ورکولو په صورت کې
- د لابراتواري معاینې د تائید لپاره
- د ناروغ د وضعیت د خرابیدو په صورت کې

ناروغ ته لارښوونې

- د انفرادي او عمومي روغتیا ساتنې توصیه کول.
- په خوړو له لاس وهلو مخکې او د تشناب له کارولو څخه وروسته په صابون د لاسونو منځل
- په ناروغو نویو پیدا شویو ماشومانو او کوچنیانو له لاس وهلو وروسته په صابون لاس منځل
- د صابون په وسیله د خیرنې روجایي او جامو منځل
- له خوندي تشنابونو څخه استفاده
- د ژوند په لومړیو شپږو میاشتو کې یوازې د مور د شیدو په وسیله تغذیه

۲.۱.۶ جیارديازس (Giardiasis)

تشریح

جیارديازس د وړو کولمو یوه پروتوزوایي ناروغي ده چې لامل یې *Flagellate Giardia lamblia* ده. د تروفوزویت یا سیست بڼه یې د غایطه موادو *feco-oral* له لارې انتقالیږي.

تشخیص

- جیارديازس غالباً اعراض نلری او یا ځینی وخت لاندې متناوبې نښې شتون لري:
 - کولای شي د حادې اوبلنې نس ناستې په بڼه څرگند شي، چې ځینې وختونه د خو ورځو څخه تر څو اونيو دوام کوي.
 - کولای شي له زړه بدوالي، د نس له نفخ او باد، د اېی گاسټریک د ناحیې له دردونو او یا د بطن د کرامپونو سره یو ځای وی
 - کولای شي له بد بویه غایطه موادو او له لویو غایطي کتلو سره یوځای وي.
- که چېرې لابراتواري معاینه تر سره کولای شي، دودیز تشخیص د جیارديا د تروفوزویت یا سیست د بڼې له پیژندلو سره په غایطه موادو کې وضع کېدای شي (البته په دریو بېلګو کې)
- د دیهایدریشن ارزونه او تصنیفول چې کېدای شي شتون ولري (د ۲.۱.۱ الف جدول دې وکتل شي)

درملنه

- که چېرې نس ناستی شتون ولري، د دیهایدریشن او خوارخواکۍ درملنه او مخنیوی دې وشي (۲.۱.۱ برخه "له وینې پرته شديده نس ناسته، له پنځو کلونو څخه په کوچنیو ماشومانو کې او ۲.۱.۲ برخه "له وینې پرته نس ناسته، له پنځو کلونو څخه په لویو ماشومانو او لویانو کې وگورئ").
- Metronidazole د خولې له لارې تجویز شي. د الف په مل پانه کې دې د الف ۱۴ جدول ته د ستندردو دوزونو لپاره مراجعه وشي.
- په جیارديازس اخته امېدوارې میرمنو کې، که چېرې (Furazolidone) په واک کې وي، تجویز دې شي (د خولې له لارې ۱۰۰ میلی گرامه هر شپږ ساعته وروسته د اوو ورځو لپاره)

لیردول

- د جیارديازس ټول اختلاطي موارد
- هغه پیښې چې درملنې ته یې ځواب نه دی ویلی

وقایه

- په خوړو له لاس وهلو مخکې او د تشناب له کارولو وروسته په صابون د لاسونو منځل
- له استفادې مخکې دې اوبه جوش کړای شي

۲.۱.۷ کولرا (cholera)

هغه وخت چې ناروغان له ناڅاپي اوبلن نس ناستي او ديهایدريشن سره په هغو سیمو کې چې په هغو کې د کولرا موارد تائید شوي دي، ولري باید په کولرا شکمن شو. اصلي خطر د شدید ديهایدريشن سملاسي منځ ته راتلل دي. تل د کولرا د شکمنو پیښو په اړه PPHO ته خبر ورکړئ.

تشخيص

- حاد اوبلن نس ناستی:
 - له وینې یا بلغم پرته
 - له کوم ځانګړي بوي څخه پرته غایطه مواد
 - غایطه مواد غالباً د اړو په رنگ (غایطه مواد د وریجو د اوبو په شان)
- کانګې کېدای شي شتون ولري
- ديهایدريشن کېدای شي شتون ولري چې پیلید نه یې چټکه وي، ډول یې شدید وي او کولای شي وژونکی وي (۲.۱.۱ برخه له وینې پرته شدید نس ناسته، له پنځو کلونو څخه په کوچنیو ماشومانو کې او ۲.۱.۲ برخه له وینې پرته نس ناسته، له پنځو کلونو څخه په لویو ماشومانو او لویانو کې وګورئ).
- کېدای شي شاګ شتون ولري (د ۱۶.۹ شاګ برخه دې وکتل شي)

درملنه

- د ديهایدريشن او د احتمالي شاګ د مخنیوي په موخه دې سملاسي درملنه پیل شي.
- د لومړنۍ روغتيايي څارنې په کچه د انټي بیوتيک په وسیله درملنې ته اړتیا نشته.
- تر پنځو کلنو ماشومانو نه دې د خولې له لارې د Zinc ټابلیټ د لس ورځو لپاره تجویز شي.
- تر شپږ میاشتنو ماشومانو: نیم ۲۰ میلی ګرامه ټابلیټ هره ورځ په لږو پاکو اوبو یا د تی په شیدو کې حل شي او ماشوم ته تجویز شي.
- شپږ میاشتني یا تر هغه لوی ماشومان: یو ټابلیټ ۲۰ میلی ګرامه هره ورځ، په لږ څه پاکو اوبو کې حل او ماشوم ته تجویز شي.
- تل د کولرا د شکمنو پیښو په اړه PPHO ته خبر ورکړئ.

وقایه:

- توصیه دې وشي څو فردي او عمومي روغتیا ساتنه رعایت او عملي شي
- د لاسونو مینځل
- له څښلو مخکې د اوبو جوړول
- د خوندې تشابونو کارول

۲.۲ د پېتيک تپ ناروغی (Peptic Ulcer Disease (PUD)

تشریح

د معدې ټپونه د معدې او اثنا عشری د مخاط د پردې له تخریب او زیانمنیدو څخه عبارت ده چې د مخاطي غشا د طبیعي دفاعي عامل د ستونزې او اختلال له امله او یا د لومن په داخل کې د یرغلزو فکتورونو د لاملونو په وسیله لکه اسید او پېسین، رامنځته کیږي. دا پېښه کېدای شي په مري، پلور کانال، د اثنا عشر لومن، جیچمن او یا د مکمل په دیورتیکولونو کې منځ ته راشي. د اثنا عشر ټپ معمولا په ناروغانو کې چې عمر یې له ۳۵ - ۵۵ کلونو وي، پېښیږي. په داسې حال کې چې د معدې ټپ په هغو ناروغانو کې چې عمر یې له ۵۵ - ۷۰ پورې وي، خپریدونکی دی.

د پېتيک (PUD) ټپ د ناروغی لاملونه په لاندې ډول دي:

- عمده لاملونه:
 - هلیکوباکتر پیلوري (H.Pylori)
 - غیرې استروئیدی د التهاب ضد درمل (NSAIDs) لکه Aspirin, Indometacin, Diclofenac او نور
 - هغه حالات او ناروغی چې د معدې د اسید د زیات افراز لامل کیږي لکه زولینجر الیسون سندرم –
- غیر معمول لاملونه:
 - ارثیت (د جداري حجرو د شمېر زیاتوالی)
 - د O د وینې ګروپ (آنتي جن کېدای شي له H.Pylori سره وصل شي)
- غیر ثابت لاملونه:
 - روحي فشارونه
 - قهوه
 - الکول
- د سګرټو څکول د خطر یو مهم لامل دی چې د تپ د روغیدو او ښه کېدو چټکوالی کموي او د هغه د بیرته راګرځیدو خطر زیاتوي.

تشخیص

- اعراض:

- د اپي ګاستریک د ناحیې درد او د غذا خوړلو پرمهال او یا سملاسي تر هغه وروسته د نس په پورتنی برخه کې د نامعلومې نارامتیا یا (بډ هضمی) احساسول. سره له دې هم دا شکایتونه په کافي اندازه د پېتيک (PUD) تپ لرونکي ناروغ لپاره د باور وړ د یو تشخیصي معیار په توګه حساس او ټاکونکی نه دي.
- سوخت (سوز یا سوئ)، دروندوالی، مالښت Gnawing، درد او د لوړې احساس.
 - د معدې په ټپونو کې له غذا خوړلو څخه وروسته سملاسي درد (له ۱۵-۳۱ دقیقو)، په داسې حال کې چې د اثنا عشر په تپ کې درد شاوخوا له ۹۰ دقیقو څخه تر درې ساعته د غذا له خوړلو وروسته پېښیږي. او دا درد معمولاً د شپې له خوا وي.
 - د معدې د تپ درد سوخت لرونکی وي او د غذا له خوړلو سره زیاتېږي او یا کېدای شي له غذا خوړلو سره کوم تړاو ونلري، د اثنا عشر تپ د غذا د جذبولو سره ارامیږي.
 - د درد خپریدل یا انتشار د تپ د سوري کېدو (تثقب) یا نفوذ څرګندونه کوي.
- علایم – په PUD یا پېتيکو غیر اختلاطي پېښو کې فزیکي معاینه زیاتره نورماله او طبیعي ده، له ژور لمس کولو (عمیق جس) سره کېدای شي د اپي ګسټریک په ناحیه کې موضعي او خفیف حساسیت شتون ولري. په یو دریمه برخه ناروغانو کې کېدای شي د وینې د کموالي نښې شتون ولري.
- تفریقي تشخیص – د اپي ګاسټریک درد کېدای شي د زړه په اسکمی ناروغیو (IHD)، حاد پانکراتیت ناروغیو او حاد Cholecystitis کې هم پېښ شي.

درملنه

د درملو پرته اهمات

- د سګرټو له څکولو څخه ډډه کول
- له NSAID او یا سټروئیدونو په وسیله د درملنې او اوږدمهاله کارولو څخه مخنیوی.
- د الکولو له څښلو څخه مخنیوی.

دوايي درملنه

- د معدې د اسید د افرازاتو د کمولو په موخه دې Ranitidine ټابلیټ تجویز شي.

○ د ماشومانو یا نويو ماشومانو لپاره: د بدن د وزن په هر کيلو گرام له ۲-۴ ميلي گرامو هر ۱۲ ساعته وروسته، اعظمي دوز په ورځ کې ۳۰۰ ميلي گرامه.

○ په لويانو کې:

■ هر ۱۲ ساعته وروسته ۱۵۰ ميلي گرامه ټابليټونه

او يا

■ هره شپه ۳۰۰ ميلي گرامه (له ۶ - ۸ اونيو)

• د معدې د اسيد د خنثی کولو په موخه دې Antacid توصیه شي

○ له ۱-۱۲ کلنو ماشومانو ته: له نیم څخه تر ۱۵ ميلي ليتره د خولې له لارې سسپنشن ۱-۳ ساعته د ډوډۍ له خوړلو څخه وروسته او د ویده کېدو پرمهال.

○ لويان: دوه ټابليټه هر اته ساعته وروسته د ډوډۍ له خوړلو نیم ساعت مخکې د لس ورځو لپاره

ليږدول

- په اختلاطي حالاتو کې لکه د هضمې د جهاز څخه وینه راتلنه يا د ټپ سوري کېدل
- له درملو او موجوده درملنې سره ځواب نه ورکول
- په هلیکوباکتر پیلوري او یا نورو پټالوژيو (کانسرس) شکمن والی او يا د انډوسکوپي معاینې ته اړتیا

وقایه

- د الکولو د څښلو، د سگریټو څکول، د التهاب ضد او درد غیر استروئیدی درملو له کارولو څخه ډډه کول.
- له هغو خوړو څخه ډډه کول چې تاریخ یې تیر شوی وي.

د ناروغانو لپاره لارښونه

- شخصي او د ژوند د چاپیریال روغتیا ساتنه (لکه له تشناب وروسته د لاسونو مینځل، له سالمې او خوندي خوړو او اوبو څخه ښه اخیستل) دې رعایت شي.
- په خپل سر درملو اخیستلو څخه دې ډډه وشي.
- له یوې اونۍ وروسته دې د ارزونې لپاره بیا مراجعه وشي.

درېم څپرکی د تنفسي سیستم ناروغۍ RESPIRATORY SYSTEM CONDITION

۳.۱ استما (Asthma)

د هوايي لارو د ارجاع وړ بند یدو سره یوه التهابي مزمنه ناروغي ده.

۳.۱.۱ استما په ماشومانو کې

تشرېح

استما په ماشومانو کې د ویز (غږ-غږ) له متکررو بریدونو څخه عبارت ده چې غالباً له توخی او سینه و بغل له علایمو سره یوځای وي، چې د قصباتو توسع وړکونکي درمل له تطبیق سره ځواب وړکوي.

تشخیص

ناروغ د تکراري بریدونو (حملو) او لاندې حالاتو تاریخچه لري:

- ویز یا (غږ غږ)، چې د ویز غږ د زفیر (له سږو څخه د هوا د ویستلو) په وخت کې ښه اوریدل کیږي. مگر کېدای شي د شهبه په صفحه (په سږو کې د هوا داخلیدل) کې هم واوریدل شي.
- سالنډي چې غالباً له توخی سره یوځای وي.

ناروغان کېدای شي د لاندې حالاتو څخه حکایت وکړي:

- د بریدونو ترمنځ له اعراضو پرته دوره
- تحریکونکي فکتورونه لکه الرژونه، فزیکي تمرینونه، سړه هوا او یا تنفسي انتانات

د فزیکي معاینې په موندنو کې کېدای شي لاندې موارد شامل وي:

- اوږد زفیر د اوریدو وړ ویز سره، په ماشومانو کې تر ټولو ډېره عامه علامه ده.
- د عمومي خطر، Stridor او د سینې ښکته تلنه یا Chest indrawing علامې دې چک شي، که داسې وي نو د شدیدې نوموتیا په شان دې درملنه وشي. (په ماشومانو او لویانو کې دې د نوموتیا "۳.۳ برخه مطالعه شي)
- د ناروغ چېک تنفس دې چک شي که بې شتون درلود: د سینه و بغل په شان دې درملنه وشي (۳.۳ برخه دې وکتل شي)

که چېرې تشخیص باوري نه وي، یو دوز د قصباتو سریع التاثير توسع وړکونکي دې ماشوم ته تجویز شي چې په دې صورت کې به په استما اخته ماشوم ژر روغ شي او د تنفسي حرکتونو د چټکوالي او د سینې د ښکته تلنې په شان ښې کمیري او تنفسي Distress هم کمیري. په سختې استما اخته یو ماشوم مخکې له دې چې روغ شي کېدای شي د درملو څو دوزونو ته اړتیا ولري.

درملنه

لومړۍ، سینه بغل دې رد شي. ۳.۱.۱ جدول دې وکارول شي.

په یو ماشوم کې چې سینه بغل (نوموتیا) نلري د استما درملنه په لاندې توګه ده:

- د قصبي توسع وړکونکي تجویز: د پنځو ورځو لپاره Salbutamol ټابلیټ. د ستندرد دوز د مطالعې لپاره دې په مل پانه کې الف ۱۷ جدول ته مراجعه وشي.
- معمولاً سټرویدونه د ویز (د سینې غږ غږ) په لومړي برید کې اړین نه دي. که چېرې یو ماشوم د ویز سخته حمله

- (د سښې غږ غږ) او د استما تکراري تاریخچه (مخینه) لري، لاندې درمل دې ورته توصیه شي:
- د خولې له لارې Prednisolone ۰.۵ میلی گرامه/د بدن د هر کیلو گرام وزن/ دوز هر ۱۲ ساعته وروسته د دریو ورځو لپاره. پردنیزولون په DHS یا دولسوالیو په روغتونونو کې دلاسرسي وړ دي
 - که چیرې ماشوم بیا هم ډیر ناروغ پاتې شو درملنه دې د سټیروئید په وسیله د ماشوم د ښه کېدو تر وخته دوام پیدا کړي.
 - Aminophylline تجویز کړئ.
 - که چیرې ماشوم د انشافي Salbutamol له دریو دوزو او سره له د خولې له لارې د Prednisolone کارولو وروسته ښه نه شو Aminophylline تجویز شي.
 - په ورو توګه - لږ تر لږه په ۲۰ دقیقو او ترجیحا یوه ساعت کې د Aminophylline یو وریډي زرق دې توصیه شي. د معیاري دوزونو د مطالعې لپاره دې په مل پاپه کې د الف ۲ جدول ته مراجعه وشي.
 - احتیاط: ماشوم په دقیقه توګه وزن کړئ او د درملو دوز دې د ماشوم د دقیق وزن مطابق توصیه شي.
 - بیا دې تعیبيي دوز د ورید د داخل یا IV زرق له لارې تجویز شي. بیا دې الف ۲ جدول ته مراجعه وشي.
 - احتیاط: د ورید په داخل کې چټک زرق او یا د Aminophylline له حده او اندازې زیات تجویز کولای شي خطرناکه وي. په هغه صورت کې چې یو ماشوم په تیرو ۲۴ ساعتونو کې Aminophylline یا Theophylline اخیستی وي، Aminophylline دې تجویز نشي.

۳.۱.۱ جدول: د استما او سینه بغل ترمنځ تفریقي تشخیص

موجود اعراض	اړین اقدامات	د تجویز وړ درمل*	وروستي پړاونه
▪ د خطر عمومي نښې او یا Stridor - او یا ▪ د سښې ښکته تله	د شدیدې نومونیا په شان دې درملنه وشي	▪ د ناروغ له لېږلومخکې یو دوز اتی بیوتیک ○ Ampicillin^b + ○ Gentamicin ▪ د ویز د شتون په صورت کې یو دوز د قصباتو سریع التأثير توسع وړونکي (لکه Salbutamol د انشافي یا نیبولایزر له لارې)	ناروغ دې سملاسي روغتون ته ولېږدول شي.
▪ ویز (غږ-غږ) او ▪ چټک تنفس مګر ▪ د خطر عمومي نښې او Stridor شتون نلري	د نومونیا په شان دې درملنه وشي	▪ پنځه ورځې Co-trioxazole + ▪ پنځو ورځو Salbutamol سره (په هغه صورت کې چې ماشوم له شپږ میاشتو لوی وي او ویز ولري)	له دوه ورځو وروسته دې ماشوم بیا و ارزول شي
ناروغ یوازې ویز (غږ-غږ) لري.	له نومونیا څخه پرته درملنه دې وشي.	Salbutamol د خولې له لارې د پنځو ورځو لپاره (په هغه صورت کې چې ماشوم له شپږو میاشتو څخه لوی وي)	هیڅ (بل اقدام نه غواړي)

الف. د ستندرد دوز د مطالعې لپاره دې د الف مل پانې ته دې مراجعه وشي. د Ampicillin لپاره ۴ الف جدول، د Co-trimoxazole لپاره د الف ۸ جدول، د Gentamicin لپاره د الف ۱۳ جدول، د Salbutamol لپاره د الف ۱۷ جدول. ب. د Ampicillin پر وړاندې د حساسیت په صورت کې دې Erythromycin وکارول شي. د الف مل پانې الف ۱۲ جدول ته دې د ستندرد دوز لپاره مراجعه وشي.

احتياط: په هغه صورت کې چې د Aminophylline له تجویزولو سره ماشوم کانګې پیل کړي، د زړه د ضربان په یوه دقیقه کې له ۱۸۰ څخه زیات شي، د سر درد او یا اختلاج پیدا شي، سملاسي دې د Aminophylline تطبیق ودرول شي.

• انټي بیټیکونه دې یوازې په هغه صورت کې چې په سخت سینه بغل شکمن اوسو، تجویز شي (په ماشومانو او لویانو کې د سینه بغل ۳.۳ برخه دې مطالعه شي).

لیردول

- ټول هغه ناروغان چې له درملنې او جدي څارنې څخه وروسته روغتیا پیدا نه کړي، ودې لیردول شي.
- که چېرې له پورته عاجلي درملنې څخه وروسته ټول ناروغان چې د ژوند ګواښونکي علایم لري، ولیردول شي
- استما یوه مزمنه او عود کونکې ناروغي ده، د درملنې یوه اوږدمهاله برنامه باید د هغه د سختوالي او د اعراضو او علایمو د تکرار پر بنسټ تر لاس لاندې ونیول شي. ناروغان دې یوه متخصص ته د اوږدمهاله درملنې د پیلولو لپاره ولیردول شي.

۳.۱.۲ استما په لویانو کې (Asthma in Adult)

تشریح

استما په لویانو کې د سختې سالدنۍ له بریدونو، د سینې له قیدیدو او په ویز (د سینې غږ غږ) متصف ده چې دا ټولې پیښې د عضلاتو د سېزم له امله د قصبي هوايي لارو له تنګ والي، د مخاط له اذیمو او قصباتو د غلیظو افرازاتو څخه چې د قصباتو د جدار د التهابي غبرګون په پایله کې منځ ته راځي. جنتیکي او محیطي لاملونه د استما په راپیدا کېدلو کې دخپل دي.

تشخیص

- اعراض او علایم:
 - په سینه کې د بندیدلو احساس
 - د سالدنۍ حملې
 - وچه ټوخله چې د سالدنۍ د سختوالي لامل کیږي
 - ویز یا غږ غږ د زفیر یا د سپړوڅخه د هوا د خارجیدو پر مهال
- علایم
 - خفیفه حمله
 - خفیفه ټاکي کارډي او ټاکي پني
 - منتشر خفیف (Rhonchi)
 - منځنۍ حمله
 - د تنفس له فرعي عضلاتو څخه استفاده
 - لوړ زفیر ویز
 - د بین الضلعي عضلاتو کشېدل یا Retraction
 - سخته حمله

- ستريا
- پارادوکس نبض
- د نه اوریدو وړ تنفسي اوازونه (Silent chest) د Rhonchi له کموالي سره
- د خملاستی وضعیت په ساتلو کې ناتوانی.
- سیانوز

درملنه

- د استما درمل دوه ډوله دي: چېک آرامونکي درمل او دوهم اوږدمهاله کنټرولونکي درمل.
 - چېک آرامونکي درمل د استما د حادثې حملې لپاره کارول کيږي.
 - په حاده حمله کې انشافي Salbutamol تجویز کړئ. درملنه په کلینیک کې دوه پغه ده او کولای شي په هرو ۱۵ دقیقو کې د یو ساعت لپاره په یوه سخته حمله کې په تکراري توګه وکارول شي.
 - انشافي Salbutamol کېدای شي د نیولایز په بڼه په هغه صورت کې چې د لاسرسي وړ وي بدل شي. د ستندرد دوز د مطالعې لپاره دې په مل پانه کې الف ۱۷ جدول ته مراجعه وشي.
 - هغه وخت چې ناروغ په کافي اندازه ښه شو او له کلینیک څخه رخصتیده، له څلور میلی ګرامه Salbutamol ټابلیټ څخه دې یو ټابلیټ هر اته ساعته وروسته د درې ورځو لپاره تجویز شي.
 - سیستمیک کورټیکوسټروئیدونه
 - د څولې له لارې Prednisolone -۰.۵ میلی ګرامه د بدن پر هر کیلو ګرام وزن پر یو دوز (۰.۵ mg/Kg/dose)، هر ۱۲ ساعته له ۳-۱۰ ورځو. Prednisolone د ولسوالۍ په روغتون کې شتون لري.
 - په یوه شدید حمله کې چې قصبي توسع ورکونکي (انشافي Salbutamol) شتون ونلري او یا هغه ته ځواب ور نه کړي، ناروغ باید ولیردول شي. د ناروغ له لیږدولو مخکې دې ۲۰۰ میلی ګرامه وریډي Hydrocortisone تجویز شي.
 - په یوه حاده حمله کې چې توسع ورکونکي (انشافي Salbutamol) شتون ونلري او یا تطبیق یې اغیز نلري
 - Aminophylline د وریډي زرق له لارې، Loading dose پنځه میلی ګرامه د بدن پر یو کیلو ګرام وزن ورو په ۲۰ دقیقو کې ورکړئ که چېرې د ۱۰۰ میلی لیتره مایع سره ګډ شي غوره به وي. د Maintenance دوز: ۰.۷-۰.۹ ملي ګرمه د بدن پر یو کیلو ګرام وزن په یوه ساعت کې د وریډ د داخل د دوامداره انفیوژن په بڼه.
 - احتیاط: د زړه احتقاني عدم کفایه باندې اخته ناروغانو ته Aminophylline یوازې باید د ۰.۲۵ ملي ګرامونو په اندازه پر یو کیلو ګرام په یوه ساعت کې د وریډي انفیوژن له لارې په دوامداره توګه تطبیق شي.
 - احتیاط: له پورته اندازو څخه یوازې په هغه صورت کې چې ناروغ په ۲۴ تیر ساعتونو کې Aminophylline یا Theophylline نه وي اخیستی، استفاده کېدای شي.
 - Aminophylline د هغو ناروغانو لپاره چې د استما حاده حمله (Status Asthmaticus) لري او قصبي انشافي توسع ورکونکي او کورټیکوسټروئیدونو ته یې ځواب نه دی ورکړی، کارول کيږي. دا ناروغان د EPHS روغتیايي مرکزونو ته باید ولیردول شي.
 - د اوږدمهاله درملنه د استما د وقایو او مزمنو ښو د درملنې په موخه یو متخصص ته، لیردونې ته اړتیا ده.
 - له انشافي سټروئیدونو (Beclomethasone) په وسیله درملنه چې د التهاب ضد قوي او اغیزمن درمل دی او د استما د حملو د فریکونسی او سختوالي د کمولو لامل کيږي. له دې څخه استفاده د استما د ډول او دوز په اړه د یو متخصص مشورې ته اړتیا ده.
 - سیستمیک کورټیکوسټروئیدونه (فمي او زرقی) د سختې دوامدارې او سختیدونکې استما اغیزمن درمل دي.

لیږدول

- ټول هغه ناروغان چې د درملنې او عاجلې څارنې څخه وروسته چې پورته بې یادونه وشوه، بڼه نشي او یا دا چې د ژوند گواښونکي علایم ولري، و دې لیږدول شي.
- ټول هغه ناروغان چې وقایوي درملنې او د مزمنو حالاتو درملنې ته اړتیا لري-همدا راز د لا بڼه تشخیص او درملنې او د اوږدمهاله درملنې د پلان د طرحه کولو لپاره دې ولیدول شي.

مخنیوی

- د الرژن له لاملونو څخه ډډه کول لکه د کور خاورې او د وږې، سبیریو، کورنیو حیواناتو، د چمن له گرد او کیمیاوي موادو څخه.
- د تنفسي سیستم د انتاناتو ژر او په خپل وخت درملنه.
- د بتا بلاکرونو (لکه Propranolol, Atenolol)، د انجیوتنسن کانونرینګ انزیم (ACE) نهې کونکي (لکه Captopril) او د غیرې سټروئیدي التهابي ضد درملو (NSAIDs) له کارولو څخه دې ډډه وشي.

ناروغ ته لارښوونې

- ناروغ یا د هغه پرستار ته په لارښوونو کې لاندې بېلګې شاملې دي:
 - د ناروغی د ژر تشخیص او پیژندنې په اړه زده کړه او د حادو حملو درملنه
 - د ناروغی تشخیص او طبیعي سیر
 - زده کړه او څارنه له انشافي درملو او نورو درملو څخه د ناروغ د کارولو لپاره
 - د درملنې د خونديتوب او اغیزمنتوب په اړه د ډاډ ور کول

۳.۲ زکام او انفلونزا (Common Cold and Flu)

تشریح

زکام او انفلونزا یوه عامه او Self-limiting (په خپله بڼه کېدونکې) ناروغي ده، عامل یی ویروسي انتانات دي چې یوازې تقویني څارنې ته اړتیا لري. دا ساري ناروغي ده او د هوایي معلقو څاڅکو په وسیله خپریږي. په زیاتره مواردو کې د ۱۴ ورځو په موده کې په لویانو او کوچنیانو کې پای ته رسېږي. هغه ماشوم چې ټوخله، ستونزمن تنفس، د خطر عمومي علایم، د سینې ښکته تله، Stridor (په هغه صورت کې چې ماشوم ارامه وي)، او چټک تنفس ونلري په زکام یا انفلونزا کې تصنیف شوی دی. هغه ماشوم چې مزمنه ټوخله (یعنې ټوخله یې له ۱۴ ورځو څخه زیات دوام وکړي) ولري کېدای شی نری رنځ، استما، توره ټوخله او یا کومه بله ستونزه ولري. خوځړواکه ماشومان، زاړه او کمزوري کسان د اختلاطاتو له ډیر خطر سره مخ دي.

تشخیص

- ټوخله
- د پزې څخه اوبه او افرازات
- د ستوني درد
- د سر درد، د عضلاتو درد او تبه چې په انفلونزا کې ډیره معمول ده
- کېدای شي د منځني غوږ له التهاب، ویز او سینوزیت سره اختلاطی شي.
- نوب: ملاریا، شری او نمونیا کېدای شي د انفلونزا په شان له علایمو سره پیل شي.

درملنه

د درملو پرته اهمات

- د اوتیا په صورت کې په بستر کې د استراحت لپاره توصیه.
- د بدن د اوبو د له لاسه ورکولو د مخنیوي او د مخاط د اوبلنولو یا رقیقولو لپاره د مایعاتو اخیستلو ته هڅول.
- د ستوني او د ټوخي ارامول د سیمه ییزو او دودیزو درملنو په وسیله، لکه تود او خور چای.
- له تغذیې څخه مخکې د ماشوم د پوزې د افرازاتو پاکول په اوبو کې د یوې خیشې شوې پارچې څخه په استفادې سره چې ښه تاوه شوې وي او د یوې لولې یا پلټې په بڼه وي.

دوايي درملنه

- په نویو پیدا شویو ماشومانو کې، له $0.9\% \text{ NaCl}$ څخه د پوزې د بندښت د له منځه وړلو لپاره د قطرې په بڼه چې د پوزې په هر سوري کې د اوتیا په صورت کې کارول کیږي.
- د لورې تې (38.5°C) یا تر هغه پورته) لپاره له Paracetamol څخه استفاده د تې تر کمولو. د معیاري دوزونو د مطالعې لپاره دې په الف مل پاڼه کې د الف ۱۵ جدول ته مراجعه وشي. لویان په لوړه تبه کې تر یو ګرام Paracetamol هر شپږ ساعته وروسته اخیستل شي.
- نوټ: د لاندې درملو د ورکولو څخه دې ډډه وشي:
 - آنتی بیوټیکونه – جواز نلري ځکه زکام او انفلونزا ویروسي میکروبونه دي.
 - هغه درمل چې Codeine, Atropine یا د Codeine مشتقات یا الکول ولري کېدای شي زیان رسوونکي وي.
 - په پوزه کې د څڅولو ځاڅکي.

لیردول

- سخت اختلاطات (لکه نمونیا، د منځني غوړ التهاب، سینوزیت)
- د ناروغ د شعور د حالت بدلون
- په څښلو او خوړلو کې کمزورتیا

وقایه

- د منتن کس په وسیله د هوايي ځاڅکو له خپریدو څخه د مخنیوي لپاره د ټوخي یا د ټوخلې د ادابو رعایتول.
- ښه او مناسبه تغذیه

ناروغ ته لارښوني

- د مایعاتو او مناسبې تغذیې اخیستلو ته هڅول
- د پوزې د سوریو پر پاک ساتلو ټینګار، په ځانګړې توګه په نویو پیدا شویو ماشومانو چې د پوزې له لارې اجباري تنفس لري.
- ناروغ ته توصیه:
 - له چټک او سخت تنفس څخه څارنه، او سملاسي بیرته ستندل که دواړه حالتونه رامنځته شي.
 - بیرته ستندل په هغه صورت کې چې د ماشوم ناروغي زیاته شي او یا ماشوم په څښلو او یا د شیدو په خوړلو برلاسی نه وي.
 - که چیرې ماشوم د پنځو ورځو په ترڅ کې ښه والی پیدا نه کړ، تعقیب دې شي.

۳.۳ په ماشومانو او لویانو کې نمونیا (Pneumonia in Children and Adults)

سینه و بغل یا نمونیا د سږو د نسج منتن کیدل دی. نمونیا معمولاً د ویروسونو او باکتریاګانو او لږه کچه د فنگسونو

او پرازټونو په وسیله رامنځته کیږي. زیاتره سختې پیښې یې د باکټریا په وسیله پیدا کیږي. د اصلي لامل معلومول، د کلینیکي لوحې او د ناروغ د سینې د ایکسۍ په وسیله شونې نه دی. د کلینیکي لوحې پر بنسټ سینه بغل په نمونیا او شدیدې نمونیا باندې تصنیف شوی دی چې هر یو یې ځانګړې درملنه لري. د سینه و بغل په ټولو مواردو کې د درملنې لپاره انټي بیوټیک ته اړتیا ده.

احتیاط: شدیدې نمونیا اضافي درملنو لکه اکسیجن ته اړتیا لري او ناروغ باید سملاسي روغتون ته ولیږدول شي.

۳.۳.۱ نمونیا د پنځو کلونو ټیټو ماشومانو کې (Pneumonia in Children younger than 5 Years)

تشریح

نمونیا له پنځو کلونو څخه په کوچنیو ماشومانو کې د مړینې یوله معمولواو عمده لاملونو څخه دی. همدا راز د IMCI چارټ دې "ماشوم له ټوخلې یا ستونزمن تنفس سره" وکتل شي.

تشخیص

- په ټولو ماشومانو کې چې ټوخې یا ستونزمن تنفس لري او یا هغه ماشومان چې له نورمال حالت څخه چټک تنفس لري باید په سینه و بغل شکمن شو.
- زیاتره وخت لوړه تبه (38.5°C یا لوړه) شتون لري مګر نه تل.
- که چیرې ماشوم ارامه نه وي له معاینې مخکې صبر وکړئ خو ماشوم ارامه شي. که چیرې ماشوم ویده وي، لومړی د تنفس سرعت محاسبه او د ماشوم له وینولو څخه مخکې د سینې ښکته تلل یې چک شي.
- تنفس دې د یوې بشپړې دقیقې په اوږدو کې له یو ټایمر یا ساعت څخه په استفادې د دویم لاس په وسیله چک شي (له یوې دقیقې څخه کمه لیدنه کېدای شي تشخیص غلط کړي ځکه چې د تنفس سرعت په خفیفه توګه بدلون مومي). که چیرې ماشوم لاندې حالات ولري، تنفس چټک دی:
 - له دوه میاشتو څخه په یوه کوچني ماشوم کې په یوه دقیقه کې له ۶۰ یا له ۶۰ څخه زیات تنفس
 - له ۲-۱۱ میاشتني ماشوم کې په یوه دقیقه کې له ۵۰ او یا ۵۰ څخه زیات تنفس
 - له ۵-۱ کلن ماشوم کې په یوه دقیقه کې له ۴۰ او یا ۴۰ څخه زیات تنفس.
- د سختې نمونیا یا د ډیرې سختې ناروغۍ علایم دې وڅیړل شي (لکه د زړه ولادي ناروغۍ). د خطر عمومي علایم، سخته نمونیا او یا ډیره سخته ناروغي عبارت دي له:
 - چټک تنفس (۶۰ نفس په یوه دقیقه کې یا ترهغه زیات) له دوه میاشتو څخه په یو کوچني ماشوم کې
 - د سینې ښکته تله: د سینې د قفس ښکتنی برخه ښکته ځي هغه وخت چې ماشوم هوا په سږو کې داخل لوري ته نفس کاږي).
 - د سږو خراب غږونه هغه وخت چې ماشوم تنفس کوي.
 - له خښلو یا شیدو خورولو څخه ډډه کول
 - غیر طبیعي خوب او یا له خوب څخه په وینېدو کې ستونزه
 - بیهوشی یا غیر شعوري حالت
 - اختلاجات او یا په نږدې تیر وخت کې د اختلاجاتو تاریخچه
 - کانګې یا په وروستیو کې د کانګو دوامداره تاریخچه
- د استما د علایمو څیړل له هغې جملې څخه لاندې موارد:
 - ویز د سینې غږ غږ هغه وخت چې ماشوم هوا له سږو څخه باسي (زفیری)
 - ټوخله له ۱۴ ورځو څخه د زیات وخت لپاره.
- د نري رنځ یا نورو ناروغيو علایم دې په لاندې توګه چک شي:
 - ټوخله له ۱۴ ورځو څخه د زیات وخت لپاره.

- برسیره پردې د سینه و بغل نور علایم (په اصغا سره) شوني دي، چې شتون ولري: رال (Crackle)، د تنفسي غبرونو کموالي، او یا د سینې په یوه ساحه کې د قصبي تنفسي غیر (bronchial breathing sound) شتون. په یو ماشوم کې اصغا غالباً ستونزمنه دي.
- که چېرې هېڅ یو له پورته ذکر شویو علایمو څخه شتون ونلري او تاسو د استمنا، نري رنځ او نورو ناروغيو علایم رد کړئ، په دې صورت کې تاسې کېدای شي دا پایله واخلئ چې ماشوم یو زکام لري (۳.۲ برخه "والگی او انفلونزا" دې مطالعه شي).

درملنه

هغه ماشوم چې ډیره شدید ناروغي یا شدید نمونیا لري: (Child with very severe disease or severe Pneumonia) د درملنې لومړی دوز دې تجویز شي، او ناروغ دې سملاسي روغتون ته ولیږدول شي.

- د انټي بیوتیک لومړنی دوز دې تجویز شي. د Ampicillin لومړنی دوز د عضلې د داخل د زرق (IM) له لارې + Gentamicin په عضله کې د ورون په مخکینۍ برخه کې وزن یا عمر ته په پاملرنې سره + Ampicillin IM. د ستندرد د مطالعې لپاره دې دالف په مل پانه کې الف ۴ جدول ته مراجعه وشي

+

- Gentamicin IM: د ستندرد دوز د مطالعې لپاره دې د الف په مل پانه کې الف ۱۳ جدول ته مراجعه وشي
- که چېرې ویز (د سینې غږ غږ) شتون ولري د Salbutamol په وسیله د نیبولایزر له لارې درملنه وشي. د ستندرد دوز د مطالعې لپاره دې د الف په مل پانه کې الف ۱۷ جدول ته مراجعه وشي.
- د اختلاج د شتون په صورت کې دې درملنه وشي.
- احتیاط: که چېرې ماشوم یوازې د اختلاج مخینه ولري دا درملنه دې تجویز نشي؛ یوازې د موجوده اختلاج درملنه دې وشي.

- د ریکمال یا مقعد له لارې د Diazepam تجویز. د Insulin نري رنځ له سورنځ څخه استفاده وشي؛ او په هغه کې دې د دیازپیم یو مناسب ډوز وټاکل شي او بیا دې کش شي او سورنځ دې د ستنې له ایستلو ورسته ۴-۵ سانتي متره په مقعد کې داخل او بیا دې تخلیه شي. بیا دې Buttocks ناحیه ته یو له بل سره له دوه تر درې دقیقو فشار ورکړل شي. د ستندرد دوز د مطالعې لپاره دې د الف په مل پانه کې الف ۹ جدول ته مراجعه وشي
- که چېرې روغتون ته د سملاسي لیږدولو امکانات نه وي:

- د انتان درملنه دې د IM د انټي بیوتیکونو په وسیله وشي او د تېې مناسبه درملنه دې وشي.
- Ampicillin د عضلې د داخل زرق (IM + Gentamicin) په پورته توګه د پنځو ورځو لپاره. د ستندرد دوز د مطالعې لپاره دې د الف په مل پانه کې الف ۱۳ جدول ته مراجعه وشي.
- که چېرې ماشوم درملنې ته ښه ځواب ورکړ په هغه صورت کې دې د درملنې کورس د پنځو نورو ورځو لپاره په کور یا روغتیايي مرکز کې په لاندې توګه بشپړ شي:
- د خولې له لارې Amoxicillin: د ستندرد دوز د مطالعې لپاره دې د الف په مل پانه کې الف ۳ جدول ته مراجعه وشي. له Penicillin سره د حساسیت په صورت کې دې له Erythromycin څخه استفاده وشي.
- د ستندرد دوز د مطالعې لپاره دې د الف په مل پانه کې الف ۱۲ جدول ته مراجعه وشي.

جمع

- Gentamicin عضلي زرق (IM). د ستندرد دوز د مطالعې لپاره دې د الف په مل پانه کې الف ۱۳ جدول ته مراجعه وشي

○ د تقویتی څارنې برابرول:

- که چېرې تېه (له ۳۹ درجې سانتي ګریډ څخه لوړه) شتون ولري او د ستونزې لامل شي، ناروغ ته دې Paracetamol ورکړل شي. د ستندرد دوز د مطالعې لپاره دې د الف په مل پانه کې الف ۱۵ جدول ته مراجعه وشي

- ناروغ پیاوړې دې وهڅول شي خو د مور د شیدو په وسیله تغذیې ته دوام ورکړي، او د خولې له لارې ماشوم ته کافي غذا او مایعات ورکړل شي.

ماشوم او نمونیا (Child with Pneumonia)

- د اتان درملنه دې وشي. د مناسب انټي بیوټیک یوه پنځه ورځنۍ دوره (د لومړۍ کرښې یا دویمې کرښې درملنه) دې تجویز شي.
- د لومړۍ کرښې انټي بیوټیک: Co-trimoxazole. د ستندرد دوز د مطالعې لپاره دې د الف په مل پانه کې الف ۸ جدول ته مراجعه وشي. همدا راز د IMCI فلیپ چارټ دې وکتل شي.
- د دویمې کرښې انټي بیوټیک: Amoxicillin. که چیرې ماشوم له Co-trimoxazole سره حساسیت درلود او یا د Co-trimoxazole په وسیله له درې ورځې درملنې څخه وروسته ماشوم روغ نه شو، Amoxicillin دې تجویز شي. د ستندرد دوز د مطالعې لپاره دې د الف په مل پانه کې الف ۳ جدول ته مراجعه وشي.
- مور یا هغه کس ته چې د ماشوم څارنه کوي لارښونه وشي چې څه ډول د درملنې بشپړ کورس پنځه ورځې په کور کې تطبیق کړي. د ماشوم مور یا پالونکي ته دې وښودل شي چې د اوتیا په صورت کې ټابلیټونه څه ډول میډه کړي. مور یا پالونکي وهڅوی چې لومړنۍ دوز ستاسو پر وړاندې تطبیق کړي.
- د لوړې تېرې درملنه (که چیرې شتون ولري) عمر او وزن ته په پاملرنې د Paracetamol په وسیله تر هغه وخته چې تبه له منځه ځي. د ستندرد دوز د مطالعې لپاره دې د الف په مل پانه کې الف ۱۵ جدول ته مراجعه وشي.
- د ویز (د سینې د غږ غږ) درملنه (که چیرې شتون ولري) وزن او عمر ته په پاملرنې سره د Salbutamol په وسیله. د ستندرد دوز د مطالعې لپاره دې د الف په مل پانه کې الف ۱۷ جدول ته مراجعه وشي.

ماشوم د پوڅی او زکام سره: (Child with cough or common cold)

۳.۲ برخه "والگي او انفلوزا" دې مطالعه شي.

ناروغ ته لارښونې

- مور یا د ماشوم څارونکي دي وهڅول شي خو د ماشوم تغذیې ته دوام ورکړي.
- د ماشوم مور ته دې توصیه وشي خو ماشوم ته دموږ له شیدو سره تغذیې ته او د مایعاتو ورکول زیات کړي
- مور یا د ماشوم څارونکي ته دې یادونه وشي چې د ماشوم د واکسینونو ته د ماشوم د واکسین د کارت د جدول مطابق دوام ورکړي.
- معلومه کړئ چې ایا د ماشوم پایواز پوهیدلی چې درمل څه ډول او څه وخت ماشوم ته ورکړي.
- د ماشوم مور یا پالونکي ته دې توصیه وشي خو ماشوم له دوو ورځو وروسته د بیا چک او معاینه کولو لپاره راولي
- د ماشوم مور یا پالونکي ته دې توصیه وشي خو په لاندې حالاتو کې ماشوم په چټکۍ سره راولي:
 - د ناروغۍ زیاتیدل
 - د غذا نه خوړل یا د مور د شیدو نه اخیستل
 - د لوړې تېرې پیدا کېدل (38.5°C او یا تر هغه لوړ)
 - چټک او یا ستونزمن تنفس.
- هغه مهال چې ماشوم له دوه ورځو وروسته د چک کولو لپاره مراجعه کوي:
 - که چیرې تنفس ښه شوی وو (لکه ورو تنفس)، د تېرې درجه ټیټه وي او د ماشوم غذا خوړل ښه وي، په دې صورت کې د انټي بیوټیک په وسیله د درملنې د درې پاتې ورځو کورس بشپړ کړئ (سینه و بغل).
 - که چیرې د تنفس چټکتیا، تبه یا د ماشوم غذا خوړل ښه شوي نوي، د دویمې کرښې په انټي بیوټیک دې بدل شي او د ماشوم مور یا څارونکي ته دې توصیه وشي چې له دوه ورځو وروسته دې بیا مراجعه وکړي. د دې ترڅنګ پوښتنه وکړئ چې ایا ماشوم له سینه بغل څخه درې میاشتې مخکې په شري اخته شوی وو، که چیرې ځواب مثبت وي روغتون ته دې ولېږدول شي.

○ که چېرې ماشوم د سخت سینه بغل د ډیرې سختې ناروغۍ علایم لري، د IMCI د فلپ چارټ د درملنې لارښود مطالعه کړئ "په ډیره سخته ناروغۍ یا په سخت سینه و بغل اخته ماشومان." او سملاسي دې روغتون ته ولیږدول شي.

۳.۳.۲ نمونیا په لویانو او د پنځو کلونو پورته ماشومانو کې (Pneumonia in Children Older Than 5 Year and in Adults)

تشریح

سینه و بغل یا نمونیا د سږي د نسج انتان دی، او لاملونه یې له پنځو کلونو څخه د کوچنیو ماشومانو سینه و بغل ته ورته دي. په لویو کسانو کې سینه و بغل د مزمنو ناروغیو د شتون په صورت کې (لکه شکره، HIV انتان، خوارخواکي یا د سږو مزمنې ناروغۍ) ډیر خطر لري.

تشخیص

- له پنځو کلونو څخه په لویو ماشومانو او لویانو کې د سینه بغل علایم د لاندې شکایتونو د شتوالي په صورت کې چک کړای شي:
 - ټوخی
 - د سینې د یوې خوا درد
 - سالتېږي یا سطحي تنفس
 - تبه چې له ناڅاپي پیل سره معمولاً (۳۸.۵ درجې سانتي گراد څخه لوړ) مگر نه تل شتون لري، په ځانگړې توگه په لویو کسانو کې.
 - چټک تنفس، په ژوره توگه ساه اخیستل کېدای شي درد لرونکې وي.
 - په اصغا کې رال (Crackles)، غالباً شتون لري. له اصغا سره کېدای شي د تنفس د غبرونو کموالی یا ویز (د سینې غږ غږ) شتون ولري.
- د سخت سینه بغل علایم وڅیړئ:
 - تنفسي فشار (د پوزي الوتل)
 - په یوه دقیقه کې له ۳۰ څلو څخه د تنفس زیات شمېر
 - خوبجن والی او گنگس والی
 - سیانوز (د شونډو یا نوکانو شینوالی)
 - د ویني تپ فشار (سیستولیک له ۹۰ څخه کم او دیاستولیک له ۶۰ څخه کم)
- استما وڅیړئ:
 - ویز (دسینې غږ غږ) هغه وخت چې ناروغ بهر لوري ته تنفس کوي.
- نری رنځ دې وڅیړل شي:
 - ناروغ د ۱۴ ورځو یا له هغه زیات بلغمي ټوخله ولري.

درملنه

- د نمونیا شدید واقعات (Severe cases of Pneumonia)
 - د انتان درملنه د انټي بیوټیک د لومړني دوز له تجویزولو او ورکولو سره:
 - د خولې دلاړی Amoxicillin دې پیل شي، د ستندرد دوز د مطالعې لپاره دې د الف په مل پاته کې الف ۳ جدول ته مراجعه وشي
- یا
 - که چېرې ناروغ نشي کولای هغه تیر کړي، Ampicillin IM یا د عضلي زرق له لارې دې تجویز شي. د ستندرد دوز د مطالعې لپاره دې د الف په مل پاته کې الف ۴ جدول ته مراجعه وشي

یا

○ له Penicillin سره د حساسیت په مواردو کې دې Erythromycin وکارول شي. د سټنډرډ دوز د مطالعې لپاره دې د الف په مل پانه کې الف ۱۲ جدول ته مراجعه وشي

یا

○ Doxycycline ورکړئ. د سټنډرډ دوز د مطالعې لپاره دې د الف په مل پانه کې الف ۱۰ جدول ته مراجعه وشي. احتیاط Doxycycline: دې له اتو کلونو څخه په کوچنیو، ماشومانو امېدواره او شیدو ورکونکو ښځو ته و نه کارول شي.

- روغتون ته لیږدول

Nonsevere cases of Pneumonia

د نمونیا غیر شدیدې پیښې

- د انتان درملنه د مناسب انټي بیوټیک د یو پنځه ورځنۍ دورې له تجویزولو سره.

○ د لومړۍ کړنې ټاکل: Co-trimoxazole. د سټنډرډ دوز د مطالعې لپاره دې د الف په مل پانه کې الف ۸ جدول ته مراجعه وشي.

○ د دویمې کړنې ټاکل: Amoxicillin. د سټنډرډ دوز د مطالعې لپاره دې د الف په مل پانه کې الف ۳ جدول ته مراجعه وشي. د Penicillin پر وړاندې د حساسیت یا الرژۍ په مواردو کې، له Erythromycin څخه دې استفاده وشي. د سټنډرډ دوز د مطالعې لپاره دې د الف په مل پانه کې الف ۱۲ جدول ته مراجعه وشي. نوټ: په هغه صورت کې چې ناروغ له Co-trimoxazole سره حساسیت ولري، یا د ناروغ امېدواري شکمنه وي او یا دا چې ناروغ د Co-trimoxazole په وسیله له درې ورځې درملنې څخه وروسته ښه والی نه وي پیدا کړی، له Amoxicillin څخه دې استفاده وشي.

- د لوړې تېې درملنه د Paracetamol په وسیله د تېې تر ټیټېدو پورې. د سټنډرډ دوز د مطالعې لپاره دې د الف په مل پانه کې الف ۱۵ جدول ته مراجعه وشي.
- ناروغ ته دې توصیه وشي څو له دوه ورځو وروسته د بیا کتلو لپاره مراجعه وکړي
- که چیرې ښه والی یې پیدا کړی وو، درملنې ته دوام او ناروغ دې وهڅول شي څو د انټي بیوټیک په وسیله د درملنې کورس بشپړ کړي.
- د نه ښه کېدو په صورت کې د انټي بیوټیکونو د دویمې کړنې ټاکنې ته دې بدلون ورکړل شي او ناروغ دې له ۴۸ ساعتونو وروسته بیا وځیرل او معاینه شي.
- که چیرې په دویمه معاینه او ارزونه کې ناروغ ښه والی نه وو پیدا کړی، د سخت سینه بغل په شان دې درملنه وشي او روغتون ته دې ولېږدول شي.

د ناروغ لپاره لارښوونې

- ناروغ دې وهڅول شي څو له معمولي اندازې څخه دې زیات مایعات وڅښي، خواړه دې په معمول ډول وخورې او خپل درمل دې پر خپل وخت او مناسبه توګه واخلي.
- ناروغ ته دې توصیه وشي څو له دوه ورځو وروسته د بیا کتلو لپاره مراجعه وکړي
- ناروغ ته دې توصیه وشي څو په لاندې حالاتو کې سملاسي بیرته مراجعه وکړي.
- د خوب جن والي او ګڼګڼس والی په صورت کې
- د ستونزمن تنفس په صورت کې
- چټک تنفس (په یوه دقیقه کې له ۳۰ څله څخه زیات)
- لوړه تېه (۳۸.۵ °C یا تر هغه لوړ)

۳.۴ د سړي مزمنه انسدادی ناروغی (Chronic Obstructive Pulmonary Disease)

تشریح

د سړي مزمنه انسدادی ناروغی (COPD) یوه داسې ناروغی ده چې د مزمن برانشیتس او امفیزما په پایله کې د هوا د جریان د بندیدو له امله پیدا کیږي. د سگریټو څکول د COPD تر ټولو مهم لامل دی. د هوا ککړتیا، گرد او دورې، شغلي کیمیاوي توکي، د تنفسي لارو انتانات، ارثي ستونزې او الرژي هم د مزمن برانشیتس د پیدا کېدو لاملونه دي.

سره له دې چې امفیزما او مزمن برانشیتس باید تشخیص او هر یو د ځانګړې ناروغۍ په توګه تر درملنې لاندې ونیول شي مګر زیاتره ناروغان چې په COPD اخته دي کلینیکي لوحه یا څرګندونې دواړه ناروغی په یوه وخت کې ښيي.

• مزمن برانشیتس یو کلینیکي تشخیص دی چې زیاتره له ۳۰-۴۰ کلنۍ نه وروسته لیدل کیږي، چې په برانشونو کې د مخاط له حده زیات ترشح او بلغمي ټوخي سره یوځای هره ورځ د درې میاشتو او یا ډېر، په پرله پسې دوه کلونو کې وي.

• امفیزما یو پتولوزیک تشخیص دی چې زیاتره له ۵۰ کلنۍ څخه وروسته لیدل کیږي چې د برانشونو د وروستيو هوايي فضا غیرطبیعي او دايمي لوییدل دي چې د جدارونو د تخریب سره یوځای وي او پرته له څرګند فیبروز څخه د ګازاتو د تبادلې د کمولو لامل کیږي.

تشخیص

- د سګرټ د کارولو او د ککړتیا سره د مخ کېدلو تاریخچه
- ټوخی (په مزمن برانشیتس کې له بلغم سره)
- پرمختلونکې سالتډي (په امفیزما کې ډیر سخت دی)
- ویز (د سینې غږ غږ)، زیاتره د قصباتو توسع ورکونکي ځواب نه ورکوي
- سیانوز یا شینوالی چې د دې ناروغۍ په وروستيو پړاونو کې لیدل کیږي.
- تبه (د تنفسي لارو له ثانوي او سختو انتاناتو سره)
- په مزمن برانشیتس کې هیموګلوبین لوړیږي.

درملنه

د درملو پرته اهماتامات

- د سګرټو پرېښودلو ته هڅول د درملنې تر ټولو مهمه برخه ده.
- ټول موارد چې بلغم لرونکې ټوخی له دوو اونيو څخه زیات وخت اوږدېږي (د مهربانۍ له مخې د "نری رنځ" ۱۵.۱۰ برخه وګورئ) باید د نري رنځ له پلوه تست شي.

د درملو په وسیله درملنه

- د شتون په صورت کې، هغو ناروغانو ته چې سخته هیپوکسمي لري، اکسیجن ورکړل شي.
- د ویز (د سینې غږ غږ) لپاره دې د قصباتو توسع ورکونکي تجویز شي. په یوه وخت کې دې یوازې د هغه یو درمل تجویز شي.

○ Salbutamol. د ستندرد دوز د مطالعې لپاره دې په الف مل پانه کې الف ۱۷ جدول ته مراجعه وشي.

■ انشاقی

یا

■ ټابلیټ

یا

- Aminophylline: د ستندرد دوز د مطالعې لپاره دې الف په مل پانه کې الف ۲ جدول ته مراجعه وشي.
- د خولې له لارې Prednisolone ۰.۵ میلی گرامه\د بدن یو کیلو گرام وزن\ هره ورځ له ۱۴-۲۱ ورځو دې تجویز شي، که چیرې ناروغ:
 - په استماتیک برانشیت اخته وي.
 - د سختوالي تاریخچه او یا د کمزورتیا علایم ولري.
 - د Aminophylline په وسیله درملنې ته د نه خواب ورکولو په صورت کې
- نوټ: Prednisolone د ولسوالیو په روغتونونو کې شتون لري.
- د حاد برانشیت د درملنې لپاره او د مزمن برانشیت د سختیدو د مخنیوي لپاره انټي بیوتیک تجویز کړئ:
- Co-trimoxazole د ستندرد دوز د مطالعې لپاره دې د الف په مل پانه کې الف ۸ جدول ته مراجعه وشي

یا

- Amoxicilli: د ستندرد دوز د مطالعې لپاره دې د الف په مل پانه کې الف ۳ جدول ته مراجعه وشي

یا

- Penicillin سره د حساسیت په مواردو کې دې Erythromycin وکارول شي. د ستندرد دوز د مطالعې لپاره دې د الف په مل پانه کې الف ۱۲ جدول ته مراجعه وشي

یا

- Doxycycline: د ستندرد دوز د مطالعې لپاره دې د الف په مل پانه کې الف ۱۰ جدول ته مراجعه وشي.
- احتیاط: Doxycycline دې له اتو کلونو څخه په کوچنیو ماشومانو، امیدواره او شیدو ورکوونکو ښځو ته تجویز او و نه کارول شي.

لیردول

- د ناروغی ټول شدید موارد چې درملنې ته خواب ور نه کړي، ودې لیردول شي.
- د ویز (د سینې غږ غږ) په صورت کې د قصبانو د پراخونکو د څلورو اونیو له تجویز وروسته دې سټروئید په وسیله د احتمالي درملنې لپاره یو DH ته ولیردول شي.

وقایه او مخنیوی

- ناروغ ته دې توصیه وشي څو سگرت څکول پریردي.
- خلک دې وهڅول شي څو له کیمیاوي توکو، دږو، خاورو، دښاتانو گرز او لوگی سره د مخ کېدو په صورت کې احتیاطي اقدامات وکړي.

خلورم څپرکی د غوړ، پوزي او ستوني ناروغۍ Ear, Nose, and Throat Conditions

۴.۱ د باندینی غوړ التهاب (Otitis Externa)

تشریح

د باندیني یا خارجي غوړ التهاب، د غوړ د اوریدو د باندینی مجرا التهاب یا انتان دی. د باندینی غوړ د التهاب څلور اصلي لاملونه په لاندې توګه دي:

- د باندینی غوړ Furuncular التهاب (Ear Boil) له باکتریاګانو څخه پیدا کېږي زیاتره د طلايي ستافیلوکوکونو په وسیله.
- د باندینی غوړ خپریدونکی یا منتشر التهاب — التهاب چې کېدای شي د یوه بیګانه جسم، په ککړو اوبو کې خان مینځل یا لامبو وهل او یا د خیرنو نوکانو په وسیله د باندینی اوریدونکي مجرا د ګرولو په وسیله رامنځته کېږي.
- د باندیني غوړ فونګسي التهاب (اوتومايکوزیس) — د غوړ د اوریدو باندینی مجرا له فونګسي انتان څخه راپیدا کېږي.
- د باندیني غوړ اګزیماټوز التهاب — چې د باندینی غوړ د اوریدو د باندینی مجرا د درماتیت یا اګزما څخه پیدا کېږي.

تشخیص

- د باندینی غوړ په Furuncular التهاب (Ear Boil) کې، شدید درد ژامو یا سر ته خپرېږي. د تراګوس نښه مشته ده (یعنې تراګوس د فشار پواسطه درد لرونکی دی).
- باندینی منتشر اوتیت له درد او نا ارامتیا او د اوریدو له لاسه ورکولو سره مل دی.
- اګزیماټوز التهاب یا د باندینی غوړ فونګسي التهاب له خارښ، ناڅرګند درد او څښې وخت له ترشحاتو او افرازاتو سره یوځای دی.
- د Otoscope په وسیله معاینه کېدای شي لاندې حالات وښيي:
- د باندینی غوړ Furuncular التهاب کېدای شي د باندینی غوړ د اوریدو د مجرا له مردار دانو (Pustules) سره یوځای وي.
- د باندینی غوړ فونګسي التهاب کېدای شي د یوې منظري په بڼه "لکه مرطوب کاغذي داغ" د باندینی اوریدو د مجرا په داخل کې څرګند شي او کېدای شي ترشحات او افرازات ولري.
- د باندینی غوړ اګزیماټوز التهاب کېدای شي چې د اوریدو باندینی مجرا د سور رنګه، تفلسی Patch او اذیما په بڼه ولیدل شي.
- نوت: د باندینی غوړ په التهاب کې د غوړ پرده، نورماله او طبیعي ښکاري.

درملنه

غیر دوايي درملنه

- د پردیو یا بهرنیو پاتې شونو جسمونو لرې کول.
- د غوړ کانال له پاکوونکو څخه په استفادې سره پاک او وچ وساتئ. د غوړ د کانال پاکول او وچول د روغتيايي کارکوونکي (ډاکټر) او ناروغ لپاره یوه وخت نیونکې پروسه ده، مګر باید د اغیز لرونکې درملنې لپاره تر سره شي او هغه باید په دقت ناروغ یا د هغه پالونکي ته وښودل شي. او په عملي توګه ورته وښودل شي او هغوی وپوهول شي چې هغوی کولای شي دا کار په سمه توګه تر سره کړي. لاندیني تګلاره د غوړ د کانال د وچولو لپاره له کوچني لرګي سره چې په پورتنۍ برخه کې یې پخته تاوه شوې ده، تعقیب شي.
- یوه پاکه جذبونکې پارچه دې په یو کوچني لرګي تاوکړي.
- په دقت سره کوچنی لرګی په غوړ کې داسې کیږدئ چې د ایښودو پرمهال هغه ته دوراني حرکت ورکړئ.

- بیا هغه را وباسئ او د هغه پرځای دې یوه بله پاکه پارچه ځای پر ځای شي.
- دا کار دې تر هغه وخته پورې چې پر لرګي تاوه شوې پارچه وچه را وېستل شي، تکرار کړئ.
- په دې توګه دې له لرګي او جذ بونکې پارچې څخه په استفادې په ورځ کې څلور ځله په کور کې غوړ وچ شي. تر هغه وخته چې پر لرګي تاوه شوې پارچه وچه پاتې شي.
- که چیرې وینه راتلنه پېښه شوه په هغه صورت کې دې په لنډ مهاله توګه د غوړ وچولو پروسه ودرول شي.
- د غوړ وچولو د وقفو ترمنځ هیڅ شی په غوړ کې مه ږدئ.
- هیڅ شی په غوړ کې مه څڅوئ.
- ناروغ یا د هغه پالونکي ته لارښونه وکړئ څو د لمبلو یا حمام کولو په جريان کې د غوړ له لوندوالي څخه مخنیوی وکړي.
- هره اونۍ دې بیا ارزونه وشي څو ډاډ تر لاسه شي چې ناروغ یا د هغه پالونکي د غوړ وچولو پروسه په سمه توګه تر سره کړې ده.

د درملو په وسیله درملنه

- یادونه: د باندیني غوړ التهاب معمولا د فمۍ انتی بیوتیکونو له تجویزولو پرته تداوي کيږي
- د یو سلنې (۱٪) Gentian violet تطبیق هره ورځ د غوړ د اوږدو باندیني مجرا پر جلد د مالوج په وسیله د لسو ورځو لپاره.
 - د درد د ارامتیا تر وخته د درد لپاره Paracetamol توصیه کړئ. د معیاري دوز د مطالعې لپاره دې په الف مل پانه کې الف ۱۵ جدول ته مراجعه وشي.
 - که چیرې تاسو د باندیني غوړ په Furuncular التهاب شکمن یاست (یعنې تاسو یو پستول د غوړ باندیني مجرا په معاینه کې پیدا کوئ)، په دې حالت کې دې لاندې درمل تجویز شي:
 - Cloxacillin (۵۰۰ میلی ګرامه کپسول) په هغه صورت کې چې شتون ولري:
 - ماشومان: ۱۵ میلی ګرامه د بدن هر کیلو ګرام وزن په هر دوز، هر شپږ ساعته وروسته د اوو ورځو لپاره.
 - لویان: ۱ کپسول هر شپږ ساعته وروسته د اوو ورځو لپاره

یا

- له Penicillin سره د حساسو ناروغانو لپاره Erythromycin د پنځو ورځو لپاره. د معیاري دوز د مطالعې لپاره دې په الف مل پانه کې الف ۱۲ جدول ته مراجعه وشي.

یا

- Chloramphenicol. د معیاري دوز د مطالعې لپاره دې په الف مل پانه کې الف ۵ جدول ته مراجعه وشي.
- که چیرې تاسې د باندیني غوړ په اګریماټوز التهاب (درماتیت آلرژیک) شکمن یاست، د تطبیقونکې لرګي د څو کې په وسیله له مالوج څخه په استفادې:
- Betamethasone cream (۱٪) تطبیق کړئ

— له —

- Neomycin (۰.۵٪) کریم سره د باندیني غوړ په مجرا کې، هر ۱۲ ساعته وروسته د اوو ورځو لپاره.

لیږدول

- د باندیني غوړ د مجرا او تمپاتیک پردې د دقیقې او مناسبې معاینې او څیړنې نه ځواکمنتیا.
- درملنې ته ځواب نه ورکول.

وقایه

- له ګرولو یا په غوړ کې د پردې جسم له ایښودلو څخه ډډه کول.
- په ککړو او منتو اوبو کې دې حمام او لامبو ونشي.

- غوړ پاک او وچ وساتي.

ناروغ ته لارښونې

- غوړ پاک او وچ وساتي.
- ناروغ ته و وایست اړینه ده خو درملنه، د باندی غوړ د وچولو تګلاره او د موضعي درملو تطبیق و ارزوي او په یاد وساتي.

۴.۲ د منځني غوړ حاد التهاب (Acute Otitis Media)

تشریح

د منځني غوړ حاد التهاب، د منځني غوړ لنډمهاله انتان دی چې په چټکۍ سره پیل کیږي او لامل یې باکتریاګانې (لکه سټرپټوکوک، نوموکوک، هیموفیلوس آئفلوآئزا، پايوجن سټافیلوکوکونه) او یا ویروسونه دي. دا حالت زیا تره له یوه زکام یا د ستوني د التهاب سره مل وي، ځکه منځني غوړ د استاخي ټیوب له لارې له ستوني سره نښتی دی. که چیرې له درملنې پرته پریښودل شي په هغه صورت کې ځینې خطر لکه د غوړ د مزمن التهاب، کونیوالي او د ډیر مهم ماستویډیت (یعني ماستویډ انتان، د غوړ د شا د هډوکي وتل) شونی دی، چې کولای شي د مننژیت اود دماغ د اېسې لامل شي چې دواړه روغتون ته د سملاسي لیردولو اړتیا لري.

تشخیص

- تاریخچه
 - د غوړ درد
 - په دې وروستیو کې ناروغ فرنجیت (د بلعوم التهاب) او یا زکام تیر کړی دی.
 - تبه
 - کانګې یا نس ناستی
 - ژوا او راپاریدونکي هیجاني حالت
- Otoscopic معاینه کېدای شي لاندې حالات وښيي (چې د ناروغی له پړاوونو سره تړاو لري) -
 - سوروالی او د غوړ د پردې پړسوب
 - د غوړ په پرده کې د نور د عکسې له منځه تلل
 - سوري کېدل، د قیح راتلل، یا دواړه.

۴.۲.۱ د پنځو کلونو څخه په کوچنیو ماشومانو کې د منځني غوړ حاد التهاب (Acute Otitis Media in Children Younger than 5 Years)

د IMCI فلپ چارټ "د غوړ له ستونزو سره د ماشوم برخه" دې هم ولیدل شي.

درملنه

پرته له درملو اهمتومات

- د ماشوم والدینو یا پالنکي ته توصیه وکړئ چې ماشوم لاندې مواردو ته اړتیا لري:
 - د زیاتې اندازې مایعاتو څښل د دیهایدریشن د مخنیوی لپاره
 - په غوړ کې د هر شي له ایښودلو څخه ډډه کول
 - د غوړ له خیشتلو یا مرطوبولو څخه ډډه کول

- د ماشوم والدينو يا پالونكي ته دې توصيه وشي څو د ماشوم تغذيي ته په نورماله توگه دوام ورکړي.

دوايي درملنه

- پوښتنه وکړئ چې ايا ماشوم د غوړ درد لري.
- له غوړ څخه د افرازاتو وتل وگورئ. که بې شتون درلود، پوښتنه وکړئ چې له څه وخت څخه د غوړ د افرازاتو وتل شتون لري؟
- د غوړ تر شا درد لرونکې او حساسې نقطې لمس يا جس کړئ (د مستوئيدت نښه)
- که چيرې ماشوم د غوړ تر شا پرسوب درلود، د مستوئيدت لپاره د درملنې لومړۍ دوز دې تجويز شي او ناروغ دې سملاسي روغتون ته وليږدول شي.
- د Ampicillin لومړۍ دوز عضلي زرق IM له Gentamicin سره د ماشوم وزن او عمر ته په پاملرنې سره تجويز شي. د ستندردو دوزونو د مطالعې لپاره دې الف مل پانه کې د الف ۴ جدول (Ampicillin) او د الف ۱۳ جدول (Gentamicin) ته مراجعه وشي.
- د Paracetamol لومړۍ دوز دې د درد لپاره تجويز شي. د ستندرد دوز د مطالعې لپاره دې په الف مل پانه کې الف ۱۵ جدول ته مراجعه وشي
- که چيرې ليږدول شوني نه وي، د IM Ampicillin دوز هر شپږ ساعته وروسته د Gentamicin له IM دوز هرو ۱۲ ساعتونو کې تر هغه وخته چې ماشوم روغ شي، په تکراري توگه تطبيق شي. پاتې د درملنې رژيم دې په يو مناسب خوراكي انټي بيوتيک (Amoxicillin) او که چيرې له Penicillin سره حساسيت شتون ولري، (Erythromycin) د لس ورځې درملنې د دورې د بشپړولو لپاره، بدل شي. د ستندردو دوزونو د مطالعې لپاره دې د الف په مل پانه کې الف ۳ جدول (Amoxicillin) او الف ۱۲ جدول (Erythromycin) ته مراجعه وشي.
- که چيرې له غوړ څخه له ۱۴ ورځو د کمې مودې لپاره قيح تخليه کيږي او يا که چيرې ماشوم د غوړ درد لري او په اوتوسکوپ کې د غوړ پرده سور رنگ، التهابي، پرسيدلې او مکدر او يا سورۍ شوي له افرازاتو سره ښکاري، په هغه صورت کې دې د منځني غوړ د حاد التهاب درملنه وشي.
- د Co-trimoxazole په پنځو ورځو، لپاره تجويز شي. د ستندرد دوز د مطالعې لپاره دې په الف مل پانه کې الف ۸ جدول ته مراجعه وشي.

يا

- د Amoxicillin په پنځو ورځو لپاره تجويز شي. د ستندرد دوز د مطالعې لپاره دې په الف مل پانه کې الف ۳ جدول ته مراجعه وشي.
- له Penicillin سره د حساسيت په صورت کې دې له Erythromycin څخه استفاده وشي. د ستندرد دوز د مطالعې لپاره دې په الف مل پانه کې الف ۱۲ جدول ته مراجعه وشي.
- د Paracetamol دې د تې او درد د له منځه تللو پورې تجويز شي. د ستندرد دوز د مطالعې لپاره دې په الف مل پانه کې الف ۱۵ جدول ته مراجعه وشي.
- که چيرې د ماشوم له غوړ څخه قيح تخليه کيږي د ماشوم مور يا پالونکي ته دې وښودل شي چې څه ډول غوړ د غوړ پا کوونکو لرگيو په وسيله لکه څرنگه چې په ۴.۱ برخه کې "د باندې غوړ التهاب" تشرېح شوی دی، وچ شي. د ماشوم مور يا پالونکي ته دې توصيه وشي چې په ورځ کې درې ځله تر هغه وخته چې نوره قيح په غوړ کې شتون ونلري غوړ دې له پاکوونکي لرگي سره پاک او وچ کړي او د ماشوم مور يا پالونکي ته دې وويل شي څو هيڅ شی د پاکولو او د غوړ د درملنې په دوران کې د ماشوم په غوړ کې نږدي. ماشوم ته دې اجازه ورکړي چې لامبلو ته لاړ شي او يا د هغه په غوړ کې اوبه لاړې شي.
- له مور يا د ماشوم له پالونکي څخه غوښتنه وکړئ څو له پنځو ورځو وروسته د ناروغۍ د تعقيب لپاره دې ماشوم بيرته راولي. که چيرې د غوړ درد يا د هغه افرازاتو دوام درلود په هغه صورت کې دې د پنځو ورځو لپاره درملنه د هماغه انټي بيوتيک په وسيله وغزول شي. او د غوړ وجولو ته دې همدا شان دوام ورکړل شي.

له پنځو ورځو وروسته دې ناروغ بیا تعقیب شي.

۴.۲.۲ له پنځو کلونو څخه په لویو ماشومانو او لویانو کې د منځني غوړ حاد التهاب (Acute Otitis Media in Children Older than 5 Years and in Adults)

درملنه

دوايي درملنه

- پاراستامول دې د درد یا تې د کمولو لپاره د اړتیا له مخې. د ستندرد دوز د مطالعې لپاره دې په الف مل پانه کې الف ۱۵ جدول ته مراجعه وشي.
- آنتي بیوتیکونه
Amoxicillin O
- لویان: یو تابلیت ۲۵۰-۵۰۰ میلی گرامه هر اته ساعته وروسته د اوو ورځو لپاره چې اندازه یې د ناروغی د اعراضو او علایمو له سختوالي سره تړاو لري.

یا

O له Penicillin سره د حساسیت په صورت کې دې له Erythromycin څخه د اوو ورځو لپاره استفاده وشي. د ستندرد دوز د مطالعې لپاره دې په الف مل پانه کې الف ۱۲ جدول ته مراجعه وشي.

لیږدول

- که د غوړ د پردې پړسوب د ۴۸ ساعتونو درملنې څخه وروسته ښه والی و نه موند
- له ۷ ورځې درملنې څخه وروسته نه ښه کېدل
- د مستوئیدیت، د قحف داخل اختلاطات، او یا د وجهي عصب د ګوزڼ علایم
- د غوړ د پردې سوري کېدل او یا د قحف تخلیه کېدل
- د منځني غوړ راستنیدونکی التهاب

وقایه

- د بلعوم د التهاب (فرنجیت)، دستوني درد، یا د پورتنیو تنفسي لارو د انتان له مناسبې درملنې څخه ډاډ تر لاسه کول.
- د خطر د لاملونو کمول لکه حساسیت پیدا کوونکي، د سګرت دود (Passive smokers) او له زکام لرونکو یا انفلوانزا لرونکو کسانو سره مخ کېدل.

ناروغ ته لارښوې

- د بیا ارزونې لپاره دې اوه ورځې وروسته مراجعه وشي.

۴.۳ د منځني غوړ مزمن التهاب (Chronic Otitis Media)

تشریح

د منځني غوړ مزمن التهاب، د منځني غوړ دوامدار انتان، د غوړ پردې له سوري کېدو او له غوړ څخه د ۱۴ ورځو څخه زیات د قحف راتلل څخه عبارت دی. ثانوي انتان له بیلابیلو مایکروارګانیزمونو سره (لکه سټرپتوکوک، پنوموکوک او د منفي گرام ګډ انتانات) شونې دي چې پېښ شي او د انټي بیوتیکونو په وسیله درملنه ستونزمنه کړي. دا حالت کېدای شي له مستوئیدیت، د سر د ننه انتان، کولستیاټوما، او کونوالي سره مل وي.

تشخيص

- په دې حالت کې درد شتون نلري مگر دا چې د باندیني غوړ د التهاب او يا نور اختلالات منځ ته راغلي وي.
- د افرازاتو راتلل څرگند دي مگر دا چې له ثاني انتان سره يوځای وي.
- په اتوسکوپي کتنه کې د غوړ پردې مرکزي سوري کېدنه ښيي چې کېدای شي وچ او يا لوند وي.
- کوڼ والی شونی دی.
- په اختلاطي مواردو کې د غوړ بڼګس، سرتاوبدل او د وجهي عصب ګوزڼ پېښېدای شي.

درملنه

پرتله له درملو اهمات

- د غوړ د کانال وچول د غوړ وچ ساتل مهمه لاره ده او د ټپ رغېدل اسانه کوي. ۴.۱ برخه "د باندیني غوړ التهاب" د پړاو په پړاو شرحې لپاره دې د وچولو تګلاره مطالعه شي.

دوايي درملنه

- معمولا دمنځنی غوړد مزمن التهاب لپاره انټي بیوتیک نه ورکول کیږي
- د موضعي درملنې سره سره که چیرې بیا حاد انتان له تې او درد سره پېښ شي، په دې صورت کې د منځني غوړ د حاد التهاب لپاره دې د انټي بیوتیک په وسیله درملنه وشي (۴.۲ برخه "دمنځني غوړ حاد التهاب" دې مطالعه شي)

لېږدول

- ټول هغه ماشومان چې کانګې او خوبجن والی لري او يا پرتله له دې د ناروغۍ اعراض او علايم ښيي.
- په هغو حالاتو کې چې په مستوئیدیت شک شتون ولری - د غوړ تر شا د درد لرونکې پړسوب شتوالی
- هغه ناروغان چې د درملنې له پیل څخه وروسته له خلورو اونیو څخه د زیات وخت لپاره دوامداره افرازات ولري.
- هغه ناروغان چې له درملنې سره سره، دوامداره افرازات ولري باید په نري رنځ شکمن شو.
- هغه ناروغان چې د غوړ پرده یې یو لوی مرکزي سوری او يا په منځني غوړ کې یوه کتله ولري.

وقایه

- د منځني غوړ د حاد التهاب له مناسبې درملنې څخه د ډاډ تر لاسه کړئ.
- غوړ وچ وساتئ.
- په غوړ کې د هر ډول پردې جسم له ایښودو څخه دې ډډه وکړئ.

ناروغ ته لارښوې

- ناروغ یا د هغه پالونکي ته وښایاست چې څه ډول خپله وټیا د غوړ د وچولو لپاره د غوړ پاکونکي لږګکي (هغه لږګکي چې پر سر یې مالوج تاوه شوې وي) وکاروي.
- د ارزوني لپاره په اونی کې یوځل بیرته راتلل.
- هر ډول اختلاط لکه د عفونت خپریدل، د داخلي هډوکي زیانمنیدل یا مستوئیدیت دې و ارزول شي، او د لومړنۍ نښې د پیدا کېدو په صورت کې دې بیرته راشي.

۴.۴ حاد سینوزیت (Acute Sinusitis)

تشریح

حاد سینوزیت د یو یا څو سینوسونو باکتریايي التهاب او انتان دی، چې معمولا دپړۍ د ویروسی التهاب، د غاښ له انتان یا د حساسیتی رښت څخه وروسته راپیدا کیږي. له پنځو کلونو څخه په کم عمره ماشومانو کې ډیر کم دی ځکه د هغو

سینوسونو لا ښه پرمختیا نه ده کړې. که چیرې په مناسبه توګه یې درملنه ونشي، حاد سینوزیت کولای شي په لویانو او په لویو ماشومانو کې د مزمن سینوزیت لامل شي.

تشخیص

- د پوزې بنديدل د بویولو د حس له لاسه ورکولو سره
 - د پوزې قیحي دوامداره افزاوت
 - د سر درد او ځنې وخت د غاښونو درد
 - د یوه یا څو سینوسونو په ناحیه کې درد او حساسیت (وچلی یا د سترګې پر شاوخوا)
 - احتمالا تبه
- يادونه: هر زکام چې له ۵-۶ ورځو څخه وروسته ښه نشي او یا زیات شي، په دې صورت کې دې سینوزیت وارزول شي.

درملنه

پرتله له درملو اهتمامات

- ناروغ ته د کافي هایډریشن د ساتلو او دوام او د زیاتې اندازې مایعاتو د څښلو په اړه لارښوونه
- توصیه دې وشي چې د بخار اخیستل کېدای شي ګټور وي او د مخاط د اوبلنیدو لامل کیږي چې د پوزې د بندیدو په له منځه وړلو کې به ګټور وي.
- د غاښ د میکروبي منابعو لپاره چک او ارزونه؛ که چیرې د غاښ میکروبي منابعو شتون درلود د هغه د ویستلو لپاره دې ناروغ ولیردول شي.

دوايي درملنه

- یو انټی بیوټیک تجویز کړی
- Amoxicillin O د خولې له لارې هر اته ساعته وروسته د لس ورځو لپاره. د ستندرد دوز لپاره دې په الف مل پاڼه کې د الف ۳ جدول ته مراجعه وشي.
- یا
- O د هغو ناروغانو لپاره چې له Penicillin سره حساسیت لري، د خولې له لارې Erythromycin په هرو شپږو ساعتونو کې د پنځو ورځو لپاره. د ستندرد دوز لپاره دې په الف مل پاڼه کې د الف ۱۲ جدول ته مراجعه وشي.
- د پوزې له قطرو څخه دې د استفادې په برخه کې ناروغ ته توصیه وشي
- O NaCl ۰.۹٪ (نارمل سالین)، غالباً دې د افزاوتو د پاکولو لپاره وکارول شي
- یو آنتی هیستامین دې تجویز شي.
- O Chlorpheniramine د خولې له لارې هر اته ساعته وروسته په ورځ کې مګر له پنځو ورځو څخه دې زیات تجویز نشي. د ستندرد دوز لپاره دې په الف مل پاڼه کې د الف ۷ جدول ته مراجعه وشي.
- د درد او تې د یو ارامونکي توصیه.
- O Paracetamol د خولې له لارې، هر شپږ ساعته وروسته هره ورځ څو درد، تبه او یا دواړه کم کړي. د ستندرد دوز لپاره دې په الف مل پاڼه کې د الف ۱۵ جدول ته مراجعه وشي.

لیردول

- په هغه صورت کې چې د درملنې پر وړاندې له پنځو ورځو وروسته ځواب مثبت نه وي.
- اختلالات لکه د غاښ اېسه، د اربیت جوف پر شاوخوا سلولیت او یا د وجه اذیما
- له دوه ورځو څخه د زیاتې مودې لپاره د تې دوام.
- تکراري سینوزیت

۴.۵ د ستوني درد (Sore throat)


تشریح

د ستوني درد يو معمول عرض او ستونزه ده چې د وېروسي، باکټريايي انتاناتو او نورو سختو ناروغيو (لکه مونونوکلئوزس، ديفټري، مقاربي ناروغي لکه سوزاک، سیفلیس، HIV) په پایله کې پیدا کېږي.

تشخيص او درملنه

په ۵.۴ بڼه کې د ناروغانو د تشخيص او درملنې د تگلارې تصميم نیول چې د ستوني په درد اخته وي، خلاصه شوی دی.

۵.۴. بڼه د ستوني درد - د تصميم نیولو ونه



۴.۵.۱ د ستوني ویروسي التهاب یا ویروسي فارنجیت (Viral Pharyngitis)

تشریح

د ستوني ویروسي التهاب یو درد لرونکی، سور رنګه، پرته له قیحي افرازاتو التهاب دی، چې غالباً لامل یې تنفسي ویروسونه دي، له دی امله یوازې عرضي درملنې ته اړتیا لري.

تشخیص

- معمولاً د یوې بهیدونکې پزۍ او ټوخلې له پېښې څخه وروسته پیدا کیږي
- په ستوني کې سوروالی یا درد
- د جامدو خوړو په تیرولو کې ستونزې
- تبه
- له قیحي افرازاتو او ترشحاتو نه شتون

یادښت: له پنځو کلونو څخه په کوچنیو ماشومانو کې، د خطر علایم دې وڅیړل شي او رد دې شي (د IMCI فلپ چارټ دې مطالعه شي).

درملنه

پرتله له درملو اهتمامات

- ناروغ ته دې د غرغره کولو په موخه د مالګینو اوبو څخه د استفادې توصیه وشي. ناروغ دې وپوهول شي چې د چای خوړلو یوه قاشغه مالګه په اتو اونسو (۲۵۰ میلی لیتره) شیر گرمو اوبو کې په یوه ګیلاس کې مخلوط او د یوې دقیقې لپاره دې په ورځ کې له ۴-۶ ځله د دې محلول په وسیله غرغره وکړي.
- ناروغ دې وهڅول شي خو د مایعاتو اخیستل زیات کړي.

دوايي درملنه

- آنتی بیوټیکونه دې توصیه نشي.
- Paracetamol توصیه او تجویز تر دې چې تبه او درد او یا دواړه کم شي. د سټنډرډ دوز لپاره دې په الف مل پاڼه کې د الف ۱۵ جدول ته مراجعه وشي.

۴.۵.۲ د تانسل باکټریايي التهاب (تانسلیټ) (Bacterial Tonsillitis)

تشریح

د تانسلیټونو باکټریايي التهاب معمولاً د A گروپ بتا همولیتیک اسټرپټوکوک له امله، په ځانګړې توګه له درې کلنۍ څخه تر ۱۴ کلنۍ پېښیږي، او د هغه د جدي اختلاطاتو د مخنیوي لپاره د انټي بیوټیکونو تجویزولو ته اړتیا ده.

تشخیص

- د ستوني درد
- معمولاً د پوزې څخه د اوبو راتلل یا ټوخله شتون نلري
- د غاږې لمفواي غدې زیاتره لویېږي او د لمس کولو پرمهال درد کوي.
- په ستوني کې سپین داغونه یا سپینې ساحې، اگزودات یا فولیکولونه.
- تبه، زیاتره له ناڅاپي پیلیدو سره.
- احتیاط: که چېرې په سمه توګه یې درملنه ونشي، د ستوني سټرپټوکوکسیک انتانات کولای شي د لاندې جدي

اختلاطاتو لامل شي.

- حاد گلو میرولونفریت (۱۱.۲ برخه)
- حاده روماتیزم تبه (۶.۳ برخه)
- په ټول ستوني کې اېسې.

درملنه

د دې ناروغۍ که په سمه توګه درملنه ونشي د زیاتو عوارضو او اختلاطاتو لامل کیږي، (۶.۳ برخه "روماتیزم تبه" دې مطالعه شي) په دې ناروغۍ کې زرقي Penicillin د انتان د له منځه وړلو د بشپړې درملنې څخه د ډاډ لپاره انتخابي درمل دی.

- د لومړۍ کرښې درملنه - یو واحد دوز دې له Benzathine BenzylPenicillin څخه د عضلي د داخل د زرق په بڼه تجویز شي چې کېدای شي د ۱.۲ میلیونه واحدو پوډر په بڼه په یوه پنځه میلی لیتره ویال کې د زرقولو لپاره وکارول شي.
- له ۳۰ کیلو ګرامو څخه کم ماشومان: ۲.۵ میلی لیتره ژور عضلي زرق (IM)
- لویان او له ۳۰ کیلو ګرامو څخه زیات ماشومان: پنځه میلی لیتره ژور عضلي زرق (IM)

یا

- د دویمې کرښې درملنه - د خولې له لارې د Penicillin V phenoxymethylPenicillin تجویز، د خوراکي شربت پوډر، هر پنځه میلی لیتره ۲۵۰ میلی ګرامه، او یا ۲۵۰ میلی ګرامه ټابلیټ د لس ورځو لپاره:
- له پنځو کلونو څخه کوچني ماشومان: ۲۵۰ میلی ګرامه/ یو دوز هر ۱۲ ساعته وروسته (یو ټابلیټ یا پنځه میلی لیتره فمي شربت)
- لویان او له پنځو کلونو څخه لوی ماشومان: ۵۰۰ میلی ګرامه هر ۱۲ ساعته وروسته (دوه ټابلیټه ۲۵۰ میلی ګرامه یا لس میلی لیتره فمي شربت)

یا

- هغو ناروغانو ته چې له Penicillin سره حساسیت لري، د خولې له لارې Ethylsuccinate Erythromycin تجویز شي، د شربت لپاره پوډر (۱۲۵ میلی ګرامه - پنځه میلی لیتره)، یا ۴۰۰ میلی ګرامه ټابلیټ، له غذا څخه مخکې له ۵-۷ ورځو.
- که چیرې ناروغ لږه تبه ولري د تې تر کمېدو پورې دې Paracetamol تجویز شي. د ستندرد دوز لپاره دې په الف مل پانه کې د الف ۱۵ جدول ته مراجعه وشي.

لېږدول

- ۵.۴ بڼه وګورئ.
- په سختو مواردو په ځانګړې توګه د تا نسلونو او د هغو د شاوخوا د اېسې په موجودیت کې دې، ناروغ ولېږدول شي.

۴.۶. رینیت (د پوزې د مخاطي غشا پرسوب) (Rhinitis)

تشریح

رینیت د پوزې د مخاطي غشا التهاب دی چې په هغه کې هیستامین او د الرژی نور تولیدونکي منځګړي یا مډیاټورونه آزادېږي چې د پرنجې یا د پوزې د بندیدو یا د مخاطي تولید د زیاتوالي (له پوزې څخه اوبه راتلل) او نورو دا ډول اعراضو او علایمو لامل کیږي. د رینیت په لاملونو کې لاندې موارد شامل دي:

- الرژیک رینیت - الرژونه لکه د گلونو ګرده (عمدتا فصلي) دوږې او خاورې، مولډ، خواړه، د حیواناتو وږی او خوړه، د ناروغۍ د اعراضو او علایمو د پیل کېدو لامل کیږي. الرژیک رینیت د پوزې د مخاطي غشا د التهاباتو (رینیتونو) تر ټولو معمولي ډول دي. زیاتره فصلي دی او فامیلی بڼه راپیدا کیږي.

- غیرالژیک رینیت -- درمل، هورمونونه، اوبه او هوا، او د حرارت د درجې بدلونونه، دود، دورې او کیمیاوي توکي (لکه حشره وژونکي، سپینونکي پوډر، رنگونه) او نور انشافي تحریکونکي د ناروغی د اعراضو د پیل لامل کیږي.
- د رینیت دا بڼه تر ټولو دوامداره وي.
- انتاني رینیت -- باکتریاگانې یا ویروسونه د دې ډول رینیت د علایمو او اعراضو د راپارولو او پیل کولو لامل کیږي (۲،۳ برخه "والکي او انفولانزا")

تشخیص

- تر ټولو څرگند اعراض او علایم
 - د پوزې څخه د ډېرو افرازاتو او ترشحاتو راتلل (بهدونکي پوزه).
 - د پوزې احتقان (بنده پوزه).
 - پرنجی، د پوزې خارش
- مل اعراض او علایم
 - د سترګې او منضې، سوروالی، التهاب، اوبښکې او پړسوب.
 - درانه او بند شوي غوړونه، د منځني غوړ انصباب
 - د پوزې د مخاط پړسوب
 - د بویولو د حس کمېدل
 - ستمیا
 - ټوخی، د ستوني درد، د سر درد - په ځانګړې توګه له انتاني رینیت سره
- مل ناروغی (ډیر کم)
 - آستما
 - سینوزیت
 - اکزیم

درملنه

- ناروغ ته د زیاتو مایعاتو د څښلو او د کافي هایدریشن د ساتلو او دوام لپاره لارښونه
- د مالګې له اوبو سره د پوزې د منځلو توصیه (۰.۹% Normal saline محلول) د پوزې د مخاط د بندیدو د کمولو لپاره په ورځ کې درې ځله.
- د سیستمیک درملو توصیه
- Chlorpheniramine maleate. د ستندرد دوز لپاره دې په الف مل پانه کې د الف ۷ جدول ته مراجعه وشي.
- ماشومان: د اړتیا له مخې
- لویان: د اړتیا په صورت کې هر اته ساعته وروسته څلور میلی ګرامه

لیږدول

- له یوې اونۍ درملنې څخه وروسته نه رغیدل
- بیا ځلي اعراض او علایم - له وقایوي درملنو څخه د اوږدمهاله استفادې په پام کې نیولو سره.

ناروغ ته لارښونې

- ناروغ ته دې توصیه وشي څو د پارولو له پیژندل شویو لاملونو څخه ډډه وکړي.
- ډاډ درې تر لاسه شي چې ناروغ د پوزې د بندیدو له ضد موضعي درملو څخه له اندازې زیاته استفاده یا ناوړه ګټه نه ده اخیستې (چې معمولاً پېښیږی) تر څو د رینیت د عود څخه مخنیوی وشي.
- Chlorpheniramine او نور انتي هیستامینونه کېدای شي د خوب جن والي لامل شي، ناروغ ته دې توصیه وشي

- څو د خوړلو پرمهال له موټر چلولو یا له ماشین آلانو سره له کار کولو څخه ډډه وکړي.
- د نه ښه کېدو یا د وضعیت د خرابیدو په صورت کې له ناروغ څخه غوښتنه وکړئ چې په یوه اونۍ کې بیا مراجعه وکړي.
 - ناروغ ته وړاندیز وکړئ چې په کور کې د دوړو، چټاسک او مایټ (mite) (یو کوچنی موجود دی چې د بالینټ، دوشکو او غالیو په گرز او خاوره کې شتون لري) کچه په متکررو پاکولو او د پخوانیو له خاورو څخه ډکو فرشونو پر ځای د نورو د هوارولو په پایله کې ځان وژغوري.

پنځم څپرګۍ د سترګې ناروغۍ Eye Conditions

۵.۱ د منضمې التهاب (د سترګې سوروالی) (Conjunctivitis)

تشرېح

د سترګې د سوروالی لوی لامل د منضمې التهاب دی (یعنې د هغې پردې التهاب چې د لېمو د ننه خوا او د سترګې د ګاټي سپینه برخه یې پوښلی ده). لاملونه یې کېدای شي باکټریايي، ویروسي، الرژیک او یا هم خارجي، ټپ او یا پردی جسم وي. که چیرې د منضمې د التهابونو درملنه ونشي کېدای شي د قرنې د التهاب یا کراتیت (یعنې د رنګه پرده چې د سترګې ګاټی یې پوښلی دی) او ړوندوالي لامل شي. انتاني لاملونه یې په اسانۍ له یوه کس څخه بل کس ته لیرېدلی شي.

تشخیص

- د سترګې له سوروالي پرته ناروغ کېدای شي خفیف درد، خارجي او یا ناسم لید ولري. معمولاً پیل یې تدریجي او ورو دی
- سترګه دې په لاندې توګه وکتل شي:
 - د لیدو وړتیا
 - قیحي افرازات - معمولاً دمنضمې د باکټریايي التهاب سره لیدل کیږي.
 - اوبلن افرازات - معمولاً د منضمې له ویروسي یا الرژیکي التهاباتو سره لیدل کیږي.
 - قرنيه - پاکه او روښانه یا ورېځ بخښه
 - د سترګې لېمه (Eyelid) - پرسیدلی یا پردی جسم. د فولیکول مدارک او شواهد دې چک شي (یعنې وتلې سپینې یا زېرې نقطې) او یا د لېمه په داخل کې د ټپ اغیز (نډبه) څکه دا کېدای شي د تراخم نښه وي (۵،۲)
 - برخه دې مطالعه شي، د شتون په صورت کې د ناروغ ولیردول شي.
 - د پردې جسم شتوالی دې په سترګه او د لېمو لاندې کې چک شي.
- په تفریقي تشخیص کې د قرنې ټپ، کراتیت، حاد Iritis او ګلوکوم شامل دي. دا ناروغی چې معمولاً په ناڅاپي پیل، سخت درد، د لید کمښت، او د تیارو یا ایره یي داغونو سره د قرینې پرمخ څرګندېږي او کېدای شي دناڅاپي ړوندوالي لامل شي. دا ناروغان سملاسي لیردونې ته اړتیا لري.

درملنه

پرتله له درملو اهتمامات

- سترګې دې د لرو تودو اوبو (مخکې جوش شوي اوبه) یا تعقیم شوي نارمل Saline (۰.۹٪) محلول سره په ورځ کې له ۴-۶ ځله پاکې شي.
- له یو پاک ټوکر څخه په استفادې دې له سترګې قیح لرې کړای شي - مګر هیڅ کله دې له همدې ټوکر څخه په لاندې حالاتو کې استفاده ونشي:
 - دوه ځله
 - د دواړو سترګو لپاره
 - د بل شخص لپاره

دوايې درملنه

- د قیحي درېنژ لپاره، د سترګې یو سلنه (1%) Tetracycline پماد دې په ورځ کې دوه ځله (له سهار چاي څښلو وروسته او له ویده کېدو مخکې) د اوو ورځو لپاره تطبیق شي. ناروغ ته دې په عملي توګه لارښونه وشي چې څه ډول په سمه توګه یوه لږه اندازه مرحم تطبیق شي (لاندې "ناروغانو ته لارښونې" دې مطالعه شي)
- د ډیر خارش لپاره دې Chlorpheniramine په پام کې ونیول شي. د سټندردو دوزونو د مطالعې لپاره دې په مل پانه کې الف ۷ جدول ته مراجعه وشي.

لېږدول

- ټولې هغه پیښې چې په هغو کې په لید کې بدلون شتون ولري.
- ټول هغه پیښې چې د قرنيې له تیاره کېدو یا ټپ سره مل دي.
- په کراتیت، Iritis، د سترګې ګلوکوم، د قرنيې ټپ، نافذه ټپونه او یا د تراخم مشکوکې پیښې.
- له پنځو ورځو څخه وروسته د نه ښه کېدو په صورت کې د تتراسیکلین د مرحم په وسیله درملنه
- د نویو پیدا شویو ماشومانو د منضمې په التهاب ټول شکمن موارد

وقایه:

- د شخصي روغتیا ساتنې ښه کول.
- په منظمه توګه د مخ او لاسونه مینځل.
- له ګډو روي پاک څخه دې استفاده ونشي.
- په سترګو دې په لاس وهلو او یا د سترګو له مینلو څخه دې ډډه وشي.

ناروغ ته لارښونې

- ناروغ (اویا د ناروغ پالونکي ته) لارښونې چې څه ډول په سمه توګه د سترګې تجویز پماد یا مرحم تطبیق کړي.
- ناروغ ته د مرحم د عملي تطبیق د څرنگوالي د بشپړې تشریح په موخه دې کافي وخت ځانګړی شي او ناروغ یا د هغه پالونکي ته دې و ویل شي چې هغوی د مرحم د تطبیق د اجرا کولو وړتیا لري. ناروغ ته دې لارښونه وشي چې لاندې پروسیجر تعقیب کړي:
- خپل لاسونه و وینځي.
- د یوې هندارې پر وړاندې دې کیښي څو دا چې تاسو کوم کار چې تر سره کوئ ولیدلی شي.
- د مرحم سر لرې کړئ.
- خپل سر شالوړي ته کش کړئ.
- په ارامۍ د سترګې لاندینۍ لېمه ښکته لوري ته کش کړي او پورته خواته وګورئ.
- د مرحم ټیوب د سترګې له پاسه ونیسئ او په ارامه فشار ورکړئ او د 1 cm کرنيې په اندازه د ټیوب له داخل څخه مرحم په لاندینۍ لېمه کې واچوئ پاملرنه وکړئ چې د ټیوب څوکه له سترګې یا لاندینۍ لېمې سره تماس ونکړي.
- سترګې دې و رپول شي څو مرحم د سترګې د ګاټې پر سطحه خپور شي.
- هغه وخت چې خپله سترګه خلاصوئ کېدای شي ستاسو دید ناسم وي، مګر خپله سترګه مه مینئ. د سترګو رپولو ته تر هغه وخته چې د لید ستونزه له منځه لاړه شي، دوام ورکړئ.
- اضافي مرحم په یو پاک دستمال کې تاو کړئ.
- که چیرې دواړو سترګو درملنې ته اړتیا لرله همدا تګلاره دې بلې سترګې لپاره تکرار کړئ.
- د مرحم سرپوښ بیرته پر ټیوب کیږدئ.
- پاملرنه وکړئ چې د ټیوب څوکه ستاسو د لاسونو له ګوتو سره تماس ونکړي.
- ناروغ ته و ویاست چې په لاندې حالاتو کې دې بیا مراجعه وکړي:
- کله چې د منضمې وېروسي یا الرژیک التهابونه (اوبلن افرازات) د قیحي افرازاتو په تولید باندې پیل وکړي.

- په هغه صورت کې چې درد او یا له نور څخه ویره رامنځته شي.
- په هغه صورت کې چې له ۴-۵ ورځو وروسته درملنې ښه والی رامنځته نشي.

۵.۲ تراخم (Trachoma)

تشرېح

تراخم د لیږدېدو وړ د منظمې یو مزمن التهاب دی چې د کلامیدیا تراکوماتیس په نوم د یو انتان په وسیله راپیدا کیږي. انتان لومړی معمولاً د ماشومتوب په دوران کې له خیرنو لاسونو، خیرن روي پاک او یا مچانو سره د مستقیم یا غیر مستقیم تماس له لارې پیلېږي. او په خپله ښه کیږي. مکرر انتانات د ندبې، بدشکلی او په لویانو کې د ډونډیدو لامل کیږي.

تشخیص

- افغانستان د تراخم د خپرېدو لپاره یو انډیمیک هېواد دی، له دې امله د منظمې د التهاب په هره پېښه کې باید په تراخم شک ولرو.
- دواړه لېسې دې بهر لوري ته قات شي او د تراخم ښې دې هغه ډول چې په ۵.۲ جدول کې لیست شوي، وکتل شي.
- د لاندې حالاتو سره دې تفریقي تشخیص وشي: د منظمې التهاب، کراتیت، د قرنيې ټپ، Iritis او گلوکوما.

۵.۲ جدول د تراخم تشخیص

پړاوونه	د تراخم ښې
۱	پنځه یا زیات فولیکولونه (یعنې څرگند، سپین، ایره یي، زیرې نقطې) کولای شو د د لېمو په ننی سطحه کې وگورو.
۲	برسیره پر فولیکولونه، څرگند التهاب. د سترگې د لېمو زیره کېدل او پرېږېدل، او نورماله اوعیه د منظمې پرمخ د فولیکولونو په وسیله پوښېدل او پرېږېدل.
۳	د فولیکولونو پر ځای ندبې منځ ته راتلل، چې د سپینو کرښو، فیتې یا ټوکرو په بڼه د لېمودېه داخلي سطحه کې وي.
۴	د لېمو بدشکلي د ندبو په پایله کې پیدا کیږي. چې دا بدشکلي د لېمو د ننه خوا ته د تاویدو لامل کیږي او کېدای شي قرنيې ته د زیان رسولو یا د هغه د ټپي کولو لامل شي.
۵	د قرنيې خیره کېدل د مزمنې زیان رسیدنې په پایله کې رامنځته کیږي او کېدای شي د ډنډیدو په لوري پرمختګ وکړي.

درملنه

پورته له درملو اهمات

- سترگې او مخ دې په ورځ کې څو ځله وو ښځل او پاک شي.
- د کثافتو د مناسب مدیریت او ټولولو له لارې د مچانو د راټولیدو محدودول

دوايي درملنه

- د فولیکول او التهاب درملنه وکړئ (لومړی او دویم پړاوونه)

- د Tetracycline یو سلنه (۱٪) پماد تجویز په ورځ کې دوه ځله د شپږو اوښو لپاره. نه یوازې ناروغ، بلکې د ناروغ د ټولې کورنۍ درملنه دي وشي. ناروغ یا د هغه پالونکي ته دې لارښوونه وشي چې څه ډول مرهم په سمه او دقیقه توګه تطبیق کړي. ناروغ ته د لارښوونې برخه دې (په ۵.۱ برخه کې "د منظمې التهاب" مطالعه شي)
- د سترګې د یو سلنې Tetracycline مرهم سره له شپږو اوښو وروسته د نه ښه کېدو په صورت کې دې ناروغ د یوه دوز Azithromycin په وسیله د درملنې لپاره دې د ولسوالۍ روغتون ته ولېږدول شي.
- ماشومان: ۲۰ mg / kg دوز (۲۰ میلی ګرامه د بدن پر یو کیلو ګرام وزن)
- لویان: یو ګرام (امیدواره او شیدې ورکونکو ښځو ته هم تجویزېدلای شي)

لېږدول

- د ناروغی له پرمختګ یا د قرنبي د تپ مدارک او شواهد، لېږدولو ته اړتیا لري.
- د ۴، ۳، او ۵ پړاونو په صورت کې دې ناروغ د احتمالي جراحي عمل لپاره روغتون ته ولېږدول شي.

وقایه

- د شخصي روغتیا ساتنې ښه کول
- په منظمه توګه د مخ او لاسونو مینځل لږ تر لږه هره ورځ په پاکو اوبو او صابون
- له ګلډ روي پاک څخه دې استفاده ونشي.
- د پاکو اوبو سرچېنې باید تامین شي.
- د فاضله توکو او پاتې شونو څخه د اهتماماتو له لارې او له سپرې (Spray) څخه په استفادې د مچانو مناسب کنټرول (له کور څخه د حیواناتو لرې ساتل او د پوښل شویو زورو تشنابونو څخه ګټه اخیستل)

ناروغ ته لارښوونې

- ناروغ او د هغه د کورنۍ غړو ته دې لارښوونه وشي چې څه ډول د سترګې مرهم په سمه او دقیقه توګه تطبیق کړي. ناروغ ته د لارښوونې برخه دې (په ۵.۱ برخه کې "د منظمې التهاب") مطالعه شي.
- ناروغان او د هغوی د کورنیو غړي باید په منظمه او مرتبه توګه خپل لاسونه او مخ لږ تر لږه هره ورځ په پاکو اوبو او صابون و مینځي. ناروغ باید د کورنۍ له نورو غړو سره په ګډه له روي پاک څخه ګټه وانخلي.

۵.۳ ګلوکوما (Glaucoma)

تشریح

ګلوکوما د سترګو یو ډول ناروغي ده چې د لیدو عصب په هغه کې زیانمنیږي. دا ناروغي معمولاً د سترګې د کورې د داخل د فشار د زیاتوالي سره یوځای وي چې د لیدو د له لاسه ورکولو لامل کیږي. درې ډوله ګلوکوما شتون لري: حاد، مزمن او ولادي.

تشخیص

- حاد ګلوکوما (تړلې زاویه)
 - پرمختلونکی دی او د یو اړخیز (Unilateral) لید له لاسه ورکولو سره رامنځته کیږي.
 - د سترګو د شاوخوا درد (غالباً شدید وي)
 - احتقان (یعنې په ټوله سترګه کې سور والی)
 - اوښل افرازات
 - زړه بدوالی او کانګې په سختو پېښو کې
 - د قرنبي خیره کېدل او اډیما

- ناروغ کېدای شي د نور پر شاوخوا رنگینه دایرې و ویني (څلېدونکې دایرې)
- حلقه کېدای شي ثابته، نیمه متوسع او بیضوي بڼه ولري.
- د سترګې سطحي قدامي بیت.
- احتیاط: حاد گلوکوما عاجله او د لیدو گواښونکې پیښه ده. پیل یې کېدای شي ناڅاپي وي.
- مزمن گلوکوما (خلاصه زاویه)
 - معمولا دواړه سترګې زیانمنوي (دوه اړخیز)
 - په تدریجي توګه د لید د له لاسه ورکول
 - نسبتا لوی ناروغان (له ۴۰ کلونو څخه لوی)
 - د حلقې پېخ غبرګون
- ولادي یا مورزادي گلوکوما
 - په معموله توګه دواړه سترګې زیانمنوي
 - په تدریجي توګه د لیدو د وړتیا له لاسه ورکول
 - د قرنې مکدروالی او خیره والی
 - اوښ افرازا
 - له نور څخه ویره یا فوتوفوبی
 - د لېمو غیر ارادي سپسمایک ریپدل (Blepharospasm).
 - Buphthalmos (یا ابي رنگ ته نږدې لوبې سترګې)

درملنه

- په گلوکوما ټول شکمن ناروغان ولیردوئ.
- احتیاط: د درد لرونکې سترګې ټول موارد د لید له لاسه ورکولو سره باید د سترګې د عاجلو پیښې په توګه په پام کې ونیول شي او روغتون ته ولیردول شي.
- ناروغ دې دلیردولو پرمهال د شا په تخته د ملاستې وضعیت کې ولیردول شي (د امکان په صورت کې)

ناروغ ته لارښونې

- ډاډ دې تر لاسه شي چې ناروغان او د ناروغانو کورنۍ په ټاکلي وخت کې د ناروغ لیردونه په پام کې ولري.
- ناروغانو او د هغو پر شاوخوا کسانو ته له ماشین الاتو څخه د استفادې او نورو خطر لرونکو فعالیتونو پرمهال د سترګې د خونديتوب په اړه لارښونه.

شپږم څپرکی د قلبي وعایي سیسټم ناروغۍ Cardiovascular System Conditions

۶.۱ د وینې لوړ سیسټمیک فشار (Systemic Hypertension)

۶.۱.۱ د وینې مزمن لوړ فشار (Chronic Hypertension)

تشریح

له ۹۰/۱۴۰ ملي متر سیماب څخه د وینې لوړ مزمن فشار د وینې د لوړ فشار په نوم یادېږي. له ۹۰-۹۵ سلنې پېښو کې، لامل یا سبب یې نه دی تشخیص شوی (د وینې لومړنۍ یا اساسي فشار). له ۱۰-۵ سلنه پورې لامل یې څرګند وي چې هغه ته د وینې ثانوي لوړ فشار ویل کېږي. د وینې د مزمن لوړ فشار د درملنې موخه وقایه او یا د وینې د لوړ فشار له اوږدمهالو اختلاطونو او عوارضو وقایه (لکه د زړه ناروغۍ او یا مغزي سکتې) ده.

تشخیص

- د وینې د فشار درجه په یوه ناروغ کې په دوو جلا ورځو کې د BP په دریو بېلابېلو کتنو کې اندازه کولو یا معلومولو په وسیله د استراحت، ناستې یا د ډډې کولو په حالت کې ټاکل کېږي. (۶.۱.۱ الف جدول مطالعه کړئ) که چېرې د وینې فشار نورمال نه وو، په دواړو متو کې دې فشار چک شي.
- د قلبي وعایي ناروغیو او د وینې د لوړ فشار لپاره په ناروغ کې د خطر د لاملونو ټاکل چې د وینې پر اوږدمهالي فشار اغېز لري:

۶.۱.۱ الف جدول: د وینې د لوړ فشار تصنیف

د وینې د فشار تصنیف	د وینې سیسټولیک فشار (ملي متر ستون سیماب)	د وینې دیاستولیک فشار (ملي متر ستون سیماب)
نورمال	$120 >$	$80 >$
د وینې لوړ فشار څخه مخکې حالت یا Pre-Hypertension	۱۲۰ - ۱۳۹	۸۰ - ۸۹
د وینې د لوړ فشار لومړنۍ پړاو (خفیف)	۱۴۰ - ۱۵۹	۹۰ - ۹۹
د وینې د لوړ فشار دویم پړاو (منځنۍ)	۱۶۰ - ۱۷۹	۱۰۰ - ۱۰۹
د وینې شدید لوړ فشار	$180 \leq$	$110 \leq$

- شکر
- چاغوالی
- سګرټ څکول
- د وینې د غوړیو ناروغۍ یا اختلالات (دیسلیپیدمي)

- له ۵۵ کلونو څخه په کم عمر لرونکو ښځو او له ۵۰ کلونو څخه په کم عمر لرونکو نارینه و کې د قلبي و عایي ژر رسېدونکو ناروغیو یا د وینې د لومړني لوړ فشار کورنۍ مخینه (سابقه)
- د بدنې فزیکي فعالیت نشتوالی
- په ناروغ کې له مخکې موجودې ناروغۍ چې انذار اغېزمنوي، تعینول.
- د کین بطن هیپرتروفی
- د زړه ایسکیمیکي ناروغۍ (صدري خنای یا د زړه د میوکارډ احتشا)
- د زړه عدم کفایه
- ژر تېرېدونکې اسکیمیکې حملې (TIA).
- ستروک یا مغزي سکته
- د پښتورگو مزمنه عدم کفایه.
- رتینوپاتي
- محیطي شریاني ناروغۍ
- ناروغ د وینې د لوړ فشار د علایمو او اعراضو لپاره معاینه کړي.
- اعراض
- د وینې لومړنۍ لوړ یا له لومړني خفیف څخه تر منځني فشار پورې تر ډیره بریده د ډیرو کلونو لپاره اعراض او نښې نلري. د سر درد پې غیر وصفې تر ټولو عامه نښه ده.
- د وینې شدید لوړ فشار کېدای شي له خوبجنوالي، گڼګسوالي، د لیدو د ستونزې، زړه بدوالي او کانګې، د زړه له درزیدو، نااښته صدري خنای، د سږي اذیمو او د پښتورگو له عدم کفایې سره مل وي.
- که چېرې د وینې د مزمن لوړ فشار درملنه ونشي زیاتره د کین بطن د هاپیرتروفی لامل کېږي چې کولای شي د فزیکي فعالیت پورې اړوند سالنډۍ، د شپې د سالنډۍ له حملو او نورو ثانوي لاملونو له اعراضو سره، مل وي.
- علایم
- د بدن په ځانګړو وغړو یا Target organs کې د اغېزې درجه، سختوالی او دوام یا موده لومړنۍ نښې دي.
- د وینې لوړ فشار کېدای شي یوازینۍ نښه وي. چې په دواړو متو کې د استراحت په حالت کې د وینې فشار لیدل شوی وي (لږ تر لږه درې ځله اندازه کول دي د استراحت په حالت کې، د دوه ورځو په واټن کې). په یو ناروغ کې د وینې د فشار د اندازه کولو د یوه ځل پر بنسټ (چې د وینې لوړ فشار وښيي)، هېڅ کله یوازې په یوه کتنه کې تصمیم مه نیئ چې ناروغ د وینې لوړ فشار لري.
- د وینې په ثانوي لوړ فشار کې کېدای شي د لومړنیو ناروغیو اعراضو او علایمو ته پاملرنه وشي (لکه د کوشنګ سندروم، پولې سیسټیک پښتورګي).
- د مغزي سکټې په ناروغانو کې چې عصبي اعراض او علایم (لکه، ضعف یا د بدن په یو لوري کې ګوزڼ) یا اختلالات او عوارض لکه د وینې له لوړ فشار څخه راپیدا شوې د زړه ناروغۍ کېدای شي شتون ولري.
- د سترګې د شبکې د اوعې زیانمنیدل (I, II, III, IV درجه) هم په احتمالي توګه د وینې لوړ فشار ښيي.

درملنه

- د درملنې موخه د وینې د فشار نورماله کول او د فشار د نورماله دوام ساتل دي. (د ۶.۱.۱ ب جدول، له درملنې پرته او د درملنې په وسیله د لوړ فشار د درملنې لټویز دې مطالعه شي)
- په ډیرو پېښو کې د وینې د لوړ فشار د درملنې موخه باید لاندې موارد ولري:
 - دیاسټولیک له ۹۰ ملي متره ستون سیماب څخه کم
 - سیسټولیک له ۱۴۰ ملي متره ستون سیماب څخه کم
- په ځانګړو مواردو کې (لکه د شکرې ناروغان یا د زړه او پښتورگو په ناروغیو اخته ناروغان)، د لوړ فشار درملنه باید لاندې موخې ولري:

- دیاستولیک له ۸۰ ملي متر ستون سیماب څخه کم
- سیستولیک له ۱۳۰ ملي متر ستون سیماب څخه کم

له درملو پرته درملنه

د وینې په لوړ فشار اخته د ټولو ناروغانو لپاره د ژوند په کپنلاره کې بدلون عبارت دی له:

- د مالګې د لګښت محدودول
- د وزن د زیاتوالي په صورت کې د وزن کمول یا له لاسه ورکول
- د سګرېټ څکلو بندول
- د الکول د څښلو بندول
- منظم ورزش

۱.۱.۶. ب جدول: د وینې د لوړ فشار درملنه

درجه بندي	درملنه	مستقیمې اغیزې
لومړی پړاو		
• د وینې دیاستولیک فشار ۹۰-۹۹ ملي متره ستون سیماب، د وینې سیستولیک فشار ۱۴۰-۱۵۹ ملي متره ستون سیماب، یا دواړه • د خطر عمده لاملونه شتون نلري • نورې مل ناروغۍ شتون نلري	له درملو پرته درملنه (پورته رجوع وکړئ)	د وینې فشار د درملنې له پیل څخه د درې میاشتو په موده کې له ۱۴۰/۹۰ ملي متره ستون سیماب څخه ټیټ شوی وي (د وینې فشار کنټرول شوی دی)
دویم پړاو		
• د وینې دیاستولیک فشار ۹۰-۹۹ ملي متره ستون سیماب، د وینې سیستولیک فشار ۱۴۰-۱۵۹ ملي متره ستون سیماب، یا دواړه • د خطر عمده لاملونه شتون نلري • نورې مل ناروغۍ شتون نلري • د لومړي پړاو له درې میاشتو وروسته د درملنې پر وړاندې ځواب نه ورکول. - یا • د وینې دیاستولیک فشار ۹۰-۹۹ ملي متره ستون سیماب، د وینې سیستولیک فشار ۱۴۰-۱۵۹ ملي متره ستون سیماب، یا دواړه • د خطر عمده لاملونه او یا نورې مل ناروغۍ شتون نلري - یا	له درملو پرته درملنه + Hydrochlorothiazide: له ۱۲،۵ - ۲۵ میلی ګرامه په ورځ کې یوځل د سهار له مخې. احتیاط: پورتنی مضاد استطبابات دی و کتل شي	د وینې فشار د درملنې له پیل څخه د یوې میاشتې په موده کې له ۱۴۰/۹۰ ملي متره ستون سیماب څخه ټیټ شوی (د وینې فشار کنټرول شوی دی)

• د وینې دیاستولیک فشار ۱۰۰-۱۰۹ ملي متره ستون سیماب، د وینې سیسټولیک فشار ۱۶۰-۱۷۹ ملي متره ستون سیماب، یا دواړه		
دریم پړاو		
• له یوې میاشتنې وروسته د درملنې د دویم پړاو د نه بریالیتوب په صورت کې یا • د وینې دیاستولیک فشار ≤ 110 ملي متره ستون سیماب، د وینې سیسټولیک فشار له ۱۸۰ ملي متره ستون سیماب څخه لوړ یا دواړه	له درملو پرته درملنه + Hydrochlorothiazide: له ۱۲،۵ میلی گرامه په ورځ کې یوځل د سهار له مخې. + د خولې له لارې Atenolol له ۲۵ ملي گرامو څخه تر ۱۰۰ ملي گرامو پورې په ورځ کې یو ځل احتیاط: پورتنی مضاد استطباب دی و کتل شی	د وینې فشار د درملنې له پیل څخه د یوې میاشتنې په موده کې له ۱۴۰/۹۰ ملي متره ستون سیماب څخه ټیټ شوی (د وینې فشار کنټرول شوی دی)
که چیرې د وینې فشار د دریم پړاو د درملنې له یوې میاشتنې څخه وروسته نورماله نه شو، ناروغ به د ډیرې څیړنې او د درملنې د ټاکلو لپاره یو مجهز روغتون ته ولیږل شي.		

- د مشبوع شویو غوړیو د لگښت محدودول (لکه کوچ، حیواني غوړ).
- د غیر مشبوع شویو غوړیو د لگښت زیاتول (لکه د زیتونو غوړ، مېوې، سبزیجات)

د درملو په وسیله درملنه

- په هغو حالاتو کې چې د ژوند په کړنلاره کې بدلون او د درملو پرته درملنه بریالی نه وي:
- د لومړۍ کړنې درملنه Hydrochlorothiazide: له ۱۲،۵ - ۲۵ میلی گرامه په ورځ کې یوځل د سهار له مخې. احتیاط: په هغو ناروغانو کې چې امیندواړه دي او یا د پښتورگو ناروغی، نفرس، او یا د ځگر سختې ناروغی لري دا درمل مضاد استطباب دي.
- د دویمې کړنې درملنه (که چیرې د لومړۍ کړنې درملنه له یوې میاشتنې وروسته له ماتې سره مخ شوه) Atenolol: له ۲۵ - ۵۰ میلی گرامه په ورځ کې یوځل (زیاته اندازه یې په ورځ کې یوځل ۱۰۰ میلی گرامه) احتیاط: Atenolol په استمنا اخته ناروغانو او د سږو په مزمنو انسدادی ناروغیو کې په مطلقه توګه مضاد استطباب دی او د زړه په بې کفایتۍ په اخته ناروغانو، برادي کارډیا (زړه ضربان له ۵۰/minute څخه کم)، زیرې او د محیطي اوعپې په ناروغیو کې په نسبي توګه مضاد استطباب دی.

نورې درملنې په لاندې توګه دي:

- یو ډیورتیک په یوازې توګه د وینې په خفیف یا منځني فشار له اخته ناروغانو څخه په ۵۰ سلنه کې د وینې فشار کنټرولولی شي او له نورو درملو سره په ګډه په اغېزمنه توګه کارول کېدای شي. د خولې له لارې Hydrochlorothiazide (۱۲،۵ - ۵۰ میلی گرامه په ورځ کې د سهار له لوري) په هغه صورت کې چې د توصې پر خلاف نه وي، تجویزېږي. یادونه: که چیرې د پښتورگو دندې مختل شوي وي Furosemide دې تجویز شي (لومړۍ دوز د خولې له لارې ۴۰ میلی گرامه د سهار له خوا، تعقیبي دوز له ۲۰ - ۴۰ میلی گرامه هره ورځ) Furosemide په جامع روغتیايي مرکزو او ولسوالۍ په روغتونګې شتون لري.

- بیتا ادرینرژیک بلاک کوونکی درمل هم کارول کېدای شي. Atenolol د بیتا ادرینرژیک د آخزو یونې کونکې درمل دی؛ د درملنې لومړۍ دوز په ورځ کې یو ۲۵ میلی گرامه دی. په هغه صورت کې چې د توصیې پر خلاف نه وي اعظمي دوز یې پر ورځ کې تر ۱۰۰ ملي گرامو پورې زیاتېدای شي. Atenolol په جامع روغتیايي مرکزو د ولسوالۍ روغتون کې شتون لري.
- د انجیوتنېسین بدلونکي ایزایم (ACE) نهې کونکې هم تجویزېدلې شي. د Captopril لومړنۍ دوز ۲۵ میلی گرامه هر ۱۲ ساعته وروسته دی. Captopril په سیمه ییزو او ناحیوي روغتونونو کې شتون لري.
- د کلسیم د کانال بندونکي، لکه Amlodipine کېدای شي له پنځه میلی گرامه دوز سره په ورځ کې یوځل تجویز شي.

لیږدول

- لاندې پېښې دې د درملو په وسیله د درملنې له پیل څخه مخکې ولېږدول شي.
- ماشومان او ځوانان (له ۳۰ کلونو څخه د کم عمر لرونکي)
- امېدواره پېښې (۳.۹ برخه "د وینې د فشار اختلالات او امیدواري دې مطالعه شي")
- ټولې لاندې پېښې دې د ارزونې او تخصصي څارنو لپاره ولېږدول شي:
- هغو ناروغانو چې په دریم پړاو کې له یوې میاشتې درملنې څخه وروسته په کافي اندازه خواب نه وي ورکړی.
- د وینې د لوړ فشار هغه ناروغان چې د غړیو د زیانمنیدو نېنې لکه د انجینا، سالتډي، اذیمیا او پروټینوریا (د پروټین موجودیت په ادرار کې) نېنې.
- هغه ناروغان چې د درملو حاد جانبي عوارض نېنې.

ناروغ ته لارښوې

- د مالګې د لګښت محدودول. د خوړو پر میز اضافي مالګه مه ږدئ.
- د وزن له لاسه ورکول.
- غوړ غذايي رژیم محدود کړئ.
- سګرټ څکول بند کړئ.
- د الکولو څښل بند کړئ.
- درمل هره ورځ وخورئ.
- هره اونۍ د وینې د فشار د چک کولو لپاره تر هغه وخته چې د وینې فشار ښه کنټرول شي مراجعه وکړئ، بیا دې هرې دوه میاشتې وروسته د وینې د فشار د چک کولو لپاره بیا راشئ. د خپل ویزټ یا ملاقات د ورځې په سهار کې درمل واخلي.
- په منظمه توګه په منځنۍ کچه فزیکي تمرینات وکړئ.
- له خفګان او د خطر له نورو لاملونو څخه ډډه وکړئ (پورته رجوع وکړئ).

۶.۱.۲ د وینې د لوړ فشار بېړنۍ پېښې (Hypertension Emergency)

- د وینې لوړ فشار چې د باسټولیک فشار له ≤ 130 او سیسټولیک فشار له ≤ 180 ، یا دواړه له لاندې هر مورد سره مل وی یو عاجل یا بېړنۍ پېښه ده.
- ناثابت انجینا (Unstable angina) (۶.۴ برخه "د سینې انژین" دې مطالعه شي)
- د وینې له لوړ فشار څخه د رتینوپاتي د درېیمې یا څلورمې درجې پېښېدل.
- عصبي نېنې: د سر سخت درد، ګڼګسوالي، د لیدو اختلالات، اختلاج، د هوښ کمېدل او یا کوما.
- د سپرو اذیمیا (۱۶.۱ برخه "د سپرو سخته اذیمیا" دې مطالعه شي)
- د پښتورګو عدم کفایه.

درملنه

- د ناروغ درملنه وکړئ او سملاسي بې وليردوئ.
- د بېرېنو ناروغیو درملنه: د سري اذیما، د زړه ایسکیمي او کوما.
- د Nifedipine تجویز: یو ۱۰ میلی گرامه ټابلیټ. په هغه صورت کې چې د وینې لوړ فشار له ۱۳۰/۱۸۰ څخه لوړ وي له یوه ساعت څخه وروسته پورته مقدار تکرار کړئ.
- یا
- د Captopril تجویز (که چیرې شتون ولري) له ۲۵ - ۵۰ میلی گرامه ټابلیټ.

لیردول

د وینې د لوړ فشار ټولې عاجلې او بیرنې پېښې سملاسي لیردولو ته اړتیا لري.

۶.۲ د زړه عدم کفایه (Cardiac Failure)

تشریح

د زړه عدم کفایه یو داسې حالت دی چې په هغه کې زړه د نسجونو د استقلال لپاره کافي وینه نشي پمپولی، او یا په بل عبارت د زړه هغې کمزورتیا ته وایي چې زړه نشي کولای د عضویت د اړتیا لپاره د زړه نورماله تولید (cardiac output) او حالت وساتي.

دا پېښه کولای شي د هغو حالاتو له امله چې د کینې بطن دندې تر فشار لاندې راوولي، رامنځته شي (لکه، د اکیلي اوعې ناروغی، د وینې لوړ فشار، کارډیومیوپاتي، د زړه دسا می ناروغی یا د زړه ولادي ناروغی) او یا هغه حالات چې د بطن د ډکېدو د محدودیت لامل کیږي، رامنځته کیږي (لکه د میترال تنګېدل، محدودوونکې کارډیومیوپاتي او یا د زړه د پریکارډ ناروغی)

د ناروغی حاد چټک کوونکي لاملونه عبارت دي له:

- د سوډیم د لګښت زیاتوالی
- اریټیمیا.
- انتانات
- د وینې کموالی
- د تایرټو کسکوزس د غدې د فعالیت زیاتیدل
- امیدواري.

تشخیص

- د زړه ښي، کین یا دواړه بطنونه د زیانمنېدو اړوندې ښي او اعراض.
- د کین بطن عدم کفایه - اصولا په سږو کې د مایعاتو د راټولیدو په پایله کې رامنځته کیږي.
- سالدني (Dyspnea) یا Tachypnea (کېدای شي هغه وخت چې ناروغ د شا په تخته پروت وي د لومړي ځل لپاره ولیدل شي)
- ټوخی - د زړه عدم کفایه کېدای شي د تنفسي انتاناتو سره یې تېروته وشي، په ځانګړې توګه په نویو پیدا شویو ماشومانو او کوچنیانو کې.
- سټریا
- د شپې له مخې ادرار (Nocturia)
- Crackles
- تاکی کارډیا، ګالوپ ریتم، د زړه سوډل چې له مل او اړوند لاملونو (Underlying cause) سره تړاو لري.

- د بڼې بطلین عدم کفایه:
 - محیطي اذیمه
 - هیپاتومیگالي، حین
 - ستریا، د شپې له مخې ادرار
 - د وداجي ورید پراخېدل
 - تاکی کاردی، گالوپ ریتم، د زړه سوفل چې له مل او اړوند لاملونو سره تړاو لري.
- د بڼې او کینې بطلینونو عدم کفایه
 - د پورته نښو او اعراضو ترکیب
 - نوي پیداشوي ماشومان کېدای شي کم خوبي او کم خوراکي وښيي.

د سینې اکسري (که شتون ولري) کېدای شي د زړه لویدل د سري له احتقان سره مل یا له هغه پرته وښيي.

درملنه

له درملو پرته درملنه

- په بستر کې د استراحت توصیه د زړه د اکسیجن د تقاضا د کموالي او د سیرو د احتقان د کموالي لپاره، په بستر کې ناست حالت توصیه کیږي.
- د لږې مالګې لرونکې غذايي رژیم ته د ناروغ هڅول (لکه، په ورځ کې له دوه ګرامو مالګې څخه کم لګښت) او په عامه توګه ښه تغذیه.
- د وزن کمولو ته توصیه که چېرې ناروغ چاغ وي.
- د سګرټ څکولو د بندولو لپاره د ناروغ هڅول.
- په منظمه او منځنۍ توګه د ورزش کولو لپاره ناروغ هڅول د موجودو اعراضو په حدودو کې.

د درملو په وسیله درملنه

- د ارجاع وړ لاملونه دې اصلاح شي لکه د میوکارډ ایسکیمي (۶.۴ برخه "د سینې انژین" دې مطالعه شي)، د وینې لوړ فشار (۶.۱ برخه "د وینې سیستمیک فشار" دې مطالعه شي)، اریتمی یا کارډیومیوپاتي.
- د دیورتیک په وسیله درملنه توصیه کېږي، چې د اعراضو د ارامتیا تر ټولو ډېره اغیز لرونکې درملنه ده په ځانګړې توګه د زړه په منځنۍ یا شدیدې عدم کفایه کې.
- Hydrochlorothiazide له ۲۵ - ۱۰۰ میلی ګرامه یو ځل (خفیف) توصیه کېږي.
- احتیاط: په امیدوارۍ، د پښتورګو ناروغیو، نفرس او د څګر په سختو ناروغیو کې مضاد استطباب دی.

یا

- د خولې د لاری د Furosemide تجویز
 - لومړنۍ دوز: په ورځ کې له ۸۰-۲۰ میلی ګرامه
 - تعقیبي دوز: له ۴۰-۲۰ میلی ګرامه/هر دوز له ۶ هرو ۶ څخه تر ۸ ساعتونو وروسته تر څو مطلوبې اغېزې لاسته راشي.

یا

- د Furosemide IV یا IM زرقي تجویز
 - له ۱۰ - ۲۰ میلی ګرامه یو ځل له یوې څخه تر دوه دقیقو په موده کې.
 - تکرار دوز د لومړي دوز په څېر په هغه صورت کې چې ناروغ خواب ورنکړي، له دوه ساعتونو څخه په کم وخت کې ورکول کیږي.
 - که چېرې خواب نا مناسب وي تعقیبي دوز دې له دوه ساعتونو وروسته تکرار شي، وروستی زرقي IV دوز کېدای شي له ۲۰ - ۴۰ ملي ګرامو لوړ شي تر هغه چې اغیزمن Diuresis رامنځته شي.
- د انجیوټنسین بدلونکي انزایم (ACE) نهې کونکي جمع یو دیورتیک، ټول هغه ناروغان چې د زړه عدم کفایه لري

باید د ACE منع کوونکي هغوی ته تجویز شي مگر پرته له هغو ناروغانو څخه چې دا درمل هغوی ته مضاد استطباب دی. احتیاط: په امیدواری کې دا درمل مضاد استطباب دی. Captopril o له ۶.۲۵ - ۱۲.۵۰ میلی گرامه هر اته ساعته وروسته دې تجویز شي.

لیږدول

- د زړه د شدیدې عدم کفایې ټول موارد (لکه د سږي اذیما، ۱۶.۱ برخه "د سږو حاده اذیما" دې مطالعه شي) باید ولیږدول شي. له لیږدولو مخکې دې لاندې درملنه پیل شي:
- o د اکسیجن او Furosemide IV په وسیله چېکه خارنه (یو میلی گرام/کیلو گرام) په هغه صورت کې چې شتون ولري، پیل شي.
- o د IV مایعاتو له ورکولو دې ډډه وشي.
- د زړه د عدم کفایې ټول تازه تشخیص شوي موارد دې د ډیرو ازمایښتونو او د درملنې د ټاکلو لپاره ولیږدول شي.
- د زړه د عدم کفایې نوي اختلاطات (لکه اریتمیا، د ناروغۍ پرمختګ، نوي اعراض او علایم) باید ولیږدول شي.

۳.۶ روماتيزمل تبه (Rheumatic Fever)

تشریح

روماتيزمل تبه یوه حاده معافیتي سیستمیکه پروسه ده چې د ستوني له سترپتوکوکسیک انتاناتو له ۱-۳ اونيو څخه وروسته پېښیږي. له ۱۵-۳ کلنو ماشومانو کې په عام ډول پېښیږي. مگر د پوستکي سترپتوکوک انتانات له روماتيزمل تې سره مل نه وي. د روماتيزمل تې د مخنيوي لپاره غوره لار د سترپتوکوکل د حادو انتاناتو سملاسي او مناسبه درملنه ده (۴.۵.۲). برخه «د تناسیل باکتریايي التهاب» دې مطالعه شي.

د روماتيزمل تې د ډیرو حملو پر وړاندې اوږدمهالې وفاقوي درملنې، د ناروغۍ اوږدمهاله زیانونه کموي.

تشخیص

- د روماتيزمل تې په اعراضو او علایمو کې کېدای شي لاندې موارد شامل وي
- تبه
 - د مفصلونو درد، سور والی، تود والی او پړسوب
 - o زیاتره د پښې ښځګرۍ، زنگون، څنگل او یا د لاس بند زیانمنوي په داسې حال کې چې داوړی مفصل، فخذې حرقفي مفصل، دلاسونو او پښو مفصلونه لږ اغیزمنوي.
 - o کېدای شي څو مفصلونه زیانمن کړي او یا له یوه مفصل څخه بل مفصل ته مهاجرت وکړي.
 - د زړه ناروغۍ
 - o په دې کې انډوکارډیت، د زړه عدم کفایه، د زړه دسامې ناروغۍ (په اصغاً کې سوفل یا د زړه مرمر) شامل وي.
 - o یا اریتمی یا د زړه د حرکتونو د چېک کېدو احساس، ټکان او ریږیدل (فلاتر) د زړه ضربان (د زړه ټپیدل) شامل وي.
 - تر پوستکي لاندې کوچني بې درده نودولونه (تحت الجلدي نودولونه) چې ډیر کم وي.
 - ستریا
 - هوار یا لږ څه وتلي، بې درده او د ناهموارو څنډو سره اندفاعات (Erythema marginatum)، چې ډیر کم وي.
 - Chorea: خوځنده، د بدن د نه کنټرولیدو وړ حرکتونه (د Chorea Sydenham's یا د سانت ویتوس دودیز ډانس) زیاتره په لاسونو، پښو او مخ کې، چې ډیر کم دی. غیر معمولي چلند لکه ژول، یا نا مناسبې خداگانې، چې ډیر کم دي.

درملنه

موخې:

- د ستوني د سترپتوکوکسیکو اتاناتو پر خپل وخت او مناسبې درملنې په وسیله د روماتیزم د تېې د ناروغۍ مخنیوی.
- د روماتیزم د تېې د ناروغۍ د پرله پسې حملو د مخنیوي په وسیله د راپیدا شوي زیان او یا د لا ډېرو زیانونو محدودول.
- د التهاب درملنه، د زړه د ناروغیو درملنه او د نورو اعراضو درملنه

له درملو پرته درملنه

- ناروغ باید په جدي توګه په بستر کې ارامه وي تر څو:
- د حرارت درجه عادي او نورماله حالت ته راوګرځي.
- د زړه ضربان د استراحت په حالت کې نورماله او طبیعي وي (په ماشومانو کې په یوه دقیقه کې له ۱۰۰ څخه کم)

د درملو په وسیله درملنه

- د ټولو هغو ناروغانو لپاره درملنه پیل کړئ چې روماتیزم تبه په هغوی کې تائید شوې او:
 - کارډیت او د زړه دوامداره ناروغی ولري. دا ناروغان د روماتیزم د حادثې تېې له وروستۍ حملې څخه وروسته د ۱۰ کلونو درملنې او یا د ۴۵ کلنۍ د عمر تر مودې او له هغه څخه زیاتې درملنې ته اړتیا لري.
 - دسامي روماتیزم ناروغی ولري. دا ناروغان د روماتیزم د حادثې تېې له وروستۍ حملې څخه وروسته د ۱۰ کلونو درملنې او یا د ۲۵ کلنۍ د عمر تر مودې او له هغه څخه زیاتې درملنې ته اړتیا لري.
 - د دسامي روماتیزم ناروغیونشتون. دا ناروغان د روماتیزم تېې له سختې وروستۍ حملې څخه وروسته د ۵ کلونو درملنې او یا د ۲۱ کلنۍ د عمر تر مودې او له هغه څخه زیاتو ته اړتیا لري.
- پورته پروتوکول ته په پاملرنې سره د درملنې لپاره لاندې درمل تجویز کړئ:
 - د درملنې لومړۍ انتخاب: Benzathine benzyl penicillin. پوډر د عضلې زرق (IM) لپاره، ۱.۲ میلیونه په یوه پنځه میلی لیتره ویال کې. له هرو څلورو اونیو څخه وروسته دې د عضلې په داخل کې (IM) یو زرق تجویز شي. د هغو ناروغانو لپاره چې له ډیر خطر سره مخ دي او یا هغه ناروغان چې لا هم روماتیزم تبه پرې راځي، هر دوه یا درې اونۍ وروسته دې د عضلې په داخل کې (IM) یو زرق تطبیق شي.
 - له ۳۰ کیلو ګرامه څخه کم ماشومان: ۲.۵ میلی لیتره د عضلې په داخل کې (IM) ژور زرق (یعنې، ۶۰۰۰۰ IU)
 - لویان او له ۳۰ کیلو ګرامو څخه زیات وزن لرونکي ماشومان: پنځه میلی لیتره د عضلې په داخل کې (IM) ژور زرق

احتیاط: هغه ناروغان چې وارفارین استعمالوي د عضلې په داخل کې دې د Benzathine benzyl penicillin له زرقولو څخه ډډه وشي.

او یا

- هغه وخت چې زرقیات مضاد استطباب وي، (Penicillin V (Phenoxymethyl Penicillin) د خولې له لارې تجویز شي د ۲۵۰ mg/ml مایع خوراكي پوډر، او یا له ۲۵۰ میلی ګرامه Penicillin V ټابلیټ څخه دې استفاده وشي.
- له پنځو کلونو څخه په کوچنیو ماشومانو کې: ۱۲۵ میلی ګرامه هر ۱۲ ساعته وروسته (۲/۱ ټابلیټ یا ۲.۵ میلی لیتره) هره ورځ
- لویان او له پنځو کلونو څخه لوی ماشومان: ۲۵۰ میلی ګرامه هر ۱۲ ساعته وروسته (۱ ټابلیټ یا ۵ میلی لیتره) هره ورځ

او یا

- که چېرې ناروغ له Penicillin سره حساسیت لري، د خولې له لارې Erythromycin دې تجویز شي. د خولې له لارې له مایع پوډر، ۱۰۰ میلی ګرامه په ۵ میلی لیتره او یا ۲۵۰ میلی ګرامه Erythromycin

Stearate دې وکارول شي، او يا دې د Estolate Erythromycin ټابلېټ (چې له ۴۰۰ میلی گرامه Ethylsuccinate Erythromycin سره برابر دی) وکارول شي.

- له پنځو کلونو څخه په کوچنیو ماشومانو کې: ۱۲۵ میلی گرامه هر ۱۲ ساعته وروسته (۱/۲ ټابلېټ يا ۲.۵ میلی لیټره) له خوړو مخکې هره ورځ
- لویان او له پنځو کلونو څخه لوی ماشومان: ۲۵۰ میلی گرامه هر ۱۲ ساعته وروسته (۱ ټابلېټ يا ۵ میلی لیټره) له خوړو مخکې هره ورځ
- د التهاب درملنه
 - د خوړې له لارې د Aspirin (Acetylsalicylic acid) تجویز. ناروغ ته دې لارښونه وشي خو درمل د خوړو په منځ کې واخلي خو د معدې له تخریبولو او سوي څخه مخنیوی وشي:
 - له پنځو کلونو څخه لوی ماشومان: ۱۰-۲۰ میلی گرامه/ هر کیلو گرام/ هر دوز هر شپږ ساعته وروسته له ۴-۲ اوونيو لپاره (د تېې او د مفصل د پړسوب له منځه تلو پورې).
- احتیاط: د Aspirin دې د Reye's سندرم د خطر په دلیل له پنځو کلونو څخه کوچنیو ماشومانو ته تجویز نشي.
- لویان: ۵۰۰ میلی گرامه Aspirin هر شپږ ساعته وروسته له ۲-۴ اوونيو لپاره (د تېې او د مفصل د پړسوب له منځه تلو پورې).

لېږدول

- د تائید لپاره د روماتیزمل تېې ټول شکمن موارد
- ټولې اختلاطې پېښې او د زړه مشکوکې ناروغۍ دی دنوروزیاتو معایناتو او درملنې لپاره و لیرل شي
- هغه ناروغان چې د درملنې په وړاندې کمزوری خواب ښیي
- هغه ناروغان چې Aspirin نشي زغمای او یا هم په هغوی کې Aspirin د استطباب مضاد وي.
- هغه ناروغان چې نور اختلاطات یا عوارض لري (لکه Chorea)

وقایه

- د ستوني د سترېټو کوسیک د انتاناتو لپاره د مناسب انټي بیوټیک په وسیله له سملاسي درملنې څخه ډاډ (۴.۵.۲ برخه "باکتریايي تانسولونه" دې مطالعه شي).
- د عمر د محدودیت تر مهاله د وقایوي درملنې دوام (پورته رجوع وکړئ).
- ناروغ ته دې د ناروغۍ د ممکنه اختلاطاتو او عوارضو په علایمو په اړه اطلاع ورکړل شي (لکه د زړه ناروغۍ، د زړه عدم کفایه او نور اعراض چې پورته توضیح شوي دي).

۶.۴ خناق صدري (Angina pectoris)

تشریح

صدري خناق کېدای شي د ثابت (پایداره) او یا نا ثابت (ناپایداره) په بڼه شتون ولري.

- ثابت صدري خناق (Stable angina pectoris): صدري خناق یو کلینیکي سندرم دی چې د میوکارډ د ژرتریدونکي ایسکمي په پایله کې د سینې د قفس سخت درد شتون لري. د سینې د قفس درد چې د روحي فشار یا فزیکي فعالیتونو له امله راپیدا شوی وي په چټکې سره له استراحت کولو یا تر ژبې لاندې د نایټرو گلیسرین د تطبیقولو په وسیله آرامیږي او له منځه ځي. تر ټولو عام لامل یې د شریانونو اټروسکلیروزس دی، له دې سره، صدري خناق کېدای شي د ابهر د تنګېدو او یا د هیپرتروفیک کارډیومیوپاتي په پایله کې هم پېښ شي.
- نا ثابت صدري خناق (Unstable angina pectoris): نا ثابت صدري خناق معمولا د یو انژین د شدیدې نوې حملې له پیل سره او یا د زړه د پخواني ثابت انژین له ناڅاپي وخامت سره پېښیږي چې کېدای شي تر ژبې لاندې Nitroglycerine د تطبیقولو په وسیله تسکین او له منځه لاړ شي.

تشخيص

اعراض

- ناروغ د سينې د قفس درد يا د نيولي، درونوالي، سوي، فشار ورکولو، څړيکې وهلو، په سينه کې د درد او يا بد هاضمي او گاز شتون احساس لري، درد د سينې د هډوکي په شا يا لږ څه کيڼ لوري کې شتون لري.
- درد کېدای شي ژامې، کيڼې اوږې يا د کيڼ مټ پورتنی برخې ته خپور شي او د مټ داخلي لوري ته تر څنگلکې، مړوند، د لاس بند، يا څلور می و او پنځمې گوټې ته حرکت کوي. درد کېدای شي له سرگنگسوالي يا ضعف سره يوځای وي.
- د سينې د درد نور لاملونه او سببونه بايد وپلټل شي.

علامت

- د حملې په وخت کې ناروغ وېرېدونکی، د تنفس له سخت والي او له الوتي رنگ سره ښکاري، سږې خولې هم کېدای شي شتون ولري.
- ECG کېدای شي د بريدونو ترمنځ نورماله او طبيعي وي، مگر د حملې په وخت کې، ECG کولای شي چې د ST د قطعې ښکته تله او د T د موج د معکوسيدو ښودونکی وي.

درملنه

له درملو پرته درملنه

- سکرېټ مه ځکوي
- د بدن مطلوب وزن لاسته راوړل
- له ډېرو خوړو وروسته، په ډېره سږه هوا کې او روحي فشار کې له سختونو فزيکي فعاليتونو څخه ډډه کول.

د درملو په وسيله درملنه

- تر ژبې لاندې د Nitroglycerine تجويز (تر ژبې لاندې ټابليټ ۰.۵ ميلي گرامه) د اوټيا په صورت کې دې له پنځو دقيقو وروسته بيا تکرار شي (مگر له درې څلو څخه زيات نه). Nitroglycerine د اکليلي اوعې د پراخېدو لامل او شاوخوا له يوې څخه تر دوه دقيقو اغيز کوي. Nitroglycerine په سيمه ييز او د ولسواليو په روغتونونو کې شتون لري.
- له ۳۲۵-۸۱ ميلي گرامه Aspirin يو دوز د خولې له لارې په ورځ کې سملاسي د نااټ انژين له تشخيص وروسته بايد تجويز او دوام ورکړل شي.
- Isosorbide dinitrate تجويز کړئ، چې د ولسواليو په روغتونونو کې شتون لري.
- په حاده حمله کې، لومړنی دوز ۲.۵ ميلي گرامه تر ژبې لاندې ټابليټ يو ځل، او د اوټيا په صورت کې د ټابليټ د حلېدو څخه وروسته زر تر زره دې بيا تطبيق شي. د زغم د پيدا کېدو په صورت کې دې د درملو دوز دوه برابره شي. د اغيز کولو پيل يې شاوخوا درې دقيقې دی.
- په مزمن صدري خناق کې تعيبي دوز له ۴۰-۱۰ ميلي گرامه له ټابليټونو چې په ورو آزاديږي، هر ۱۲ ساعته وروسته. که چېرې ټابليټونه يې په واک کې وي، په ناروغ کې د زغم د پيدا کېدو د مخنيوي لپاره غوره بلل کيږي.
- د سينې د مزمن انژين لپاره ورځ له ۱۰۰-۵۰ ميلي گرامه Atenolol تجويز.
- احتياط: Atenolol په استمداخته ناروغانو او د سږو په مزمنو انسدادې ناروغو کې په مطلقه توگه د استېباب مضاد دی او په هغه ناروغانو کې چې د زړه په عدم کفايه، برادي کارډيا (د زړه ضريان له ۵۰/Minute څخه کم)، د بيايت او د محيطي اوعې په ناروغۍ لري، په نسبي توگه د استېباب مضاد دی.
- يادونه: نااټه انژين د ميوکارد د احتشا په توگه تر درملنې لاندې نيول کېدای شي. لاندې دې د ميوکارد د حادې احتشا برخه مطالعه شي.

لیردول

ټول هغه ناروغان چې د سینې د قفس معند یا د سینې عود کونکی درد لري د ډیرې معاینې او څیړنې لپاره، د فزیکي فعالیت د زغم د ټسټ (Exercise tolerance test) او د اکلیلې اوعې او انژیوگرافي په شمول دې د درملنې لپاره ولیردول شي.

ناروغانو ته لارښونه

- سگرېټ مه ځکوی.
- غوړ غذايي رژیم دې محدود شي (لکه، د غوړو اشباع شوي ډولونه، مغزیات).
- له درندو فزیکي فعالیتونو، درندو خوړو او سپرې هوا څخه ډډه کول.
- په منظمه توګه ورزش او فعالیت.

۶.۵ د میوکارد حاده احتشا (Acute Myocardial Infarction)

تشریح

د میوکارد حاده احتشا (AMI)، د میوکارد یوې ساحې (د زړه عضله) د حاد اسکیمک نګروز څخه عبارت ده چې د اکلیلې اوعې له بشپړ یا قسمي بندیدو څخه راپیدا کیږي.

تشخیص

یادونه: اړینه نده چې ټول اعراض او علایم شتون ولري، ځکه چې د احتشا په ۲۵ سلنه پېښو کې هیڅ ډول روښانه کلینیکي اعراض او علایم شتون نلري.

- کلینیکي لومړنۍ نښه د سینې د قفس سخت درد د صدري خنای په شان وي.

- د قص شا یا ایپې ګاسټریک (شرفیه) ناحیه کې
- فشار ورکونکی یا سوزونکی
- غاړې، د کینې مټې داخل یا دواړو برخو ته خپریدل
- له ۳۰ دقیقو څخه زیات دوام
- د استراحت په حال کې پېښیږي.
- نورې نښې چې کېدای شي شتون ولري عبارت دي له:

- الوتې رنګ
- خولې کېدل
- د زړه نامنظم ضربان
- پرېښانتیا یا اضطراب
- په تنفس کې ستونزې، به د زړه د عدم کفایې څرګندونکې وي (۶.۲ برخه "د زړه عدم کفایه" دې مطالعه شي)
- یادونه: استراحت او تر ژبې لاندې Nitroglycerine په بشپړه توګه نشي کولای د سینې درد ارامه کړي.

درملنه

د لیردولو لپاره دې تیاری ونيول شي.

له درملو پرته درملنه

- فعالیت:
- د لومړیو ۱۲ ساعتونو لپاره په بشپړه توګه په بستر کې استراحت
- که چېرې د وېنې فشار ښکته نوي په ناست وضعیت یا په چوکۍ کې د ۲۴ ساعتو لپاره استراحت.

- غذایي رژیم
O له ۱۲-۴ لومړیو ساعتونو دې د خولې له لارې هېڅ شی و نه خوړل شي، د کانگو او اسپایریشن د خطر له امله یوازې اوبه یا نری (رقیق) مایعات د خولې له لارې اخیستلای شي.
- O د بستر ترڅنګ باید یو کمود هم د لاسرسي وړ وي، د قبضیت په صورت کې دې مسهل درمل تجویز شي.

د درملو په وسیله درملنه

- د اړتیا په صورت کې د سپرو او زړه بیا ځواکمنول.
- د وینې د لخته کېدو د کمولو لپاره، سملاسي دې د خولې له لارې ۳۲۵ میلی گرامه Aspirin تجویز شي. که چیرې فرمولیشن په جامده بڼه وي، غوره ده لومړی دوز میده یا وژول شي، او یا هم و زیښل شي.
- د درد د تسکین لپاره تر ژبې لاندې Nitroglycerine ټابلیټ (په سیمه ییزه او ولسوالۍ په روغتونونو کې شتون لري): ۰.۵ میلی گرامه دې په هرو پنځو دقیقو کې تر دریو ډوزونو تجویز شي.

یا

- تر ژبې لاندې Isosorbide dinitrate ټابلیټ (د ولسوالۍ په روغتون کې شتون لري): ۵ میلی گرامه په هرو ۵-۱۰ دقیقو کې د اړتیا په صورت کې د درد لپاره زیاته اندازه پنځه ټابلیټونه.
- که چیرې د ناروغ درد ښه نشي، Morphine له ۸-۴ میلی گرامه (یو میلی گرام/ دقیقه) د ورید په داخل کې ورو زرق (۰.۴-۰.۸ میلی لیتره، په هر ملي لیتر کې ۱۰ میلی گرامه ویاړونه).
- د ناروغ ورید یا IV خلاصول او روغتون ته سملاسي لیږدول.

لیږدول:

د زړه د احتشا ټولې پېښې دې سملاسي روغتون ته ولېږدول شي.

ناروغانو ته لارښونې

- سگړت ځکول دې ودرول شي.
- د الکولو څښل دې ودرول شي.
- د وینې فشار او د وینې شکره دې کنټرول شي.
- درانده وزنونه دې نه پورته کوي.
- د بدن د وزن کمول.
- جنسي اړیکې له شپږو اوښو څخه وروسته شونې دی.
- له ۶-۸ اوښو وروسته دې کار ته ستون شي.
- د ډاکټر له لوري منظم تعقیب او څارنه.

اوم خپرکی د مرکزي عصبي سیستم تشوشت Central Nervous System Disorders

۷.۱. صرع یا میرگی (Epilepsy)

تشریح

د (Epilepsy) میرگیو اصطلاح د هغو ناروغيو بیانونکې ده چې له بیا پېښېدونکې اختلاج سره مل وي. اختلاج د دماغ د دندو ژر تېرېدونکي اختلال دی چې د عصبي سیالو شدیدو غیرنورماله لېږلو څخه منځ ته راځي. میرگی، چې په غالب ګمان له ټولنیز، رواني، حقوقي او فرهنګي ناوړه تفاهم سره یوځای وي، بیلایېلې بڼې او لاملونه لري:

- ایډیوپاتیکه صرع - د هغه لپاره هیڅ ځانګړی لامل نه دی پېژندل شوی.
- عرضي صرع - پارونکي لاملونه په لاندې توګه تشخیصولای شوو:
 - د جملې په داخل کې انتانات لکه باکتریايي مننژیت، ټپونه، کتلې یا دماغي ستروکونه.
 - متابولیکې ناروغۍ لکه یوریمیا، هایپوګلیسمي، هایپوګلیسمي، د څکر عدم کفایه یا نور اختلالات.
 - د الکولو یا نشه یي توکو څخه استفاده او یا هم د درملو بندول.

تشخیص

هیڅکله صرع د اختلاج فقط د یوې حملې پر بنسټ مه تشخیصوئ، شاوخوا لس سلنه خلک د خپل عمر په اوږدو کې د اختلاج یوه حمله لري. په صرع کې د تشخیص کلي دا ده چې ناروغ پرته له هر ډول روښانه لامل څخه دوه یا څو ځله اختلاج ولری (یعنې له پورته پارونکو لاملونو څخه هیڅ یو نلري)، له ناروغانو څخه ۷۰ سلنه چې دوه ځلي اختلاج یې درلود د اختلاج دریمه حمله به هم ولري.

د دقیقې تاریخچې اخیستل مهم دي

- د روغتایي تاریخچې په اخیستلو کې لاندې موارد شامل دي:
 - لږ تر لږه د اختلاجو دوه وروستیو حملو څخه مفصله شرحه
 - د اختلاج کورني تاریخچه
 - د زیږون د دورې (Perinatal) تاریخچه
 - د ماشومتوب د دوران وده
 - د تېر اختلاج درملنه
- د ناروغ د ملاتړ چاپیریال د ارزونې لپاره د ټولنیزې تاریخچې اخیستل یوه دقیقه فزیکي معاینه به لاندې ټکي وټاکي:
 - آیا د درملنې وړ یوه ناروغي شتون لري. مهمه ده چې د درملنې وړ هر ډول ناروغی چې کېدای شي د فعلی اختلاج یو پارونکی لامل وی وپېژندل شي. (د پورته لاملونو لست)
 - د اختلاج درجه بندي. اختلاج کېدای شي په لاندې توګه درجه بندي شي:
 - عمومي اختلاج (ګرانډمل) یا تونیک-کلونیک: د میوکلونیک تیز او چټک حرکتونه
 - غایب یا ابسنس (پټت مل) اختلاج: په لنډه توګه د شعور له لاسه ورکول او نرم او شل غړي
 - قسمي یا محراقي اختلاج: د بدن د یوې برخې موضعي مصایېدل.
 - مل ناروغۍ. اختلاج کېدای شي مل وي له:
 - له اختلاج څخه مخکې یو احساس یا aura - یو خبرداری ورکونکی سیګنال چې د ژر پېښېدونکې اختلاج څرګندوی دی (چې معمولا د ناروغ له خوا تشخیصیږي)، هغه کېدای شي د لېدو یا اوریدو له ډول څخه وي او یا کېدای شي د ذائقې، بوي او یا سوماتیک احساس له ډول څخه وي.

- سیانوز، د لعاب ترشح، د ژبې ژول او یا د مټاڼې او کولمو د کنټرول له لاسه ورکول.
- چټک او یا ورو ښه کېدل، ناروغان کېدای شي په چټکه توګه ښه شي او یا کېدای شي له خوښې والي، ګټګس والي یا د سر د درد اوږدمهاله دوره ولري.
- غیر طبیعي چلند یا د خوي او عادت بدلون (دا مسئله ډیر لږ تړاو لري)

درملنه

له درملو پرته درملنه

- د اختلاج پرمهال
 - ناروغ د خطر له ځایونو څخه لرې کړئ (لکه، اور، اوبه، ماشین آلات)
 - د هوايي لارو له خلاصوالي څخه دې ډاډ تر لاسه شي چې هوايي لارې صافې او پاکې دي.
- د اختلاج له دریدو وروسته:
 - هغه لوري ته د ناروغ وضعیت ورکول چې ناروغ د ارامتیا احساس کوي (لکه، په اړخ پرمخې یا Semi prone)
 - ناروغ کېدای شي له ۳۰ - ۶۰ دقیقو پورې خوښې او ګټګس وي، هغه باید تر بشپړې روغتیا یوازې پاتې نشي.

د درملو په وسیله درملنه

- د اکسیجن تطبیق (د شتون په صورت کې) د دماغی هیپوکسیا د مخنیوي لپاره
- د Diazepam تطبیق.
 - له لس کلونو څخه کوچني ماشومان
 - د ریکتال یا د مقعد د لاری د Diazepam تجویز
 - د Insulin یا نري رنځ یو سورنچ دې وکارول شي او په هغه کې دې په مناسبه اندازه Diazepam کش شي بیا دې له سورنچ څخه ستن لرې شي او پرته له ستنې همدا سورنچ دې له ۵-۴ سانتي مترو له تخلیې مخکې په مقعد کې داخل شي. وروسته دې د Buttocks ناحیه ته له ۳-۲ دقیقو فشار ورکړل شي.
 - د معیاري دوزونو د مطالعې لپاره دې د الف په مل پاته کې ۹ جدول ته مراجعه وشي.
- یا
 - د ورید IV د داخل د زرق له لارې د Diazepam تجویز (لسو دقیقو څخه زیات). د الف ۹ جدول ته دې مراجعه وشي
 - لویان او له لسو کلونو څخه لوی ماشومان
 - د Diazepam تجویز د اختلاج ضد یو درمل په توګه د ورید IV د داخل د زرق له لارې. د معیاري دوزونو د مطالعې لپاره دې د الف په مل پاته کې ۹ جدول ته مراجعه وشي
 - احتیاط: تنفسی انحطاط او تنفسی توقف دې تر څارنې او مانیتورینګ لاندې وي.
- یا
 - زرق کېدای شي د عضلې په داخل IM وي (د لومړني دوز په څېر) او د اړتیا په صورت کې له ۴-۳ ساعتونو وروسته یوځل تکرارېدلی شي.

لیردول

- په ټولو هغو ناروغانو چې د میرګي شک کيږي د تشخیص او د متخصص ډاکټر په وسیله د درملنې د پیلولو لپاره دې روغتون ته ولیردول شي.
- په میرګیو ټول اخته ناروغان دې د Diazepam د لومړي دوز له تطبیق څخه وروسته ژر تر ژره ولیردول شي.
- هغه ناروغان چې د اختلاج شمېر یا فریکوینسي یې زیاته وي او یا د اختلاج په ډول کې بدلون ولري باید ولیردول شي.
- ټولې هغه ښځې چې میرګي لري او د امیدوارۍ په دوران کې دي د درملنې د شوني تنظیم او د خپلو درملو لپاره دې ولیردول شي.

- هغه ناروغان چې په هغو کې عصبي اعراض او علايم شتون ولري.
- هغه ناروغان چې په هغوی کې د درملو غبرگون (د درملو جانبي عوارض) او يا د درملو سميت شکمن وي.
- هغه ناروغان چې د هغوی د دوه کلونو يا له هغه څخه په زياته موده کې يې درملنه شوې وي او اختلاج ونلري - د درملنې د ارزونې او څېړنې په موخه.

پاملرنه: د ناروغانو د ليردونې پرمهال تل د اختلاج په اړه دقيق معلومات وړاندې کړئ

- د اختلاج فريکونسي او شمېر (په هر کال يا هره مياشت کې)
- د اختلاج د لومړنۍ او وروستۍ حملې نېټه
- د اختلاج درجه
- د اختلاج شرحه
- په ځانگړي ډول
 - آیا وروستي اختلاج له پېښېدو مخکې له "اورا" سره مل وو؟
 - آیا شعور يې په بشپړه توگه له لاسه ورکړی وو؟
 - د اختلاج پرمهال څه پېښ شول (پړاو په پړاو)؟
- په ټوليز ډول
 - په معمولي توگه د څومره وخت لپاره د ناروغ اختلاج دوام درلود؟
 - له اختلاج څخه وروسته ناروغ څه احساس درلود او يا يې څه تر سره کړل؟
 - څومره وخت نيسي چې ناروغ له اختلاج څخه بيرته ښه شي؟
- د اختلاج کورنۍ تاريخچه.
- د الکولو او نشه يي توکو په شمول له درملو يا نورو توکو څخه د ناوړې ګټې اخيستنې تاريخچه.
- د ميرګي ضد درملو نوم او دوز چې ناروغ يې اخلي او دا چې ايا ناروغ په ښه توگه د درملنې پابندي لري.

وقايه

- د ميرګي ضد درملو په اړه ناروغ ته د ښې پابندۍ توصيه
- د دې ناروغۍ په اړه ناروغ او د هغه کورنۍ ته مشوره تر څو د ټولنيزو نارامتياو کچه ټيټه اوژوند عادي بڼه غوره کړي.
- د هغو حالاتو وقايه او مناسبه درملنه چې کېدای شي يې نظمي راوباروي.

ناروغ ته لارښونې

- د ناروغ د ليردلو په اړه د لسټ شويو معلوماتو او اطلاعاتو د يو دفتر لرل اود صحت او د ليرد مرکز ته د دوی راورول
- د اختلاج د عود او يا د نوي اعراضو او علايمو په صورت کې بيرته مراجعه.
- له موټر چلولو، د درنو ماشين آلاتو له کارولو، د الکولو يا نشه يي توکو له استفادې څخه ډډه په هغه صورت کې چې د اختلاج درمل اخلي.

۷.۲ آنسفاليت او مننژيت (Encephalitis and Meningitis)

تشرېح

د مرکزي عصبي سيستم او سحايوو حاد انتانات يا التهاب چې کېدای شي د باکتریاگانو، وېروسونو، فنگسونو، پرازېتي ارګانيزمونو په وسيله رامنځته شي او همدارنگه کېدای شي له انتاناتو وروسته التهاب پيدا شي. هر ناروغ چې په هغه کې د مرکزي عصبي سيستم او سحايوو انتانات او التهاب شتون ولری باید د يوې چټکې يا عاجلې طبي پېښې په توگه په پام کې ونيول شي او چټکې ارزونې او درملنې ته اړتيا لري او روغتون ته دې وليردول شي.

انتانات يا التهاب کېدای شي د مرکزي عصبي سيستم د جوړښت يوه برخه او يا د CNS د جوړښتونو يو ترکيب زيانمن کړي.

- مننژیت: د دماغ یا د نخاع د پوښ او یا د سحایا انتان ته ویل کیږي
- زیاتره د (پنومو کوک، مننگو کوک، اچ - آنفلوانزا، د منفي گرام گډو انتاناتو [په ماشومانو کې]) د باکتریاگانو او یا ویروسونو د پیدا کېدو په ترڅ کې رامنځته کیږي.
- آنسفالیت: په خپله د دماغ انتان یا التهاب دی؛ کېدای شي د قحف د ننه د اسکیمي یا وینې راتلنې د اختلاطونو سره مل وي.
- زیاتره د ویروسونو له امله (له بیلایلو ډولونو سره) او یا له ویروسي ناروغۍ څخه وروسته منځ ته راځي.
- کېدای شي د باکتریاگانو، فنگسونو، پرازیتونو (په ځانگړې توګه په ناروغانو کې چې معافیت ټیټ وي) شتون ولري.
- پاملرنه: د نري رنځ انتان کېدای شي د CNS هر جوړښت زیانمن کړي او په وصفي توګه په لږه کچه حاد وي.

تشخیص

پاملرنه: له پنځو کلونو څخه د کوچنیو ماشومانو لپاره دې د IMCI چارټ مطالعه شي.

د CNS انتانات یا التهاب کېدای شي په ارامه او ورو او یا په ډیرې چټکې رامنځته شي او د ژوند په یو ګواښونکې ناروغۍ بدل شي. مننژیت په وصفي او سخته او دراماتيکه توګه حرکت لري مګر د اعراضو او علایمو پراخ ډولونه لري او د علایمو د پیل چټکتیا یې هر وخت چې د CNS جوړښتونه زیانمن شي، شتون لري. د اعراضو په ډولونو کې کېدای شي لاندې موارد شامل وي:

- د سر درد
- تبه یا ضعف
- اختلاج
- عمومي یا موضعي ضعف
- د غاړې درد یا شخ والی
- د Brudzinski نښه: د شا په تخته د ملاستې په حالت کې د ناروغ د غاړې قبضول، د ورانه اود زنگون د مفصلونو د غیرې ارادي قبض کېدلو لامل کیږي.
- د Kernig نښه: د زنگون بسط د کلک مقاومت یا د غاړې د درد یا دواړو سره مخ کیږي.
- د ذهني وضعیت بدلون: هغه ناروغان چې ګڼګڼت یا کوما ولري باید د مرکزي عصبي سیستم (CNS) انتان په پام کې ونیول شي مګر دا چې بل څه ثابت شي. د ذهني وضعیت د بدلون نور لاملونه عبارت دي له:
 - دماغي ملاریا - Smear چک او د ناروغانو چټک ټسټ
 - متابولیکې ناروغۍ
 - هایپو ګلايسيمي - په ټولو ناروغانو کې دوېنې ګلوکوز چک کړئ.
 - هایپر ګلايسيمي یا ډایبېټیک کنواسیدوزس - د ګلوکوز کچه دې چک شي.
 - Hypertensive crisis - د وینې فشار چک شي.
 - دماغي ضربه یا زیان رسیدنه یا دماغي سکنه - د ناروغ تاریخچه دې په دقیقه توګه واخیستل شي.
 - د درمل له امله - د الکولو، نشه یي توکو په شمول او یا له نورو درملو او توکو څخه د استفادې د تاریخچې
- اخيستل (له هغې جملې څخه له بریده د زیاتي اندازې لګښت)
- د پښتورگو او څگرعدم کفایه. په شکمنو مواردو کې دې د لابراتواري ټسټونو د تر سره کولو په موخه ناروغ ولیردول شي.

- پورېورا یا پېشیا - د مننگو کوکال د مننژیت له ځینو مواردو سره یو څېر وي.
- په نویو پیدا شویو ماشومانو کې (له یو کال څخه په کوچنیو ماشومانو کې) او په ټولیزه توګه له پنځو کلونو څخه په کوچنیو ماشومانو کې اعراض او علایم نا ځانگړي یا غېروصفي دی او عبارت دي له:
 - تخریشیت
 - له خوړو څخه ډډه، کمزوری رودل، کانګې، نس ناستی
 - خوبجن والی، کمزورې ژړا

- عضلاتي کمزورتیا (یعنی هیپوتونی)
 - د استراحت په حالت کې د فونتانل وتل
 - کوما یا اختلاج
- احتیاط: د خطر علایم دې په ټولیزه توګه چک شي، او د شتون په صورت کې دې د یوې 'ډیرې سختې ناروغۍ' په توګه د IMCI د فلپ چارټ مطابق درملنه وشي.

درملنه

له دې امله چې د CNS د انتاناتو درملنه زیاتره درملو او مداخلاتو ته اړتیا لري چې د BPHS په روغتیايي مرکزونو کې شتون نلري، ناروغان باید لومړی تثبیت یا Stabilized شي، د موجود او مناسب انټي بیوتیک د لومړي دوز تر درملنې لاندې ونیول شي او بیا دې روغتون ته ولیږدول شي.

- ناروغ دې تثبیت شي.
 - د اړتیا په صورت کې دې اکسیجن تجویز شي (که چیرې شتون ولري)
 - د ورید (IV) پرانیستل او د هایدریشن پیل
 - د اختلاج پرمهال ناروغ ته د زیان رسیدو مخنیوی
 - په هغه حالت کې چې ناروغ اختلاج ولري د هوایي لارو له خلاصوالي او صافوالي څخه د ډاډ تر لاسه کول.
- Diazepam د تطبیقولو په وسیله د اختلاج کنټرول
 - له لس کلونو څخه کوچني ماشومان
 - ریکټال Diazepam

- د Insulin یا نري رنځ یو سورنځ دې وکارول شي او په هغه کې دې په مناسبه اندازه Diazepam کش شي بیا دې له سورنځ څخه ستن لرې شي او پرته له ستنې همدا سورنځ دې له ۵-۴ سانتي مترو له تخلیې مخکې په مقعد کې داخل شي. وروسته دې د Buttocks ناحیه ته له ۳-۲ دقیقو فشار ورکړل شي.

- د ستندردو دوزونو د مطالعې لپاره دې د الف په مل پانه کې الف ۹ جدول ته مراجعه وشي.

یا

- د ورید IV د داخل د زرق له لارې د Diazepam تجویز (لسو دقیقو څخه زیات). د الف ۹ جدول ته دې مراجعه وشي
- لویان او له لسو کلونو څخه لوی ماشومان
- د Diazepam تجویز د اختلاج ضد یو درمل په توګه د ورید IV د داخل د زرق له لارې. د ستندردو دوزونو د مطالعې لپاره دې د الف په مل پانه کې الف جدول ته مراجعه وشي
- احتیاط: تنفسی انعطاط او تنفسی توقف دې تر څارنې او مانیټورینګ لاندې وي.

یا

- زرق کېدای شي د عضلې په داخل IM وي (د لومړني دوز په څېر) او د اړتیا په صورت کې له ۴-۳ ساعتونو وروسته یوځل تکراریدلی شي.
- د بیرني او عاجل انټي بیوتیک تجویز: Ampicillin له Gentamicin سره
 - له پنځو کلونو کوچني ماشومان
 - Ampicillin د عضلې په داخل کې زرق IM. د ستندردو دوزونو د مطالعې لپاره دې د الف په مل پانه کې الف جدول ته مراجعه وشي د عضلې په داخل کې زرق IM Gentamicin. د ستندردو دوزونو د مطالعې لپاره دې د الف په مل پانه کې الف ۱۳ جدول ته مراجعه وشي
 - لویان او له پنځو کلونو څخه لوی ماشومان
 - د عضلې په داخل کې د Ampicillin زرق یا د ورید په داخل کې IV ورو زرق تر یو ګرام هر شپږ ساعته وروسته له ۵۰۰ میلی ګرامه ویالونو څخه.

له

▪ Gentamicin د عضلي په داخل کې زرق IM یا د وريد په داخل کې یا IV زرق ورو، دوه میلی گرامه د بدن پر هر کیلو گرام وزن په Loading dose توگه (یعنې درې میلی لیتره یا څلور میلی لیتره ویال چې ۸۰ میلی گرامه لري، تر هغه وروسته تعقیبي دوز ۱-۱.۷ میلی گرامه \ د بدن پر هر کیلو گرام وزن هر دوز، هر ۱۲ ساعته وروسته).

- د تېې کنترول که چیرې د حرارت درجه ۳۸.۵ درجې سانتي گراد یا تر هغه لوړه وي.
- ناروغ دې په تمې (شیرگره) اوبو لوند یا تریند شي.
- د Paracetamol تجویز. د سندرودو دوزونو د مطالعې لپاره دې د الف په مل پانه کې الف ۱۵ جدول ته مراجعه وشي
- له پنځو کلونو څخه په کوچنیو ماشومانو کې د وینې د گلوکوز د کموالي مخنیوی. د مور د شیدو یا خوړو اوبو په وسیله د ماشوم تغذیه.
- د دماغی ملاریا درملنه دې وشي که چیرې سمیر مثبت وي یا د ملاریا په انډیمیکو سیمو کې له پنځو کلونو څخه په کوچنیو ماشومانو کې د ډیرې سختې تېې لرونکې ناروغی د خطر نښې شتون ولري (۱۵.۷ برخه "ملاریا" دې مطالعه شي).

وقایه

ډاډ تر لاسه کړئ چې ټول کسان په مناسبه توگه واکسین او EPI کې ثبت شوي دي.

ناروغ ته لارښونې

- د ناروغ لیریدول د طبي او مسلکي کسانو په ملتیا، د شتون په صورت کې.
- د ناروغ د لیرید رالیرد پرمهال د اوونډ بالونکي په مرسته د اختلاج او هوايي لارو د مناسبو اهتماماتو په پام کې نیول.
- د مننژیت د اعراضو د پیدا کولو لپاره د نږدې تماس له امله د کورنۍ د ټولو غړو څارنه او ارزونه.

اتم خپرکي رواني ناروغي Mental Health Conditions

تشریح

روحي او رواني ناروغي معمولاً له هغه کچې چې په عمومي ډول پېژندل شوی، ډېرې عامې دي - د خفگان پیداکونکو پېښو په پایله کې (یا د ژوند د تراماتیکو پېښو څخه وروسته)، او یا هم د عصبي اړینو نورو ترانسسمیټرونو د ناندولې په پایله کې او یا په دواړو حالاتو کې راپیدا کیږي. زیاتره ناروغان چې د رواني روغتیا اړوند مسایل لري له سوماتیکو شکایتونو سره مل وي. په همدې ترتیب، هغه ناروغان چې پټ عضوي یا مل ستونزې لري کېدای شي ځان له رواني څرګندونو سره وپېښي - له دې امله اړینه ده چې عضوي ستونزې او ناروغي د رواني اعراضو د یو ریښه یي لامل په توګه رد شي.

رواني ناروغي کولای شو له لاندینو اعراضو سره په مل ناروغیو وویشو:

- د حالت یا مزاج بدلون (لکه ژور خفګان (Depression) او مانیا)
- اضطراب (لکه، وحشت (Panic) یا د وېرې احساس چې د ژوند په طبیعي چلند کې د اختلال لامل کیږي)
- سایکوزس یا رواني ناروغتیا "او یا رواني پرېښانتیا" (لکه، چټتیا، خیالات، وهم او له حقیقت سره د تماس له لاسه ورکول چې ځینې وختونه له تاوتریخوالي ډک چلند سره مل وي)

تشخیص

رواني ناروغي په دوو ګروپونو ویشلې شو: لومړی، له خبرې شوې خفینې څخه تر منځنۍ ناروغي چې د ژوند د عادي فعالیتونو او ټولنیزو اړیکو دوام ته اجازه ورکوي. دویم، د سختو اعراضو او علایمو سره چې د ټولنیزو اړیکو او طبیعي نورماله چلند خنډ ګرځي:

- د ناروغ علایم
 - معمولي رواني اختلالات؛ هغه خفیف یا منځني اختلالات دي چې په هغه کې ناروغ د خپل ژوند د ورځنیو نورماله فعالیتونو په تر سره کولو برلاسی وي او په هغه کې خفګان، د اندېښنې یا اضطراب اختلالات، ناتوضیح شوی جسماني شکایتونه او بدلیدونکې ناروغي (Conversion disorders) شاملې دي.
 - خفګان یو رواني اختلال دی چې په عاطفه او خوي کې د مرکزي بدلونونو څرګندوی دی چې له غم، زړه تنګوالي او اندېښنې، یاس او ناهیلې، د خوښې او لذت له لاسه ورکولو، د بې ارزښتې احساس یا د ګناه احساس، کمزورتیا او د انرژۍ د نشتوالی، د نه تصمیم نیولو، کمزوري تمرکز، بې اشتهاې، رواني-حرکي بیرته پاتې کېدنې، د مړینې افکار یا د ځان وژنې فکر او یا د پورته مواردو له یو ترکیب سره مل وي.
 - د پرېښانتیا یا اضطراب په اختلالاتو کې یو شمېر دماغي ناروغي شاملې دي چې له بریده زیاتې اندېښنې، عصبانیت، د زړه درزهاری، ویره، افراطي افکار او یا انګیرنې او یا له ټپي کېدو سره مل وي. د پرېښانتیا یا اضطراب د ناروغي بیلایل ډولونه شتون لري:
- د پرېښانتیا یا اضطراب عمومي ناروغي او اختلال Generalized anxiety disorders
- ویریدونکې ناروغي Panic disorders
- د زیان رسیدنې څخه وروسته د رواني فشاري ناروغي Post traumatic Stress disorders
- ویره Phobia
- جبري وسواسي اختلال او ناروغي Obsessive compulsive disorders
- سخت رواني اختلال یا سایکوزس (یا لېونټوب) عمومي اصطلاحات دي چې د یو رواني اختلال د معرفي کولو لپاره چې په هغه کې کس واقعیتونه نشي درک کولی، کارول کیږي. په تفکر، احساساتو-هیجاناتو او چلند کې سخت اختلالات شتون لري. لېونټوب یا سایکوزس په جدي توګه د یو شخص د ژوند اړیکې او کار محنتوي

او له ځان څخه د څارنې نوښت او له نورو سره د اړيکو ساتل ستونزمنوي. سایکوزس له هزيان، وهم، له عجیبو افکارو، وینا، چلند، تیري، تاوتریخوالي او یا له پورته مواردو له هر ترکیب سره مل وي. په حادو رواني ناروغيو او اختلالاتو کې لاندې موارد شامل دي:

- حاد سایکوزس
- مزمن سایکوزس یا شیزوفرنی
- مانیا
- له ولادت څخه وروسته سایکوزس

○ په نورو اختلالاتو کې لاندې موارد شامل دي:

- له الکولي درملو او نشه یي توکو د مسمومیت یا د پریښودو اعراض (لکه جرس، تریاک)، یا هغه درمل چې کېدای شي په ناروغانو کې د ګڼګڼوالي، دیرغلیز حالت یا خوښ والي لامل شي.
- صرع: یو دماغي اختلال دی چې په خپل سر او تکراري د اختلاج له حملو سره مل وي، صرع یو رواني اختلال نه دی، مګر یو نورولوژیکي اختلال له پرله پسې رواني ستونزو او د شرم د احساس له حالت سره مل دی.
- ځینې وخت د صرع تشخیص په ماشومانو کې له پنیګ ناروغيو سره مغشوش کیږي.

• د معاینې طرز او له ناروغ سره چلند:

- لومړی دې عضوي لاملونه او سببونه په ناروغ کې د رواني اعراضو او علایمو لپاره رد شي.
- د تیروید غدې د فعالیت کموالي یا زیاتوالی - په خوي، اخلاقو او چلند کې بدلون
- د وینې د فشار لوړوالی، د زړه یا تنفسي ناروغی - د پرېښتیا یا اضطراب ناروغی
- هاپوګلیسمی یا هاپیرګلیسمی - په چلند کې بدلون
- انتانات - په چلند کې بدلون (انسفالیت)، اخلاق او خوي، او یا د هوښیاری حالت کې بدلون
- نشه یي توکي، الکول او یا له درملو څخه استفاده یا د درملو د پریښودو اعراض - په چلند او عادت کې بدلون، تاوتریخوالی.
- متابولیکي ناروغی (د ځګړ/پښتورګو عدم کفایه) - په چلند کې بدلون یا هوښیاري.

درملنه

له ناروغ څخه د درملنې او مراقبت په اصولو او اساساتو کې د اعراضو څارنه، د ناروغ له خوندیتوب څخه د ډاډ تر لاسه کول او د درملو په وسیله د اغیزمنې درملنې وړاندې کول او د ناروغ د رواني او ټولنیز وضعیت پیاوړي کول او درملنه (د سببونو او د پاملرنې وړ ټولنیزو او رواني خفګان پیداکونکو لاملونو د پیدا کولو په شمول) شامل دي. د مداخلو موخې او د درملنې تګلارې په رواني ناروغيو د اخته ناروغانو لپاره په BPHS کې په لاندې توګه تنظیم شوي دي:

- ناروغ او نورو ته د زیان رسیدنې مخنیوی
- د دې ثابتول چې آیا احتمالا کوم عضوي لامل په ناروغ کې د اعراضو او علایمو لپاره شتون لري ("تشخیص" پورته دې مطالعه شي)
- ناروغ او د ناروغ کورنۍ ته د بنسټیزو مشورو ورکول او په یوه امن او محرم چاپیریال کې ټولنیزو لاملونو ته پاملرنه
- د هغو کسانو لپاره چې له خفیفو اعراضو څخه معمول سندروم ښيي د درملو په وسیله د لنډمهالې چټکې درملنې د مل پانې برابرول (یعنې له ژوند او ورځنیو فعالیتونو سره مداخله نه کوي)
- یو ښه روزل شوي سلاکار ته او له مناسب پرسونل او روغتیايي امکاناتو لرونکي یو روغتیايي مرکز ته د لیردولو د زمينې برابرول د سختو اعراضو د درملنې په موخه (ناروغي د ژوند د ورځنېو عادي فعالیتونو او د ناروغ د اړیکو د مخنیوي لامل کیږي)، او هغه کسان چې لږ عمر یا ډیر عمر لري (ماشومان او لوی کسان)، او هغه کسان چې پټې ناروغي لري او یا هغوی چې د لومړنۍ درملنې پر وړاندې له ځانه کمزوری ځواب ښيي.

له درملو پرته درملنه

ټولنیز- رواني مشورتي خدمتونه دې د یو روزل شوي روغتیايي کارکوونکو یا اړوندو سلاکارانو په وسیله یو کس،

کورنی او یا هم د افرادو یو ګروپ ته د رواني، روغتیا، سوکالۍ، د خفګان او پرېښانتیا د کمولو او له خفګان او روحي فشارونو سره د مقابله د مهارتونو د لوړولو لپاره وړاندې شي. په رواني - ټولنیزو مشورو کې دې عاطفي مسایل او خفګان پیدا کونکي وضعیتي او پرمختیايي لاملونه په محرمه توګه کسانو، ښځې او خاوند، ګروپونو او یا کورنېو لپاره تنظیم او هغوی ته وړاندې شي. موخه مثبتو پایلو او د خطر د پیژندل شویو لاملونو د کمولو له لارې رواني مطلوبې پرمختیا ته رسیدل دي. دوه ډوله رواني ټولنیزې مشورې شتون لري: اساسي مشورې او مسلکي مشورې.

د درملو په وسیله درملنه

د درملو درې عمده ګروپونه چې د معمولو رواني ناروغیو په درملنه کې کارول کیږي په اتم جدول کې ذکر شوي دي.

اتم جدول- هغه درمل چې د روانی ناروغیو د درملنې لپاره کارول کېږي

دودز		د استعمال		درملنه
ماشومان				
لویان				
(Sedatives or anxiolytic)				
• پنځه میلی گرامه په ورځ کې دوه ځله، په اعظمي توګه دوه اونی، له هغه وروسته په یوه اونی کې د taper په بڼه د درملو بندول. • د سخت هیجان یا خیرالیا لپاره، کېدای شي ۱۰ میلی گرامه عضلي زرق IM، د اړتیا په صورت کې دې د ۶۰ دقیقو وروسته تکرار شي		ولیدون	• کېدای شي د لنډ مهال لپاره (۳ اوږه) وکارول شي، ځکه کولای شي له درملو سره د روږدوالي لامل شي. • د پریښتیا یا اضطراب د اختلاط، بې خبرۍ، هیجان او خیرالیا (له سایکوزس یا رواني پریښتیا یا پرته له هغه) د درملنې لپاره کارول کیږي.	Diazepam
د حالت یا طبیعت لوړه ونکړي درمل (Mood Elevators)				
• لومړنی دوز: ۵۰ میلی گرامه په شپه کې، کېدای شي د درملو دوز د ۲۵ ملي گرامو په اندازه په هرو ۱۴ ورځو کې د نظر وړ اغیزو د تر لاسه کولو په موخه اعظمي اندازې ۱۵۰ ملي گرامو ته د شپې له لورې لوړ شي. • د درملنې له پیل څخه وروسته لږ تر لږه تر شپږو میاشتو په ځانګړي توګه درملنې ته اړتیا وي. • لوی یا لوړ عمر لرونکي کسان: درملنه دې له ۲۵ ملي گرامو سره د شپې له مخې پیل شي، اعظمي دوز د شپې له مخې ۱۰۰ میلی گرامه.		ولیدون	• کېدای شي د خفیف څخه تر منځني ځنګان د روښانه تشخیص لپاره وکارول شي. • کېدای شي د لیږدونکو منابعو له لوري د ویرې د اختلالاتو د ناروغی د درملنې په توګه توصیه شي.	Amitriptyline
• لومړنی دوز: ۲۰ میلی گرامه د سهار له مخې له څلورو اونیزو وروسته که چیرې په بشپړه یا څه نا څه خوب ور نځي، کېدای شي دا اندازه تر ۴۰ ملي گرامو لوړه شي. • لویان: پیل د ۱۰ ملي گرامو سره د سهار له مخې له څلورو اونیزو وروسته که چیرې په بشپړه یا څه نا څه خوب ور نځي، کېدای شي دا اندازه تر ۲۰ ملي گرامو لوړه شي.		ولیدون	• کېدای شي د لیږدونکو منابعو په وسیله د پریښتیا یا اضطراب د درملنې لپاره پیل شي. • کېدای شي له تروما څخه وروسته د فشاري ناروغیو په درملنه کې په محدوده توګه وکارول شي (له لیږدولو سره)	Fluoxetine (یو اړي) په DH کې شتون لري

آنتي سایکوپټک درمل (Agents Antipsychotic)

• لومړنۍ دوز: ۲.۵ میلی ګرامه هر ۱۲ ساعته وروسته، کېدای شي اعظمي ورځنۍ دوز ۱۲.۵ ملي ګرامو ته د اعراضو په صورت کې لوړ شي. • د سختو هيجانانو او حيرانتيا لپاره: د عضلي په داخل کې (IM) پنځه میلی ګرامه زرق ۴ د اړتيا په صورت کې کېدای شي له ۶۰ دقيقو وروسته دا اندازه تکرار شي.	ولير دوى	• کېدای شي په سختو يا مزمينو رواني ناروغيو کې وکارول شي (د ناروغ د ليدولو توصيه شوي ده) • کېدای شي د هيجان او حيرانتياو د درملنې لپاره په هغه صورت کې چې دنازيم اغيز ونلري او يا هغه وخت چې د هډيان له اعراضو سره مل وي، پيل شي.	Haloperidol – پرازي، د ولسوالۍ په روغتون کې شتون لري
• لومړنۍ دوز: ۲۵ میلی ګرامه هر اته ساعته وروسته، کېدای شي اندازه يې ورو ورو اعظمي حد ۱۰۰ ملي ګرامو ته هر اته ساعته وروسته لوړه شي. ځواب ته په پاملرنې سره معمول تعقيبي دوز له ۷۵ – ۳۰۰ میلی ګرامه هره ورځ دې د درملو اندازه تنظيم او برابره شي. • په سختو هيجانانو کې: ۵۰ میلی ګرامه عضلي زرق IM د اړتيا په صورت کې کېدای شي له ۶۰ دقيقو وروسته دا اندازه ۵۰ میلی ګرامه هر اته ساعته وروسته تکرار شي.	ولير دوى	• کېدای شي په سختو يا مزمينو رواني ناروغيو کې وکارول شي (د ناروغ د ليدولو توصيه شوي ده) • کېدای شي د هيجان او حيرانتياو د درملنې لپاره په هغه صورت کې چې دنازيم اغيز ونلري او يا هغه وخت چې د هډيان له اعراضو سره مل وي، پيل شي.	Chlorpromazine

احتیاط:

- د خفگان ضد درمل په ځانگړې توگه د خفگان ضد ترای سیکلیک درمل، که چیرې له اندازې څخه زیات واخیستل شي کېدای شي وژونکی وي. د هغو ناروغانو په اړه چې د ځان وژنې افکار لري ډیر زیات احتیاط دې په پام کې ونیول شي.
- د ترای سیکلیک د گروپ د خفگان ضد درملو له تجویز څخه دې د هغو ناروغانو لپاره چې د زړه د ناروغی مخینه، د ادرار احتباس، گلوکوم یا میرگي لري، ډډه وشي.
- لوړ عمر لرونکي کسان د خفگان ضد درملو پر وړاندې زیات حساس دي او باید له یو کم دوز سره پیل او تعقیب شي.

لیږدول

ټول ناروغان چې هغوی د لومړي ځل لپاره رواني اختلال لري باید د یو ښه روزل شوي سلاکار یا متخصص په وسیله و ارزول شي، په ځانگړې توگه که چیرې ناروغ په یو سخت رواني اختلال اخته وي (پورته دې رجوع وشي) چې د ناروغ د ژوند د چلند، شخصي اړیکو او نورماله کار د اخلالیدو لامل شي.

نور اضافي شرایط چې په هغه کې د لیږدولو په اړه ډیره توصیه کیږي په هغو کې لاندې موارد شامل دي:

- ټول هغه ناروغان چې کېدای شي د ځان یا نورو لپاره گواښ وي.
- کوچنیان، تنکي ځوانان او لوړ عمر لرونکي.
- هغه ناروغان چې سختې مخفي ناروغی لري.
- امیدواره او شیدې ورکونکې ښځې.
- هغه ناروغان چې د راستنیدونکو اعراضو او علایمو لرونکي دي.
- هغه ناروغان چې له لومړنۍ درملنې سره ځواب ور نه کړي.
- رواني ناروغان یا هغوی چې لومړۍ حمله ولري او یا هغه کسان چې د هغوی د مزمنې ناروغی درملنه بریالۍ نه وي.
- هغه کسان چې کمزوری ټولنیز ملاتړ لري.
- هغه ناروغان چې له تاوتریخوالي ډک چلند او یا هزیان له ځانه څرگندوي.
- هر هغه کس چې د Bipolar ناروغی یا اختلال لري (مانیا او خفگان)

وقایه

- ناروغ او ټولنې ته په دې اړه لارښونه چې رواني ناروغی معمولي دي او د درملنې وړ دی.
- مخکې له دې چې د ناروغی اعراض او علایم سخت شي درملنه دې پیل شي.
- د ټولنیزې او کورنۍ ملاتړ پر میکانیزمونو باور وشي.

د ناروغانو لپاره لارښونې

- ناروغ ته دې توصیه وشي چې یوځل د درملو په وسیله درملنه پیل شوه هغوی باید خپل درمل څه ډول چې لارښونه ورته شوې ده، واخلې څو د معتادېدو مخنیوی وشي او مطلوبه پایله تر لاسه شي.
- ناروغانو ته دې لارښونه وشي څو:
 - له نشه یي توکو، الکولو او کافین څخه ډډه وکړي.
 - خوب، غذايي رژیم، او مناسب ورزش ته باید دوام ورکړل او وساتل شي.
 - د ټولنیزو او کورنیو کړکېچونو د پیدا کېدو په مواردو کې دې له روغتيايي سلاکار سره وکتل شي (د شتوالي په صورت کې).

نهم څېړکي ولادې - نسایي ناروغۍ Obstetrics and Gynecological Conditions

۹.۱ امیندواری او د امیندواری د دوران څارنې (Pregnancy and Antenatal Care)

تشرېح

امیندواري هغه حالت ده چې مور په خپل بدن کې جنین ته وده او پرمختیا ورکوي. امیند واري معمولا ۴۰ اونۍ وخت نیسي او په دریو ترایمسترونو ویشل شوې ده. هر ترایمستر یې نږدې درې میاشتې وي.

- له زیږون څخه مخکې څارنه هغه څارنه ده چې یوه امیندواره مور یې د امیندواري په دوره کې تر لاسه کوي.
- له زیږون څخه مخکې څارنې (ANC) له دې څخه د ډاډ په موخه چې یوه امیندواره میرمه د امیندواري، زیږون او له زیږون څخه په وروسته دوران کې په یوه سالم حالت او وضعیت کې، روغ ماشوم و زیږوي، تنظیميږي.
- له ولادت څخه مخکې څارنې د یوې ښې تاریخچې او معاینې د برابرولو په موخه د هر ډول ستونزو د پېژندلو لپاره چې په احتمالي توګه د امیندواري، ولادت په دوران یا له ولادت څخه په وروسته دوران کې پیښیږي وړاندې کوي.
- هغه ستونزه چې په دې دوران کې پېژندل کیږي، یا یې درملنه کیږي او یا په لوړه کچه یو روغتيايي مرکز ته لیږدول کیږي.
- د ANC مطلوب حالت د امیندواري له پړاو څخه مخکې او یا د امیندواري پرمهال پیليږي، سره له دې چې غالباً له دریولومړیو میاشتو څخه پیليږي یعنې هغه وخت چې یوه میرمن متوجه کیږي چې هغې د میاشتي عادت یوه دوره ترک کړې ده
- له زیږون څخه مخکې د څارنې موخې (ANC):

- میرمن او د هغې خاوند ته د زده کړې او تعلیماتو، ډاډ او ملاتړ برابرول
- د امیندواري د کوچنیو ستونزو او اعراضو په اړه لارښوونه
- له ولادت څخه مخکې د معایناتو برابرول او د هغو ستونزو درملنه چې په دې دوران کې څرګندیږي.
- د امیندواري په پیل کې د مور او جنین د خطر د لاملونو او د امیندواري په دوران کې د هغوی د پرمختیا ارزونه.
- د هغو امیندوارو میرمنو څارنه چې د امیندواری له ډیر خطر سره مخ او تجربه کوي، لوړو روغتيايي مرکزونو ته د هغوی لیږدول.
- د ولادت د وخت، تګلارې او ځای ټاکل (یعنې د ولادت د یو پلان طرحه او ډیزاینول)
- د خطر د هر ډول علایمو ټاکل لکه:

- د وینې شدید کموالی
- شدید سر دردي
- د وینې لوړ فشار
- د بدن د پورتنۍ برخې پړسوب
- مهبلي وینه راتلنه یا لیکاز
- تبه
- اختلاج
- د جنین ستونزې

تشخیص

- هغه وخت چې د یوې میرمنې میاشتنۍ طبیعي عادت څرګند نشي یا د امیندواري اعراض و لری، په امیندواری شک کیږي او په ادرار کې د امیندواري له تېسپ سره تائیدیږي.
- د امیندواري په اعراضو کې کېدای شي لاندې حالتونه شامل وي:

۹.۱ امیندواری او د امیندواری د دوران څارنې

- د میاشتنی عادت نه راتلل
- زړه بدوالی
- د تیو حساسیت
- سترتیا
- پرله پسې ادرار کول
- لوی، نرم او د لمس یا جس وړ رحم
- د جنین د زړه د ږغونو څرگندیدل (په نورماله توګه ۱۴۰-۱۶۰)
- په ادرار کې د امیندواری د تېس مثبت څرګندیدل (مګر نه په لومړۍ اوښو کې)
- د میرمنې د وزن زیاتیدل (په معموله توګه له ۱۱-۱۳ کیلو ګرامه د امیندواری د دورې په اوږدو کې)
- د WHO د لارښود مطابق، یوه امیندواره میرمنه باید له ولادت څخه د مخکې څارنو لپاره لږ تر لږه څلور ځله معاینه او وکتل شي (۹.۱ جدول دې مطالعه شي)

۹.۱ جدول: د امیندواری په دوران کې له ولادت څخه مخکې (ANC) د معمولو څارنو لنډیز

مداخلې	کتنې
• د بشپړې تاریخچې اخیستل. • د یوې فزیکي معاینې تر سره کول. • د اړتیا په صورت کې د لابراتواري معایناتو سپارښتنه (وینه او ادرار). • د حیاتي علایمو ثبتول، قد او وزن • امیندواری میرمنې، د هغې کورنۍ او خاوند ته د امیندواری د څارنې د تګلارې او د غذایی رژیم په اړه د معلوماتو وړاندې کول. • د زیریدو د متوقع نېټې د ټاکلو په موخه د Naegle له قاعدې څخه استفاده، لکه څرنګه چې معمولاً په افغانستان کې له هغې څخه استفاده کیږي. ○ د وروستۍ میاشتنی عادت د دورې د لومړنۍ ورځې ټاکل ○ پر هغه د اوو ورځو زیاتول ○ بیا درې میاشتې له هغه څخه کمې کړئ ○ بیا پر هغه د یو کال زیاتول • د فیرس سلفیت او فولیک اسید د مرستندوی پیلول. • د امکان په صورت کې په ادرار کې د باکتریاګانو، ګلوکوز او پروتین د معلومولو لپاره د ادرار معاینه کول • د امکان په صورت کې د وینې د ګروپ او د هغه د Rh د ډول معاینه کول.	لومړۍ - په لومړي ترایمستر کې (د امیندواری لومړۍ درې میاشتې)
• د لومړي ترایمستر د معاینې د موندنو بیاکتنه. پاملرنه وکړئ په هغه صورت کې چې هر ډول بدلون په دې موندنو کې شتون ولري (یعنې اذیم، د وینې د کموالي نښې یا نورې ناروغۍ او یا د خبردارۍ نښې). • د حیاتي نښو او د رحم د لوړوالي اندازه کول. • د ادرار تکراري معاینه (باکتریاګانې، پروتین، ګلوکوز) په هغه صورت کې چې تېس په لومړي کتنه کې نورماله نه وي. • امیندواری میرمنې، د هغې کورنۍ او خاوند ته د امیندواری د څارنې د تګلارې او د غذایی رژیم په اړه د معلوماتو وړاندې کول. • میرمن او خاوند ته د نوي زیردلی ماشوم ته د سملاسی یوازی د مور شیدو ورکولو د ګټې په اړه لارښونه وشي.	دویم - دویم ترایمستر یعنې د امیندواری شاوخوا ۲۶ اونۍ

• د دویم کتنې (ویزېټ) د ټولو دندو تر سره کول. • د جنین د زړه د ضربان ثبتول. • د وینې د شدید کموالي د پیژندنې لپاره د وینې د هیموګلوبین اندازه کول. • له میرمنې او د هغې له خاوند سره د ولادتونو ترمنځ د واټن د تګلارې په اړه بحث. • د تیو د یوې معاینې تر سره کول. • د TT د واکسین تجویزول	دریم - دریم ترایمستر یعنې د امیندواري په شااوخوا ۳۲ اونۍ کې
• د دریم کتنې (ویزېټ) د ټولو دندو اجرا او تر سره کول. • د لیوېوله له معاینې او یا له نورو سیستماتیکو ارزونو څخه په استفادې د جنین د موقعیت ارزونه. • د جنین د بریچ اعتلان او یا د جنین د نورو غیر نورماله موقعیتونو د شواهدو ارزونه. • د میرمنې د ولادت لپاره د پلان جوړول. په دې اړه ټول معلومات چې باید څه وکړئ، له چا سره تماس ونیسئ، او هغه وخت چې د ولادت دردونه پیل شي چیرته لاړه شي او یا د نورو علایمو د پیدا کېدو په اړه باید ناروغ ته مشوره ورکړل شي. • نوي پیدا شوي ماشوم ته په سملاسي توګه د مور د شیدو په وسیله د تغذیې د اهمیت په اړه میرمنې او د هغې خاوند ته لارښونه.	څلورم - د امیندواري د ۳۶ - ۳۸ اونیو ترمنځ

درملنه

- د اوسپنې له کموالي د کمخونۍ څخه مخنیوی
 - د امیندواري په اوږدو کې او له ولادت څخه وروسته تر دریو میاشتو او یا د جنین د سقط د ټولو ناروغانو لپاره دې تجویز شي:
 - Ferrous sulfate + Folic acid (۶۰ میلی ګرامه Iron + ۰.۴ میلی ګرامه Folic acid) ۱ ټابلیټ په ورځ کې یوځل (له خوړو سره یا د شپې له مخې)
 - هغو ناروغانو ته چې هیموګلوبین یې له $g/dl 11$ څخه کم دی، تجویز شي:
 - Ferrous sulfate + Folic acid (۶۰ میلی ګرامه iron + ۰.۴ میلی ګرامه Folic acid) ۱ - ټابلیټ هر ۱۲ ساعته وروسته د درې میاشتو لپاره - له هغه وروسته -
 - د امیندواري په دوران کې هره ورځ له یو ټابلیټ سره د درملنې تعقیب او له ولادت څخه وروسته تر دریو میاشتو پورې.
 - د امیندواري له امله زړه بدوالی او کانګې، Pyridoxine (ویتامین B6) - ۱ ټابلیټ ۲۵ میلی ګرامه هر ۸ ساعته وروسته د درې ورځو لپاره توصیه کیږي (د ولسوالیو په روغتونونو کې شتون لري).
 - د TT واکسین تطبیقول، هغو میرمنو ته چې په بشپړه توګه واکسین شوي نه دي (پنځه ثبت شوی دوزونه)
 - که چیرې امیندواره میرمن واکسین شوې نه وي له ولادت څخه مخکې د څارنې په لومړني ویزېټ کې و لیدل شي: سټلرډ دوز دې تجویز شي:
 - د TT لومړی دوز دې له ولادت څخه مخکې د څارنې په لومړني ویزېټ کې تجویز شي. ۵۰ ملي لیتر د عضلې په داخل کې.
 - دویم دوز دې څلور اونۍ وروسته تجویز شي.
 - دریم دوز دې له دویم دوز څخه شپږ میاشتې وروسته (حتی که چیرې هغه له ولادت څخه وروسته هم ورکړو)
 - څلورم دوز یو کال وروسته له دریم دوز څخه.
 - پنځم دوز یو کال وروسته له څلورم دوز څخه.

- که چیرې امیندواره میرمن په بشپړه توګه واکسین شوې نه وي، په دې صورت کې باید ډاډ تر لاسه شي چې له ولادت څخه مخکې لږ تر لږه د TT د واکسین دوه دوزه تطبیق شي.
- که چیرې ناروغ ډاډه نه وي، ډاډ دې تر لاسه شي چې ناروغ له ولادت څخه مخکې د TT دوه دورې واکسین کړی دی (لږ تر لږه په څلورو جلا اونیو کې)
 - که چیرې ناروغ مخکې د TT دوه یا څو واکسینونه اخیستي وي، په دې صورت کې دې د TT د واکسین یوه دوره له ولادت څخه مخکې هغې ته توصیه شي.
- که چیرې په ناروغ کې د TT د واکسین د پنځو دورو د اخیستلو شواهد شتون ولري او د واکسین د تطبیق وروستی دوره له لسو کلونو څخه په کم وخت کې اخیستل شوې وي په دې صورت کې ناروغ ته د TT د واکسین د تطبیقولو اړتیا نشته.
- د ۵۰۰ میلی ګرامه Mebendazole تجویز (پنځه ټابلیټ ۱۰۰ میلی ګرامه یوځل) - یو ځل په دویم یا دریم تریامستر کې، لکه څرنګه چې د نړیوال روغتیايي سازمان له لوري توصیه شوې ده.
 - احتیاط: د امیندواري په لومړیو دریو میاشتو کې دې تجویز نشي.

لېږدول

- ټولې هغه میرمنې چې د پام وړ ونې راتلنې مخینه (تاریخچه) او یا له ولادت څخه وروسته د پلاستنا احتباس لري.
- په هره میرمن کې چې لاندې حالات څرګند شي:
 - د ونې شدید کموالی (هیموګلوبین له g/dl څخه لږ)
 - هغه وخت چې د رحم جسم، له یوه جنین سره د امیندواري له عمر څخه ډېر لوی وي.
 - لوی بطن (څو ګونی جنین او یا Polyhydramnios)
 - د جنین غیر طبیعي موقعیتونه، لکه مستعرض اعتلان
 - اوږده امیندواري - د امیندواري عمر له ۴۲ اونیو څخه زیات
 - پری اکلامپسیا یا اکلامپسیا
 - د ونې لوړ فشار (د ونې فشار له ۱۴۰/۹۰ څخه لوړ)
 - د شدیدو ناروغیو نښې او شواهد
- هره میرمن له لاندې مخینې یا تاریخچې سره:
 - د مړه ماشوم د ولادت پخوانی تاریخچه او یا د رحم په داخل کې د جنین د ودې محدودیت (یعنې د جنین په دوران کې د ماشوم کمزورې وده - د امیندواري له عمر څخه د رحم کوچنې اندازه)
 - په لومړۍ اونۍ کې د نویو پیدا شویو ماشومانو مړینه.
 - له وسایلو څخه په استفادې پخوانی ولادت - له فورسپس او یا له Vacuum extraction څخه په استفادې ولادت.
 - پخوانی سیزارین
 - د رحم پخوانی جراحي عملیات (میومیکتومي) او یا تنقب (له ولادت یا سزارین څخه وروسته)
- هره میرمن چې د جینیټیکي یا ارثي ناروغیو کورنی مخینه ولري.

وقایه

د امیندواری اختلالات په معمولي ډول د ولادت څخه مخکې څارنې او پارتو ګراف په واسطه، په بڼه توګه مخنیوی کیږي (د ج مل پانه دې مطالعه شي).

ناروغ ته لارښوونې

- د ANC د کتنې (ویزې) پرمهال دې وړاندې شوې مشورې او وړاندیزونه تعقیب شي.
- فیرس سلفیت او فولیک اسید د لارښوونې مطابق واخیستل شي.
- TT واکسین تطبیقول دې د لارښوونې مطابق تر سره شي.

O د کورنۍ سره د زیږون پلان جوړول تر څو په روغتيايي مرکز کې زیږون تر سره شي. د ولادت د یو پلان طرحه کول په ځانګړې توګه هغه وخت مهم دي که چېرې د ANC د ویزې پرمهال یوه ستونزه تشخیص شوې وي. په لاندې مواردو کې دې یو پلان وړاندې شي:

- د ولادت لپاره د ناروغ د لیږد رالیږد لپاره ټګلارې - د دواړو حالتونو "عادي او بېرني" حالت لپاره
- د کورنۍ د هغه شمېر غړو په اړه معلومات چې کولای شي په چټکو حالاتو کې د اړتیا په صورت کې وینه ورکړي.
- د یو منظم غذايي رژیم اخیستل (مغزبات، سبزیجات، د لبنیاتو محصولات، غوښه، کب، مېوې).
- مناسبه او کافي ارامتیا او د درنو کارونو له تر سره کولو څخه ډډه کول.
- د ملاریا په یوه مساعده سیمه کې د حشرې وژونکو درمل لرونکو ماش لومو لاندې ویده کیدل
- هیڅ ډول درمل دې په خپل سر وا نه خيستل شي مګر دا چې د یو روغتيايي مرکز له لوري توصیه شوي وي.
- د ټباکو، الکولو او نشه یي توکو کارول دې بند کړای شي.
- په دې اړه د یو پلان جوړول چې د وینې راتلنې، د بطن د درد او یا په هر ډول بل بېرني حالت کې له چا سره تماس ونیول شي او چیرته لاړ شي.
- د جنین د لومړنیو خوځښتونو ثبتول هغه وخت چې هغه احساسوی.
- د ځواند (یا د کورنۍ د یو غړي) راوستل د دې لپاره چې هغوی زده کړي چې څه ډول د امیندواري پرمهال د مېرمنې ملاتړ وکړي.
- د هر هغه څیز یادښتول چې تاسو غواړئ په راتلونکي ویزې کې یې ذکر کړئ.
- د مور له شیدو سره د تغذیې په اړه زده کړه او د نوي پیدا شوي ماشوم څارنه.
- د ولادتونو ترمنځ د واټن د رامنځته کولو د موخو کتل

۹.۲ په امیندواري کې د وینې کموالی (Anemia in Pregnancy)

تشریح

هیموګلوبین له ۱۱ g/dl څخه کم، په وصفی توګه د اوسپنې یا فولیت د کموالي له امله، او یا هم د دې دواړو ترکیب د وینې له کموالي څخه عبارت دی. د اوسپنې د کموالي له امله د وینې کموالی د امیندواري په دوران کې د وینې د ۹۵ سلنې د کموالي مسوولیت لري چې دلیل یې د امیندواري په دوران کې زیاتې اوسپنې ته ضرورت ده. د وینې شدید کموالی کېدای شي د رحم په داخل کې د ودې د وروسته پاتې کېدو، د ژر ولادت او یا د دواړو لامل شي.

تشخیص

- د منظمې، د نوکانو د بستر او د ژبې الوتې رنګ
- ژر ستړیا، ګڼګسوالی.
- د وینې په سخت کموالي کې د سر درد، د زړه د حرکتونو زیاتوالی، د زړه تپیدل، په پښو کې اذیمه، د تنفس ستونزه (په یوه دقیقه کې له ۳۰ څخه زیات تنفس، د استراحت په حالت کې ساتنډي)
- د وینې په اوږدمهاله کموالي کې، د خولې د کونج یا ژبې التهاب، د نوک په بڼه کې بدلون (د قاشغې په ډول نوکان)
- د هیمولیتیک د وینې د کموالي په ځینو مواردو کې، زېړی.
- په هر ډیسي لیتر کې له ۱۱ ګرامو څخه کم د وینې هیموګلوبین

درملنه

له درملو پرته درملنه

- له ولادت څخه مخکې په لومړني کتنې کې د وینې د هیموګلوبین اندازه کول.
- د اوسپنې د کموالي له امله د وینې له کموالي څخه پرته د وینې د کموالي نور لاملونه په پام کې ونیسئ، (د اړتیا په صورت کې یې وځیرئ):

- چنگکي چينجي (Hookworm)
- ملاريا
- مزمني ناروغۍ
- د هاضمي جهاز له لارې د وینې ضایع کیدل.

د درملو په وسیله درملنه

- د اوسپنې د کموالي له امله د وینې د کموالي مخنیوی.
- ټولو امیندوارو میرمنو ته د امیندواري به اوږدو کې له ولادت یا د جنین د سقط څخه وروسته تر دری میاشتو
- Ferrous sulfate+ Folic acid (۶۰ میلی گرامه iron + ۰،۴ میلی گرامه Folic acid) ۱ ټابلیټ په ورځ کې یوځل (خوړو سره یا د شپې له مخې)
- هغو ناروغانو ته چې هیموگلوبین یې له ۱۱ g/dl څخه کم دی، تجویز شي:
- Ferrous sulfate+ Folic acid (۶۰ میلی گرامه iron + ۰،۴ میلی گرامه Folic acid) دوه برابره دوز، ۱۲ ساعته وروسته د درې میاشتو لپاره
- ۱ ټابلیټ هر ۱۲ ساعته وروسته د درې میاشتو لپاره
- له هغه وروسته-
- د امیندواري په دوران کې هره ورځ له یو ټابلیټ سره د درملنې تعقیب او له ولادت څخه وروسته تر دریو میاشتو پورې.
- هرې میرمنې ته په شپږو میاشتو کې یو دوز ۵۰۰ میلی گرامه د Mebendazole تجویز او یا (پنځه ټابلیټ ۱۰۰ میلی گرامه)
- احتیاط: د امیندواري په لومړیو دریو میاشتو (لومړي ترايمستر) کې دې تجویز نشي.

لیردول

- د امیندواري په هر پړاو کې په هر ډیسي لیتر کې له اتو گرامو څخه کم هیموگلوبین، دا د وینې یو شدید کموالی دی. ناروغ دې یو مناسب روغتيايي مرکز ته چې په هغه کې د وینې د ترانسفیوژن امکانات شتون لري، ولیردول شي.
- د امیندواري له ۳۴ اونۍ څخه په زیات وخت کې په یو ډیسي لیتر کې له ۱۱ گرامو څخه کم هیموگلوبین
- د زړه د عدمې کفایې شواهد
- له ناڅاپي پیل سره د وینې کموالی.
- د وینې کموالی او د ولادي اختلاطاتو شواهد
- د مزمنو ناروغیو، نري رنځ او ملاريا شواهد.

وقایه

- له ولادت څخه مخکې د معمولو مراقبتونو تر سره کول (ANC) د اوسپنې او فولیک اسید د ستندرد مرستندویه په شمول (پورته دې رجوع وشي).
- د یو متعادل او له اوسپنې څخه د بډای غذايي رژیم اخیستل له هغې جملې څخه میوې او شنه سبزیجات (لکه غوښه، کب، غوړ، مغزيات، دانې، غلې، حبوبات، سبزیجات، پنیر، شیدې).
- له ملاريا څخه د مخنیوي لپاره په حشره وژونکو درملو له ککړو ماش لومو څخه استفاده.
- د ولادت د یو پلان د جوړولو له لارې د ولادي اختلاطاتو مخنیوی.

ناروغ ته لارښوونې

- د ولادت څخه مخکې د څارنو په کتنو کې حاضریدلو او د ورکړل شوو لارښوونو منلو ته د ناروغ هڅول.
- ناروغان دې وهڅول شي خو د خاورې (پیکا) د خوړلو لپاره لېوالتیا و نه ښيي.
- د اوسپنې په وسیله د درملنې په اړه د هر ډول ناسمې انگیرنې په برخه کې دې له ناروغانو سره خبرې وشي (لکه دا

- چې ګویا وینه راتله زیاتوي او یا د دې لامل کیږي چې جنین له حده زیات لویږي)
- ناروغ ته دې وویل شي چې د اوسپنې ټاپلیټونه څه ډول وخوري (یعنې له خوړو سره یوځای او یا په ورځ کې یو ځل، یا په شپه کې)

۹.۳ په امیندواري کې د وینې د لوړ فشار ناروغی (Hypertension Disorders of Pregnancy)

د وینې د لوړ فشار ناروغی دامیندواري پر مهال عبارت ده له: د وینې مزمن فشار، د امیندواري د وینې فشار، پري اکلامپسیا او اکلامپسیا.

تشریح

- د وینې د لوړ فشار ناروغی د امیندواري پر مهال کېدای شي دواړو مور او ماشوم ته سختې پایلې ولري. د وینې لوړ فشار په لاندې توګه تعریف شوی دی: هر وخت چې د وینې سیسټولیک فشار له ۱۴۰ ملي متر ستون سیماب او دیاستولیک فشار له ۹۰ ملي متر ستون سیماب څخه لوړ وي، د وینې فشار لوړ دی.
- د وینې مزمن لوړ فشار چې له امیندواري څخه مخکې شتون ولري (۶.۱ برخه "د وینې سیسټمیک فشار" دې مطالعه شي).
- د امیندواري له امله د وینې لوړ فشار د وینې هغه لوړ فشار دی چې د امیندواري له شلمې اونۍ څخه وروسته پیلېږي او په درې ډوله دی:
- د امیندواري د وینې لوړ فشار (له پروټین یوریا څخه پرته)
- د وینې لوړ فشار له پروټین یوریا سره یا پري اکلامپسیا
- د وینې لوړ فشار له پروټین یوریا او اختلاج سره یا اکلامپسیا، چې د ژوند یوه ګواښوونکې پېښه ده چې له اختلاج او کوما سره یوځای وي.

تشخیص

- له ۱۵ دقیقو استراحت څخه وروسته د وینې اندازه شوی فشار له ۱۵۰/۱۰۰ لوړ. پر تر لږه دوه ځله دې د وینې فشار د څلورو ساعتونو په وټن کې چک شي. په امیندواري کې دې د وینې د لوړ فشار لپاره درملنه تجویز شي.
- د وینې لوړ فشار او پروټین یوریا شتون د پري اکلامپسیا څرګندونه کوي. معلومه کړئ چې ایا پروټین یوریا د سر له درد، په لیدو کې له بدلون، د خټې په پورتنۍ ناحیه کې د درد، زړه بدوالي او کانګو، ګڼګسوالی او د وزن له ناڅاپي زیاتوالي (په اونۍ کې ۰.۹ کیلو ګرامه) سره یوځای دی. اذیما دې په مخ او لاس کې معاینه شي، مګر اذیما د پري اکلامپسیا لپاره ډیره وصفې نه ده، ځکه کولای شي د نورماله او طبیعي امیندواري په دوران کې هم شتون ولري.
- د وینې لوړ فشار، پروټین یوریا او اختلاج د اکلامپسیا څرګندونه کوي.
- پاملرنه: ډاډ دې تر لاسه شي چې د اختلاج لپاره هیڅ بل لامل لکه مننجیټ، ملاریا او یا د مرګېو یوه مخینه شتون نلري. پاملرنه: اکلامپسیا همدا راز کېدای شي آن له ولادت څخه په وروسته دوره کې هم پېښه شي چې په دې صورت کې به ناروغ معاینې او ارزونې ته اړتیا ولري.

درملنه

له درملو پرته درملنه

- هغه امیندواره ناروغانې چې په لوړ فشار اخته دي باید هره اونۍ د لاندې مسایلو د چک او څېړنې په موخه تر څارنې او ارزونې لاندې ونیول شي:
- د وینې فشار
- د مور د وزن زیاتیدل او د اذیما شتون
- د جنین وده او وضعیت
- د پروټین لپاره ادرار

- د ولادت د پلان د جوړولو لپاره لومړنوب (په یو روغتیایي مرکز کې د ولادت لپاره د پلان جوړول او یا د امیندواري ناروغی لیرد رالیرد په بېونیو حالاتو کې او نورې لارې.
- ټول هغه ناروغان چې لوړ فشار لري باید له کم مالکین غذايي رژیم څخه استفاده وکړي.
- په پروتین یوریا (پري اکلامپسیا) اخته میرمنې باید په کور کې استراحت ولري او په اونۍ کې یوځل په دقیقه توګه په روغتیایي مرکز او یا د روغتیایي کارکونکي په وسیله په کور کې تر څارنې او ارزونې لاندې ونیول شي.

د درملو په وسیله درملنه

- د امیندواري یا (Gestaional) د وینې د لوړ فشار لپاره چې د وینې فشار له ۱۵۰/۱۰۰ ملي متره ستون سیماب څخه لوړ وي او لږ تر لږه دوه ځله چک شوی وي (په څلورو جلا ساعتونو کې)
- Methyldopa ۲۵۰ میلی ګرامه ټابلیټونه دې تجویز شي. له ۲۵۰ میلی ګرامو (۱ ټابلیټ) هر اته ساعته وروسته سره دې پیل شي، اعظمي دوز تر ۵۰۰ میلی ګرامه، دوه ټابلیټه هر شپږ ساعته وروسته د اړتیا په صورت کې.
- له اکلامپسیا سره د وینې د لوړ فشار لپاره له لیردولو مخکې دې سملاسي لاندې درمل ورکول شي:
- لومړی دوز Magnesium sulfate ۵ – ګرامه د عضلې داخلي زرق IM (یو آمپول ۵۰۰ میلی ګرامه / میلی لیتر) په هر کوناتي کې هر څلور ساعته وروسته تر هغه وخته چې ناروغ روغتیایي مرکز ته ورسیري (په DH او CHC کې شتون لري)

+

- Hydralazin ۵ – ۱۰ میلی ګرامه ورو زرق د ورید په داخل کې IV؛ له ۱۰ میلی لیتره د ۰.۹ % NACL سره دې نری شي (په DH کې شتون لري).

لیردول

- د امکان په صورت کې دې ټولې امیندواري میرمنې چې د وینې لوړ فشار لري د ډیرې څیړنې او درملنې لپاره ولیردول شي.
- د امیندواري له عوارضو او اختلاطاتو څخه د مخنیوي لپاره، هره امیندواره میرمن چې د وینې لوړ فشار او د ۳۸ اونیو امیندواره وي باید د اکلامپسیا د درملنې لپاره دې سمبال روغتیایي مرکز ته د ولادت په موخه د بستر کیدو لپاره ولیردول شي.
- هغه میرمنې چې د فشار د کنترول لپاره د Methyldopa د اعظمي دوز د اخیستلو سره سره د وینې دوامداره یعنې له ۱۵۰/۱۰۰ څخه لوړ فشار ولري، ولیردول شي.
- د هغو ټولو امیندواره میرمنو سملاسي لیردول او بستر کیدل چې اکلامپسیا لري، هغه روغتیایي مرکز ته چې د سیزارین عملیات تر سره کولای شي.
- په کین لوري د میرمنې لیرد رالیرد د روغتیایي کارکونکي او د امکان په صورت کې له اکسیجن سره.
- هغه میرمنې چې اختلاج لري هوایي لارې دې خلاصې اود ځان د زخمۍ کیدو څخه دې وساتل شي.

وقایه

- د وینې د فشار له ناروغۍ څخه د امیندواري پرمهال د راپیدا شوو اختلاطاتو مخنیوی له ولادت څخه مخکې ددقیقې څارنې او په مناسب او په خپل وخت لیردولو په وسیله کیږي.

ناروغ لپاره لارښوونې

- ټولو امیندواړو میرمنو ته چې د وینې لوړ فشار لري د پري اکلامپسیا او اکلامپسیا د علایمو او اعراضو او روغتیایي مرکز ته د معاینې او ارزونې د سملاسي راستنیدنې د اړتیا په اړه لارښونه.
- له بېونی لیردونې او د لیردونو له نورو لارو څخه د ډاډ تر لاسه کولو لپاره د ناروغ د ولادت د پلان څیړنه

۹.۴ له ولادت څخه مخکې وینه راتلنه (Antepartum Hemorrhage)

تشریح

له ولادت څخه مخکې وینه راتلنه د ولادت له مجرا څخه د وینې راتلنې (د رحم له تگلوري څخه د رحم تر غاړې، مهبل او فرج پورې) د امیندواري له ۲۲ اونۍ څخه د ولادت تر مودې (د ولادت د زمان په گډون) پورې عبارت ده. د وینې راتلنې لامل کېدای شي د امیندواري (ولادي) پورې اړوند او یا غیر ولادي وي.

- ولادي سببونه او لاملونه
 - پلاستا پریویا - پلاستا یا جوړه په څه نا څه یا په بشپړه توګه د مور د رحم د غاړې په برخه کې غرس وي چې د رحم غاړه پوښوی (د رحم او مهبل تر منځ لاره) وینه راتلنه کېدای شي د امیندواري په هر وخت کې پېښه شي.
 - د جنین د جوړې یا پلاستا ژر جلا کېدل - د جنین له ولادت څخه مخکې له نورماله موقعیت څخه د پلاستا له جلا کېدو څخه عبارت ده، وینه راتلنه د ولادت پرمهال پېښېږي.
 - د رحم څیرې کېدل - د ولادت پرمهال وینه راتلنه احتیاط: د رحم څیرې کېدل یا تمزق په هغه صورت کې چې وینه د مهبل پرځای د بطن د جوف داخل او یا broad لیګامېنټ کې تخلیه شي، کېدای شي پرته له مهلبې وینې راتلنې څخه وي.
 - غیر ولادي سببونه او لاملونه
 - د رحم د غاړې پولېپ، خباثت، انټان یا ترضیض.
 - د وینې د لخته کېدو ناروغي (تحرې ناروغي)
 - پاملرنه: د وینې راتلنې د غیر ولادي لاملونو پیژندنه د ولادي وینې راتلنې د لاملونو احتمال په امیندواري ناروغه کې نشي ردولی.

تشخیص

- د امیندواري له ۲۲ اونۍ څخه وروسته د امیندواري میړمنې مهلبې وینه راتلنه دې تجزیه او تحلیل شي. پخوانۍ وینې راتلنې کېدای شي له رحم څخه د بهر حمل او یا د جنین د سقط له امله وي (۹.۵ برخه) [د جنین سقط د امیندواري په لومړیو کې مهلبې وینه راتلنه] او ۹.۶ برخه "له (رحم بهر امیدواره کېدل" دې مطالعه شي).
- د میړمنې عمومي وضعیت دې معاینه شي. شاک دې رد شي.
- پاملرنه وکړئ چې د بطن درد کېدای شي شتون ولري او کولای شي د رحم څیریدل یا له رحم څخه بهر حمل وښيي.
- د بطن ارزونه دې د رحم د اندازې، بڼې، د جنین د موقعیت او د جنین د زړه له اوازونو څخه د شواهدو په موخه دې تر سره شي.
- کېدای شي نارمل وي - د پلاستا پریویا او یا د پلاستا ژر جلا کېدل ځینې موارد.
- کېدای شي غیر نارمل وي - د رحم څیریدل، د پلاستا پریویا او د پلاستا ژر جلا کېدل ځینې موارد.
- احتیاط: مهلبې معاینه مه کوئ، د پلاستا پریویا په ځینو پېښو کې مهلبې معاینه کېدای شي د ډیرې وینې راتلنې لامل شي.

درملنه

له درملو پرته درملنه

- که چېرې میرمن په شاک کې وي، لومړی دې د ناروغي وضعیت ثابت (Stabilize) شي او بیا دې سملاسي ولیردول شي (۱۶.۹ برخه «شاک» او ۱۶.۹ د ج جدول دې مطالعه شي).
- له ولادت څخه مخکې د وینې راتلنې د ټولو پېښو لپاره، غوره اقدام یو روغتایي مرکز ته د ناروغ لیردول دي چې کولای شي د اړتیا په صورت کې د سیزارین عملیات تر سره کړي. که چېرې ناروغ په خوندي توګه نشي لیردول کېدای، په دې صورت کې دې ماشوم ته ژر تر ژره ولادت ورکړل شي.

د درملو په وسیله درملنه

- که چیرې په لیږدولو له برلاسې کېدلو څخه پرته د ماشوم ولادت ته اړ شو، په دې صورت کې دې د ولادت دردونه له Oxytocin سره تحریک او تنه شي (۹.۸ برخه "ولادت او له ولادت څخه وروسته څارنه" دې مطالعه شي).
- تر هغه وخته چې وینه راتلنه ودریږي د ورید په داخل کې د مایعاتو په وسیله د شاک درملنې ته دې دوام ورکړل شي.

لیږدول

- له ولادت څخه د مخکې وینې راتلنې د ټولو پېښو لپاره، غوره شوی اقدام دادی چې ناروغ دې د ارزونې او زیاتې درملنې په موخه یو روغتیايي مرکز ته ولیږدول شي.
- غوره ده د ناروغ د لیږدولو لپاره یو روغتیايي کارکوونکی اود امکان په صورت کې د وریدی انفیوژن سره د لیږدوی

وقایه

- د امیندواري په دوران کې هر ډول مهبلي وینه راتلنه غیر نورماله او باید جدي پاملرنه ورته وشي. هغه میرمنې چې حتی د کمې وینې راتلنې مخینه لري باید د التراسونډ لپاره ولیږدول شي چې کېدای شي پلاستا پرویو یا نوږې ستونزې تشخیص شي.
- د میرمنې د ولادت د پلان د یوې برخې په توګه له ولادت څخه مخکې د څارنو د کتلو په ترڅ کې، میرمن دې د لاندې نګلارو د پیژندلو لپاره وهڅول شي.
- روغتیايي مرکز ته د عاجلې او بیرنې لیږد رالیږد.
- هغه شمېر د کورنۍ غړي چې کولای شي په عاجلو او بیرنیو حالاتو کې وینه ورکړي.

۹.۵ سقط (د امیندواري په لومړیو کې مهبلي وینه راتلنه)(Abortion (Vaginal Bleeding in Early Pregnancy)

تشریح

- سقط د امیندواري له ۲۸ اونۍ څخه مخکې د جنین یا د حمل د نورو محصولاتو له بهر کېدو څخه عبارت دی. دا حالت په معمولي توګه د بطن له دردنو، مهبلي وینې راتلنې، د رحم له خلاصې غاړې او یا د جنین او د حمل د نورو محصولاتو یا دواړو له قسمي یا بشپړو وتلو سره مل وی.
- د سقط په ډولونو کې لاندې موارد شامل دي:
- ګواښل شوی (Threatened) سقط – لږ مهبلي وینه راتلنه، د رحم تړلې غاړه. اړتیا نه ده چې امیندواري ته د پای ټکی کېښودل شي.
 - نه ګرزدونکې سقط (Inevitable) – متوسطه وینه راتلنه، د رحم پرانیستې غاړه، بطني کرامپونه. امیندواري د پای ته رسیدو په حال کې وي.
 - نا بشپړ یا Incomplete سقط – وینه راتلنه، د وینې لخته کېدل او یا هم دواړه شتون ولري، د جنین ځینې برخې او د حمل محصولات مخکې وتلي او د رحم غاړه خلاصه وی.
 - بشپړ (Complete) سقط – وینه راتلنه، د وینې لختې شتون لري، جنین او د حمل ټول محصولات وتلي دي، او وینه راتلنه ورو او یا دریدلې ده او د رحم غاړه ثابته او تړلې وي.
 - پاتې شوی یا Missed سقط – د امیندواري له شلمې اونۍ څخه مخکې د رحم په داخل کې د جنین مړینه ښيي، چې په دې حالت کې د امیندواري اعراض بیرته ستیږي، وینه لرونکې پر له پسې مهبلي ترشحات شتون لري.
 - متن سقط (Septic) – چې له بد بویه مهبلي ترشحاتو، د خټې له درد او یا له حساسیت، او له 38°C څخه له لوړې تې سره یوځای وي؛ جنین کېدای شي شتون ولري یا بې ونلري، دا حالت کېدای شي رحم ته له زیان رسیدنې سره مل وي او کولای شي د یو اختلاط او عارضې په توګه د اېزارو او وسایلو د استفادې په پایله کې له غیر خوندي سقط سره مل وي.
- احتیاط: ناروغ دې سملاسي روغتون ته ولیږدول شي.

- له رحم څخه بهر حمل: له لاندې عواملو څخه دوه یا زیات: د بطن درد، کمزورتیا، الوتي رنگ او ډیره کمزورتیا. احتیاط: ناروغ دې سملاسي روغتون ته ولیږدول شي.

تشخیص

- د مياشتني عادت د خنډیدو د مودې د پوهېدو لپاره د ناروغ د تاریخچې ارزونه او یا پیژندل شوې امیندواري.
- که چیرې د امیندواري په لومړۍ نیمایي کې ناروغ مهيلي وینه راتلنه ولري، لاندې موضوعات دې په پام کې ونیول شي:
 - سقط (پورته دې د هغه ډولونه وکتل شي)
 - له رحم څخه بهر حمل - کېدای شي د نس له درد، د ملحقانو له کتلو او شاګ سره مل وي.
- د شاګ شواهد دې چک شي او که چیرې شتون یې درلود سملاسي دې درملنه وشي (۱۶،۹ برخه "شاګ" او د ج جدول، ۱۶،۹ دې مطالعه شي)
- د ټیونو او یا اجنبي جسمونو له پلوه د مهیل ارزونه
- د دې معلومول چې ایا د رحم غاړه خلاصه ده یا تړلې.
- د وینې راتلنې، د وینې د لخته کېدو او یا د امیندواري د محصولاتو د کچې ارزونه
 - "لږه وینه راتلنه" له پنځو دقیقو څخه زیات وخت نیسی چې کوتکس مرطوب شي.
 - "ډیره وینه راتلنه" له پنځو دقیقو څخه لږ وخت نیسی چې کوتکس مرطوب شي.
- د نس د درد لپاره معاینه
- که چیرې ناروغ د لمس په وسیله تود وي د تېې د اندازې معلومول
- په احتیاط د رحم د اندازې (د مناسبې نېټې لپاره) او adnexa ارزونه.
- د لابراتواري معایناتو تر سره کول
 - په شکمنو حالاتو کې د امیندواري معاینه.
 - د هیموګلوبین اندازه
- د وینې ډول او کراس مچ په هغه صورت کې چې د وینې د ورکولو لپاره اړتیا شتون ولري (د شاګ او یا د شاګ د احتمال په حالت کې).

درملنه

د درملنې لومړیتوب د شاګ د شواهدو پلټنه ده چې د شاګ د شتون په صورت کې دې سملاسي درملنه وشي (۱۶،۹ برخه "شاګ" او ۱۶،۹ ج جدول دې مطالعه شي). تل دې په میرمنه کې چې د مياشتني عادت خنډیدنه (Missed Period) او شاګ لري، له رحم څخه بهر حمل په پام کې ونیول شي (د مهيلي وینې راتلنې او د بطن له درد سره یا له هغه پرته) ۱۳،۹ برخه "له رحم څخه بهر امیندواري" دې مطالعه شي. او تل دې ناروغ د سپټیک سقط له پلوه معاینه او و ارزول شي (غیر فني سقط د رحم له لاسي مداخلو سره)

د درملنې موخې

- د رحم له بشپړ خالي کېدو څخه ډاډ
- د وینې راتلنې دریدل
- د Rhesus-isoimmunization وقایه
- د رواني پیاوړتیا برابرول (ناروغ ته مشوره ورکول)

له درملو پرته درملنه

- په ارزونې او د شاګ پر درملنې تمرکز، ناروغ ته مشوره ورکول او د اړتیا په صورت کې دې د رحم خالي کول تر سره شي (هغه هم په هغه صورت کې چې مناسب کارکونکي او امکانات شتون ولري).
- ګواښل شوی سقط

- وینه راتلنه دې له ۶-۴ ساعتونو پورې په کلینیک کې تر مشاهدې لاندې ونیول شي.
 - که چیرې وینه راتلنه نه کمیري ناروغ دې روغتون ته ولېږدول شي.
 - که چیرې وینه راتلنه کمه شوه، میرمنې ته اجازه ورکړئ چې کور ته لاړه شي او د څو ورځو لپاره ارام وکړي.
- ناروغ ته دې د روغتیا ساتنې په اړه په لاندې توګه لارښونه وشي.
 - د کوټکس یا ټوکر بدلول له هرو ۶-۴ ساعتونو پورې.
 - د عجان هره ورځ مینځل
 - تر هغه وخته چې وینه راتلنه ودریږي له جنسي اړیکو څخه ډډه کول
- ناروغ ته دې لارښونه وشي چې د خطر د لاندې نښو د پیدا کېدو په صورت کې دې ناروغ سملاسي بیا مراجعه وکړي.
 - د وینې راتلنې زیاتېدل
 - د دوه ورځو لپاره د وینې راتلنې دوام
 - مهلي بد بویه ترشحات
 - د بطن درد
 - تبه او ضعف
 - ګنګس والي او کمزورتیا
- د کورني تنظیم د نګلارو د کارولو په اړه ناروغ ته لارښونه
 - بشپړ سقط
 - له ځان څخه د څارنې په اړه ناروغ ته مشوره ورکول ("د جنین د سقط ګواښ" دې پورته مطالعه شي).
 - د وقایو اقداماتو ارزونه او څېړنه لکه د TT د معافیت حالت.
 - د اوسپنې او فولیت د بشپړوونکو تجویز (لاندې وګورئ).
 - ناروغ ته دې لارښونه وشي چې له دوه ورځو وروسته دې د تعقیبولو لپاره بیا مراجعه وکړي.
- نابشپړ یا نیمګړی سقط
 - که چیرې مناسب امکانات او کارکوونکي شتون ولري د حمل پاتې محصولات دې تخلیه شي.
 - که چیرې وینه راتلنه کمه یا متوسطه وي او امیندواري له ۱۶ اونیو څخه کمه وي د خپلو ګوتو څخه د امیندواري د هر ډول پاتې محصولاتو د لرې کولو په موخه چې د رحم د خولې له لارې بهر ته وتلي دي، استفاده وکړئ.
 - که چیرې وینه راتلنه زیاته وي او امیندواري له ۱۶ اونیو څخه کمه وي، رحم دې تخلیه شي.
- که چیرې کارکوونکي او مناسب امکانات شتون ونلري او یا که چیرې تاسو د رحم د خالي کولو وړتیا نلرئ:
 - د ورید د داخل مایعات پیل کړئ.
 - Ergometrine ۰.۲ ميلي گرامو په اندازه د عضلې د داخل لارې تجویز کړئ.
 - ناروغ ولېږدوئ.
- نه ګرځېدونکی سقط (Inevitable)
 - د جنین د وتلو څخه وروسته د رحم خالي کول
 - مناسب درمل دې تجویز شي (لاندې وګورئ)
- متنن سقط
 - که چیرې اړینه وي، د شاک درملنه دې وشي (۱۶.۹ برخه "شاک" او جدول ۱۶.۹ ج دې مطالعه شي)
 - د IV د یوې کرېنې تامینول او له دې لارې د مایعاتو تطبیق.
 - د درد لپاره دې پراسټامول تجویز شي. د معیاري دوز د مطالعې لپاره دې د الف په مل پاته کې الف ۱۵ جدول ته دې مراجعه وشي.
 - یو مناسب انټي بیوټیک دې د عضلې د داخل او یا د ورید د داخل له لارې تجویز شي (لاندې یې وګورئ)
 - ناروغ دې سملاسي روغتون ته ولېږدول شي.

- له رحم څخه بهر حمل:
 - که چیرې اړینه وي، د شاک درملنه دې وشي (۱۶،۹ برخه "شاک" او جدول ۱۶،۹ ج دې مطالعه شي)
 - د IV د یوې کرښې تامینول او له دې لارې د مایعاتو تطبیق.
 - ناروغ دې د جراحي عمل لپاره سملاسي روغتون ته ولیردول شي.
- د درملو په وسیله درملنه
 - د درملو په وسیله درملنه دې د اړتیا په صورت کې د سقط د ډول له مخې په پام کې ونیول شي (پورته رجوع وکړئ)
 - د شدیدو دردونو لپاره د درد ضد درملو تجویز
 - ۵۰ میلی گرامه Tramadol د عضلې په داخل یا IM کې زرق شي (په جامع روغتیایي مرکزونو او د ولسوالۍ په روغتونونو کې شتون لري)
- اويا -
 - Paracetamol. د معیاري دوز د مطالعې لپاره دې د الف په مل پاڼه کې الف ۱۵ جدول ته دې مراجعه وشي.
 - هغه وخت له یوه Oxytocic درمل څخه استفاده چې د حمل د محصولاتو د ویستلو لپاره رحمي تقلصاتو ته اړتیا وي (په نابینې یا نیمګړې سقط او یا هم په Inevitable سقط)، د رحم د وینې راتلنې یا دواړو د مخنیوي لپاره.
 - Oxytocin
 - ۰.۹ سلنه NaCl په یوه لیتر محلول کې ۴۰ واحد، په یوه دقیقه کې دې د ۳۰ څاڅکو په چټکتیا تطبیق شي.
- اويا-
 - د وینې راتلنې د درولو لپاره (د ټولو حملې محصولاتو له ویستلو څخه وروسته) - د عضلې د داخل یا IM د زرق له لارې ۱۰ واحد (یو امپول یو ملي لیتر)
 - که چیرې Oxytocin د وینې راتلنې مخنیوی ونشي کولای په هغه صورت کې:
 - د ورید د داخل د زرق له لارې ۰.۲ میلی گرامه Ergometrine تطبیق شي.
 - ناروغ دې ولیردول شي
 - احتیاط: Ergometrine له تجویز څخه دې د هغو ناروغانو لپاره چې د وینې لوړ فشار لري، ډډه وشي.
- د اوسپنې او فولیک اسید بشپړونکي دې تجویز شي.
 - که چیرې د ناروغ هیموګلوبین له ۱۱g/dl نه زیات وي په هغه صورت کې دې لاندې درمل تجویز شي:
 - Ferrous sulfate + Folic acid (۶۰ میلی گرامه iron + ۰.۴ میلی گرامه Folic acid) ۱ ټابلیټ په ورځ کې یو ځل د درې میاشتو لپاره.
 - که چیرې د ناروغ هیمو گلوبین په یوه ډیسي لیتر کې له ۱۱ گرامو څخه کم وي په هغه صورت کې دې لاندې درمل تجویز شي:
 - Ferrous sulfate + Folic acid (۶۰ میلی گرامه iron + ۰.۴ میلی گرامه Folic acid) ۲ ټابلیټه په ورځ کې د درې میاشتو لپاره.
- د سپټیک سقط لپاره دې انټي بیوټیک له لومړي دوز سره تجویز شي او بیا دې تر عمومي انسټیزۍ لاندې د رحم د ارزونې او یا تخلیې لپاره ولیردول شي.
 - Ampicillin دوه گرامه هر شپږ ساعته وروسته د ورید په داخل (یا IV) له لارې زرق شي.
- یا-
 - له Penicillin څخه د حساسیت په مواردو کې له Erythromycin څخه استفاده وشي. د معیاري دوز د مطالعې لپاره دې په مل پاڼه کې دې الف ۱۲ جدول ته مراجعه وشي.
- له -
 - Gentamicin سره چې دوز یې د بدن د یو کیلو گرام وزن لپاره ۵ mg / kg هر ۲۴ ساعتونو کې د ورید له لارې
- له-
 - د ورید د داخل له لارې ۵۰۰ میلی گرامه Metronidazole سره هرو اتو ساعتونو کې (د ولسوالۍ په روغتونونو

او CHCs کې شتون لري)

TT .

- د مېرمنې د TT د اېمونایزېشن د حالت معاینه کول.
- د اړتیا په صورت کې یا د نه تشخیص په صورت کې، ۰.۵ میلی لیتره TT د مې د عضلې په داخل کې IM زرق شی د TT د واکسین کارت او پروګرام ته په پاملرنې سره (۱۹ څپرکي "اېمونایزېشن" دې مطالعه شي).

لېږدول

- هغه ناروغان چې متنن سقط لري - د انټي بیوټیک د لومړني دوز له تجویز څخه وروسته د IV زرق او د شاک لپاره د درملنې تر سره کول
- هغه ناروغان چې د رحم تخلیې ته اړتیا ولري په هغه صورت کې چې کارکونکي یا مناسبې اسانتیاوې په واک کې نه وي.
- له رحم څخه د بهر حمل د شکمنډو په صورت کې - د ورید د داخل د زرقیاتو له پیلولو او د شاک د درملنې لپاره د ناروغ له چمتو کولو وروسته.
- پاتی شوي سقط
- هغه مېرمنې چې Rh (D) پې منفي دی - په ۷۲ ساعتونو کې د انټي Rh (D) اېمونوګلوبولین د ارزونې او درملنې لپاره (یوازې په ولایتي او سیمه ییزو روغتونو کې شتون لري)

وقایه

- له زیږون مخکې په خپل وخت څارنې د ملي لارښودونو د توصیه په پام کې لرلو سره.

ناروغ ته لارښوونې

- ناروغ ته د رواني پیاوړتیا او ملاتړ برابرول. په راتلونکې کې د نورماله امیندواري د ښه چانس د لرلو په اړه ناروغ ته ډاډ ورکول.
- د کورني تنظیم په اړه توضیحات. ناروغ ته دې لارښوونه وشي چې لږ تر لږه د شپږو میاشتو لپاره دې د حمل له اخیستلو څخه مخنیوی وکړي.
- ناروغ ته دې زده کړه ورکړل شي چې د تېې د پیدا کېدو یا د وینې راتلنې د دوام په صورت کې دې بیا مراجعه وکړي.
- د وینې د کموالي په پېښو کې دې ناروغ ته د اوسپنې او فولیک اسید بشپړونکي هره ورځ د درې میاشتو لپاره توصیه شي.

۹.۶ له رحم څخه بهر حمل (Ectopic Pregnancy)

تشریح

له رحم څخه بهر حمل هغه وخت پېښېږي چې القاح شوی تخمه د رحم د اندومتر له پوښښ څخه بهر په یو ځای کې ځای پر ځای شي. القاح شوی تخمه کېدای شي په نفیر او یا د بطن په جوف کې غرس شي. له رحم څخه بهر حمل باید په هره مېرمن کې چې د امیندواري عمر او د حوصلې درد ولري، پرې شکمن شو. له رحم څخه بهر د حمل پېښې په هغو مېرمنو کې چې له رحم څخه د بهر امیندواري مخینه، د حوصلې التهابي ناروغۍ، د (IUD) استعمال، د نفیرونو جراحي او یا عقامت ولري، لږ څه زیات وي.

له رحم څخه د بهر حمل لوی خطر د رحم څېرې کېدنه ده چې کولای شي د بطن په داخل کې د وینې راتلنې، شاک، او د مړینې لامل شي. له رحم څخه بهر څېرې شوی حمل یوه عاجله جراحي پېښه ده.

تشخيص

- د مياشتني عادت خنډېدل
- د اميندواري لومړنۍ نښې او اعراض
- د اميندواري مثبت ټسټ
- يادونه: په ادرار کې د اميندواري منفي ټسټ په حتمي توګه له رحم څخه بهر حمل نشي ردولی.
- د خيټې په ښکتنو برخو کې درد
- په ملحقاتو کې کتلې او يا د رحم د غاړې دردونه
- مهيلي وينه راتلنه (چې معمولاً خفيفه ده)
- شاک (له رحم څخه بهر حمل د څيرې کېدو په صورت کې) - کمزورتيا، خسافت، د شعور ژر ترېرېدونکي ضياع، تاكي کارديا، د وينې ټسټ فشار سره د ناڅاپي تيز اود چاقو وهلو په څير درد د Hypogastrium په برخه کې او د غزېدو پرمهال په اوږه کې څيرې کېدو ته ورته درد.

درملنه

د درملو په وسيله درملنه

د حياتي علايمو ارزول، د IV خلاصول او د وريد په داخل (IV) کې د مايعاتو پيلول، که چيرته تاسوله رحم څخه بهر په څيرې شوي حمل شکمن ياست. که چيرې ناروغ تاكي کارديا او يا د وينې ټسټ فشار لري د شاک درملنه دې وشي (۱۶،۹ برخه "شاک" او جدول، ۹.۱۶ ج دې مطالعه شي) او ناروغ دې روغتون ته وليږدول شي.

ليږدول

ټول درح څخه بهر اميندواري شکمن واقعات دی د مشاهدې او جراحي عمليات لپاره و ليږدول شی. له رحم څخه بهر څيرې شوی حمل يوه عاجله جراحي پيښه ده.

۹.۷ له وخت څخه مخکې ولادت (Preterm Labor)

تشرېح

له وخت څخه مخکې ولادت درح د منظمو تقلصاتو څخه عبارت ده چې د ۲۰ اونيو څخه وروسته او د ۳۷ اونيو څخه مخکې را مينځ ته شی او د رحم د غاړې د ليدېدو او د Effacement سره يو ځای وی. له وخت څخه مخکې ولادت د نوو پيدا شويو ماشومانو د مړينې اصلي لامل دی.

تشخيص

- ژر تر زړه تشخيص له وخت څخه د مخکې ولادت د اغيزمنې درملنې کلي ده. د خطر علايمو ته دې پاملرنه وشي:
- د لمس يا جس وړ تقلصات (په هر ساعت کې له څلورو څخه زيات)
 - اوبلن يا وينه لرونکي مهيلي افرازات
 - له دوه سانتي مترو څخه زيات د رحم د غاړې پراخېدل
 - له ۵۰ سلنۍ څخه زيات د رحم د غاړې Effacement

درملنه

له درملو پرته درملنه

- اجازه دې ورکړل شي چې د ولادت صفحې پرمختګ وکړي، که چيرې:
 - اميدواري له ۳۶ اونيو څخه زياته وي
 - د رحم غاړه له درې سانتي مترو څخه زياته پراخه شوې وي

- فعاله وینه راتلنه شتون ولري
- جنین په خطر کې اویا مړ وي
- انتان یا پري اکلامپسيا شتون ولري.
- له وخت څخه د مخکې ولادت د احتمال لپاره چمتو والی.
- که چیرې امیندواري له ۲۶ اونيو څخه زیاته وي، د Tocolytic درملو له تجویز سره دې د رحمي تقلصاتو د بندولو لپاره ولیردول شي.
- که چیرې امیندواري له ۲۶ اونيو څخه کمه وي، د Tocolytic درملو له تجویز څخه پرته دې ولیردول شي.

د درملو په وسیله درملنه

- د هغه درمل تجویز چې زیږون ودری (Tocolysis) د امیندواري په ۲۶-۳۶ هفتو کې. د درملنې لومړۍ موخه داده چې ولادت دې په کافي اندازه وځنډول شي (شاوخوا ۴۸ ساعته) تر څو سټروئید چې د ماشوم د سږو د ودې لامل کیږي، تجویز کړای شي. دې سټروئیدونو ته د امیندواري له ۳۴-۲۴ اونيو پورې اړتیا ده. له وخت څخه د مخکې د ولادت ځنډول میرمنې ته اجازه ورکوي خو د اړتیا په صورت کې هغه روغتیايي مرکز ته چې کولای شي تخصصي څارنې نارسیدلي پیداکېدونکي ماشوم ته برابرې کړي و لیردول شي.
- Salbutamol ټابلیټ لومړنی دوز له ۲ - ۵ میلی گرامه او له هغه وروسته دوه میلی گرامه هر اته ساعته وروسته له ۴۸-۷۲ راتلونکو ساعتونو پورې.

یا

- Nifedipine (۲۰ میلی گرامه ټابلیټ)، لومړنی دوز، ټول یو ټابلیټ د خولې له لارې یوځل او بیا له ۲۰-۱۰ میلی گرامه له هرو شپږو څخه تر اتو ساعتو وروسته له ۴۸-۲۴ ساعتونو پورې، او بیا ناروغ ولیردوي.
- احتیاط: که چیرې تاسو په ناروغ کې د پورتنیو تناسلي لارو په انتان شکمن یاست او یا که چیرې ناروغ له ۸۰/۱۲۰ څخه ټیټ فشار لري نو په دې صورت کې Nifedipine تجویز نه کړئ. Nifedipine د هغو میرمنو لپاره چې د زړه ناروغی لري مضاد استطباب ده او په هغو ناروغانو کې چې شکره یا څو ګونی حمل لري باید په احتیاط سره وکارول شي ځکه چې د سږي د اذیما خطر لري.
- د امینوتیک مايع د لیکاز په مواردو کې له انتان څخه د مخنیوي لپاره د انټي بیوتیک تجویز:
- Erythromycin Ethylsuccinate د خولې له لارې ۴۰۰ میلی گرامه هر اته ساعته وروسته له ۷-۵ ورځو.

یا

- Amoxicillin ټابلیټ ۵۰۰ میلی گرامه هر اته ساعته وروسته له ۷-۵ ورځو

یا

- که چیرې ناروغ د خولې له لارې درمل نشي تیرولی - زړقي Ampicillin - ۵۰۰ میلی گرامه ویال د عضلې د داخل IM د زړق له لارې هر اته ساعته وروسته.

لیږدول

ټول هغه ناروغان چې د خطر نېنې لري لومړی باید د ناروغ عمومي حالت ثبات پیدا کړي او بیا دې ولیردول شي:

وقایه

له ولادت څخه مخکې څارنې دې په معموله توګه اجرا شي (۹.۱ برخه "امیندواري او له ولادت څخه مخکې څارنې" دې مطالعه شي)

ناروغ ته لارښوې

- که چیرې درمل د ولادت د دردونو او د تقلصاتو په مخنیوي کې اغیزمن وي، ناروغ ته لارښوونه وکړئ خو د امیندواري تر پایه په کور کې استراحت وکړي، او د ناروغ کورنۍ وپوهوئ خو له ناروغ سره په دې موده کې

مرسته او ملاتړ وکړي.

- ډاډ تر لاسه کړئ چې مور بڼه مایعات اخیستي دي. ځانګړي څارنې دې د دوې په موسم کې په پام کې ونیول شي خو له دیهایدریشن (د ناروغ د اړتیا وړ د بدن د اوبو له لاسه ورکولو) څخه مخنیوی وشي.
- مور ته دې لارښوونه وشي چې د تقلصاتو د بیا پیلیدو په صورت کې دې بیا مراجعه وکړي.
- ډاډ تر لاسه کړئ چې مور د ولادت یو پلان د لیږد رالیدو او عاجلو څارنو لپاره د اړتیا په صورت کې د ولادت د مهال لپاره طرحه کړی دی.

۹.۸ ولادت او له ولادت څخه وروسته مراقبتونه (Delivery and Postpartum Care)

تشریح

نارمل ولادت د امیندواري د ۳۶ او ۴۰ اونيو ترمنځ تر سره کیږي. یو روغ ولادت له ولادت څخه مخکې د څارنو په دوران کې د کتنو د تر سره کولو په وسیله په ښه توګه حمایت او برابرېدای شي.

تشخیص

پر یوې امیندواري میرمنې د رحم د متناوبو تقلصاتو په صورت کې د Effacement او د رحم د غاړې د پراختیا سره چې زیاتره په وینو له ککړو مخاطي ترشحاتو (د وینې داغونو) سره وي باید د ولادت د دردوونو په پیلیدو شکمن شو.

نارمل ولادت د ولادت په درېو صفحو یا پړاوونو ویشل شوی:

- لومړی پړاو: د منظمو تقلصاتو له پیل څخه د رحم د غاړې تر ۱۰ سانتي متره (بشپړه) پراختیا یا Effacement پورې. منظم تقلصات هغه وخت پېښیږي چې ناروغ د ولادت لومړي پړاو ته داخل شي، چې هغه دوه نور پړاونه لري:
 - مخفي یا پټ پړاو: د رحم غاړه له ۴-۱ سانتي مترو پراخه وي.
 - فعال پړاو: چې د رحم غاړه له ۱۰-۴ سانتي مترو پراخه شوې وي. په فعال پړاو کې د منظم تقلص اصطلاح له ۳-۴ تقلصونو له ۳۰-۲۵ ثانیودوام له هرو لسو دقیقو څخه وروسته عبارت ده.
- دویم پړاو: د رحم د غاړې د لس سانتي مترو پراختیا څخه د ماشوم تر زیږیدنې پورې وي.
- درېیم پړاو: د ماشوم له زیږیدنې څخه د مل یا پلاستنا تر ولادت پورې وي.
- پاملرنه: د ولادت د پروسې نا سم تشخیص کولای شي د غیرې اړینو مداخلو او ویرې لامل شي.

درملنه

ټول هغه ناروغان چې د ولادت فعال صفحات لري باید له پارتوګراف سره یې څارنه وشي خو د اختلاطاتو مخنیوی وشي. ج مل پاته دې مطالعه شي.

د ولادت د پروسې او پړاوونو لپاره تیاریدل:

- د ناروغ تاریخچه او د ناروغ له ولادت څخه مخکې د معایناتو ریکارډ دې وکتل شي.
- له هغه چاپیریال څخه د ډاډ تر لاسه کول چې ناروغ په هغه ځای کې ولادت کوي، له پاکو او تعقیمو تجهیزاتو او وسایلو څخه د ډاډ تر لاسه کول او دا چې روغتیايي کارکونکو د ولادت د روغتیا ساتنې مناسبه تګلاره تعقیب کړې ده.
- اجازه ورکړئ چې میرمن هر ډول موقعیت چې د هغې لپاره ارامونکي وي وټاکي، ناروغ وهڅوئ چې د ولادت په اوږدو کې هر څومره چې غواړي وخوري او وخښي.
- میرمن وهڅوئ چې خپله مثانه ښه خالي کړي.

د ولادت د پړاونو د پرمختګ ارزونه

- لومړی پړاو: د Effacement او پراختیا لپاره وخت تر درې سانتي مترو (مخفي يا پټ پړاو) ورو دی او له هغه وروسته (په فعال پړاو کې) د منلو وړ لږ تر لږه چټکتیا سره په هر ساعت کې یوسانتي متر پراخیږل (په لومړیو امیدوارو کې له ۱۲-۸ ساعته او په څو ګونو کې له ۸-۶ ساعته).
- د جنین د زړه د ضربان څارنه او ارزونه دې په هرو ۳۰ دقیقو کې له Fetoscope سره وشي.
- د مور نبض دې هر ۳۰ دقیقې وروسته، د وینې فشار دې هر څلور ساعته وروسته او د حرارت درجه دې هر دوه ساعته وروسته چک شي.
- د تقلصاتو ارزونه په هرو ۳۰ دقیقو کې د دفعاتو شمیرل (شمېری يا Number په هرو لسو دقیقو کې) او دوام په ثابو کې.
- د رحم د غاړې د پراخیدو او Effacement د کچې، د ماشوم د بدن د غړو د موقعیت، د سر د موقعیت، د معتلنه غړي موقعیت او د افرازاتو د ډول د ارزونې په موخه هر څلور ساعته وروسته د مهلي معاینې اجرا کول.
- دویم پړاو: د ولادت د دویم پړاو دوام په اول باري مېرمنو کې له ۳۰ دقیقو څخه تر درې ساعتونو او په څو ګونو کې له ۳۰-۵ دقیقو وي. په دې پړاو کې، د جنین وتل دوام مومي تر دې چې معتلنه غړي د حوصلې سطحې ته ورسېږي. مېرمن به هم د فشار راوستل پیل کړي.
- د جنین د ښکته کېدو د ټاکلو په موخه لږ تر لږه په هر ساعت کې یوځل د مهلي معاینې تر سره کول.
- د جنین د زړه ضربان دې له هر تقلص څخه وروسته وڅارل شي.
- د ولادت د کنټرول او د عجان د ناحیې د څیړي کېدو د مخنیوي په موخه د سر او اوږې د ولادت پرمهال د عجان ناحیې ته د تقویه کولو برابرول.
- اېی زیتومي دې په لاندې مواردو کې په پام کې ونیول شي:
 - اختلاطي او پیچلی مهلي زیرون یعنې د ماشوم بریځ اعتلان، د Vacuum په وسیله ویستل، غټ ماشوم
 - د جنین ډیسټریس Fetal DiStress
 - پخواني ندبه
- دریم پړاو: د مل یا پلاستا جلا کېدل په عامه توګه د دویم پړاو له پای ته رسیدو وروسته له ۱۰-۲ دقیقو تر سره کیږي، مګر کېدای شي ۳۰ دقیقې وخت واخلي. د دې پړاو فعاله درملنه مرسته کوي څو له PPH څخه مخنیوی وشي او په هغه کې لاندې موارد شامل دي:
 - Oxytocin تجویز سملاسي ورسته له دې څخه چې ډاډ تر لاسه کړو چې څو ګونی حمل شتون نلري. د څو ګونو امیندواړیو په مواردو کې دې د وروستي ماشوم له ولادت څخه وروسته پرته له ځنډ څخه تجویز شي. د لس واحدو په اندازه د عضلې په داخل یا IM کې زرق.
 - د جېل سروی د ترکښ کنټرول. عجان ته نژدې د جېل سروی کلېمپ. هغه وخت چې رحم کلک او ګرد شي او یا جېل سروی اوږد شي، د جېل سروی ترکښ یا کشول دې په ښې لاس ترسره شي، او دا په داسې حال کې ده چې د رحم د غوړ یا فندس پیاوړي کول دې (معکوس یا په مخالف لوري ترکښ) په کین لاس تر سره شي. د نرۍ پردې د څیړي کېدو د مخنیوي لپاره مل یا پلاستا دې په دواړو لاسونو ونیسئ او هغه تر هغه وخته تاو کړئ چې پردې تاوې شي، او بیا هغه ورو کش کړئ. مل یا پلاستا باید وکتل شي څو ډاډ تر لاسه شي چې په بشپړه توګه وتلی دی.
 - د پلاستا یا مل له ولادت څخه وروسته دې، ناروغ په دقت سره وڅیړل شي، او ایډیټومي یا هر ډول څیړې کېدنه دې د اړتیا په صورت کې ترمیم شي.
 - د رحمي مساز تر سره کول. د مېرمنې د بطن له لارې د رحم د فندس مساز تر هغه وخته چې رحم متقبض شي. د رحم د مساز تکرار هر ۱۵ دقیقې وروسته د دوه لومړیو ساعتونو لپاره. ډاډ دې تر لاسه شي چې رحم دې د مساز له بندولو وروسته نرم (استرخا شوی) نشي.
- پاملرنه: په هغو حالاتو کې چې د ولادت د پړاونو په لومړي او دویم پړاو کې پرمختګ قناعت ښوونکي نه وي په دې صورت کې Oxytocin د ورید د داخل یا IV له لارې کېدای شي په لاندې توګه وکارول شي (یعنې

که چیرې تقلصات نامنظم یا کم دي):

- د ماشوم د نارملو موندنو څخه د ډاډ لپاره د ماشوم د اعتلان د وضعیت او موقعیت بیا ارزونه.
- که چیرې یوه روزل شوې دایه شتون ولري، د ولادت پروسه یا د ولادت د پړاونو پیل دې د Ringer lactate او یا Physiologic سیروم په ۱۰۰۰ میلی لیتره کې د لس واحدو Oxytocin سره د ورید د داخل د زرق یا IV له لارې په هره دقیقه کې د لس څاڅکو په چټکتیا تقویه شي. مطلوبو تقلصاتو ته د رسیدو لپاره (منظم تقلصات، یعنې په لسو دقیقو کې درې تقلصه، چې هر یو یې ۳۰ ثانیې دوام کوي)، تاسو کېدای شي د زرق چټکتیا اعظمي اندازې اتو څاڅکو ته په هره دقیقه کې ۳۰ څاڅکو ته زیات کړئ، تر هغه وخته چې یو ښه تقلص رامنځته شي (درې تقلصه په ۱۰ دقیقو کې او هر تقلص ۳۰ ثانیې دوام وکړي) او په ټولیزه توګه په هره دقیقه کې له ۵۰ څاڅکو څخه زیات نشي.
- احتیاط: د دوز د زیاتولو پرمهال د حالت څارنه وکړئ. که چیرې رحم له بریده زیات تنبه شو (یعنې له ۶۰ ثانیو څخه اوږد تقلص یا په هرو ۱۰ دقیقو کې له څلورو څخه زیات)، د اوکسي توسین زرقول دې ودرول شي.

له ولادت څخه وروسته څارنه (Postpartum Care)

له ولادت څخه په وروسته څارنه کې له ولادت څخه وروسته شپږ اونۍ شاملې دي. له ولادت وروسته بنسټیزې او سملاسي شپې (له ولادت وروسته لومړي دوه ساعته) د دواړو یعنې مور او ماشوم لپاره حیاتي دي. د دې مودې په ترڅ کې د مور حیاتي علایم دې په پرله پسې توګه وڅارل شي او وڅېړل شي. مهبلي وینه راتله او د رحم مناسب تقلصات دې معاینه شي.

- د دوه لومړیو ساعتونو په ترڅ کې په هرو ۱۵ دقیقو کې د حیاتي علایمو څېړل
- د دوه لومړیو ساعتونو په ترڅ کې په هرو ۱۵ دقیقو کې د رحم مساز
- مور دې سملاسي ماشوم ته د شیدو ورکول پیل کړي
- که چیرې مور او ماشوم ښه وي کېدای شي له شپږو ساعتونو وروسته د لاندې لارښوونو په وړاندې کولو سره مور رخصت شي:
- د مور د شیدو په وسیله دې تغذیې ته دوام ورکړل شي
- نوی پیدا شوی ماشوم دې تود وساتل شي
- ډیره غذا دې وځوري او ډیر مایعات دې وڅښي
- په کافي اندازه استراحت دې وکړي
- د کورنۍ برنامې تګلاره یا فامیلی پلاننګ دې پیل کړي
- د مور او نوي پیدا شوي ماشوم د ارزونې لپاره دې په لومړۍ اونۍ او بیا دې یوه میاشت وروسته مراجعه وکړي.

لیږدول

په ډېرو مواردو کې، هغه وخت چې یوځل د ولادت صفحات یا دردونه پیل شول، تاسو په کافي اندازه وخت نلرئ چې ناروغ ولیدوئ البته د لارې لیرې والي او روغتیايي مرکزونو ته لاسرسي ته په پاملرنې سره. که چیرې لیږدول په پام کې وي، دا کار باید په لومړني وخت کې تر سره شي. هغه شرایط چې باید د لیږدولو سره په پام کې ونیول شي په لاندې توګه دي:

- ډیره کوچنۍ میرمن او یا غټ ماشوم.
- د Malpresentation شواهد او یا د ماشوم غیر طبیعي وضعیت.
- د ډډا وړنه پرمختګ د ولادت د لومړي او دویم پړاو کې
- د ولادت اوږدمهاله پړاوونه. که چیرې له اتو ساعتونو وروسته رحمي تقلصات ځواکمن او زیات وي او د رحم د غاړې په پراختیا کې هېڅ ډول پرمختګ د امینوټیکې غشا له څیرېدنې یا پرته له څیرېدنې څخه نه وي، ناروغ دې سملاسي روغتون ته ولیدول شي.
- د امینوټیکې غشا څیرېدل د ولادت د دردونو له پیل څخه پرته.
- میګنونیوم داغونه

- د ولادت په لومړي او دويم پړاونو کې مهيلي وينې راتلنې.
- د جنين د ديستريس علايم (يعنې د جنين د زړه ضربان له ۱۲۰ څخه کم او يا له ۱۸۰ څخه زيات په يوه دقيقه کې).
- له ولادت څخه وروسته اوږدمهاله يا له حده زياتې وينې راتلنې يا PPH (۹.۹ برخه "له ولادت وروسته وینه راتلنه" دې مطالعه شي).
- د مل يا پلاستا نيمگړی او نابشپړ ولادت.
- د مور تبه
- په مهبل کې د کتنې وړ غيږيدنې، په فرج يا عجان کې درد لرونکی پرسوب (هيماتوم)، او يا دواړه.
- د رحم چپه کېدل يا د رحم Inversion.
- نورهر ډول جدي عوارض او اختلاطات چې په مور او ماشوم کې وليدل شي.
- يادونه: که چيرې غواړئ ناروغ وليردوئ د ناروغ ورید د IV د تطبيق په وسيله د امکان په صورت کې خلاص وساتئ، مور دې په کېن اړخ ځملي، او د شتون په صورت کې، ناروغ ته دې اکسيجن تجويز شي.

ناروغ ته لارښوونې

که چيرې د ولادت د لومړي پړاو له اتو ساعتونو څخه وروسته، تقلصات زيات نه شي، امينوتيکه غشا څيرې نشي او هيڅ ډول پرمختګ د رحم د غاړې په پراختيا کې شتون ونلري، هغه دی رخصت او توصیه وکړئ که چيرې درد او نارامتيا زيات شي او يا مهيلي وینه راتلنه او يا هم که چيرې امينوتيکه غشا څيرې شوه بيا دې مراجعه وکړي.

۹.۹. له ولادت څخه وروسته وینه راتلنه (PPH) Post Partum Hemorrhage

تشریح

له ولادت څخه وروسته وینه راتلنه د مهبل له لارې د ولادت پرمهال له ۵۰۰ ميلي ليتره وينې څخه د زياتې له لاسه ورکولو او يا په سزارين ولادت کې له يو ليتر د زياتې وينې له لاسه ورکولو څخه عبارت ده. دوه ډوله PPH عبارت دي له:

- مقدمه له ولادت څخه وروسته وینه راتلنه يا PPH primary (لومړنۍ)
 - له ولادت څخه وروسته د لومړيو ۲۴ ساعتونو په ترڅ کې پېښيږي.
 - کېدای شي د مل يا پلاستا احتباس، د اتونیک رحم، د ولادت د مجرا د تضيض او د وينې په لخته کېدل کې د اختلال (يعنې د وينې تحري ناروغۍ) له امله رامنځ ته شي.
- موخړه يا ځنډنې له ولادت څخه وروسته وینه راتلنه يا PPH secondary (دوهمۍ)
 - په ۲۴ ساعتونو کې له ولادت څخه وروسته تر شپږو اونيو پېښيږي
 - کېدای شي د پلاستا يا مل له احتباس او يا د انتان له امله رامنځته شي.

تشخيص

- د ناروغ بشپړه تاريخچه دې واخيستل شي، حياتي علايم دې ثبت شي او يوه فزيکي معاینه دې تر سره شي.
- د وينې راتلنې سببونه او لاملونه دې وپاتل شي، په خپل ذهن کې د ولادت څخه وروسته وینه راتلنې يا PPH څلور ت (T) په ياد ولرئ مقويت يا Tone، تضيض يا Trauma، نسجونه يا Tissue او ترومبين Thrombine (د وينې تحري ناروغۍ). ۹.۹ جدول وگورئ.

۹.۹ جدول. له ولادت څخه وروسته د مهبلي وینې راتلنې تشخیص

احتمالي تشخیص	هغه اعراض او علایم چې ځینې وخت شتون لري	هغه اعراض او علایم چې په وصفی ډول شتون لري
پوست رحم (Atonic Uterus)	• شاګ	• سملاسي PPH • رحم پوست یا نرم او تقلص یې نه دی کړی
د رحم د غاړې، مهبلی او یا عجان څیرې کېدل.	• مل یا پلاستا په بشپړه توګه ولادت کړی وی • رحم متقلص کړی وی	• سملاسي PPH
مل یا پلاستا احتباس شوی	• سملاسي PPH • رحم متقلص شوی	• جوړه یا پلاستا له ولادت څخه وروسته په ۳۰ دقیقو کې تولد شوی نه وی.
د مل یا پلاستا ځینې پارچې احتباس شوي.	• سملاسي PPH • رحم متقلص شوی	• د مورنۍ مل یا پلاستا یوه برخه ورکه شوې وی • له اوږدې سره امینوټیکه غشا څیرې شوې.
رحم سر چپه شوی Inverted uterus	• رحم سر چپه شوی چې په فرج کې ښکاري • سملاسي PPH	• د بطن په لمس یا جس کې رحم قاعده نه جس کیږي • لږ یا شدید درد
څیرې شوی رحم Ruptured uterus	• شاګ • حساس بطن • د مور چټک نبض	• سملاسي PPH • د بطن په داخل کې وینه راتلنه، مهبلي وینه راتلنه او یا دواړه • د بطن شدید درد چې کېدای شي له څیرې کېدنې وروسته کم شي
• د مل یا پلاستا احتباس • اتان	• بدلیدونکې وینه راتلنه (لږ یا ډیره، دوامداره یا نا منظمه) او بد بویه ده. • د وینې کموالی	• ځنډنې PPH، له ولادت څخه وروسته له ۲۴ ساعتونو څخه په زیاته موده کې پېښېږي. • له ولادت څخه د تېرې شوې مودې په پرتله له متوقع اندازې څخه لوی او پوست رحم.

له ولادت څخه وروسته د ژر وینې راتلنې (لومړنۍ) PPH درملنه

له درملو پرته درملنه

- مرسته واخلي. خپل ټول حاضر پرسونل په چټکۍ سره چمتو کړئ.

- که چیرې مل یا پلاستا نه وي وتلی، تر کشن یا د حبل سروې کنترول کړئ.
- که چیرې مل یا پلاستا وتلی وي په دې صورت کې رحم مساز کړئ.
- یادونه: که چیرې مل یا پلاستا وتلی وي او رحم متقلص یا قبض وي، ناروغ ته په Lithotomic موقعیت کې (د بڼې رڼا په شتون کې) د رحم د غاړې، مهبل د خیریدنې د شواهدو د ارزونې او یا د رحم د معاینې لپاره موقعیت ورکړئ.
- په چټکۍ سره دې د مور عمومي وضعیت و ارزول شي.
- که چیرې پر ناروغ د شاګ گمان کیږي، سملاسي دې درملنه پیل شي (۹.۱۶ برخه "شاګ" او) ۱۶.۹ ج جدول دې مطالعه شي.
- د هیموګلوبین د چک کولو لپاره د وینې استول او دوه واحده وینه د احتمالي تطبیق لپاره کراس مچ کړئ (که چیرې روغتیايي مرکز د دې کار د تر سره کولو وړتیا ولري)
- که چیرې د احتیاسي مل یا پلاستا د ویستلو لپاره د لاس په وسیله تر انستیزی لاندې امکانات شتون ونلري، نو د ناروغ د چټک لیردونې لپاره دې چمتووالی ونیول شي. د روغتیايي څارنو کارکوونکي باید له ناروغ سره تر روغتون پورې د دې لپاره چې د شاګ په درملنه کې وقفه پېښه نشي، ملتیا وکړي.

د درملو په وسیله درملنه

- د رحم د اتوني یا کمزورتیا او سستی په حالاتو کې، ۲۰ واحد Oxytocin په ۱۰۰۰ میلی لیتره Normal saline کې (په یوه دقیقه کې د ۶۰ څاڅکو) په سرعت په ورید کې تجویز شي. تعقیبي دوز، که چیرې ناروغ لا هم وینه راتلنه لري ۱۰ واحد Oxytocin په ۱۰۰۰ میلی لیتره Normal saline کې (په یوه دقیقه کې د ۳۰ څاڅکو) په چټکۍ تطبیق شي.
- پاملرنه: باید له درې لیتره (۳۰۰۰ میلی لیتره) او کسي توسین لرونکي مایعاتو څخه زیات د IV له لارې ناروغ ته تجویز نشي.

یا

- که چیرې وریدی IV مایعات شتون ونلري، لس واحد Oxytocin دې د عضلې د زرق IM له لارې یا د ورید د داخل د زرق IV له لارې تجویز شي. که چیرې ډیره وینه راتلنه لا هم دوام لري، د ۲۰ دقیقو له تیریدو وروسته بې تکرار کړئ.
- که چیرې د Oxytocin په وسیله درملنه بریالی نه وه، ۰.۲ میلی گرامه Ergometrine په ورو توګه د ورید د داخل IV د زرق یا د عضلې زرق IM له لارې تجویز کړئ. که چیرې ډیره وینه راتلنه بیا هم دوام پیدا کړي په دې صورت کې Ergometrine بیا د عضلې د داخل زرق IM له لارې له ۱۵ دقیقو وروسته اعظمي حد، مګر نه له پنځو دوزونو څخه زیات (ټول یو میلی گرام)، په تکراري توګه تطبیق شي.
- پاملرنه: له Ergometrine څخه دې د هغو کسانو لپاره چې د وینې لوړ فشار لري، ډډه وشي مګر دا چې ناروغ د شاګ په حالت کې وي.
- که چیرې پر ناروغ د شاګ گمان کیږي، سملاسي دې درملنه پیل شي (۹.۱۶ برخه "شاګ" او) ۱۶.۹ ج جدول دې مطالعه شي. د ورید د داخل د زرق یا IV د دویمې کرښې تر سره کول اړین دي.

لیږدول

- هغه مهال چې د لیږدولو وړ یو روغتیايي مرکز ته لاسرسی وي او ناروغ په خوندي توګه لیږدول کېدای شي، ټول ناروغان دې په لاندې حالاتو کې ولېږدول شي:
- هغه ناروغان چې د مل یا پلاستا د احتیاس یا تروما له امله د جراحي لپاره انستیزی ته اړتیا لري.
- هغه ناروغان چې د شاګ د درملنې لپاره د وینې لیږدولو ته اړتیا لري. هغه وکړي چې له لیږدولو مخکې وینه راتلنه ودرول شي او د شاګ درملنه وشي.

روغتیايي کارکوونکي باید د ناروغ ملتیا وکړي او د اړتیا په صورت کې پر ابهر فشار راوړل شي.

د ځنډنې (ثانوي) PPH درملنه

له درملو پرته درملنه

که چیرې ناروغ د ډیرې وینې د له لاسه ورکولو شواهد نښې، د هغې هیموګلوبین چټک کړی او دوه واحده وینه د احتمالي تطبیق لپاره کراس مچ کړی (که چیرې دا روغتایي مرکز د دې کار د تر سره کولو وړتیا ولري).

د درملو په وسیله درملنه

د خولې له لارې د انټي بیوټیکونو په وسیله د کمې وینې د له لاسه ورکولو درملنه

- Amoxicillin ۵۰۰ میلی گرامه هر اته ساعته وروسته د اوو ورځو لپاره.

یا

له Penicillin سره د الرژی اوحساسیت په مواردو کې د Erythromycin څخه استفاده وشي. د معیاري دوز د مطالعې لپاره دې په الف مل پاڼه کې د الف ۱۲ جدول ته مراجعه وشي.

له

- ۵۰۰ میلی گرامه هر اته ساعته وروسته د اوو ورځو لپاره.
- یادونه: له بریده زیات PPH باندې په اخته ښځو کې باید درملنه د اوسپنې په وسیله د درې میاشتو لپاره (۶۰ میلی گرامه Iron او ۰،۴ میلی گرامه Folic acid ټابلیټ) دوه ټابلیټه هره ورځ ورکړل شي.

لېږدول

- هغه میرمنې چې تر انستیزی یا بې هوښۍ لاندې د رحم معاینې او سونوګرافي ته اړتیا لري.
- هغه میرمنې چې په هغو کې د شدیدو انتاناتو اعراض او نښې شتون لري.
- هغه میرمنې چې په هغوی کې د وینې دلخته کېدو ناروغۍ علامې شتون ولري (د وینې دلخته کېدو یا کواګولوپاتي ناروغۍ)

وقایه

- د ولادت د دریم پړاو فعاله څارنه د PPH د پېښیدو رامنځته کېدل کموي.
- له رحمي مساز څخه ځټکه.
- د اړتیا په صورت کې د حل سروې ورو کښول.
- د ماشوم له پیدا کېدو وروسته د عضلې یا IM د داخل د زرق له لارې د لس واحده اوکسي توسین تجویز.
- د مل یا پلاست له بشپړ ولادت څخه ډاډ او د ولادت په دریم پړاو کې، کور ته د میرمنې له تللو څخه مخکې د رحم ښه مقویت.

ناروغ ته لارښوې

- ناروغ ته دې لارښوونه وشي څو د غیر نورمالې وینې راتلنې د پیدا کېدو په صورت سملاسي روغتایي مرکز ته مراجعه وکړي.

۹.۱۰ د نوي پيدا شوي ماشوم څارنه (Newborn Care)

تشریح

د نوي پيدا شوي ماشوم یا د هغه د نوي پيدا کېدو دوره د ژوند لومړۍ ۲۸ ورځې تعریف شوي دي. زیاتره د ماشومتوب د دورې مړینه (یعنې له یو کال څخه په کوچنیو ماشومانو کې) د همدې دورې په ترڅ کې پیښیږي، په ځانګړې توګه د ژوند په لومړیو ۲۴ ساعتونو کې. پلان جوړونه، څارنه او د نوي ماشومتوب د دورې په اوږدو کې په عاجلو او بیړنیو حالاتو کې څارنه او درملنه کولای شي د ماشومتوب په دوران کې د ماشوم پر پابښت او ژوندې پیدا کېدو د پام وړ

اغيز ولري.

د نوي پيدا شوي ماشوم په څارنه (Newborn care) کې د ژوند د لومړيو ۲۸ ورځو په اوږدو کې د اوتيا وړ يو لړ

مداخلې شاملې دي:

- له نوي پيدا شوي ماشوم څخه څارنه له هغو اړينو تگلارو څخه عبارت ده چې بايد د ټولو نويو پيدا شوو ماشومانو لپاره تعقيب شي.
- له نوي پيدا شوي ماشوم څخه اضافي څارنه له خطر سره د مخ کېدونکو نويو پيدا شويو ماشومانو لپاره له هغو تگلارو څخه عبارت ده چې بايد د لاندې مواردو په شمول تعقيب شي:
 - له کم وزن سره نوي پيدا شوي ماشومان (له ۲۵۰۰ گرامو څخه کم)
 - هغه نوي پيدا شوي ماشومان چې له ناروغو ميندو څخه زيږيدلي وي.
 - هغه نوي پيدا شوي ماشومان چې د شديدو اختلاطي او پيچلو ولادتونو په وسيله دنيا ته سترگې غړلې دي.
- له نوو پيدا شويو ماشومانو څخه عاجل او بيړنۍ څارنه (Newborn care emergency) هغه تگلارې دي چې د هغه نوو پيدا شويو ماشومانو لپاره تعقيبېږي چې يوه ناروغي يا اختلاط لکه د لاندې ډير معمول اختلاطات ولري:
 - آسفيکسيا
 - هيپوترميا
 - انتانات يا سپيس
 - زېړی
 - وينه راتلنه
 - د نوي پيدا شوي ماشوم په خوړو يا شيدو رودلو کې ستونزې
 - مورزادي يا ولادې بد شکلي

تشخيص

- د نوو پيدا شويو ماشومانو څارنه د زيږيدو پر مهال له يوې لومړنۍ ارزونې سره پيلېږي، او د ژوند تر لومړيو ۲۸ ورځو پورې دوام کوي. د هر نوي پيدا شوي ماشوم لپاره د اوتيا وړ څارنې اندازه دې وټاکل شي: اړين، اضافي او يا بيړنۍ.
- د دې موضوع د پيژندنې لوی لومړيتوب دا دی چې نوي پيدا شوي ماشومان بېرنيو څارنواو يا بيا احياً ته اوتيا لري (د ب مل پاڼه دې مطالعه شي). هغه کسان چې د خطر نېنې لري سملاسي مداخلو ته اوتيا لري، او هغه کسان چې د لاندې مسايلو په شمول د ژوند په لومړۍ اونۍ کې د لوړ خطر د پيښېدو، اختلاطونو او ستونزو د پرمختيا سره مخ دي:
 - کم وزنه نوي پيدا شوي ماشومان
 - زيات وزنه نوي پيدا شوي ماشومان
 - له يوې مل ناروغۍ او د اميندواړي په اختلاطونو له اخته ميندو څخه پيدا شوي ماشومان (د مثال په توگه، د وينې لوړ فشار، شکر، اکلامپسيا، د HIV وېروس)
 - هغه نوي پيدا شوي ماشومان چې د زيږيدو پر مهال د ولادت له يو اختلاطي خطر سره مخ وي.
- د نوو پيدا شوو ماشومانو د خطر په نېټو کې لاندې موارد شامل دي:
 - په تنفس کې ستونزې (د مثال په توگه، غير نورماله تنفس، د تنفس پر مهال په سينه کې غير نورماله ټنکته راتلنه يا Chest indrawing، Grunting په سا ويستلو کې، چټک تنفس)
 - احتياط: که چېرې تنفس په يوه دقيقه کې له ۶۰ څخه زيات يا له ۲۰ څخه کم وي دا د اندېښنې وړ يوه موضوع ده.
 - اختلاج، سپرم يا تشنج او يا د شعور له لاسه ورکول
 - سيانوز (د ماشوم د رنګ شين والی)
 - شخ والی يا نرموالی
 - تبه (يعنې هايپرترمي، او يا د 37.5°C د بدن د حرارت لوړه درجه) او يا هايپوترمي (يعنې له 36.5°C د بدن د حرارت ټيټه درجه)
 - د نامه له بند څخه وينه راتلنه

- غیر نورماله زیری چې د ولادت له دوه ورځو څخه مخکې راپیدا شوی وي او د طبیعت له پلو شدید وي.
- نیمگړې تغذیه
- نس ناستې
- دوامداره کانگې
- د نامه چرک یا د رنگ سوروالی او د سترگو یا جلد لوري ته د هغه خپریدل (یعنې لس جلدې پستولونه یا د جلد پړسوب، سوروالی او یا سختوالی)
- د نوو پيدا شوو ماشومانو د نامه د انتاناتو او یا تیتانوس لپاره ارزونه
- د منضمې د شدیدو التهاباتو لپاره ارزونه (Ophthalmia Neonatorum)
- د اطرافو او مفصلونو پړسوب
- خاسف یا آبی شونډې او ژبه

درملنه

- د لاندې مواردو د بنسټیزې ارزونې تر سره کول:
- د نوي پيدا شوي ماشوم له روغتیا څخه ډاډ
- د نوي پيدا شوي ماشوم د ځانگړو او تياو پېژندنه
- د مهمو اختلاطاتو پېژندنه
- د عاجلو او بېرنيو پېښو درملنه، د اړتیا په صورت کې دې نوی پيدا شوی ماشوم یو سمبال روغتیايي مرکز ته ولېږدول شي.

د درملو پرته درملنه

- د ټولو نوو پيدا شوو ماشومانو لپاره د خدمتونو او اړینو څارنو برابرول
- له یو پاک ټوکر سره د نوي پيدا شوي ماشوم وچول.
- د کافي تودوالي او د تودوخې د مناسبې درجې لرونکي چاپیریال برابرول د مور له جلد سره د نوي پيدا شوي ماشوم د جلد د تماس له تگلارې څخه په گټې اخیستنې سره.
- د ماشوم د پښې د لمس په وسیله په هرو څلورو ساعتونو کې په منظمه توگه د تودوخې د درجې ارزونه او څېړنه. د هاپیو ترمي د خطر نښې دې وڅیړل شي.
- د فعالیت کموالی او یا ضعیفیت
- نرم والی
- نا منظمه تغذیه
- کمزورې ژړا
- سطحي تنفس
- د مخ او جلد سور والی
- د نوي پيدا شوي ماشوم لمبول لږ تر لږه تر ۲۴ ساعتونو پورې وځنډوئ.
- په هغه خونه کې چې نوی پيدا شوی ماشوم ساتل کیږي د حرارت درجه یې باید 25°C وساتل شي.
- د نامه د بند لپاره د ښې څارنې برابرول
- د نامه د بند له څارنې څخه مخکې او وروسته خپل لاسونه و مینځی.
- هېڅ شی د نامه د بند په برخه کې مه ږدئ.
- د نامه له بند څخه د مخ ښکته برخه کې ډایپر وتړل شي.
- د نامه د بند برخې دې په ازاده توگه د پاک ټوکر په وسیله وپوښل شي.
- که چیرې د نامه بند خیرن ښکارېده، د پاکو اوبو او صابون په وسیله دې و مینځل شي او له پاک ټوکر سره د په بشپړه توگه وچ شي.
- دموږ د شدیدو په وسیله په چټکه توگه د تغذیې پیلول (له ولادت څخه وروسته د یو ساعت په ترڅ کې)

- سملاسي په خونه کې د پريښېدو لپاره هڅول (يعنې ماشوم دې له مور سره پاتې شي)
 - زيات څارنې دې د هغو ماشومانو لپاره چې له خطر سره مخ دي لکه څرنگه چې پورته تعريف شوې ده، برابر شي.
 - اضافي ملاتړ دې کلينيکي وضعيت، تغذيې او د تودوخې ساتنې ته له پاملرنې سره برابر شي.
 - د اميندوازي د روغتيا او له نوي پيدا شوي ماشوم څخه د څارنو د خدمتونو لپاره د ملي سټنډرډ مطابق، "د نوي پيدا شوي ماشوم د بېرني او عاجل څارنو د اړتيا وړ اتو عناصرونو" پر بنسټ نوي پيدا شوي ماشوم ته د عاجل مراقبت برابرول:
 - د نوي پيدا شوي ماشوم د خطر د نښو پېژندل (پورته رجوع وکړئ)
 - ناروغ ماشوم ته د باکفېته بېرنيو څارنو برابرول.
 - د اړتيا له مخې د نوي پيدا شوي ماشوم د بيا احيا لپاره د زمينې برابرول (ب مل پانه دې مطالعه شي)
 - د هايپوگليسمي ارزونه او درملنه
 - د مور د شيدو په وسيله د تغذيې د ثابتې برنامې ساتل (يعنې په ۲۴ ساعتونو کې لږ تر لږه اته ځله او د غوښتنې په صورت کې).
 - د پوزې او معدې د يو ټيوب په وسيله د ناروغو يا ډيرو کم وزن لرونکو نويو پيدا شويو ماشومانو لپاره د تغذيې د ملاتړ برابرول.
 - د نويو پيدا شويو ماشومانو له اسفکسي څخه څارنه
 - د نويو پيدا شويو ماشومانو د شديدو انتاناتو څارنه
 - د مننژيت، سپسېس، سينه بغل او د منضمې د شديد التهاب تشخيص.
 - احتياط: له وخت څخه مخکې ولادتونه زياتره له مورنيو انتاناتو سره مل وي، نو پيدا شوی ماشوم په دقت معاينه کړئ.
 - د نوي پيداشوي ماشوم څيړنه د تېتانوس له پاره وکړئ.
 - د نوي ماشومتوب د دوران له زېري څخه څارنه او څيړنه وکړئ.
 - شديد زېري په دوو لومړيو ورځو کې ښکاري او پرمختگ کوي.
 - فيزيولوژيک زېري په وصفې ډول د ژوند تر ۴-۳ ورځو د پام وړ نه وي او ډير کم وي.
 - په نوي پيدا شوي ماشوم کې د شديدې وينې راتلنې لپاره څارنه او ارزونه
 - د مورزادي يا ولادي سوشکلونو او نيمگړتياو له پلوه د نويو پيدا شويو ماشومانو ارزونه
- د درملو په وسيله درملنه**
- نويو پيدا شويو ماشومانو ته د بنسټيزو څارنو برابرول:
 - د نور مال وزن لرونکو نويو پيدا شويو ماشومانو لپاره وېتامين K (Phytomenadione) اميلي گرام د عضلې له لارې يوځل تجويز شي.
 - له زېړيدو وروسته د يو ساعت په ترڅ کې د سترگې څارنه برابره کړئ.
 - سترگې د پاک او وچ ټوکر په وسيله وچې کړئ او بيا سترگې د پاکو اوبو په وسيله و مينځئ.
 - يو سلنه Tetracycline مرهم په دواړو سترگو کې يوځل تطبيق کړئ.
 - پاملرنه: د شېدو په وسيله د نوي پيدا شوي ماشوم د سترگو، پوزې او غوړونو مينځل نه توصيه کيږي.
 - د ناروغ له رخصتيدو مخکې دې نوي پيدا شوي ماشوم ته واکسين پيل شي، د امکان په صورت کې، او تل د ژوند په لومړيو دوه اوبو کې (همدا راز ۱۹ څپرکي "معافيت" مطالعه کړئ).
 - د BCG واکسين
 - د OPV صفري واکسين
 - د هپايت B واکسين (د شتون په صورت کې)
 - احتياط: په نري رنځ له اخته ميندو څخه پيدا شويو ماشومانو ته بايد د BCG واکسين ونشي؛ د ډيري ارزونې لپاره دې مور او نوي پيدا شوي ماشوم د نري رنځ مرکز ته وليږدول شي.

- د شديدو شکمونو انتانا تو يا اختلاطاتو درملنه دې وشي: سپيسس، سينه بغل، منتزيت، د جلد يا د نامه د بند انتانات.
- د لومړۍ کړنې درملنه دې د انټي بيوتيک په وسيله پيل شي (د IMCI فلپ چارټ د نوي پيدا شوي ماشوم له زېږون څخه تر دوه مياشتو وگورئ) په عضله يا IM کې زرق:
- Ampicillin ۵۰ ميلي گرامه\د بدن د وزن پر هر کيلو گرام\دوزهر شپږ ساعته وروسته.
- له
- Gentamicin:
- د ژوند لومړۍ اونۍ ۲.۵ ميلي گرامه\د بدن د وزن پر هر کيلو گرام\ دوز، هر ۱۲ ساعته
- د ژوند له دويمې اونۍ څخه تر دوو مياشتو ۲.۵ ميلي گرامه\د بدن د وزن پر هر کيلو گرام\دوزهر اته ساعته وروسته.
- که چيرې د انټي بيوتيک د لومړۍ کړنې درملنې ته لاسرسی نه وي او يا اغېز ونلري، د شتون په صورت کې د انټي بيوتيک په وسيله د دويمې کړنې درملنې ته (يعنې د ولسواليو په روغتونونو کې) بدله کړئ.
- Ceftriaxone ۱۰۰-۵۰ ميلي گرامه\د بدن د وزن پر هر کيلو گرام\ په ورځ کې يو ځل.
- ناروغ وليږدوئ، که ليريدونه ناشونې وي انټي بيوتيک دې لږ تر لږه د پنځو ورځو لپاره تجويز شي.
- د جلدې پستولونو او د نامه د انتاناتو درملنه دې وشي.
- د پنځو ورځو لپاره هره ورځ درې ځله لاندې چارې تر سره کړئ:
- خپل لاسونه د پاکو اوبو او صابون په وسيله و مينځئ.
- په ارامه توگه قيح او خپرونه د جوش شويو سږو اوبو او صابون په وسيله و مينځئ.
- هماغه ساحه د يو پاک ټوکر په وسيله وچه کړئ.
- ساحه د جشن ويولټ په وسيله رنگ کړئ.
- بيرته خپل لاسونه و مينځئ
- په دوه ورځو کې بيا ارزونه
- که چيرې وضعيت له لومړي حالت څخه خراب شوی وي، ناروغ وليږدوئ.
- په هغه صورت کې چې وضعيت ښه شوی وي، مور ته پې و وايست چې په کور کې درملنې ته دوام ورکړي.
- د سترگې د انتاناتو درملنه دې وشي.
- د پنځو ورځو لپاره، هره ورځ له شپږ څخه تر اته ځله لاندې چارې تر سره کړئ:
- خپل لاسونه د پاکو اوبو او صابون په وسيله و مينځئ.
- له جوش شويو سږو اوبو سره د لوند پاک ټوکر څخه گټه واخلي.
- د ماشوم له سترگې څخه قيح په ارامه توگه له لوند ټوکر څخه په گټې سره پاکه کړئ
- هر اته ساعته وروسته په دواړو سترگو کې د يو سلنه تتراسيکلين مرهم تطبيق کړئ.
- بيا خپل لاسونه و مينځئ.
- په دوه ورځو کې بيا ارزونه
- که چيرې وضعيت ډير خراب شوی وي، ناروغ وليږدوئ.
- په هغه صورت کې چې وضعيت ښه شوی وي، مور ته پې و وايست چې په کور کې درملنې ته دوام ورکړي.
- د سترگې د منضې شديد او شکمن التهاب (Neonatorum ophthalmia) درملنه وکړئ.
- هر اته ساعته وروسته په دواړو سترگو کې د يو سلنه Tetracycline مرهم تطبيق.
- له-
- د سيستمیک انټي بيوتيکونو له تجويز سره: Ampicillin له Gentamicin سره (د انتاناتو درملنه پورته وگورئ).

ليږدول

- ټول نوي پيدا شوي ماشومان چې په هغو کې د خطر نښې څرگنديږي:
- له ليريدولو څخه مخکې دې د ناروغ د عاجلې درملنې او ثبات ساتنې زمينه برابره شي.
- ناروغ دې د امکان په صورت کې له يو روغتيايي کارکوونکي سره وليږدول شي.

- د لارې په اوږدو کې دې د نوي پيدا شوي ماشوم د تنفس د تقويه کولو، تود ساتلو او تغذيې په موخه څارنه په پام کې ونیول شي.
- د ډير کم وزن لرونکي ټول نوي پيدا شوي ماشومان دې (يعنې له ۱۷۵۰ گرامو څخه کم وزن) د تغذيې د پياوړي کولو او څارنې لپاره وليږدول شي.
- پاملرنه: يو شمير نوي پيدا شوي ماشومان چې وزنونه يې له ۱۷۵۰ څخه تر ۲۵۰۰ گرامه وي د بڼې تغذيې او د بدن د حرارت د درجې د ساتنې لپاره ليږدولو ته اړتيا لري.
- هغه نوي پيدا شوي ماشومان چې وينه راتلنه لري او يا هغوی چې د وينې اخيستو ته اړتيا لري، او يا هم دواړه حالتونه.
- هغه نوي پيدا شوي ماشومان چه شديد زېري لري او کېدای شي د وينې بدلولو ته اړتيا ولري.
- هغه نوي پيدا شوي ماشومان چې شکمن انتانات او يا سپيس وړی (د مثال په توگه تيتانوس او منژيت).
- هغه نوي پيدا شوي ماشومان چې ولادي يا مورزادي سوی اشکال لري د ارزونې او د درملنې د پلان جوړولو لپاره دې وليږدول شي.
- پاملرنه: ولادي سوی اشکال چې د ژوند گواښونکي نه وي (د مثال په توگه څيرې شوې شولې، Club foot) کېدای شي انتخابي ليږدونې ته اړتيا ولري.

ليږدول دې له ولادت څخه مخکې (ANC) څارنې او دولا دت د تاريخچې له يوې کاپي سره مل وي.

مخنيوی

- د يو روغ نوي پيدا شوي ماشوم حالت په مستقيمه توگه د مور د اميندواري له يو سالم وضعيت سره تړاو لري.
- د بڼې تغذيې، روغتيا ساتنې او روغتيايي څارنوپه وسيله له اميندواري څخه مخکې د روغتيا او سلامتيا څخه ډاډ.
- د کورني تنظيم او د اميندواريو او ولادتونو ترمنځ د واټن له رامنځته کولو څخه ډاډ.
- د معمولي او نورماله ويز ټپونو په شمول، د مور له مناسب ANC څخه ډاډ.
- د اوسپنې او فوليت د بشپړونکو تجويز.
- د وخت د غوښتنې سره سم د معافيت ساتنه.
- د عاجل او بېرني ولادت د يو پلان جوړول (۹.۱ برخه "اميندواري او له ولادت څخه مخکې څارنې" دې مطالعه شي).
- د اميندواري د هر ډول اختلاطاتو پيژندنه (د مثال په توگه، د وينې لوړ فشار، د وينې کموالی، اکلامپسيا، جنين ناسم وضعيت)
- له پاک او خوندي ولادت څخه د ډاډ تر لاسه کول (۹.۸ برخه "ولادت او له ولادت څخه وروسته څارنه" دې مطالعه شي).
- د مناسب ولادت څخه وروسته له څارنې څخه ډاډ تر لاسه کول چې په هغه کې عمومي تقويه، د اوسپنې او ويتامين A بشپړونکو شامل دي (۹.۸ برخه وگورئ).
- د اميندواري پرمهال د اړتيا په صورت کې، مور ته د جنسي اړيکو د انتاناتو د درملنې د زمينې برابرول.
- د لاندي مواردو په صورت کې د مور لپاره د انټي بيوټيکونو برابرول:
 - د پردی اوږد مهاله څيريدنه (له ولادت څخه مخکې له ۲۴ ساعتونو څخه زيات)
 - د پردی څيرې کېدل دوخت څخه د مخه (د اميندواري له ۳۷ اونۍ څخه مخکې څيريدل)

ناروغ ته لارښونې

- د مور د شېدو په وسيله لومړنی څانگړې تغذيې ته د ټولو نويو پيدا شويو ماشومانو لپاره د مور هڅول، د ماشوم د غوښتنې سره سم.
- د ټولو نويو پيدا شويو ماشومانو لپاره د واکسين د رژيم بيلول (EPI).
- د بدن د تودوخې د ساتنې، د روغتيا ساتنې (مينځل او حمام ورکول)، له انتان څخه وقايه او د نامه د بند څخه د

۹.۱۱ د مور د شېدو په وسیله د تغذیې په دوران کې د ټي د څوکې چاودل

څارنې د اساساتو څېړل او کتل.

- د نوي پيدا شوي ماشوم مور ته لارښوونه چې بايد نوی پيدا شوی ماشوم د شپږو ورځو لپاره لږ تر لږه هر شپږ ساعته وروسته تر څېړنې لاندې ونيول شي (غوره ده له ۲-۳ ورځو په ترڅ کې) او له زيږيدو وروسته له ۶-۴ اونيو پورې.
- نوم (نره) دې په سمه توگه له پورته څانگه شويو لارښوونو څخه په استفادې، پاک کړای شي. د نامه د بند د مراقبت لپاره دې له دوديزو ننگلارو او دوديزو درملو له کارولو څخه ډډه وشي.
- مشوره کول د هغه کسانو سره چې هغوی د اختلاطو لپاره تياری لري او سر پر سټي کوی او ډاډ تر لاسه کول چې دوی پوه شي چې څه وکړي:
 - د خطر نښې وپېژني.
 - په دې اړه بېړنۍ تصميم نيونې چې څه وخت او له کومه ځايه مرسته وغواړي.
 - د بېړني لگښت او ليږدولو لپاره د برنامې جوړول.

۹.۱۱ د مور د شېدو په وسیله د تغذیې په دوران کې د ټي د څوکې چاودل (Cracked Nipples during Breast feeding)

تشرېح

د ټي د څوکې حساسيت د مور د شېدو په وسیله د تغذیې له لومړۍ ورځې څخه يوه عامه ستونزه ده او په ټوليزه توگه هغه وخت پيلېږي چې ماشوم رودل پيلوي. څومره ژر چې شيدې جاري کيږي، د ټي د څوکې حساسيت اراميږي. دا حالت کولای شي له ټي سره د نوي پيدا شوي ماشوم د وضعیت د ناسم تماس په وسیله پيدا شي او يا هم مخکې له دې چې ماشوم د ټي د څوکې رودل پای ته ورسوي د ماشوم د لرې کولو په پايله کې، رامنځته شي. کانديدایا انتانات کولای شي د پام وړ فزيکي موندنو څخه پرته د ټي د څوکې د شديداو مزمن درد لامل شي.

تشخيص

- شديد درد
- چاودۍ يا Fissures چې کېدای شي د شېدو د نارمل ښکته راتلو مخنيوی وکړي.
- موضعي انتانات د چاودلی ځای پر شاوخوا کېدای شي د ټي د التهاب (Mastitis) لامل شي (۹.۱۲ برخه "د ټي التهاب او د ټي پلۍ" دې مطالعه شي).
- د تيونو حساسيت، پېسوب او تودیدل.

درملنه

د درملو پرته درملنه

- تود کمپرس دې پر سښې کېښودل شي او تطبيق دې شي.
- د ناروغ د حرارت د درجې ټاکل او له دې څخه ډاډ تر لاسه کول چې ناروغ تبه نلري.
- د مور د شېدو په وسیله د تغذیې دوام ته د مور هڅول.
- د مور د شېدو په وسیله د تغذیې ننگلاره وگورئ.
- ناروغ ته د سمې څارنې او له مور سره د کوچني د بشپړ تماس په اړه د زده کړې ورکول ("ناروغ ته لارښوونه او وقایه" دې لاندې مطالعه شي)
- تيو ته د فشار ورکولو او د تيو څوکو ته د شېدو د چټک جريان په اړه مور ته د زده کړې ورکول او دا چې هغه دې د شېدو ورکولو د دوه وختونو ترمنځ وچ کړي.
- مور ته په دې اړه لارښوونه چې له تغذیې څخه مخکې دې د لاس په وسیله د شېدو جريان چټک کړي. که چېرې د شېدو جريان په اخته لوري کې له کوچني څخه د پالنې پرمهال ډیر درد لري مور ته لارښوونه وکړئ څو د بل ټي په وسیله د ماشوم پالنه پیل کړي او په چاوداخته ټي دې د هوا جريان ته ونيسي څو (شيدې) ښکته راشي.
- په کمو وختونو کې، کېدای شي اړینه وي څو له اخته لوري څخه د شېدو ورکول په لنډمهاله توگه ودرول شي او

ټي د لاس يا د شېدو ویستونکي په وسیله خالي کړای شي.

د درملو په وسیله درملنه

- د درد ضد درملو تجویز:
 - Paracetamol. د معیاري دوز د مطالعې لپاره د الف په مل پاڼه کې دې الف ۱۵ جدول ته مراجعه وشي.
 - Ibuprofen ۲۰۰ میلی گرامه د اړتیا په صورت کې هر اته ساعته وروسته.
- د یو موضعي درمل تجویز:
 - د ویتامین A او D مرهم یا لانولین انهایدرس (که چیرې شتون ولري)، چې اړینه نه ده خو د ماشوم د تغذیې پرمهال پاک یا لرې شي.
 - که چیرې په کانډیډایزیس شکمن یاست، د Nystatin د قطري موضعي تجویز (۱۰،۰۰۰ IU/ میلی لیتره) هر اته ساعته وروسته دې د پنځو ورځو لپاره تطبیق شي.
 - د درملنې پرمهال مور ته زده کړه ورکړئ چې څه ډول په ناروغۍ له اخته ټي څخه د مور شیدې جاري شي او ماشوم د گیلاس په وسیله تغذیه شي، او د ماشوم مور باید د مور د شېدو په وسیله تغذیې ته له روغ ټي څخه دوام ورکړي.

ناروغ ته لارښوونې

- ډاډ تر لاسه کړئ چې د نوي پيدا شوي ماشوم او د مور د ټي ترمنځ تماس او موقعیت سم دی:
 - مور ته لارښوونه وکړئ چې څه ډول خپل نوی پيدا شوی ماشوم واخلې - او مور باید:
 - ډاډ دې ترلاسه کړي چې د نوي پيدا شوی ماشوم سر او بدن په یوه مستقیمه کرښه کې دي.
 - ډاډ دې تر لاسه کړي چې د ماشوم سر د مور له سینې سره مخامخ دی او د نوي پيدا شوي ماشوم پوزه د ټي د څوکې پر وړاندې ده.
 - د نوي پيدا شوي ماشوم بدن دې د مور بدن ته نږدې وي.
 - د نوي پيدا شوي ماشوم ټول بدن ته دې تکیه او ملاتړ ورکړل شي نه یوازې د هغه غاړې او اوږې ته.
 - مور ته دې لارښوونه وشي چې څه ډول له خپل ماشوم سره مرسته وکړي څو له مور سره نږدې تماس ولري.
 - د خپل ماشوم شونډو ته د خپل ټي له څوکې سره تماس ورکړي.
 - انتظار دې وکړي څو ماشوم خپله خوله بڼه خلاصه کړي.
 - مور دې خپل ماشوم په چټکۍ خپلې سینې ته نږدې کړي په دې توګه چې د ماشوم بڼکتنی شونډه د ټي تر څوکې لاندې راشي.
 - د نوي پيدا شوي ماشوم مور ته لارښوونه وکړئ چې له مور سره د ماشوم د بڼه تماس نښو ته پاملرنه وکړي:
 - د ټي د څوکې زیاته او نرمه برخه د نوي پيدا شوي ماشوم د خولې په پورتنۍ برخو کې د کتنې وړ وي.
 - د نوي پيدا شوي ماشوم خوله دې په بڼه او بشپړه توګه خلاصه وي.
 - د کوچني بڼکتنی شونډه دې بهر لوري ته وتی وي.
 - د ماشوم زړه دې د مور له ټي سره تماس ولري.
 - د نوي پيدا شوي ماشوم مور ته دې زده کړه ورکړل شي څو د خپل کوچني اغیزمنې رودنې نښو ته پاملرنه وکړي (ورو رودل، ژور او ځینې وخت له وقفې سره).
 - د نوي پيدا شوي ماشوم مور ته دې لارښوونه وشي چې که چیرې د ماشوم تماس یا هم شیدې رودل بڼه نه وي، په دې صورت کې دې د ماشوم مور بیا هڅه وکړي او تر هغه وروسته بیا ارزونه وکړئ.
 - که چیرې د نوي پيدا شوي ماشوم د مور تیونه ډېر ډک وي، مور ته دې وویل شي چې د شېدو په وسیله له تغذیې څخه مخکې خپلې یوه کمه اندازه شیدې وباسي څو د ټي د څوکې ناحیه نرمه شي او د نوي پيدا شوي ماشوم د بڼه تماس لپاره اسانتیا برابره کړي.

- د نوي پيدا شوي ماشوم مور ته دې لارښونه وشي څو د ټي او د ټي د څوکې روغتيا ساتنه په پام کې ونيسي څو د ټي د التهاب او انتاناتو مخنيوی وشي.
- مور ته دې زده کړه ورکړل شي او هغه دې وپوهول شي څو د مور د شيدو په وسيله تغذيې ته دوام ورکړي مګر په هغه صورت کې چې د مور د شيدو په وسيله د تغذيې د بندولو لپاره روښانه دليل شتون ولري.

۹.۱۲ د ټي التهاب او د ټي اېسی Mastitis and Breast Abscess

۹.۱۲.۱ د ټي التهاب يا Mastitis

تشرېح

ماستېټ د ټيو د التهاب په معنی دي. دا پېښه په اول باري مېرمنو کې رامنځته کېږي. معمولاً يوازې يو ټي زيانمنیږي. ستافيلوکوک د ټيو په التهاب کې د ناروغۍ تر ټولو زيات لامل دي.

تشخيص

- د ټي پړسوب
- د ټي سور والی
- د ټي حساسيت
- د ټي درد او تبه
- د ټيو د څوکو چاودل او وینه راتل

درملنه

د درملو پرته درملنه

- د استراحت توصیه
- مېرمن دې وهڅول شي څو له زيانمن ټي څخه نوي پيدا شوي ماشوم ته زياتې شيدې ورکړي، او د شېدو د کښلو له ځانګړي پمپ او يا لاس څخه په ګټې اخيستنې دې د ټي څخه شيدی واستل شي.
- د مور له ټي سره د نوي پيدا شوي ماشوم د تماس او سم موقعيت په اړه لارښونه (۹.۱۱ برخه «د مور د شېدو په وسيله د تغذيې پرمهال د ټي د څوکې چاودل» دې مطالعه شي).
- ټيو ته دې د سينه بند په وسيله تکیه ورکړل شي.
- د پړسوب او درد د کمولو په موخه د شېدو په وسيله د هرې تغذيې ترمنځ په ټي کې د سور کمپرس تطبيق.

د درملو په وسيله درملنه

- د انټي بيوتيکونو په وسيله درملنه
- ۵۰۰ میلی ګرامه Cloxacillin د خولې له لارې هر شپږ ساعته وروسته د لسو ورځو لپاره (د ولسواليو په روغتونونو او بشپړ روغتيا بې مر کرونو کې شتون لري).

يا

- Erythromycin له ۲۵۰ تر ۵۰۰ میلی ګرامه د خولې له لارې هر شپږ ساعته وروسته د لسو ورځو لپاره.
- د ټي او درد لپاره د مسکن تجویز:
- Paracetamol ۵۰۰ میلی ګرامه د خولې له لارې له ۶-۴ ساعته وروسته د درې ورځو لپاره او يا د اړتيا په صورت کې.
- ناروغ ته دې لارښونه وشي چې د درملنې له پيل څخه درې ورځې وروسته دې د درملو پر وړاندې له خواب څخه د ډاډ په موخه درملنه تعقيب شي.

پاملرنه: له انتاناتو پرته د ټي التهاب (یعنې د ټي د څوکې درد) معمولا د شېدود نه ورکولو یا د مورد شېدو په وسیله د تغذیه کولو ترمنځ د اوږد واټن له امله رامنځته کیږي او کومې ځانګړې درملنې ته هیڅ ډول اړتیا نلري.

لیږدول

لومړنۍ درملنې ته د ځواب نه ورکولو او یا د تشخیص شوي ټي د التهاب د بیا رامنځته کېدو په صورت کې دې ناروغ ولیدډول شي.

ناروغ ته لارښوونې

- د نوي پيدا شوي ماشوم لپاره د مور د شېدو په وسیله په منظمه لومړنۍ او پرله پسې توګه تغذیه (د شپې په ګلډون).
- تېوو ته له فشار ورکولو څخه ډډه.

۹.۱۲.۲ د ټي اېسي (Breast Abscess)

تشریح

د ټي اېسي یوه انتاني موضعي د ذوه ډکه ساحه ده چې د ټي په انساجو کې پيدا کیږي. دا حالت په یوه ښځه کې چې نوی ولادت یې کړی وي د ټي په څوکه کې د چاود یا تخریش له لارې د باکټریاو د برید او یرغل په وسیله، رامنځته کیږي.

تشخیص

- سره، کلک، پړسیدلي، درد لرونکي او تاوده ټي.
- تبه
- د ټي کتله په مختلفو بڼو او اندازو شتون لري (چې معمولا دا کتله د ټي څوکې ته نږدې یا د هغه پر شاوخوا موقعیت لري).
- کېدای شي په کتله یا د زیانمن ټي په څوکه کې افزازات شتون ولري

لیږدول

د ټي د اېسي ټولې پېښې باید د تشولو (درنډ) او د انټي بیوټیکونو په وسیله د درملنې په موخه روغتون ته ولیدډول شي.

وقایه

ژر تر ژره او پرله پسې شیدې ورکول.

۹.۱۴ درد لرونکی میاشتنی عادت (دیسمنوریا) (Dysmenorrhea)

تشریح

دیسمنوریا د میاشتنی عادت سره یوځای د بدن په ښکتنۍ برخه کې له متناوبو دردونو څخه عبارت دی (یعنې د میاشتنی عادت په دوران یا له هغه مخکې درد یا بریښ پيدا کیږي)

دیسمنوریا کېدای شی چې:

- لومړنۍ دیسمنوریا (Primary dysmenorrhea) – چې عضوي لاملونه یې نه دي پیژندل شوي.
- دویمۍ یا ثانوی دیسمنوریا (Secondary dysmenorrhea) – عضوي پیژندل شوي لاملونه یې په لاندې توګه دي:
 - د رحم د غاړې تنګوالی
 - د آندومتر پولیپ
 - د حوصلي التهاب

- د رحم فیروئید
- اندومترایوزس
- لوپ یا د رحم د داخل آله (IUD)

تشخیص

- د دقیقې روغتيايي تاريخچې اخیستل
- د حوصلې د معاینې په شمول د یوې فزیکي معاینې تر سره کول (هغه وخت چې مناسب روغتيايي کارکوونکي ته لاسرسی وي).
- په لومړنۍ دېسمنوریا کې د حوصلې معاینه نورماله وي.
- په دویمې (ثانوي) دېسمنوریا کې، شونې ده چې اختلال د حوصلې په معاینه کې پیدا شي.
- د نس د ښکتنې برخې راګرځېدونکي دردونه او له مياشتني عادت سره مل دردونه دې په دقت وڅیړل شي. او کېدای شي په اعراض او علايمو کې یې د شا درد، زړه بدوالی، کانګې، نس ناستی او د سر درد شامل وي.
- د حوصلې اولترا سونډ کېدای شي ځینی وخت یو عضوي لامل تشخیص کړي. د شونتیا په صورت کې ناروغ د التراسونډ د معاینې لپاره ولېږدوي.

درملنه

د درملو پرته درملنه

- ناروغ ته توصیه وکړئ څو د بطن ښکتنیو برخو ته تود ټوکر ورکړي (د مثال په توګه، د نس په ښکتنې برخه کې د تود شي اېښودل)
- ناروغې ته دې عاطفي ملاتړ برابر شي او هغې ته دې ډاډ ورکړل شي.

د درملو په وسیله درملنه

د لومړنۍ دېسمنوریا لپاره:

- د خفیفو مواردو لپاره دې لاندې درمل تجویز شي:
- Paracetamol ټابلیټ د اړتیا په صورت کې له ۳-۲ ورځو لپاره. د معیاري دوز د مطالعې لپاره په الف مل پاڼه کې الف ۱۵ جدول ته مراجعه وکړئ.

یا

- Acetylsalicylic acid (Aspirin) ټابلیټ ۵۰۰ میلی ګرامه هر اته ساعته وروسته، له ۳-۲ ورځو د اړتیا په صورت کې (تر هغه وخته چې درد آرام شي).
- له منځني څخه تر شدیدو مواردو دې لاندې درمل تجویز شي:
- Ibuprofen له ۴۰۰ - ۲۰۰ میلی ګرامه هر اته ساعته وروسته د ۲-۳ ورځو لپاره له خوړو یا وروسته له خوړو د مددی د تخریش د کمولو لپاره وکارول شي

لېږدول

- هغه میرمنې چې د دېسمنوریا لاملونه پکې پیژندل شوي وي (یعنې دویمې دېسمنوریا).
- هغه میرمنې چې د Ibuprofen له اخیستلو سره په کافي توګه نه ارامیږي او یا نشي کولای خپل نورماله فعالیتونه وساتي.

وقایه

- کم غوړه غذايي رژیم کېدای شي چې د دېسمنوریا له کمولو سره مرسته وکړي.
- په منظمه او منځنۍ کچه ورزش کېدای شي چې د دېسمنوریا له کمولو سره مرسته وکړي.

ناروغ ته لارښوونې.

- ناروغ دې وهڅول شي او هڅه دې وکړي خو د خپل ژوند نورمالو فعالیتونو ته دوام ورکړي.

۹.۱۴ د مهبل له لارې غیر نورماله وینه راتله (Abnormal Vaginal Bleeding)

تشریح

هغه وینه راتلنه ده چې د مېرمنو د عمر د نورماله شکل یا د میاشتنۍ عادت دورې یا دواړو د مقدار، مودې یا انټر وال څخه زیاته منځ ته راځي. لاملونه یې د ناروغې له عمر سره تړاو لري او دا چې ایا ښځه امیندواره ده او دا لاملونه یې عبارت دي له:

- نوی ماشومتوب او کوچنۍ والی
 - د فرج یا مهبل ترضیضي آفتونه (د مثال په توګه، ناڅاپي، پردی جسم او یا د وسایلو تطبیق، جنسي تیری).
 - د مهبل التهاب
 - ډیر کم، داخلېل ډلاری پرولیس، تومور
- مېرمنې او تنګې ځوانانې د ماشوم زیږولو په عمر ونه کې:
 - د امیندواري اختلالات.
 - هو رمونی اختلالات یا دا خلې رحمی د امیند واری مخنیوی
 - ترضیض یا تراوما: له مقاربت څخه راپیدا شوې څیریدنې، د وسایلو تطبیق، جنسي تیری.
 - اتنا نات یا التهاب د مهبل، دمهبېل دغاړی یا د حوصلې التهابي ناروغی
 - تومورونه
- د رحم د غاړې، اندومتر، مهبل، فرج، یا د تخمدانی سرطان؛ (Choriocarcinoma).
- سلیم فیروئیدونه
- غیروظیفوی رحمي وینې راتلنې (یعنې هغه وخت چې د اندومتر دیوال شدید او نامنظم پوست اچوی او غالباً د Anovulatory له سایکل سره یوځای وي) غیروظیفوي رحمي وینه راتلنه معمولاً د مياشتني عادت په زیاتوالي کې پېښیږي، په ځوانانو او له ۴۰ کلونو څخه په لویو مېرمنو کې پېښیږي.
- د میاشتنۍ عادت له درېدو وروسته مېرمنې (هغه مېرمنې دي چې د هغوی میاشتنۍ عادت له شپږو میاشتو یا له هغه زیاتې مودې څخه دریدلې وی).
 - د رحم د غاړې، اندومتر، مهبل، فرج، یا د تخمدان سرطان.
 - د استروژن په وسیله د درملنې بندول.
 - د مهبل د کو چنی کیدو التهاب او یا اندومتريت
 - تراوما: مقاربتې، پردی جسم او یا د یوې وسیلې تطبیق، جنسي تیری.

تشخیص

- د میاشتنۍ عادت، امیندواري، تراوما، او د نورو سیستمیکو اعراضو او علایمو په اړه د یوې تاریخچې اخیستل.
- د ماشوم زیږون د عمر په مېرمنو کې دې د امیندواري لابراتواري تېسټ تر سره شي.

درملنه

- د پیژندل شویو لاملونو او سپونو سملاسي درملنه وکړئ او بیا ناروغ روغتون ته ولېږدوئ.
- په امیدوارو ناروغانو کې دې له امیندواري څخه راپیدا شوي اختلالات وازوړل شي.
- د امیندواري په لومړیو کې (رحم له نامه څخه لوړ نه وي)
 - که چېرې وینه راتلنه زیاته وی (یعنې پد یا ټوکر له پنځو دقیقو څخه په کم وخت کې لوند یا مرطوب شي)

- په ورید کې دې یو کنول کېږدول شي او ناروغ ته دې په چټکۍ مایعات ورکړل شي.
- د عضلې له لارې دې ۰.۲ میلی گرامه Ergometrine تجویز شي.
- که چیرې وینه راتلنه دوام کوي د IM / IV له لارې دې Ergometrine ۰.۲ میلی گرامه بیا تطبیق شي.
- که چیرې تاسو د جنین په سپټیک سقط شکمن یاست، مناسب انټی بیوتیک دې ورکړل شي (۹.۵ برخه "د جنین سقط" [د امیندواري په لومړیو پړاوونو کې د مهبل له لارې وینه راتل] " دې مطالعه شي).
- روغتون ته سملاسي لیدول له دې امله چې غیر طبیعي وینه راتلنه کېدای شي د جنین د سقط منوراځي یا له رحم څخه د بهر حمل څرگندوی وي.
- د امیندواري وروستي پړاوونه (رحم له نامه څخه لوړ)
 - هر ډول وینه راتلنه خطرناکه ده.
 - احتیاط: مهلبې معاینه تر سره نه کړئ.
 - په ورید کې د یو کنول ایښودل.
 - که وینه راتلنه زیاته وي او یا ناروغ په شاک کې وي مایعات دې په چټکۍ تطبیق شي (۱۶.۹ برخه "شاک" او د ۱۶.۹ ج جدول دې مطالعه شي)
 - روغتون ته د ناروغ سملاسي لیدول له دې امله چې غیر طبیعي وینه راتلنه کېدای شي د پلاستا Praevia، د مل یا پلاستا د ژر جلا کېدو او یا د رحم د څیرې کېدو څرگندوی وي.
 - د ولادت په ترڅ کې، د ماشوم له ولادت څخه مخکې، د ولادت له د دردونو له پیل څخه له ۱۰۰ میلی لیټرو څخه زیاته وینه راتلنه.
 - احتیاط: مهلبې معاینه تر سره نه کړئ.
 - په ورید کې د یو کنول ایښودل.
 - که وینه راتلنه زیاته وي او یا ناروغ په شاک کې وي مایعات دې په چټکۍ تطبیق شي (۱۶.۹ برخه "شاک" او د ۱۶.۹ ج جدول دې مطالعه شي)
 - روغتون ته د ناروغ سملاسي لیدول له دې امله چې غیر طبیعي وینه راتلنه چې کېدای شي د پلاستا Praevia، د مل یا پلاستا د ژر جلا کېدو او یا د رحم د څیرې کېدو څرگندوی وي.
 - PPH (۹.۹ برخه "له ولادت څخه وروسته وینه راتلنه" دې مطالعه شي)

لیردول:

- د څیړنې او زیاتې درملنې لپاره د غیر طبیعي مهلبې وینې راتلنې ټول موارد.
- پاملرنه: که چیرې وینه راتلنه د امیندواري څخه د مخنیوي له امله وي ناروغ دې و نه لیردول شي. ناروغ ته دې توصیه وشي که چیرې وینه راتلنه یا د راتلونکي میاشتنی عادت په سایکل کې نور علایم بڼه نه شول بیا دې مراجعه وکړي.
- د اختلاطونو، لکه سرطانونو، تراوما او Metrorrhagia په صورت کې (غیروظیفوي رحمي وینه راتلنه).

وقایه او ناروغ ته لارښوونې

- له ولادت څخه مخکې معمولو څارنولپاره امیدوارو ناروغانو ته لارښوونه.
- ناروغ دې وپوهول شي په هغه صورت کې چې وینه راتلنه زیاته یا په راتلونکي میاشتنی سایکل کې نور علایم بڼه نه شي، بیا دې مراجعه وکړي.

۹.۱۵ د میاشتنی عادت له درېدوڅخه وروسته وینه راتلنه (پوستمینوپاز) (Postmenopausal Bleeding)

تشریح

مینوپاز له ۴۵-۵۱ کلنۍ څخه ورسته د میاشتنی عادت له درېدو څخه عبارت دی. د میاشتنی عادت له درېدوڅخه وروسته یا Postmenopause د میاشتنی عادت څخه وروسته د ژوند یو پړاو دی چې باید د میاشتنی عادت له درېدو څخه

وروسته هیڅ ډول مهيلي وینه راتلنه پېښه نشي.

PMB یا له میاشتنی عادت له درېدو څخه وروسته وینه راتلنه، هغه وینه راتلنه ده چې د امینوریا له ۱۲ میاشتو څخه وروسته د منځني عمر لرونکې یوه میرمنه کې پیښیږي. PMB زیاتره کېدای شي چې د پتولوژیکو ناروغيو له امله پېښه شي او باید تل په جدي توګه تر څیښې لاندې ونیول شي. PMB د وقایې وړ نه ده.

PMB په دوه برخو ویشل کیږي:

- له نسایي پرته لاملونه لکه اکروجنس هورمونونه یا انټي کواګولانتونه.
- نسایي لاملونه په لاندې توګه دي:
 - له تراوما یا له هغه پرته مهيلي اتروفي
 - آندومتر هایپرپلازي (په چاغو میرمنو کې ډیره عامه ده).
 - د آندومتر پولیپ
 - د اندومتر سرطان او د تناسلي سیستم نور سرطانونه

تشخیص

- د یوې دقیقې تاریخچې اخیستل ډیر مهم او حیاتي دي.
- کله ناکله هیماجوریا (په ادرار کې وینه) یا له مقعد څخه وینه راتلنه کېدای شي له PMB سره بې تیرونه وشي.
- په کلینیکي معاینه کې باید د بطن معاینه شامله وي او د بطني کتلو د پیدا کولو په موخه اجرا شي.
- د سپیکولم په وسیله باید یوه معاینه تر سره شي ځکه په دې توګه د اتروفیک وازینیت ارزول کېدای شي او د رحم د غاړې د پولیپ، مهيل یا فرج تومورونه رد شي.
- د مهيل نری نسج او سور والی (Patchy reddening) د مهيل د اتروفي نښې دي. هڅه وکړئ څو د تراوما له امله د مهيل هر ډول څېړېدنه څرګنده کړئ (د مثال په توګه له مقاربت وروسته وینه راتلنه).
- په یاد ولرئ چې اتروفیک مهيل نور لاملونه نه رډوي. یوه دقیقه تاریخچه تاسو ته مهم معلومات درکوي، د مثال په توګه په دې اړه چې آیا ناروغ باندېني هورمونونه اخلي او یا بې اخیستي وو (د مثال په توګه د هډوکي د پوچوالي یا Osteoporosis د درملنې لپاره).

که چیرې لامل یې باندېني هورمونونه نه وي، یا د مهيل د اتروفي په صورت کې، ناروغ روغتون ته ولیردوئ.

درملنه

- باندېني هورمونونه دې ودرول شي.
- د مهيل د اتروفي لپاره د مهيلي Estrogen موضعي تجویز لکه په هر ګرام کې ۰.۶۲۵ میلی ګرامه Estradiol په ۴۲.۵ ګرامه تیوب کې (په EML یا اساسي درملو په لست کې نشته)
- له دې امله چې PMB کولای شي د اندومتر د سرطان لومړنۍ نښه وي، ناروغ پرته له ځنډه روغتون ته ولیردوئ.

ناروغ ته لارښوې

- د تناسلي سیستم د روغتیا ساتنې رعايتول.
- له چاغېدو څخه ډډه. د یو سالم وزن ساتل د PMB چانس کموي.
- له نورو خوړو څخه برسیره د میوو او سبو د ډولونو خوړل.
- د هر PMB په اړه دې رپوټ ورکړل شي. PMB باید په جدي توګه تر څیښې لاندې ونیول شي، دې ته له پاملرنې پرته چې وینه راتلنه کمه یا ډیره کمه او ډیره څرګنده نه ده.

تشرېح

د حوصلې التهابي ناروغۍ (PID) د ميرمنو د پورتنۍ تناسلي دستگاه د انتاناتو لپاره يوه عامه اصطلاح ده (يعنې د رحم پوښښ، نفيري ټيوبونه، تخمدان او يا د حوصلې نور غړي). د حوصلې التهابي ناروغۍ کېدای شي حاد (د حوصلې د انتاناتو حاد پيل) يا مزمن (د حوصلې له درد، د درد لرونکو مياشتنيو دورو او د جنسي اړيکې پرمهال درد) وي.

PID کېدای شي د جنسي اړيکو له لارې منتقل شي، چې د ښکتنو تناسلي لارو د مايکرو ارگانيزمونو او يا د جنسي اړيکو له لارې ليرېدونکي انتان يا (STI) پورې اړوند اورگانيزمونو (لکه غير هوازي باکټرياکاني، سوزاک، کلاميديا) اويا له ولادت يا جنين له سقط څخه وروسته رامنځته شوي انتان له امله منځ ته راځي. PID کېدای شي داخلا طي پريتونيټ، ايسې، سپټيمي، د حوصلې د مزمو دردونو، له رحم څخه بهر د اميندواړه کېدو د خطر د زياتوالي يا شنې توب لامل شي.

تشخيص

د حوصلې په التهابي ناروغيو زياتره اخته ميرمنې يا دا چې هيڅ ډول اعراض يا علايم نلري او يا درملنه نه کوي. ځينې ناروغان کېدای شي لاندې نښې وښيي:

- د نس په لاندني برخه او د حوصلې په برخو کې درد يا حساسيت چې کېدای شي له تېې، تودوالي يا کانگو سره مل وي.
- د مهبل يا د رحم له غاړې څخه له غير نورمال بوي او رنگ سره افرازات.
- د مياشتني عادت کرامپونه
- د مياشتني عادت نا منظمه وینه را تلنه
- ستونزمن ادرار کول يا درد لرونکي ادرار
- د جنسي اړيکې پرمهال درد (Dyspareunia)

که لاندني علايم د پورته اعراضو د يوه يا زياتو سره مل وي د انتان احتمال شتون لري:

- د رحم د غاړې خوزيدونکي درد
- د ادينکس حساسيت
- د ادينکس يا حوصلې کتلې (د ټيوبونو او تخمدانيو ايسې)

PID بايد په لاندې ناروغانو کې رد شي:

- له رحم څخه بهر څېرې شوی حمل (۹.۶ برخه "له رحم څخه بهر حمل" دې مطالعه شي)
- د کولمو التهاب يا اېسه
- پريتونيټ
- اينديسيټ
- د تخمدان د سيست تورژن (تاويدل) يا څېريدل (۱۶.۲ برخه "د نس حاد درد" دې مطالعه شي)

درملنه

د درملو پرته درملنه

- ناروغ دې د اميندواړي له پلوه معاينه شي. د مياشتني عادت تا ريڅخه اخيستل، په ادرار کې د اميندواړي د ټسټ تر سره کول.
- O ټولې اميندواړي ناروغانې چې د حوصلې درد لري بايد د اميندواړي د اختلاطاتو او يا د اميدواړي په دوران کې

PID د ارزونې لپاره د وليردول شي.

- ناروغانې له ولادت وروسته کېدای شي د مل یا پلاستا احتباس او یا د ولادت نور اختلالات ولري.
- که چېرې لوپ یا IUD یا د رحم په داخل کې آله ولري، هغه لرې کړئ.
- د هایدريشن برابرو او د بدن د اوبو د له لاسه ورکولو او د دېهایدریشن مخنیوی.
- د جنسي اړیکو له لارې لیرېدونکې انتان یا (STIs) د شواهدو ارزول (لکه کانديديازيس، مېهلي التهاب، یا تناسلي ټپونه او یا زخې)

د درملو په وسیله درملنه

خفيف حالتونه د خولې له لارې د انټي بيوتيکونو په وسیله تر درملنې لاندې ونیسئ. شديد موارد يې د IV يا د وريد د داخل له لارې تر درملنې لاندې ونیسئ او ناروغ روغتون ته وليردوئ.

• انټي بيوتيک تجويز کړئ

○ Doxycycline (۱۰۰ ميلي گرامه کپسول). دمعیاری دوز د مطالعې لپاره د الف په مل پانه کې د الف ۱۰ جدول ته مراجعه وشي.

پاملرنه: Doxycycline دې امیدواره او شېدو ورکونکو مېرمنو ته تجويز نشي.

له

○ Metronidazole ۵۰۰-۴۰۰ ميلي گرامه هر اته ساعته وروسته لس ورځې

• د اړتیا په صورت کې د ټپي او درد ضد درمل:

○ Paracetamol د معیاری دوز د مطالعې لپاره د الف په مل پانه کې د الف ۱۵ جدول ته مراجعه وشي.

لیردول

- ټولې امیندواري (مشکو کې)، له ولادت وروسته، یا له سقط وروسته ناروغانې.
- هغه مېرمنې چې شدید ناروغي لري یا هغوی چې د خولې له لارې د درملو اخیستل نشي زغملای.
- هغه ناروغانې چې د مهل له لارې غیر طبیعي وینې راتلې لري.
- هغه ناروغانې چې لوړه ټبه (له ۳۹ درجې سانتي گراد څخه لوړه) یا سېسټمیا لري.
- د حوصلې په اېسې یا پریټونیت شکمنېدل - د جراحي مشورو لپاره.
- په هر وخت کې د اعراضو او علایمو پرمختګ او یا د ۴۸ ساعتونو په ترڅ کې د خولې له لارې د درملنې له پیل څخه وروسته نه روغېدل.

وقایه او ناروغ ته لارښوونې

- د جنسي اړیکې له لارې د لیرېدونکو انتاناتو (STIs) د خپریدو په اړه او له کانډم څخه د ښې اخیستنې د ټینګار په اړه دې ناروغ ته لارښونه وشي.
- ناروغ ته دې لارښونه وشي چې د تعقیبولو لپاره دې بیا مراجعه وکړي. که چېرې له ۴۸ ساعته درملنې څخه وروسته هېڅ ډول ښه والی نه وو رامنځته شوی ناروغ روغتون ته ولیردوئ.
- ناروغ ته دې لارښونه وشي څو د روغېدو څخه د ډاډ لپاره د درملنې د دورې په پای کې او د انتاناتو له مینځه تلو څخه د ډاډ په موخه له درملنې څخه څلور اونۍ وروسته کلینیک ته مراجعه وکړي.
- مېرمنې ته توصیه وکړئ څو د هغه خاوند هم تر درملنې لاندې ونیول شي. د مېرمنې خاوند ته لاندې درمل تجويز کړئ:
- Ciprofloxacin ۵۰۰ ميلي گرامه واحد دوز (په جامع روغتيايي مرکزونو CHCs او DHS يا د ولسواليو په روغتونو کې شتون لري)

له

○ Doxycycline ۱۰۰ ميلي گرامه هر ۱۲ ساعته وروسته د اوبو ورځو لپاره.

• له ناروغ سره دې د درملنې د تعقیبولو، د جنسي اړیکې (STIs) له لارې د لیرېدونکو انتاناتو د خطر د کمولو او د

جنسي اړیکو له لارې لیریدونکي انتان يا (STIs) او PID له لارې د لیریدونکو انتاناتو څخه راپیدا کېدونکو اختلاطاتو په اړه مشوره وکړئ.

- د ناروغ سره دې د شخصي او تناسلي روغتیا ساتنې په اړه مشوره وشي.

۹.۱۷ عقامت (Infertility)

تشریح

عقامت د یوې ښځې او خاوند د ماشوم د زیږولو نه قابلیت دی چې په منظمه توګه د جنسي اړیکو له لرلو سره سره او له امیندواري څخه د مخنیوي د هر ډول تګلارې د نه کارولو سره د یوه کال په ترڅ کې هڅه کوي او غواړي ماشوم ولري. لومړنی عقامت هغه دی چې مېرمن هېڅ کله امیندواره شوې نه وي او ثانوي عقامت هغه دی چې مېرمن په تیر وخت کې امیندواره شوې وي. په امیندواره کېدو کې ستونزه د نارینه د اړوندو فکتورونو یا د مېرمنې د اړوندو فکتورونو او یا هم د دواړو د ترکیب په پایله کې وي.

تشخیص

ناروغان د یوه کال په موده کې د ماشوم له نلرلو څخه شکایت کوي. د عقامت اړوند هر شکایت ته باید جدې پاملرنه وشي ځکه ښځې لاملونه کولای شي که چیرې په لومړیو کې تشخیص شي په اسانۍ یې درملنه وشي. تل دې مېرمنې او خاوند ته ډاډ ورکړل شي چې د عقامت د ډیرو لاملونو درملنه کېدای شي، مګر د دې لاملونو د ځینو برخو درملنه کېدای شي شاوخوا له (۶ - ۱۲ میاشتو) وخت ونیسي.

په ښځه کې:

- د مهمل غیر طبیعي افرازات او د حوصلې د التهابي ناروغیو احتمال چک کړئ. د هر ډول شکمنو انتاناتو مناسبه درملنه وکړئ. تل دواړه، ښځه او نارینه په یوه وخت کې تر درملنې لاندې ونیسي (۹.۱۶ برخه "د حوصلې التهابي ناروغی" دې مطالعه شي).
- وېلنې چې آیا په مېرمنې کې د تخمې آزادېدل شتون لري. د غیر طبیعي وېنې راتلنې د هر ډول مخینې او یا د نامنظم میاشتنۍ عادت په اړه پلټنه وکړئ: که چیرې تاسو په میاشتنۍ غیر منظمې وېنې راتلنې مشکوک شوی، په دې صورت کې مېرمن یوه نسايي متخصص ته د ډیرې څیړنې لپاره ولېږدوئ.
- که چیرې مېرمنې د میاشتنۍ دورې له درېدونکي حالت څخه شکایت لري، په اندومتريوزس شک وکړئ او ناروغه یو نسايي متخصص ته ولېږدوئ.
- دهر ډول جراحي مداخلو (هم نسايي او هم بطني) په اړه په تېر وخت کې له ناروغې څخه پوښتنه وکړئ

په نارینه کې:

- د احلیل او خصیو اناتوميک اختلالات دې وڅېړل شي. که چیرې کومې ستونزې شتون درلود، ناروغ دې د درملنې لپاره ولېږدول شي.
- د خصیو په کڅوړه کې دې متوسع وریدونه چک شي (Varicocele). که چیرې شتون یې درلود د جراحي عمل لپاره دې ولېږدول شي.
- د احلیل او د پروستات یا دواړو انتانات دې چک شي. د هر ډول مشکوکو انتاناتو مناسبه درملنه دې وشي. تل دې دواړه یعنې ښځه او خاوند په یوه وخت کې تر درملنې لاندې ونیول شي.
- د خصیو دیغوب (Mumps) د مخینې یا په تېر وخت کې د ټپونو یا د خصیو د نورو التهاباتو په اړه پوښتنه وکړئ.

په دواړو کې:

- هغه حالات چې شونې دي په کاذبه او منفي توګه د طبیعي میراني (Fertility) د بدلیدو لامل شي چک یې کړئ

لکه: عمر، روحي فشار، پې وزلي، د خوړو نا متعادل رژيم، سپورتي زده کړې يا درانه فزيکي فعاليتونه، زيات وزن لرل او يا کم وزن لرل، سگرېټ کښل، د نشه يي توکو کارول، د حشره وژونکو او سرب له زهرې چاپيريال سره مخ کېدل، ځينې درمل، او يا د سرطاني ناروغيو درملنه د شعاع او کيموتيراپي په وسيله.

- په دقت هڅه وکړئ خو پيدا کړئ چه آيا مناسب جنسي عمل (Intercourse) د القاح کېدو اجازه ورکوي، که دا ډول نه وي، مېرمنې او خاوند ته يې مناسبه لارښونه وکړئ. برسېره پردې دا موضوع دې هم وڅېړل شي چې ايا جنسي اړيکې د سایکل په مناسب دوران يعنې په مېرمنې کې د مياشتني عادت د وروستۍ ورځې له لومړۍ ورځې څخه وروسته له ۱۰ - ۱۷ ورځو پورې تر سره کيږي.

درملنه

د درملو پرته درملنه

د سالم ژوند د تگلارو په اړه دواړو مېرمنې او خاوند ته د عمومي توصيو وړاندې کول:

- د اړتيا په صورت کې د سمې جنسي اړيکې په اړه مشوره
- مېرمنې او خاوند ته توصيه:
- د روحي فشار پيدا کونکو شرايطو، حالاتو او فعاليتونو څخه ډډه کول.
- د هر ډول نشه يي توکو له کارولو څخه ډډه کول (لکه تنباکو، چرس، ترياک)
- د يوه متعاده غذايي رژيم خوړل
- د روغتيا ساتنې د غوره شرايطو رعايتول

د درملو په وسيله درملنه

د ټولو مشکوکو انتاناتو درملنه (۹.۱۶ برخه "د حوصلې التهاې ناروغۍ" دې مطالعه شي)، او د دواړو لورو درملنه يعنې هم مېرمنه او هم خاوند بايد په يوه وخت کې تر درملنې لاندې ونيول شي.

لېږدول:

ټولې نا حل شوې عقامتي ستونزې دې يو نسايي متخصص او Andrologist (د نارينه و د تناسلي دستگاه متخصص) ته ولېږل شي.

ناروغ ته لارښونې

- درملنې ته د پام نېولو پرته، مېرمنې او خاوند ته دې توصيه وشي خو له درملو پرته پورته درملنې تعقيب کړي، او يوځای کېدو ته دې په منظمه توگه دوام ورکړي، اوځپل دليږدونې مشوره تعقيب کړي.
- هغوی ته ډاډ ورکړئ چې د ډيرو عقيمو ازواجو درملنه کېدای شي، مگر کېدای شي دا حالت يوه اندازه وخت واخلي.
- د امکان په صورت کې د مېرمنې او خاوند د کورنۍ غړو ته توصيه وشي خو د دې ستونزې په اړه د روحي فشار د رامنځته کېدو لامل نشي.

لسم څپرکی د تغذیې او وینې ناروغۍ NUTRITIONAL AND BLOOD CONDITIONS

۱۰۰۱ د وینې کموالی (Anemia)

تشریح

د وینې کموالی په وینه کې د هیموګلوبین د کچې له ټیټوالي څخه عبارت ده چې د وینې د سرو حجراتو د کیفیت یا کمیت له کموالي سره څرګندېږي. د وینې د سرو حجرو د شمېر کموالی کېدای شي د لاندې مواردو په پایله کې رامنځته شي.

• د تولید کموالی

- د اوسپنې، فولیت یا دواړو او ویتامین B_{۱۲} د تغذې کموالی، چې د هیموګلوبین په تولید کې هغوی ته اړتیا ده.
 - خوار ځواکي - د خوراکي موادو کموالی د وینې د کموالي ډیر معمول لامل دی.
 - امیدواري (۹.۲ برخه «د امیدواری په دوران کې د وینې کموالی دې مطالعه شي»
 - مزمن سیستمیکي ناروغۍ.

- د هډوکي د مغز د تولید کموالی (لوکیمیا او یا نورې ناروغۍ)

○ اتان

○ خراب جذب.

- د تخریب زیاتوالی (هیمولیز)

○ ملاریا

○ انتانات (ویروسي باکتریايي)

- د درملو غبرګونونه (د مثال په توګه، Primaquine, Co-trimoxazole, CytoToxics، یا د مشتقات (Nitrofuran)

○ Hypersplenism، د انزایمونو کموالی.

- د وینې ضایع کېدل.

○ پرازیتي انتان (د مثال په توګه چنګکي چینجي، Whipworm)

○ دوینی ضایع کېدل په میا شتنی عادت کې له ډیرې وینې را تلنې یا زیرون سره

○ په مزمنه توګه د وینې له لاسه ورکول، د معدې او اثنا عشر له تپ څخه راپیدا شوې ناروغۍ، بواسیر، یا د کولمو سرطان.

تشخیص

د وینې د کموالي اعراض او علائم د هغه د مزمنوالي او شدت د درجې له مخې توپیر لري.

- د وینې خفیف کموالی کېدای شي کومه نښه ونلري. په عمده موندنو کې کېدای شي لاندې موارد شامل وي:

○ الوتی رنگ - منضمه، مخاطي غشا او د نوکانو بستر.

○ سټیا، د اشتها نشووالی، د سږښت نه زغمل.

○ د سر درد او ګټګس والی.

- د وینې شدید کموالی (په هر ډیسي لیتر کې له ۷ ګرامه څخه کم هیموګلوبین HB) چې د لاسونو په ورغوي کې د رنگ له شدید خسافت سره مل وي، دا حالت کېدای شي په سالتډۍ او د زړه د عدم کفایې لامل شي (۶.۲ برخه "د زړه د عدم کفایې برخه دې مطالعه شي" دې مطالعه شي)

- د وینې د کموالي لپاره تعریف شوي ارزښتونه د عمر او جنس له مخې توپیر لري، په ټولیزه توګه په ماشومانو کې په هر ډیسي لیتر کې له لس ګرامو څخه کم (له ۲۸ هیماتوکریټ سره سمون لري) او په لویانو کې په هر ډیسي لیتر کې له ۱۲ ګرامو څخه کم (له ۳۲ هیماتوکریټ سره سمون لري) د وینې د کموالي تعریف دی. (۱۰.۱ الف جدول دې مطالعه شي)

۱۰۰۱ الف جدول. د هیموگلوبین اندازه د خلکو لپاره دوینی کموالی تعریفوی

د عمر یا جنس گروپ	د هیموگلوبین اندازه د خلکو لپاره دوینی کموالی تعریفوی (گرام/ ډیسی لیتر)
له ۶ - ۵۹ میاشتنی ماشومان	< ۱۰.۰
له ۵ - ۱۱ کلن ماشومان	< ۱۱.۵
له ۱۲ - ۱۴ کلن ماشومان	< ۱۲.۰
له ۱۵ کلنی څخه لویې غیر امیدواری میرمنې	< ۱۲.۰
امیدواری میرمنې	< ۱۱.۰
له پنځو کلونو څخه لوی سړي او هلکان	< ۱۳.۰

منبع: WHO، یونیسف، UNU (۲۰۰۱)؛ په DHS کې کارول شوي ارزښتونه

درملنه

له درملو پرته درملنه

- د ماشوم د تغذیې ارزونه او د تغذیې په اړه د ماشوم له مور یا پالونکي سره مشوره. که چیرې ماشوم په تغذیه کې ستونزه لري په دې صورت کې دې ماشوم د پنځو ورځو لپاره تعقیب شي (د IMCI فلیپ چارټ دې وکتل شي).
- داوسپنی لرونکی یو غني غذايي رژیم ته لکه غوښې، غلو، حبوباتو، سبزیجاتو، مېوو او ټول اوسپنه لرونکو موادو استفادی ته هڅول، مګر د Heme ډول اوسپنه د Non-heme د اوسپنې پرته په اسانۍ جذبېږي. (د ۱۰۰۱د ب جدول دې وکتل شي)

۱۰۰۱ ب جدول: د اوسپنې خوراكي سرچينه

د اوسپنې سرچینې	د اوسپنې اندازه (په هرو ۱۰۰ گرامو کې یو ملي گرام)
د اوسپنې د Heme منابع	
ینه (څگر)	۷-۲۱
سره غوښه	۱-۳.۵
هګی	۲
شیدې (وچې، چې غوړ یې اخیستل شوی وي)	۰.۴
د اوسپنې Non Heme منابع	
ږدن	۸-۳.۸
حبوبات	۱.۹-۱۴
وچه میوه	۰.۶-۶.۸
ډوډی	۱.۷-۲.۵
شنه سبزیجات	۰.۴-۱.۸
وریجی	۰.۵

د درملو په وسیله درملنه

- د وینې د کموالي د هر ډول لاملونو درملنه لکه، د انتان، چینجیو، ملاریا یا مزمنو ناروغیو (له پنځو کلونو څخه د کوچنیو ماشومانو لپاره دې د IMCI فلپ چارټ وکتل شي).
- د اوسپنې مرستندویه تجویز کړئ: Folic acid او Ferus sulfate.
- د درملو اندازه دې لکه چې د ۱۰.۱ ج په جدول کې، د وینې د کموالي د مخنیوي لپاره د اوسپنې بشپړونکي ښودل شوی، دوه برابره شي. دا دوه برابره دوز باید د وینې په تائید شوي کموالي کې د درې میاشتو لپاره ورکړل شي.
- په امیدوارو میرمنو او نویو پیدا شویو ماشومانو کې (یعنې له یو کال څخه په کوچنیو ماشومانو کې) د درملو په وسیله دا درملنه باید د وقایوي مکمل رژیم په وسیله لکه څرنګه چې په ۱۰.۱ ج جدول کې ښودل شوی دی، تعقیب شي.
- که چېرې یو ماشوم له شدیدې خوارخواکۍ سره مخ وي پر هغه د وینې د سخت کموالي شک وشي. له دې سره سره، د اوسپنې د ټابلیټ اخیستل باید تر هغه وخته چې بیا د ماشوم اشتها پیل او ماشوم وزن واخلي، یعنې عملاً د غذايې د حالت له بیا احیا څخه ۱۴ ورځې وروسته، وختېدل شي.

۱۰.۱ ج جدول. د اوسپنې د کموالي له امله د وینې د کموالي د مخنیوي لپاره د اوسپنې د بشپړونکي د برنامې او تګلارې دوز

عمر	مشخصات	اندازه	دوام
د نویو پیدا شویو ماشومانو زیږون له ۲۵۰۰ گرامو څخه په کم وزن	نړیوال بشپړونکی	اوسپنه: ۲ میلی ګرام/د بدن د وزن پر هر کیلو ګرام/هره ورځ	له ۲ – ۲۳ میاشتني عمر
له ۲۳-۶ میاشتني ماشومان له نورمال وزن سره	په هغه ځای کې چې خوراکي رژیم له اوسپنې څخه بهای شوی خواړه نلری یا په هغه ځای کې چې د وینې د کموالي خپریدل له ۴۰ سلنې زیات وي.	اوسپنه: ۲ میلی ګرامه/د بدن د وزن پر هر کیلو ګرام/هره ورځ	له ۲۳-۶ میاشتني عمر
له ۲۴ – ۵۹ میاشتني ماشومان	په هغه ځای کې چې د وینې کموالی ۴۰ سلنه خپور وی	اوسپنه: ۲ میلی ګرامه /د بدن د وزن پر هر کیلو ګرام/هره ورځ تر ۳۰ میلی ګرامه	درې میاشتی
د ښونځي د عمر وړ ماشومان (>۶۰ میاشتنې)	په کوم ځای کې چې د وینې د کموالي خپریدنه له ۴۰ سلنې زیاته ده.	Iron: ۶۰ میلی ګرامه/ په یوه ورځ کې Folic acid: ۰.۴ میلی ګرامه په یوه ورځ کې.	درې میاشتنی
د امیدواری په عمر کې مېرمنې	په کوم ځای کې چې د وینې د کموالي خپریدنه له ۴۰ سلنې زیاته ده.	Iron: ۶۰ میلی ګرامه/ په یوه ورځ کې Folic acid: ۰.۴ میلی ګرامه په یوه ورځ کې.	درې میاشتنی

امیدواري میرمنې	د اوسپنې نړیوال بشپړونکی	Iron: ۶۰ میلی گرامه/ په یوه ورځ کې Folic acid: ۰.۴ میلی گرامه په یوه ورځ کې.	له امیدواري څخه وروسته زر تر زره پیلیري - مگر نه له درې میاشته څخه په زیات وخت کې او د پاتې امیدواري لپاره دې دوام ورکړل شي.
په شېدو ورکونکو مېرمنو کې	په هغه ځای کې چې د وینې کموالی ۴۰ سلنه خپور شوی	Iron: ۶۰ میلی گرامه/ په یوه ورځ کې Folic acid: ۰.۴ میلی گرامه په یوه ورځ کې.	له ولادت څخه درې میاشتې وروسته

منبع: یونیسف، د ملګرو ملتونو پوهنتون، WHO ۲۰۰۱

لیردول

- د وینې د کموالي نامعلوم لاملونه
- د وینې د شدید کموالي اعراض او علایم (د مثال په توګه، سنکوپ، د زړه درزیدل او سالتېډي).
- امیدواره میرمنې چې له ۳۶ اونيو څخه زیات حمل او د وینې شدید کموالی لري.
- د زړه د عدم کفایې شواهد (۶.۲ برخه د زړه عدم کفایه دې مطالعه شي)
- د مزمن ناروغیو علایم (د مثال په توګه، نری رنځ)
- د وینې کموالی د ځګړ طحال یا لمفاوي غدواتو له لویدو سره.
- د وینې د حاد ضایع کېدنې اعراض او علایم او یا د وینې راتلنې ناروغی.
- په غایطه موادو کې د وینې پرله پسې شتوالی (له روښانه لامل څخه پرته)
- د ناروغ د معاینې او تعقیب په څلورو اونيو کې د مناسبې درملنې سره سره نه روغېدل (یعنې د هیمو ګلوبین زیاتوالی د ۲-۳ اونيو په ترڅ کې له ۲.۰ گرامه څخه پر یو ډیسي لیتر کم وي).

وقایه

- له اوسپنې څخه د یو بډایه غذايي رژیم توصیه.
- په هر تعقیبي ویزې کې ناروغ یا د هغه پالونکي ته د اوسپنې د بشپړونکو ټابلېټونو د کافي اندازې برابرول.
- د ویتامین A له بشپړونکي سره د چینجیو ضد درمل Anthelmintics ویشل. یو دوز Mebendazole یوه کلن څخه لویو ماشومانو لپاره چې په تیرو شپږو میاشتو کې هېڅ کله Mebendazole نه وي اخیستی.
- ۲۵۰ میلی گرامه که چېرې ماشوم له دوه کلن څخه کوچنی وي.
- ۵۰۰ میلی گرامه د دوه کلنو او تر هغه لویو ماشومانو لپاره.
- د وینې د شدید کموالي د ارزونې په موخه دې د تنکیو ځوانانو او ماشومانو پر ودې د څارنې په برنامه او د امیدوارو مېرمنو له زیرونو څخه مخکې د څارنو په ویزې کې تر څارنې او څېړنې لاندې ونيول شي.
- د تغذیې د برنامه رامنځته کول.

ناروغ ته لارښوونې

- له اوسپنې څخه د یو بډایه غذايي رژیم توصیه او تعقیبول

- که چیرې د ماشوم د تغذیې د څرنگوالي په اړه د ماشوم له پالونکي یا پاپواز سره له مشورې وروسته د تغذیې ستونزې باقي پاتې شي، په دې صورت کې ارزونه وکړئ چې ایا د ماشوم پالونکي یا پاپواز په موضوع سم پوهېدلی او هغه یې درک کړې ده او له هغه غوښتنه وکړئ چې د اړتیا په صورت کې په منظمه توګه روغتیايي کلینیک ته مراجعه وکړي.
- ناروغ یا د هغه پالونکي ته و وایاست چې د اېبي ګاستریک د ناحیې نا ارامتیا، زړه بدوالي، نس ناستی، یا قبضیت کېدای شي د اوسپنې له ۶۰ میلی ګرامه ورځني دوز او یا له هغه څخه د زیات په وسیله په ناروغ کې څرګند شي.
- که چیرې دا نښې پېښې شوې ناروغ ته لارښوونه وکړئ چې د اوسپنې بشپړونکي له خوړو سره یوځای واخلي.
- ناروغ یا د هغه پالونکي ته و وایاست چې کېدای شي د ناروغ د غایطه موادو رنګ تور شي چې دا زیان رسونکی حالت نه دی او د اوسپنې په وسیله درملنه باید دوام ومومي.
- ناروغ یا د هغه پالونکي ته دې توصیه وشي چې د اوسپنې ټول مستحضرات د تتراسایکلین، سلفامیدونو او تري متوپریم جذب نهی کوي. له دې امله اوسپنه باید په یوه وخت او یوځای له دې درملو سره وا نه خيستل شي.
- احتیاط: له اندازې څخه د اوسپنې زیات اخيستل کولای شي د سختو ناروغیو لامل شي. د دې درملو زیرمه باید په یو خوندي ځای او د ماشومانو له لاسرسي څخه لرې وساتل شي.

۱۰.۲ تالاسیمي (Thalassemia)

تشریح

تالاسیمي د وینې د کموالي د یو ډول څرګندونکي ده چې په کورنیو کې شتون لري (یعنې ارثي ده) او د هغه له امله غیر نورمال ګلوبولینونه او د دې ګلوبولینونو کموالی شتون لري - چې دا پروتین د وینې په سرو حجرو کې د اکسیجن د لیږدولو مسوولیت لري.

تالاسیمیا په دوه ډوله دی:

- لویه تالاسیمي - چې ناروغان وخیمه ناروغی لري او په هغه کې د وینې شدید کموالی او لنډ ژوند لري.
- کوچنۍ تالاسیمي (انتقالدونکي حالت) - چې ناروغان غالباً اعراض نلري، تشخیص د کورنۍ تاریخچې او د وینې په سمیر کې د میکروسایټیک (وړوکی) سرو حجرو شواهدو له مخې ایښودل کیږي.

تشخیص

په لاندې حالاتو کې تالاسیمیا په پام کې ولرئ:

- د تالاسیمیا کورنی پیژندل شوې تاریخچه شتون ولري.
- یو ماشوم چې دوینی هایپوکرومیک او میکروسایټیک کموالی لري او د اوسپنې (یا فولیت) په وسیله د درملنې په صورت کې ځواب ور نه کړي.
- یو ماشوم چې د وینې شدید کموالی لري او له دې سره فزیکي فعالیتونه نشي کولای، کمه وده یا لوی توری ولري.
- د وینې په کموالي اخته ماشوم چې د هډوکو له بدلونونو سره لکه د وچلې یا جبهې هډوکي Bossing (په محده بڼه وتل)، د پوزې د هډوکي ټیټ شوی حالت او پتولوژیکو کسرونو سره مخ کیږي.
- د وینې د سمیر یو ټسټ (د امکان په صورت کې) کېدای شي د تشخیص لپاره اړین وي.
- احتیاط: د لویې تالاسیمیا اختلاطات چې درملنه یې ونه شی د زړه د عدم کفایه، د ځګر د ستونزو او په انتاناتو د اخته کېدو د زمینې د برابرولو لامل کیږي.

درملنه

پر هغو ناروغانو چې د تالاسیمیا شک کیږي باید د ډیرې څیړنې او درملنې په موخه روغتون ته ولېږل شي.

۱۰.۳ خوارخواکي او د تغذیې کموالی (Malnutrition and Under Nutrition)


تشریح

خوارخواکي یو کلینیکي سندروم دی چې د بدن د فردي اړتیا او خوړو د مصرف یا اخیستلو د نا انډولۍ په پایله کې رامنځته کیږي. دا حالت زیاتره د دواړو د کمیت (په ورځ کې د کیلوکالوري شمېر) او کیفیت (د ویتامینونو او معدني موادو او نورو) د کموالی له امله رامنځته کیږي. اختلالات یې په دوامداره او پیاوړې توګه ژوند ګواښونکی وي. له ۵۰ سلنې څخه د ماشومانو مړینه له خوارخواکۍ سره مل ده، ۱۰ سلنه د شدیدې خوارخواکۍ له اخته کېدو سره مل ده. منځنۍ او خفیفه خوارخواکي تر زیاته بريده له پنځو کلونو څخه د کوچنیو ماشومانو لوی وژونکي دي. د مل نوتریشن دوه ډوله شتون لري: زیاته تغذیه او د تغذیې کموالی. دلته یوازې د تغذیې کموالی تر بحث لاندې نیول کیږي.

د تغذیې د کموالی کلینیکي څرګندونې او د هغه تصنیفول په لاندې توګه دي (۱۰.۳) ښه دې وکتل شي چې عبارت دي له:

- منځنۍ ډول (کم وزن) – وزن پر لوړوالي (یا جګ والی) ۷۹-۷۰ سلنه.
- شدید خوارخواکي (ډیر کم وزن) – وزن پر لوړوالي (یا جګوالي) له ۷۰ سلنې څخه کم.
- Marasmic ډول (د عضلې ذوب): د عضلې د کتلې او د جلد لاندې شحم د پام وړ ویلې کېدل د اسکلیتي څرګندیدنې لامل کیږي.
- Kwashiorkor (اذیمایي ښه): دوه اړخیزه اذیمې د ښکتنیو برخو/ د مخ اذیمې، زیاتره له جلدې علایمو سره مل وي (د جلد ځلیدل او یا چاودنې، لکه د سوزیدنې څرګندیدنه، د وینتانو ماتیدل او د رنګ بدلون).
- Marasmo Kwashiorkor چې دواړه ښې یو له بل سره یوځای شتون لري – پورتنۍ ویلې شوي برخې او د ښکتنیو برخو اذیمې.

د تغذیې له کموالی سره د مړینې راپیدا شوي لاملونه چې په هغه کې هایپوترمي، هایپوګلیسمي، د الکترولیتونو نا انډولۍ، د بدن د اوبو کموالی، انتانات (یعنې سپټیک شاک)، د ویتامین او معدني موادو کم والی شامل دي.



منبع: د IMC فلپ چارټ

۳.۱۰. پټه د وزن پر عمر چارټ

تشخیص

- خفیف ذوب (په پیل کې پورتنی برخې، بیا ښکتنی برخې)
- په ښکتنیو برخو یا اندامونو کې اذیمه
- نور متفرقه خایونه
- حاد او دوام داره نس ناستی
- مکرر انتانات (صدری انتانات، سینه بغل) خینې وخت د تېې او ځانگړو علایمو د نشتوالي له امله یې تشخیص ستونزمن دی.
- هاپیوترمي (ساره اندامونه)
- د اشتها نشتوالی.
- د وینې کموالی.

درملنه

منځنۍ خوارخواکي

- د کورنۍ درملنې توصیه یا د شتون په صورت کې دې د تغذیې مرستندویه مرکز ته ولېږدول شي.
- د ماشوم د تغذیې ارزونه او د ماشوم د تغذیې په اړه د ماشوم له مور یا پالونکي سره مشوره: د دې موضوع د کتنې لپاره "د ناروغۍ او د روغتیا په دوران کې د تغذیې توصیه" د ماشوم د مور یا پالونکي لپاره دې د IMCI د فلپ چارټ مطابق مناسب وخت په پام کې ونیول شي او تعقیبي ویزېت دې پنځه ورځې وروسته او بیا دې ۳۰ ورځې وروسته اجرا شي خو په کور کې د لارښوونو مطابق له مناسبې تغذیې څخه ډاډ تر لاسه شي. که چېرې په ۳۰ ورځو کې ماشوم وزن اخیستی وو د ماشوم مور یا پالونکي ته مبارکي وایو او بیا د ناروغ دوسیه د ماشوم د تغذیې د توصیې او ماشوم په اړه د نوې پوهې د پیاوړي کولو په هکله گورو. په ۳۰ ورځو کې چېرې ماشوم لاهم د عمر په پرتله ډیر کم وزن ولري د ماشوم له مور یا پالونکي سره د ماشوم د تغذیې د ستونزو په اړه مشوره کوو او د دې ترڅنګ دې هغوی ته لارښوونه وشي چې ماشوم هره مياشت د وزنولو لپاره راولي.
- که چېرې ماشوم ناروغ وي (سینه بغل، پیچش، دوام داره نس ناستی، د غوړ حاد یا مزمن انتان او یا هره بله ناروغي) د ماشوم مور یا پالونکي ته دې توصیه وشي خو د ناروغۍ پرمهال ماشوم ته ډیر مایعات ورکړي او کافي تغذیې ته دې دوام ورکړي او له هغوی وغواړئ چې له ۵-۲ ورځو د تعقیب او بیا معاینې لپاره راشي او یا د وضعیت د ډیر خرابیدو په صورت کې دې سملاسي مراجعه وکړي (هغه وخت چې ماشوم نشي څښلای او یا شیدې و نه روي د ماشوم د ناروغۍ شدت زیات شي، تبه پیدا شي، چټک تنفس، ستونزمن تنفس په غایطه موادو کې وینه، د څښلو په برخه کې کمزورتیا).
- که چېرې ماشوم له شپږو میاشتو څخه کوچنی وي: د مور د شېدو په وسیله د تغذیې د عمل ارزونه: له مور سره دې د ماشوم مناسب تماس و ارزول شي، ډاډ دې تر لاسه شي چې په ۲۴ ساعتونو کې لږ تر لږه اته ځله د مور د شېدو په وسیله تغذیه کيږي (د شېې په شمول)، له مور څخه غوښتنه وکړئ په هغه صورت کې چې د خپلو شېدو په وسیله تغذیه زیاتوي نور غذايي یا د څښلو توکي دې کم کړي. هغې ته وړاندیز وکړئ چې تعقیبي ویزیتونه په دوه ورځو او ۱۴ ورځو کې دې تر سره کړي.
- که چېرې تاسو فکر نه کوئ چې د ماشوم تغذیه به ښه شي، او یا که چېرې په تعقیبي ویزېت کې ماشوم وزن له لاسه ورکړی وي، ماشوم ولیرئ.
- یو دوز Mebendazole که چېرې ماشوم یو کلن او یا تر هغه لوی دی او په تېرو شپږو میاشتو کې یې هیڅ کله Mebendazole نه دي اخیستي، تجویز کړئ.
 - ۲۵۰ میلی گرامه په هغه صورت کې چې ماشوم له دوه کلنۍ څخه کوچنی وي
 - ۵۰۰ میلی گرامه په هغه صورت کې چې ماشوم دوه کلن یا تر هغه لوی وي
- د نورو احتمالي لاملونو درملنه (د مثال په توګه، سینه بغل، حاد یا دوام داره نس ناستی، یا هاپیوګلیسمي). د غه اړوندو ناروغیو ته دې ولېږل شي.

شديده خوارځواکي

- ټول هغه ماشومان چې شديده خوارځواکي لري، بايد د تغذيې د مرکز په وسيله يې درملنه وشي او يا روغتون ته وليږل شي.
- له ليريو مخکې:
 - يو دوز ویتامین A دې تجویز شي (۱۰۴ برخه د ویتامین A کموالی دې وکتل شي)
 - د ماشوم درملنه دې وشي خو د شکړې له ټيټې کچې څخه مخنیوی وشي.
 - د بورې د چای څښل د څلورو قاشغو (۲۰ گرامه) بورې په ۲۰۰ ميلي ليتراوبو کې په يو پاک گيلاس کې حلول.
 - که چېرې ماشوم تيرولی نشي، په هغه صورت کې ۵۰ ميلي ليتره شيدې يا د بورې محلول د انفي معدي ټيوب له لارې تجویز کړئ.
 - په هغه صورت کې چې ناروغ انتاني اعراض او علايم لري د انټي بيوتيک لومړی دوز دې ورته تطبيق شي (د مثال په توگه اموکسی سيلين، کوتريموکسازول يا امپي سيلين) او (د IMCI فلپ چارټ دې مطالعه شي). د انټي بيوتيکونو د معیاري دوز د مطالعې لپاره دې د الف مل پاتې ته مراجعه وشي. د پنسلين سره د حساسيت په اړه، له اريترومايسين څخه دې استفاده وشي. په مل پاتې کې الف ۱۲ جدول ته د انټي بيوتيکونو د معیاري دوز د کتنې لپاره مراجعه وشي.
 - د ليريدلو په جريان کې دې د هايپوترمي څخه د مخنیوی لپاره: د ماشوم له ډير نيردې تماس ساتل د مور له بدن سره (د کانگرو تگلاره) او له کمپلې څخه دې گټه واخستل شي.

وقايه

- له پنځو کلونو څخه د ټولو کوچنيو ماشومانو سيستماتيک وزن کول.
- د ولادتونو ترمنځ له واټن څخه ډاډ، له ولادت څخه مخکې د مراقبتونو لپاره ويزټ او معاینه، او د اميدوارو مېرمنو بڼه تغذيې (د تغذيې زياتول).
- په کم عمر کې له واده کولو څخه ډډه کول.
- د نوي پيدا شوي ماشوم تر شپږ مياشتو يوازې د مور د شېدو په وسيله د لومړنۍ تغذيې ترسره کول. د مور د شېدو په وسيله د تغذيې دوام تر هغه وخته چې ماشوم دوه کلن شي، او مرستندويه غذايي مواد دې له شپږ مياشتني څخه پيل شي.
- د جامدو او نيمه جامدو خوړو ورکول د شپږو مياشتو په عمر کې. د ماشوم د ودې په موخه د تغذيې د انسجام تنوع او دفعاتو زياتول. ماشوم دې "د ناروغۍ او سلامتيا په دوران د تغذيې د توصيې لپاره" د IMCI د فلپ چارټ مطابق وليږل شي.
- ناروغو ماشومانو ته د تغذيې دوام او د مياغتو د لگښت زياتول.
- د کتلوي معافيت برنامې ته په پاملرنې سره له دوه کلونو څخه په کوچنيو ماشومانو کې د بشپړ واکسيناسيون لپاره هڅونه او تبليغ (۱۹ څپرکي، معافيت دې مطالعه شي).
- له روغتيايي مرکزونو يا د ټولنې له روغتيايي کارکوونکي څخه د روغتيايي تعليماتو تعقيبول. له خوارځواکي څخه د پيدا شويو اختلاطونو او د اړوندو اطلاعاتو راټولول او د يوه متعادل خوراکي رژيم اهميت.

۱۰۴ د A ویتامین کموالی (Vitamin A Deficiency)

تشریح

د ویتامین A کموالی زیاتره جلد، مخاط، سترگه زیانمنوي او له یو څخه تر پنځو کلونو ماشومانو کې ډیر معمول دی. د ویتامین A کموالی کېدای شي له شري، نس ناستي او يا خوارځواکۍ سره مل وي او کولای شي له دې ناروغیو څخه د را پیدا کېدونکې مړینې کچه لوړه کړي. که چېرې دا حالت له درملنې پرته پاتې شي په ماشومانو کې د ډنډیدو تر ټولو لوی لامل دی.

تشخیص

- شب کوري، زیاتره وخت د دې ناروغی لومړنی شکایت دادی چې ناروغ د شپې له مخې او یا د لمر پربوتو پر مهال څه نه وینی او ولیری یا ځنی شیان په پښه وهي.
- په سترگو کې بدلونونه:
 - په سترگو کې په سپین رنگ څک لرونکې صفحي (Bitot ټکي)
 - د سترگې او لېمو وچوالی
 - قرینه ګونځې او ورېځجن کيږي.
 - قرینه راوړی او نرميږي چې د بیرته نه راګرځېدو ډنډیدو لامل کيږي.
- د جلد بدلونونه
 - په جلد کې د وتلو ځایونو څرګندېدل Bumpy appearance
 - د پوستکي ږیریدل او وچیدل
 - د وینټانو فولیکولونو وچ او له کراتین سره وصلیږي.
- د ودې اړونده بدلونونه، د نړۍ په هغو سیمو کې چې د ویتامین A کموالی شتون لري، د کمزورې ودې لامل کيږي.

درملنه

له درملو پرته درملنه

- له ویتامین A څخه د بډایه خوړو د لګښت زیاتول (د ۱۰.۴ الف جدول دې وکتل شي)

۱۰.۴ الف جدول. د A ویتامین مهمې منابع

د کاروتین په بڼه	په لویه کچه د ریتینول په بڼه
• د سرې خرما غوړي (کاروتین د تیلو د سره رنگ لامل کيږي) • نارنج او زېړې مېوې او ام • نارنجي ډولونه سبزیجات، لکه ګازو او کډو. • شنې پانې، لکه پالک او لوییا • زېړ جوار او کله	• د مور شیدې - Colostrums، په ځانګړې توګه له ویتامین A څخه ډیر بډایه. • د حیواناتو څګر، الوتونکي او کبان په ځانګړې توګه کوچني کبان چې ټول له څګر سره خوړل کيږي. • پښتورګي • هګۍ • کوچ او حیواني غوړی

د درملو په وسیله درملنه

- ټولو ماشومانو ته درملنه چې د معافیت د ملي ورځې یا واکسیناسیون (NIDS) د ملي ورځې د کمپاین پر مهال یې ویتامین A کپسول (یعنې په تېرو ۳۰ ورځو کې) نه وي اخیستی او لاندې ستونزې ورته پیدا شوي وي:
- د سترګې وچ والی: د سترګې ناروغی ده چې د ویتامین A دحاد کموالي پورې اړه لري، لکه شب کوري، وچ والی، د قرینې نرم والی، او د قرینې وېلې کېدل (۱۰.۴ ب جدول دې مطالعه شي)
 - د نورو ځانګړو ناروغیو له خطر سره مخ کېدونکي لکه له شري سره ماشومان او هغه ماشومان چې به شدت د خواړواکې سره مخ شوي دي، په مزمن نس ناستي اخته ماشومان (۱۰.۴ ج جدول دې مطالعه شي)
 - پاملرنه: تل د ویتامین ای کپسول په کلینیک کې تجویز کړئ او په کور کې یې تجویز نه کړئ. ډاډ تر لاسه کړئ چې ماشوم کپسول تیر کړی دی.

۱۰۴ ب جدول. په ماشومانو کې د سترګې د وچ والي د درملنې برنامه

د ویتامین A دوز	د بیلابیلو عمرونو پر بنسټ مهال ویش	څه وخت تجویز شي	دوز
IU۵۰۰۰ IU۱۰۰۰۰ IU۲۰۰۰۰	> ۶ میاشتې ۶-۱۲ میاشتې < ۱۲ میاشتې	سملاسي په تشخیص کې	لومړی
په همدې عمر کې - ځانګړی دوز		راتلونکې ورځ	دویم
په همدې عمر کې - ځانګړی دوز		دوه اونۍ وروسته	دریم

په شري او د پروتین او انرژۍ د شدیدې خوارځواکۍ او د مزمنو نس ناستو په اخته ماشومانو کې د ویتامین A د کموالي خطر زیات دی. پورتنۍ ناروغۍ د بدن د ویتامین A د زیرمو د تشیدلو لامل کیږي چې ماشوم د ویتامین A د کموالي له خطر سره مخ کوي او کولای شي د راتلونکو انتاناتو د شدت د زیاتوالي لامل شي. د ویتامین A مرستندویه په شري یو اخته ماشوم ته په څرګنده توګه له شري څخه د راپیدا کېدونکو عوارضو او مړینې د کمولو لامل کیږي.

۱۰۴ ج جدول. له ویتامین A د راپیدا شویو ناروغیو لپاره د درملنې برنامه

مهالوېش	اندازه	ناروغۍ او د عمر ګروپ
د عمر ځانګړی دوز په لومړۍ ورځ، دویمه ورځ او ۱۴ ورځ (ټول درې دوزه)	IU۱۰۰۰۰ IU ۲۰۰۰۰	شری له ۶-۱۲ میاشتو < ۱۲ میاشتو څخه تر پنځو کلونو
د عمر ځانګړی دوز په لومړۍ ورځ، دویمه ورځ او ۱۴ ورځ (ټول درې دوزه)	IU۵۰۰۰ IU ۱۰۰۰۰ IU۲۰۰۰۰	شدیده خوارځواکي > ۶ میاشتې ۶-۱۲ میاشتې < ۱۲ میاشتو څخه تر پنځو کلونو
یو دوز په هر ځانګړي عمر کې	IU۵۰۰۰ IU ۱۰۰۰۰ IU۲۰۰۰۰	مزمن نس ناستی له شپږ میاشتو څخه کم ۶-۱۲ میاشتو < ۱۲ میاشتو څخه تر ۵ کلونو

لیردول

ټول هغه ناروغان چې د سترګې اعراض او علایم، شدیدې خوارځواکي او یا نور اړوند اختلالات لري، باید ولیرل شي.

وقایه

له پنځو کلونو څخه ټول لوی ماشومان باید د ویتامین A مرستندویه هر شپږ میاشتې وروسته لکه څرنګه چې په ۱۰۴ د جدول کې ښودل شوی دی، واخلي او مېرمنې باید له ولادت څخه وروسته یوځل ویتامین A واخلي.

۱۰.۴ د جدول. د ویتامین A د وقایو دوز برنامه

د ویتامین ای کپسول	د ویتامین اندازه		عمر	واحد دوز
	۲۰۰۰۰۰ یونته	۱۰۰۰۰۰ یونته	۵۰۰۰۰ یونته	
دوه کپسوله	یو کپسول	نیم کپسول	۱۰۰۰۰۰ IU هر شپږ میاشتې	< ۶-۱۲ میاشتو
خلور کپسوله	دوه کپسوله	یو کپسول	۲۰۰۰۰۰ IU هر شپږ میاشتې	له ۱۲ میاشتو تر پنځو کلونو
خلور کپسوله	دوه کپسوله	یو کپسول	۱۰۰۰۰۰ IU	له ولادت څخه ۴۸ ساعته وروسته، مګر لږ تر لږه له ولادت څخه وروسته په شپږ اونیو کې له ولادت څخه ۴۲ ورځې وروسته ور نه کړئ.

ناروغ ته لارښوونې

- له پنځو کلونو څخه ټولو کوچنیو ماشومانو ته باید د ویتامین A له کموالي څخه د وقایې ملي برنامه او د ویتامین A د بشپړولو وقایو برنامه تعقیب کړئ.
- تعقیب کړئ
- ټولې هغه مېرمنې چې له ولادت څخه په وروسته پړاو کې دي، باید له ولادت څخه په وروسته پړاو کې ویزې شي.
- د ویتامین A له کموالي څخه د مخنیوي لپاره، له ویتامین A څخه د بډایه خوړو مصرفول، او هر وخت چې د ویتامین A له کموالي څخه کوم اعراض یا علایم څرګند شول له یو ډاکټر سره دې مشوره وشي.

۵.۱۰. د ویتامین D کموالی او ریکتس (Vitamin D Deficiency and Rickets)

تشریح

ویتامین D په بدن کې د لمر له نور سره د مخ کېدو پرمهال تولیدیږي او په غذايي منابعو کې یې کب، څګر، غوړي، د هګی زیر، کوچ، ځښې حیوانات او شیدې شامل دي. له دې امله چې ویتامین D د کلسیم او فسفات په متابولیزم کې مهم رول لري نو ځکه د ځواکمنو هډوکو د پیاوړي کولو لپاره اړین دي.

د ویتامین D کموالی کېدای شي د هډوکو د مترالونو او کلسیم د کموالي او کمزورتیا لامل شي او د لاندې ناروغیو او حالاتو سبب شي.

- ریکتس - د ماشومتوب د دوران ناروغي ده چې د هډوکو له نرموالي، د ودې له اختلالاتو او د اوږدو هډوکو د بد شکلی سره څرګندیږي.
- د هډوکو نرموالی یا اوستیومالیشیا - د هډوکو د نري کېدو اختلال دی چې په لویانو کې پېښیږي او د قریبه عضلاتو له کمزورتیا او د هډوکو د ماتېدونکي حالت سره مل وي.
- د هډوکو پوچېدل یا اوستیوپوروزس - په هډوکو کې د مترالونو کمزورتیا او کموالی دی چې د هډوکو له ماتېدونکي حالت سره مل وي (په ډېر عمر لرونکو کسانو کې).

تشخیص

- د هلوکو د تغیراتو څخه وړاندې اعراض خفیف او ناڅانګړي یا غیروصفی وي. په تنکیو ماشومانو کې چې په وده کې اختلال یا د هلوکو بدشکلې لري د ویتامین ډي د کموالي تشخیص دې په نظر کې ونیول شي - مقدمه درملنه له دایمي معیوبیت څخه مخنیوی کوي.
- ریکس - له ۲۴-۶ میاشتې په عمر کې ډیر معمول وی
 - Craniotabes - د جمجمې د هلوکو نرمېدل په کروي بڼه (Ping pong ball) او د ټنډي د هلوکي د راوتولامل کیږي
 - د هلوکي درد، بدشکلې (Deformity)، او په وده کې خنډ.
 - د غاښونو په جوړښت کې خنډ
 - د اسکلتیې بدشکلې
 - د پښې کریدل (Bowlegs) او یا (Knock knees)
 - د اضلاعو یا پښتو نوډولونه Rachitic rosary (په اضلاع کې د تسبیح د دانو په شان وتلي ځایونه)
 - د سینې د هلوکي بهر ته وتل Pigeon chest (د کوترې د سینې په شان)
 - د ملا د تیر انحنا لکه Kyphosis، اسکولیوزس یا دواړه.
 - په اکسیرې کې کېدای شي د Epiphyseal صفحه پراخه شوې یا د هلوکي د وروستیو برخو پلنوالی څرګند شي (په ځانګړې توګه د کمرې او زند د هلوکي وروستی برخه)
- د هلوکي پوچېدل او نرمېدل (اوسټیوپوروزس او اوسټیوملشیا) - په لو یا نو کې:
 - په اکسیرې کې د هلوکو د مترالونو کثافت کموالی.
 - د هلوکي ماتېدونکې حالت چې د یو غیر معمول او کوچني فشار په وسیله پېښېدای شي.

درملنه

درملنه باید د ویتامین ډي، کلسیم او فاسفور په مناسب تعویض متمرکز شي.

له درملو پرته درملنه

- د میزایې (د مات هلوکي د تړلو لپاره) ایښودل او فیزیوتراپي کېدای شي د هلوکي د نرمېدو په پرمختللو پېښو کې ګټور وي. پاملرنه: د ریکس په لومړنیو پړاونو کې د هلوکي بدلونونه د مناسبې درملنې په وسیله په چټکۍ عادي حالت ته راګرځي.
- د غذايي رژیم بشپړونکی
 - ویتامین D (لاندې وګورئ)
 - کلسیم د لبنیاتو او د سبزیجاتو د محصولاتو څخه
- په کافي اندازه د لمر له نور سره مخ کېدل.

د درملو په وسیله درملنه

- هغه وخت چې د لاسرسي وړ وي.
- ویتامین D دې تجویز شي.
 - له ۵۰۰ څخه تر ۱۰۰۰ واحد هره ورځ د یوې میاشتې لپاره
 - بیا هره ورځ ۴۰۰ IU په وقایوې ډول.
- د کلسیم د یو مرستندویه تجویز
 - هره ورځ د Mcronutrient او یا د MultiVitamine ټابلیټونو تجویز
 - غذايي منابع - د لبنیاتو او سبزیجاتو محصولات

لیدډول:

د هلوکي د نرم والي یا د هلوکي د ډیر پوچوالي ټول شکمن موارد باید د لابراتواري معایناتو، د اکسیرې د تائید او درملنې لپاره روغتون ته ولیدل شي.

يوولسم څپرکی د بولي لارو او پښتورگو ناروغۍ URINARY TRACT AND RENAL CONDITIONS

۱۱.۱ د بولي لارو انتان (Urinary Tract Infection)

۱۱.۱.۱ حاد پیلونفریت (Acute Pyelonephritis)

تشریح

حاد پیلونفریت د پښتورگي ډېرا نشیم او د حویضي دانتان څخه عبارت دی. دا حالت زیاتره د ګرام منفي باکتریا په وسیله د بولي لارو د صعودي انتاناتو (ډیر معمول د E. coli باکتریا) او یا د ګرام مثبت باکتریاګانې (انتیروکوک، ستافیلوکوک) په پایله کې منځته راځي. که د دې حالت درملنه په سمه توګه ونشي، کولای شي په پیاوړې توګه د ژوند ګواښونکی سپټیمی، پریټونیت، یا دواړو لامل شي. هغه ناروغان چې په حاد پیلونفریت اخته دي باید ولیږل شي.

تشخیص

- تبه، لرزه یا دواړه، معمولاً له زړه بدوالي او کانګو سره.
- په اړخونو کې درد یا Flank pain (د قرعې سره حساسیت).
- د ادرار سوخت او د ادرار د دفعاتو زیاتوالی.
- مکدر یا وینه لرونکی ادرار – کېدای شي ادرار طبیعي یا نورماله وي.
- د ادرار Dipstick کېدای شي لوکوسایټ او نایټریټ وښيي.
- د ادرار په میکروسکوپيکي معاینه کې کېدای شي د وینې سپینې حجرې، سرې حجرې او باکتریاګانې شتون ولري.

درملنه

له درملو پرته درملنه

د زیاتو مایعاتو اخیستلو ته هڅول.

د درملو په وسیله درملنه:

- د تې او درد لپاره Paracetamol. د معیاري دوز د مطالعې لپاره د الف په مل پانه کې الف ۵ جدول ته مراجعه وکړئ.
- د یو انټي بیوټیک تجویز
- ماشومان

■ Ampicillin د لس ورځو لپاره. د معیاري دوز د مطالعې لپاره د الف په مل پانه کې الف ۴ جدول ته مراجعه وکړئ.

یا

له Penicillin سره د الر جی یا حساسیت په صورت کې دې له Erythromycin څخه استفاده وشي. د معیاري دوز د مطالعې لپاره د الف په مل پانه کې الف ۱۲ جدول ته مراجعه وکړئ.

■ Gentamicin سره د اوو ورځو لپاره. د معیاري دوز د مطالعې لپاره د الف په مل پانه کې الف ۱۳ جدول ته مراجعه وکړئ.

یا

■ د هغه بدیل په هغه صورت کې چې د لاسرسي وړ وي (د ولسوالۍ په روغتونونو کې شتون لري) mg / kg ۸۰ په ورځ کې یوځل، لس ورځې.

○ لویان

- Ampicillin (يو گرام ويال) - د وريد په داخل IV کې يو گرام زرق هر شپږ ساعته وروسته د ۱۴ ورځو لپاره او يا
- له Pencilline سره د حساسيت په صورت کې دې له Erythromycin څخه استفاده وشي. د معيارى دوز د مطالعې لپاره د الف په مل پاڼه کې الف ۱۲ جدول ته مراجعه وکړئ.
- Gentamicin (امپول ۴۰ mg / ml) ۶۰ ميلي گرامه (۱،۵۰ ميلي ليتره) ورو د وريد په داخل IV کې يا عضلي يا IM زرق هر اته ساعته وروسته د اوو ورځو لپاره.
- او يا
- د هغه بدیل، په هغه صورت کې چې د لاسرسي وړ وي (د ولسوالۍ په روغتونونو کې شتون لري) Ceftriaxone (۵۰۰ ميلي گرامه ويال) - يو گرام عضلي يا IM زرق هر ۲۴ ساعته وروسته د لس ورځو لپاره.
- اميندواړې ميرمنې
- د نورو لويو ناروغانو په شان Ceftriaxone.

ليږدول:

- ټول هغه ناروغان چې د پيلونفریت شک پرې کيږي د درملنې لپاره دې وليږل شي.
- د درملنې لومړۍ دوز دې د انټي بيوتيک په وسيله له ليږلو مخکې تجويز شي.

ناروغ ته لارښوني

- ډير مايعات دې واخلي.
- د بولي لارو د انتاناتو درملنه دې ژر تر ژره وپاتل شي او ترسره دې شي.
- د لارښونو مطابق دې ليږل شوی ناروغان تعقيب شي.
- د بولي لارو او پښتورگو د مکررو انتاناتو په پيښو کې د الټراساوند معاینه د ډبرې او يا د نورو اېنارمليټو يا اختلالاتو د ردولو لپاره.

۱۱.۱.۲ د مثاني التهاب (سيستيت) او د احليل التهاب (يوريتريت) (Cystitis and Urethritis)

تشریح

- سيستيت او د يوريتريت په ترتيب سره د مثاني او احليل انتانونه دي. د سيستيت او يوريتريت غير اختلاطي موارد کېدای شي د ميرمنو په مياشتني دوران کې چې نورماله بولۍ لارې لري، وليدل شي. نور ټول موارد (نارینه، ماشومان او په ځوگونو مکررو انتاناتو اخته ميرمنې) د بولي لارو د اختلاطي انتاناتو لپاره اندېښنې زياتوي او ارزونې او څيړنې ته اړتيا لري.
- غالباً د گرام منفي باکتریاگانو او يا د کولمو له فلورا (E. coli) څخه پيدا کيږي.
- کېدای شي چې د گرام مثبت باکتریاگانو څخه هم پيدا شي.
- کېدای شي چې مل وی:
- د مثاني له ډبرې سره.
- د ادرار له بندښت سره.
- په نارينه و کې د پروستات د لوييدو سره.
- او په ماشومانو کې د احليل له Valve سره.

تشخيص

- د ادرار پرمهال د درد يا سوي احساس
- د ادرار د دفعاتو زياتوالی

- په ډیرو سختو حالاتو کې د سوپرا پوړیک د ناحیې درد یا حساسیت.
- پاملرنه: پیلونفریت، د حوصلې التهابي ناروغۍ او یا د خټې د درد نورې انتاني منابع دې رد شي.
- په ماشومانو کې غیر اختصاصي ناروغۍ (لکه نس ناستی، د علوي تنفسي اعراض).
- مکدر یا وینه لرونکی ادرار.
- د ادرار Dipstick باید د لوکوسایټونو لپاره مثبت وي.
- د ادرار Dipstick کېدای شي د نایټریت لپاره هم مثبت وي.
- د ادرار په مایکروسکوپیکې معاینه کې لوکوسایټونه شتون ولري او کېدای شي باکټریاوې هم وښيي.
- په تفریقي تشخیص کې باید لاندې مسايل په پام کې ونیول شي:
- د حوصلې التهابي ناروغۍ او یا واژینیت (د مهبل التهاب) په مېرمنو کې
- پروستاتیت (د پروستات التهاب) په نارینه و کې.

درملنه

له درملو پرته درملنه
ناروغ وهڅوی خو زیات مایعات واخلي.

د درملو په وسیله درملنه:

- ماشومان
- Amoxicillin د پنځو ورځو لپاره. د معیاري دوز د مطالعې لپاره د الف په مل پانه کې الف ۳ جدول ته مراجعه وکړئ.
- او یا
- Co-trimoxazole د پنځو ورځو لپاره. د معیاري دوز د مطالعې لپاره د الف په مل پانه کې الف ۸ جدول ته مراجعه وکړئ.
- لویان
- Nitrofurantoin (۱۰۰ میلی گرامه ټابلیټ): ۱۰۰ میلی گرامه هر اته ساعته وروسته د پنځو ورځو لپاره
- او یا
- Amoxicillin د پنځو ورځو لپاره. د معیاري دوز د مطالعې لپاره د الف په مل پانه کې الف ۳ جدول ته مراجعه وکړئ.
- او یا
- Co-trimoxazole د پنځو ورځو لپاره. د معیاري دوز د مطالعې لپاره د الف په مل پانه کې الف ۸ جدول ته مراجعه وکړئ.
- او یا
- Ciprofloxacin: ۵۰۰ میلی گرامه هر ۱۲ ساعته وروسته د پنځو ورځو لپاره.
- پاملرنه: Ciprofloxacin د امېدوارو مېرمنو لپاره استنباط نلري.

لېږدول

- د درملنې پر وړاندې نه خواب ورکول.
- د بولي لارو پرله پسې یا ستنېدونکي انتانونه.

مخنیوی او ناروغ ته لارښوونې

- د مقعدي او تناسلي ناحیې د ښې روغتیا ساتنې د شرایطو رعایتول.
- د زیاتو مایعاتو اخیستل.

۱۱.۲ حاد گلومیرولونفریت (Acute Glomerulonephritis)

تشریح

حاد گلومیرولونفریت (AGN) په لویانو او ماشومانو کې یو معایفېتی سندروم دی، چې معمولاً په ثانوي ډول د سترپتوکک د نه تداوي شویو انتاناتو په پایله کې (لکه امپټیګو، تانسلیټ، یا فرنجیت) رامنځته کیږي، چې د گلومیرولونو د حاد التهاب لامل کیږي. د سودیم او مایعاتو احتباس کولای شي د ژوند ګواښونکي وي (یعنې د سږو حاد اډیما یا دماغي اډیما)، مګر پایله د څو ورځو په موده کې د کلینیکي علایمو د غلې کېدو له امله او د څو هفتو یا میاشتو په ترڅ کې د پرتین یوریا او هیماچوریا د له منځه تللو له امله مطلوبه ده.

تشخیص

- د مالګې او مایعاتو د احتباس پیل چټک دی، د سترګې د شاوخوا له پړسوب او د پښو بې درده پټینګ اډیما.
- ادرار د کولا رنگ ته ورته دی، تیره ادرار د هیماچوریا نښه ده.
- په هغه صورت کې چې د پښورګو ستونزه او اختلال زیات وي، د وینې لوړ فشار هم شتون لري.
- اولیګیوریا له غلیظ ادرار سره مل دی.
- احتیاط: هغو ناروغانو ته چې اولیګیوریا لري ډیر مایعات تر هغه وخته چې حاد گلومیرولونفریت یا AGN د اولیګوریا د لامل په توګه رد نشي، تجویز نه کړئ.
- حاد گلومیرولونفریت یا AGN له ۱۲-۵ کلنو ماشومانو کې ډیر معمول دی او له درې کلونو څخه په کوچنیو ماشومانو کې معمول نه دی.
- زیاتره ناروغان د ستوني سترپتوکوک انتان او یا د جلدي انتان (Pyoderma) له یوې تاریخي څخه حکایت کوي. د ستوني فعال ستر پتو کوک انتانونه یا د جلد انتانونه دې و ارزول شي.
- نور وصفی اعراض یې د ضعف، بې حالی، د خټې درد یا د اړخ درد او تبه ده.
- د ادرار په معاینه کې د وینې د سرو حجراتو (RBC) شتون، د کاسټ شتون، پروتین یوریا او پلي مورفونو کلیر لوکوسیتونه ښي. د RBC کاسټ په گلومیرولونفریت دلالت کوي.
- د AGN حاد اختلاط د وینې د لوړ فشار او د سودیم او مایعاتو احتباس دي.
- د وینې لوړ فشار په ۶۰ سلنه ناروغانو کې لیدل کیږي او د پښو لس سلنه کېدای شي له هایپر تنسیف انسفالوپاتي سره مل وي.
- د دې ناروغۍ نورو قوی اختلاطاتو کې د زړه عدم کفایه د سږي له اډیما سره او اختلاج د دماغي اډیما له امله شامل دي.

درملنه

له درملو پرته درملنه

په غذايي رژیم کې باید د بدلون توصیه وشي. د پروتین، سودیم (مالګه)، پوتاشیم (لکه کیله، رومیان او د پوتاشیم نورې غذايي منابع) او مایعات باید د وینې د لوړ فشار په پېښو کې محدود شي.

د درملو په وسیله درملنه

- د جلد او یا ستوني سترپتوکک هر ډول ځانګړي انتانونه دې د Pencillin او یا د هغه د بدیل په وسیله تر درملنې لاندې ونیول شي (۴،۵،۲ برخه، د تانسېل باکټریایي التهاب او ۱۳،۱ برخه امپټیګو دې مطالعه شي)
- د وینې د پیژندل شوي لوړ فشار درملنه دې وشي (۶،۱ برخه، د وینې سیسټمیک لوړ فشار دې مطالعه شي)
- د حاد گلومیرولونفریت اختلاطات AGN لکه د سږو اډیما (۱۶،۱ برخه، د سږو حاد اډیما دې مطالعه شي)، د زړه د عدم کفایې (۶،۲ برخه، د زړه عدم کفایه دې مطالعه شي) او اختلاج (۷،۱ برخه مرګی مطالعه کړئ) درملنه دې وشي.

ليږدول

ټول ناروغان روغتون ته د ډيرې ارزونې، څېړنې او درملنې لپاره وليږئ.

وقايه

لومړنۍ تشخيص، مناسبه درملنه، د سترېتوګوکل انتانونو تعقيبول.

دولسم څپرکی د اندوکرين د سيستم ناروغي ENDOCRINE SYSTEM DISORDERS

۱۲.۱ د شکرې ناروغي (Diabetes Mellitus)

تشرېح

شکره يوه ميتابوليکه ناروغي ده چې د وينې د گلوکوز له دوام دارې لوړې کچې سره څرگندېږي. شکره کېدای شي د ارثي او محيطي کچې شمېر فکتورونو له امله د پانقراس له حجرو څخه د انسولين د نيمگړي افراز، د Insulin پر وړاندې د مقاومت او يا دواړو حالاتو له کډون څخه رامنځته شي.

- شکره کېدای شي د شعور له اختلال، کوما او شاګ سره د لاندې حاد (بېړنيو) حالاتو لامل شي:
- هايپرګلايسيميا (د گلوکوز زياتوالی په وينه کې) له کيتواسيدوزس يا له هغه پرته (۱۲،۲ برخې، هايپرګلايسيميا او کيتواسيدوزس دې وکتل شي).
- هايپوګلايسيمي (د وينې د گلوکوز غیر نورماله کمېدل) (۱۶،۸ برخې هايپوګلايسيميا ته دې وکتل شي).

شکره کېدای شي له څو کلونو څخه وروسته د لاندې مزمنو اختلاطاتو لامل شي.

- د زړه، پښتورگو او اوعيو ناروغي.
- د معافيتي سيستم د دندو کمېدل.
- مزمن ټپونه.
- Blindness يا ښکته کول.

معمولا درې ډوله شکره شتون لري:

- لومړۍ ټايب، د بابت
 - کېدای شي د عمر په هر وخت کې پېښ شي مګر معمولاً په ماشومانو او ځوانانو کې او د ښوونځي له عمر څخه مخکې په يوه لوړه کچه واقع کېږي.
 - د لومړنيو ډېرو شديدو اعراضو سره څرگندېږي. (د تشخيص برخه دې لاندې وکتل شي).
 - په پلازما کې د گلوکاکون د لوړيدو او د دوراني انسولين د حقيقي نه شتون سره يوه کتابوليکه ناروغي ده.
 - دا کتابوليکه ناروغي د روغيدلو په موخه د انسولين په وسيله درملنې ته اړتيا لري.
- دويم ټايب د بابت
 - په څرگنده توګه په لويانو او د زړښت په دوران کې (ډېر لږ په ماشومانو کې) لېدل کېږي
 - زياتره له چاغوالي سره مل وی چې د ناروغي په شدت کې عمده او مهم رول لوبوي.
 - لومړنۍ اعراض يې په تدريجي توګه څرگندېږي. مخکې له دې چې ناروغي تشخيص شي ناروغ زياتره د بابت له مزمنو اختلاطو سره مراجعه کوي.
 - معمولاً په غذايي رژيم کې له بدلونونو، د خوړلي له لارې د بابت ضد درمل يا د دواړو په وسيله يې درملنه کېږي
 - د اميدواری د مهال د بابت (Gestational diabetes): د اميدواری پرمهال د وينې د گلوکوز له لوړيدو سره څرگندېږي.
 - غالباً د ولادت څخه په مخکې څارنه يا معاينه کې د گلوکوز د چک کولو په وسيله څرگندېږي.
 - د معالجې ډاکټرانو او ولادي متخصصينو له تيم سره دقيقې درملنې ته اړتيا لري او ناروغ بايد وليدل شي.
 - کېدای شي له ولادت څخه وروسته هم دوام وکړي او يا بيا د ژوند په دوران کې څرگند شي.
 - درملو په وسيله درملنه د شکر د ناروغي د درملنې لپاره د EPHS يا د روغتونيزو خدمتونو په ټولګه کې محدوده وي.
 - ټول ناروغان ليرلو ته اړتيا لري.

- د BPHS اړوند روغتيايي مرکزونو کې کېدای شي لاندې اقداماتو ته اړتیا وي:
 - د شکر ناروغي د عاجلو پېښو درملنه دې وشي. (۱۲.۲ برخه، هايپرگلايسېما او کيتواسيدوزس او ۱۶.۸ برخه هايپوگلايسېما دې وکتل شي).
 - په مزمنو پېښو کې او يا EPHS روغتيايي مرکزونو ته د تللو پرمهال له ناروغانو سره مرسته کول.
- د شکر تشخيص
 - لومړی ټایپ شکره له ډيرو شديدو او څرگندو کلينيکي موندنو سره څرگندېږي سره له دې چې معمولي اعراض او علايم کېدای شي د شکرې په هر ټایپ کې شتون ولري چې عبارت دي له:
 - بولي يوريا - د ادرار پرله پسې او زیاتې اندازې اطراح.
 - تنده او په زیاته اندازه د اوبو څښل.
 - د شپې له مخې ادرار
 - ضعف او ستړیا
 - په غیر روښانه توګه د وزن بایلل او يا په ماشومانو کې د ودې او پرمختیا او د وزن اخیستلو نشتوالی.
 - د لیدو، کمزورتیا يا ناروغي.
 - بیاځلي يا ستېدونکي انتانات په ځانګړې توګه جلدي اېسې، د بولي لارو انتانات، مېلې التهاب، خارش او نور فنگسي انتانات.
 - د مزمنو اختلاطاتو شواهد
 - محيطي نیوروپتي
 - د وعایي ناروغيو علايم
 - د زړه اسکیميکې ناروغي
 - دزړه سخته
 - د پښو ټپونه
 - د ولادي اختلاطاتو تاریخچه (د امیدواری د مهال شکره)
 - عقامت
 - پرله پسې مړه شوي ولادتونه (دنيا ته مړ نوی پیدا شوی ماشوم راوستل)
 - غټ ماشوم
 - لابراتوري موندنې
 - د وينې ګلوکوز (په هغه صورت کې چې Strip test يا ګلوکومتر شتون ولري)
 - په وينه کې د ګلوکوز د کچې د ټاکلو ټسټ په وړې يا FBS حالت کې ډیر رښتینی او دقیق وي، هغه وخت چې د ګلوکوز اندازه له ۱۲۶ mg/dl څخه په يوه معاینه کې زیات وي، د شکر شتون ثابتوي.
 - په مړه ګېټه دوينې دګلوکوز کچه: په هر ډیسي لیتر کې له ۲۰۰ ملي ګرامو څخه د ګلوکوز زیاتوالی.
 - د ادرار Dipstick: له ++ ډېر ګلوکوز.
 - له شکر سره مل سملاسي څرګندونې عبارت دي له:
 - هايپرګلايسېما
 - هغه ناروغان چې تشخيص شوي نه وي يا نیمګړی کنټرول شوی شکر لري، کېدای شي د دېهایدریشن، د شعور د اختلال، د کوما او شاک په حالت کې مراجعه وکړي (لاندی وګوري).
 - هغه ناروغان چې اوږدمهاله شکر لري زیاتره د زړه ناروغيو، ستروک يا د زړه سکټې، انتانات او يا پنډیدو ته ډیر مساعد وي.
 - هايپوګلايسېما
 - هغه ناروغان چې د انسولین د زیاتې اندازې او يا د خوړلې له لارې د شکر ضد درملو د اخیستو له امله هايپو ګلايسېمیا لري کېدای شي په چلند يا حالت کې له یو بدلون، د شعور له اختلال او يا کوما سره مراجعه وکړي

(۱۶ و ۱۸ برخې، هايپوگلايسيميا دې وکتل شي).

درملنه

د BPHS د پرسونل په موخو کې لاندې موارد شامل دي:

- ناروغي تشخیص او ناروغان وليري.
- د شکرې د عاجلو حالاتو درملنه دې وکړي او بيا دې وليري.
- د ناروغي د مزمو پېښو لپاره د اهتماماتو او مراقبت برابرول.

له درملو پرته درملنه

- ډاډ تر لاسه کړئ چې ناروغ خپل درمل له هغه روغتیايي مرکز څخه چې ورته استول شوی دی په سمه او منظمه توګه اخیستي دي.
- د چاغو ناروغانو لپاره د مناسب غذايي رژیم د اخیستلو په پام کې نیول او له هغو سره مرسته کول څو خپل وزن کم کړي.
- ناروغانو ته توصیه وکړئ څو لاندې موارد په پام کې ولري:
 - د خوړو له زیات لګښت څخه ډډه کول.
 - په ورځ کې درې ځله په منظمه توګه خواړه خوړل، متوازنه او مناسبه خوراک.
 - د الکولو له څښلو څخه ډډه کول.
 - د فزیکي منظمو تمریناتو تر سره کول (سپورټ کول).
 - د سګرټو له کارولو څخه ډډه کول.
- د اوږدمهاله اختلاطونو وقایه کول.
 - د انتاناتو څارنه او څیړل.
 - د وينې د فشار کنټرولول.
 - د ناروغ د سترګې د ستونزو او لید څارنه او څیړل.
 - روغتیا ساتنې ته پاملرنه او له جلد څخه څارنه، د هغو ټپونو درملنه چې د پرمختګ په حال کې وي.
 - په پښو کې د تراوما او یا د ترضیضاتو له رامنځته کېدو څخه مخنیوی یا ډډه کول.

د درملو په وسیله درملنه

- د شکر لومړی ټایپ - Insulin د EPHS په روغتیايي مرکزونو کې پیل شوی دی
- د شکر دویم ټایپ - د غذايي رژیم کنټرول د خولې له لارې د شکر له ضد درملو یا له هغه پرته لکه څرنګه چې په EPHS روغتیايي مرکزونو کې پیل شوی دی.
- د شکر د ناروغي حادثې پېښې: د شعور اختلال، کوما، دیهایدریشن
 - د کینواسیدوزس سره په هايپرګلايسيميا د شګمېندو په حالت کې مایعات اعاده او ناروغ دې وليردول شي. (۱۶.۹ برخه، شاک "د مایعاتو د اعادې په موخه" دې وکتل شي.
 - په هايپو ګلايسيميا د شګمېندو په حالاتو کې دې ناروغ ته د خولې له لارې یا ناروغ ته د وريد د داخل د زړو له لارې ګلوکوز تجویز شي او بيا دې ناروغ وليرل شي.
 - که چیرې ناروغ په کوما کې وي او د وينې د ګلوکوز کچه یې معلومه نه وي په دې صورت کې د هايپوګلايسيميا درملنه ناروغ ته ترسره کړئ (یعنې ناروغ ته د ګلوکوز ورکول) او بيا د هغه ليرل. (۱۶.۸ برخه، هايپوګلايسيميا دې وکتل شي).

ليږدول

- په ټولو هغو ناروغانو چې د شکر شک کيږي باید د لابراتواري معایناتو او مناسبې او ښې درملنې لپاره د EPHS روغتیايي مرکزونو ته وليرل شي.

- هغه ناروغانې چې د امیدواری د مهال شکر لري باید له ولادت څخه د مخکې ځانگړو خدمتونو او څارنو څخه برخمن شي (د مثال په توگه الټراسونډ) په هغه صورت کې چې شتون لري.
- بېړني حالات باید له لږولو څخه مخکې تر درملنې لاندې ونیول شي او ناروغان باید د طبي پرسونل په وسیله ولیږدول شي. (۱۶۸ هایپرگلاسیسمیا دې وکتل شي).

وقایه

- د شکرې دویم ټایپ: په ځینو ناروغانو کې کېدای شي له لاندې حالاتو څخه په استفادې وقایه یا درملنه یې وشي:
 - د وزن کنټرولول (یعنې په چاغو ناروغانو کې د وزن کمول)
 - سم او مناسب خوراکي رژیم.
 - په منظمه توگه فزیکي تمرینونه.
- د شکر د اختلاطو مخه کېدای شي د لاندې حالاتو په وسیله ونیول شي او یا لږ تر لږه کم شي:
 - په سمه توگه د وینې د شکرې کنټرولول.
 - له انتاناتو څخه وقایه کول.
- بڼه روغتیا ساتنه
- د جلد او په ځانگړې توگه د پښو سمه څارنه.
- د موضعي ترضیضاتو د راپیدا کېدو څخه د مخنیوي په موخه د مناسبو پوټانو کارول.

ناروغانو ته لارښوونې.

- د راجع شوي روغتیايي مرکز د لارښوونې سره سم د درملو په اخیستلو کې د ناروغانو پاملرنه او ارزونه.
- د فعالیتونو په تر سره کولو کې د ناروغانو ارزول او لیدل چې باید د لیرونکي روغتیايي مرکز د لارښوونې سره سم تر سره شي. د بېلگې په توگه له گلوکومتر څخه څه او د هایپرگلاسیسمیا د اعراضو پیژندل او دا چې څرنگه باید دا حالات کنټرول کړي.
- د ناروغانو د خوراکي رژیم پیاوړي کول او ارزول او هغوی ته د فزیکي فعالیتونو یا ورزش لارښوونه.
- د ناروغانو څخه دې غوښتنه وشي څو د شکر د تشخیص کارت، د Insulin دوز او د خپل کورني ډاکټر نوم او شمېره له ځان سره ولري.
- په دې اړه ناروغ ته د پوهاوي ورکول چې ځینې وخت شکر په کورنیو کې هم لیدل کیږي، له دې امله د شکر د اعراضو څارنو د کورنۍ په غړو کې هم مهم دی.

۱۲.۲ هایپرگلاسیسمیا او کیتواسیدوزس (Hyperglycemia and ketoacidosis)

تشریح

د بیا بیټیک کیتواسیدوزس یوه طبي بېړنۍ ژوند گواښونکې پېښه ده. د بیا بیټیک کیتواسیدوزس کېدای شي د لومړي ټایپ د شکر لومړنۍ څرگندونه وي او د لومړي ټایپ په ناروغانو کې اسلولین ته د اوتیا د زیاتوالي په پایله کې له انتاناتو، تروما، د زړه له احتشا او یا جراحي سره د مخ کېدو پرمهال رامنځته شي. د دویم ټایپ په ناروغانو کې کیتواسیدوزس کېدای شي د یو شدید فشار (سترس) لکه انتانات او یا تروما (ترضیض) په پایله کې منځ ته راشي.

تشخیص

- مخکې له دې چې د دې پېښې حاد اعراض او علایم څرگند شي د کیتواسیدوزس تشخیص پر خفیفو اعراضو ولاړ وي.
 - خفیف اعراض
 - پولي یوریا (یعنې د ادرار زیاته اندازه اطراح او بیا بیا ادرار کول).
 - تنده او د زیاتې اندازې اوبو څښل

- زړه بدوالی او کانګې.
- د پښو درد
- کمزورتیا او سټریا
- په ماشومانو کې له روښانه لامل څخه پرته د وزن بایلل او د وزن نه اخیستل او د ماشوم په وده کې ستونزه.
- د لیدو څیره والی.
- خټی درد.
- حاد اعراض او علایم.
- دیا بیټیک کیتواسیدوزس چې د شکرې په لومړي ټایپ کې لیدل کیږي د شکرې له وصفی اعراضو او علایمو سره له لاندې حالاتو سره مل وي:
 - شدید دیهایدریشن د سترګو له ژوریدو سره، وچ جلد او د جلد د Turgor کمېدل.
 - د وینې د فشار ټیټېدل. (د وینې د حجم کمېدل)
 - د اسیتون له بوی سره چټک او ژور تنفس.
 - چټک او کمزوری نبض
 - د حرارت د درجې کموالی
 - د شعور اختلال.
 - خوبجن والی، کوما او یا دواړه حالاته
 - د وینې د ګلوکوز لوړېدل (هایپرګلاسیسمیا) له 11mmol/L څخه زیات او یا 200mg/dl څخه زیات.
 - په ادرار کې د ګلوکوز اندازه د Dipstick په وسیله یعنې د ګلوکوز اندازه ++ یا له هغه څخه ډیر وي.
 - په ادرار کې د کیتونونو اندازه د Dipstick په وسیله یعنې د کیتون اندازه ++ یا له هغه څخه زیات وي.
 - اسیدوزس: د وینې pH له ۷.۳ څخه کم.
- هایپر اوسمولار Non-ketotic حالات، چې د شکرې په دویم ټایپ کې لیدل کیږي؛ له Diabetic ketoacidosis سره یوشان اعراض او علایم لري، پرته له دې چې په دې حالت کې د ادرار په Dipstick کې کیتون نشته.

درملنه

- Ketoacidosis درملنه د دیهایدریشن د اصلاح څخه عبارت ده. (۱۶.۹ برخه، شاګ او ۱۶.۹ ج جدول دې وکتل شي). او بیا دې ناروغ د Insulin د تجویز لپاره ولیردول شي (چې په سیمیزو او ولایتي روغتونونو کې شتون لري)
 - په درملنه کې باید د ګلوکوز د پایلې د معلومېدو ترمهاله او یا لېږلو کې خنډ ونه وشي.
 - که چیرې تشخیص د هایپرګلاسیسمیا او هایپوګلاسیسمیا ترمنځ روښانه نه وي په لومړي قدم کې دې د ناروغ د هایپوګلاسیسمیا درملنه وشي. (۱۶.۸ برخه، هایپوګلاسیسمیا دې مطالعه شي)
 - احتیاط: د وینې د ګلوکوز ټیټه کچه د ژوند لپاره د سملاسي خطر ښودونکي وي.
- هایپرګلاسیسمیا او هایپر ازمولر حالت (له یا پرته له Ketoacidosis) یوه سملاسي بهرنۍ پېښه ده او د مایعاتو اعادي اوعا جلو لېږلو ته اړتیا لري.

دیارلسم خپبرکی جلدي ناروغی Skin Conditions

۱۳.۱ امپیتیکو (مردار دانه) (Impetigo)

تشریح

یو ډیر ساري، سطحي جلدي انتان دی چې زیاتره د سترپتوکوکونو او ستافیلوکوکونو له امله پیدا کیږي. دا ناروغي په ماشومانو کې معمول ده او کېدای شي په لویانو کې هم پېښه شي. امپیتیکو کېدای شي له مخکې موجود خاږښ لرونکي د ر ماتوزونو (لکه اکزیم، lice، کووي او تبخال) د اختلاط په پایله کې مینځ ته راشي. د امپیتیکو کم اختلاط عبارت دي له: اېسي، پیوډرمي، د لمفاوي غدو التهاب، سپټیسیمیا او د سترپتوکوکال د انتاناتو څخه وروسته حاد گلوبیرولونفریت.

تشخیص

- خیر لرونکي کوچني شېرېدلې زخمونه معمولا په زیر طلايي رنگ.
- ویزیکولونه له زیر رنگه مایع او یا له خفیفې تیره مایع سره.
- د مخ لومړنۍ اخته کېدنه چې بیا غاړې، منو او پښو ته خپریږي.
- خینې وخت د خاږښ شتون.
- درد لرونکي ټپونه.
- ټپونه کېدای شي د ورځو یا اونیو پورې دوام وکړي.

درملنه

له درملو پرته درملنه

- هر جلدي ټپ باید پاک وساتل شي.
- جلدي ټپونه له اوبو او صابون سره و مینځی او وچ کړئ. د موضعي درملنې له تطبیق وړاندې په ورو توگه خیر لري کړئ.
- لاسونه باید په منظمه توگه له صابون سره و مینځی.

د درملو په وسیله درملنه

- د موضعي امپیتیکو لپاره په ورځ کې دوه ځله موضعي درملنه پر ټپونو او د پوزې د سوریو په وروستیو برخو کې تطبیق کړئ:

O Gentianviolet ۰.۵ سلنه

او یا

O Neomycine sulfate مرحم

او یا

O Bacitracin Neomycin (چې په DHS یا د ولسوالیو په روغتونونو کې شتون لري).

- د پراخ امپیتیکو لپاره د میکروب ضد سیستمیک درملنې څخه گټه واخلي (لکه له درې ټپونو څخه زیات، د عضویت د څو ناحیو اخته کېدل، پولوز ناروغی، اېسي او یا تبه).

O د لومړۍ کړنې درمل Penicillin دی:

- ناروغ ته دې Penicillin-v د خولې له لارې ورکړل شي (یعنې د خولې له لارې Phenoxymethyl-Penicillin (Penicillin) د اوو ورځو لپاره. د کوچنیانو او لویانو لپاره د معیار دوز د مطالعې لپاره دالف په مل پاته

کې الف ۶ جدول ته مراجعه وکړئ.
او يا

- Penicillin Benzyl procaine ژور عضلي زرق د اوو ورځو لپاره.
- له ۳۰ کيلو گرامه څخه کم وزنه ماشومان: ۶۰۰۰۰۰ يونته.
- له ۳۰ کيلو گرامو څخه زيات وزن لرونکي ماشومان: ۱،۲ Million يونته
- اويا-
- د دويمې کرښې درمل: د خولې دلاړی Cloxacillin
- ماشومان: ۱۵-۱۰ mg/kg/dos هر شپږ ساعته وروسته د اوو ورځو لپاره
- لويان: ۲۵۰-۵۰۰ ميلي گرامه هر شپږ ساعته وروسته د اوو ورځو لپاره.

او يا

- د هغو ناروغانو لپاره چې د Penicillin سره حساسيت لري: Erythromycin Ethylsuccinate دې د اوو ورځو لپاره تجويز شي.
- ماشومان: د معيار دې دوز د مطالعې لپاره دې د الف په مل پاڼه کې الف ۱۲ جدول ته مراجعه وکړي
- لويان: ۸۰۰ ميلي گرامه (دوه ټابليټه ۴۰۰ ميلي گرامه) هر شپږ ساعته وروسته

ليږدول

- په ادرار کې وينه، په ادرار کې پروتين او يا په گلو ميرولونفريت شکمنډل (۱۱.۲ برخه "سخت گلو ميرولونفريت" دې مطالعه شي)
- په هغه صورت کې چې له يوې اونۍ درملنې وروسته ښه کېدل و نه ليدل شي.

مخنيوی

- د هر جلدي انتان پاکول له پاکو اوبو او صابون سره.
- د گوتو د نوکا نو لنډ ول او پاک ساتل، د گړولو څخه ډه ډه کول.
- د پاکو اوبو او صابون په وسيله هره ورځ د روغتيا ساتنې پاملرنه.
- پر ټپونو د مرحم يا کريم له تطبيق څخه وروسته د لاسونو مينځل.

۱۳.۲ د جلد فنگسي انتانونه او Fungal Skin Infection and Napkin (Diaper) Rash

تشریح

د جلد اوسر فنگسي انتانات زياتره وخت د درماتوفيتونو (Tinea) او Candida albicans له امله راپيدا کيږي. د عضويت ټولې برخې ممکن زيانمنې کړي مگر هغه برخې چې له دوام داره رطوبت سره مخ دي يا د خپلو موضعي انتونومي له امله (لکه جلدي گونځې، دپښو د گو تو مينځونه، او يا د ورنو نو ناحيې) او يا د چاپيريال لا ملو نه (لکه د يو غړي تړلې پوښ او مرطوبه هوا) رامنځته کيږي.

Napkin يا Diaper رش، د نوي پيدا شوي ماشوم د ډاير په ناحيو کې د جلد يو خاړن لرونکی التهاب دی (له يو کال څخه په کوچنيو ماشومانو کې) چې کېدای شي په ثانوي توگه د فنگس (ډېری وخت د کاندېديا) يا د بکتریا په وسيله متن شي. د فنگسي انتانونو ډولونه په لاندې ډول دي:

- Tinea pedis: د پښو درماتوفيت ډوله فنگسي انتان په ځانگړې توگه د پښو د گوتو په منځ کې.
- Tinea cruris: د ورنو د منځ ناحيې درماتوفيت ډوله فنگسي انتان.
- Ring worm: د جلد درماتوفيت (Tinea) ډوله فنگسي انتان.
- Tinia capitis (scalp ringworm): د سر د جلد درماتوفيت ډوله فنگسي انتان دی چې زياتره ماشومان زيانمنوي.
- Candidiasis: هغه فنگسي انتان چې د پوستکي گو نخي زيانمنوي. لکه: د ورنو مينځ، تن، خوله او مهبل.

- د نوکانو فنگسي انتان (ډیر کم)

تشخيص

- د ناروغۍ څرگندیدنه د فنگسي انتانونو د ټولو ډولونو او بڼو لپاره یو شان ده.
- د غړي د هرې برخې فنگسي انتان په څرگنده توګه له سپین یا خا سف او یا سور رنګه تفلېس سره شتون لري چې لږ څه وتلی او له سوخت او څارښ سره مل وي.
- Ring worm بې په لاندې بڼو څرګندیږي.
- O زیاتره ګردې ټپونه له ضمیمو څنډو سره.
- O د سر Rng worm کېدای شي له بې وېښتو داغونو سره شتون ولري.
- کانډیایي انتانات: زیاتره یې په څرګنده توګه سور (اریتماتوز)، مرطوب، خام او جلا لرونکی څرګندیږي.
- ویزیکولونه کېدای شي په التهابي حالاتو کې څرګندې شي.
- ثانوي باکتریايي انتان کېدای شي د زوو له را وتلو سره یوځای وي.

درملنه

له درملو پرته درملنه

- د درملنې تر ټولو مهم اصل د ساحې وچ او پاک ساتل دي (په ځانګړې توګه په Napkin rashes کې)
- Tinea capitis (Scalp ringworm) - د سر د هماغې برخې د وېښتانو خړیل.

د درملو په وسیله درملنه

- د دریو اونیو لپاره هره ورځ دوه ځله د Gentian violet تطبیقول. دا درملنه زیاتره د د ټولو فنگسي انتاناتو لپاره اغیز لرونکی وي په ځانګړې توګه که چېرې ناحیه نم لرونکې او مرطوبه وي.
- او یا
- له موضعي کریمونو څخه ګټه Benzoic acid + Salicylic acid (۳٪/۶٪) هر ورځ دوه ځله د دریو اونیو لپاره تطبیق شي (د زیاترو فنگسي انتاناتو لپاره اغیزمن دی)
- احتیاط: موضعي کریمونه Benzoic acid + Salicylic acid (۳٪/۶٪) د نویو پیدا شویو ماشومانو لپاره چې Napkin rash لري د جلد په راتاو یا قابضه ځایونو کې دې تجویز نشي ځکه کېدای شي د تخریشیدو لامل کیږي.
- له
- د خوږې، مري، کولمو، مېلې او جلدې کانډیدایزېس لپاره Nystatin تجویز کړئ.
- یادونه: Nystatin موضعي کریم (۱۰۰۰۰۰ یونټه) د ورځې دوه ځله د دوه اونیو لپاره په Napkin rash کې چې د Gentian violet په وسیله او له درملو پرته درملنې سره نه دی روغ شوی، تطبیق یا کارول کېدای شي.
- O Nystatin مستحضرات (۱۰۰۰۰۰ lozeng IU)، pessary (۱۰۰۰۰۰ IU)، ټابلیټونه (۱۰۰۰۰۰ IU یا ۵۰۰۰۰۰ IU) او یا خوراكي شربتونه (۱۰۰۰۰۰ IU/ml) په اشکالو شتون لري.
- O Nystatin دوز
- د خوږې د کانډیدایز لپاره (له یوې میاشتې څخه لوی ماشومان او لویان: Nystatin oral ۱۰۰۰۰۰ IU له خوړو وروسته هر شپږ ساعتو په واټن د اوو ورځو لپاره او یا د ټپونو د له منځه تللو څخه وروسته تر ۴۸ ساعتونو.
- مېلې کانډیدایز: د لویانو لپاره Nystatin Pessery باید تطبیق شي. ناروغ ته دې لارښوونه وشي چې له ۱-۲ جامد مېلې درمل د شپې پرمهال په مېل کې داخل کړي او لږ تر لږه د دوه اونیو لپاره یې وکاروي.
- یا
- Zinc oxide د موضعي کریم توصیه د Napkin rash لپاره چې (په DHS یا د ولسوالۍ په روغتون کې د لاسرسي وړ دی).

ليږدول

- هغه پېښې چې د درملنې په ترڅ کې دېرې خړا بېږي.
- په هغو حالاتو کې چې له درېو اونيو درملنې څخه وروسته بڼه والې ونه ليدل شي.
- تېه او يا روښانه زوې يا قيح
- د نوکانو اخته کيدل.

مخنيوی

- له فنگسي انتانونو څخه د مخنيوي بنسټ د جلدي ناحيو د اوږدمهاله رطوبت سره له مخامخ کېدو څخه ډډه کول دي.
- خطر ته مساعد ځايونه په ورځ کې دوه ځله پاک او وچ کړی
- د بدن له خطر سره مخ کېدونکې ناحيې چې مرطوبې يا له اوبو سره مخ کيږي بايد وچې شي.
- د جامو، ځان پاک او نورو لوازمو په ځانگړې توگه برس او شاپي له شريکولو څخه دې په جدي توگه ډډه وشي.
- پوز خلاصې بوتان او يا خپلې بايد د دوې د تودو مياشتو په ترڅ کې په پښو شي.
- د غير اړينو انټي بيوتيکونو له گټې څخه دې ډډه وشي ځکه چې د فنگسي انتانونو خطر زياتوي.

ناروغ ته لارښوني

- د زيانمن شويو برخو پر وچ او پاک ساتلو ټينگار.
- د ډاير يا د ماشومانو د جامو ليرکيږک په منظمه توگه بدلول، د امکان په صورت کې د زيانمن شويو نواحيو په مستقيمه توگه د لمر له وړانگو سره مخ کول.
- د ناروغ د تعقيب او ارزونې لپاره دې له درې اونيو وروسته مراجعه وشي (په هغه صورت کې چې د ناروغ حالت خراب شى تر هغه ژر).

۱۳.۳ فرانکل (Furunculosis)

تشرېح

فرانکل يا د مل (Boil) د وينتا نود فولیکول او د گرد چا پېره درم يو موضعي انتان دی چې معمولا دطلايي ستافيلوکوکوسونو *Staphylococcus aureus* له امله راپيدا کيږي. په يو کاربونکل کې دوه يا زيات فورانکلونه يوځای شوي وي. سرونه يې جلا وي چې ځينې وخت د تې او لمفواي عقداتو د لويډو سره مل وي.

تشخيص

- ناروغ د وينتانو په شاوخوا يوشمېر حساس جلدي، پرسيدلي، سره رنگه او گردې پلاکونه لري.
- د هغه انتخابي ځايونه د غاړې شا، د تخرگ لاندې او *Buttock* ناحيې وي مگر فورانکلونه کولای شي د بدن په هره برخه کې رامنځته شي.
- زياتره دملونه کوچنيو ايسو ته پراخېږي. بيا مرکزي نکروز پکې منځ ته راځي او د جلد له لارې څېرې کيږي چې له هغوی سره د زوو او د نکروتيک پاتې شونو افرازات څرگنديږي.
- ناروغ کېدای شي عمومي اعراض لکه تېه او د لمفواي عقداتو غټوالی ونښي.

درملنه

له درملو پرته درملنه

- د اوبو او صابون په وسيله مينخل.
- په موضعي توگه تاوده تطبيقات په ورځ کې درې ځله په التهابي ځايونو کې د فورانکل د پرمختيا او بو خوالی لپاره او تر هغه وخته دې دوام ورکړل شي چې فورانکل تخليه کېدل پيل کړي. تر هغه وخته چې فورانکل پخېدو ته نه

- وي رسيدلی باید په هغه کې ستن و نه وهل شي او څيرې نشي (د يوې اېسې بڼه غوره کړي).
- يو فورانکل چې پخېدو ته رسيدلی وي خپله ناروغ يې څېړولی شي او تخلیه کولای شي. د اېسې د وچولو لپاره له تعميم شوي گاز څخه ګټه واخلي. (د اړتيا په صورت کې ۱۱.۱۶ برخې، «اېسې» ته مراجعه وکړئ)

د درملو په وسيله درملنه

- هغه وخت چې لومړني اندفاعات تازه او په حاد التهابي بڼه وي له څېړولو او تاودو مرطوبو تطبيقاتو (تود ټوکر) څخه ډډه وکړئ.
- که چېرې عمومي اعراض (تبه، د لمفاوي عقداتو غټېدل) شتون ولري او يا دا چې فورانکل په پورتنی شونډه، د غوړ د کانال او پوزه کې رامنځته شوی وي، انټي بيوتيک دې وکارول شي:
- Erythromycin O دې د خولې له لارې تجويز شي. د ماشومانو او لويانو لپاره د معياري دوز د مطالعې په موخه د الف په مل پايه کې د الف ۱۲ جدول ته دې مراجعه وشي.

او يا

O Cloxacillin دې لارې دې کپسول تجويز شي:

- ماشومان: له ۱۵-۱۰ ميلي گرامه د بدن د وزن په هر کيلو گرام، هر دوز، شپږ ساعته وروسته د اوو ورځو لپاره.
- لويان له ۵۰۰-۲۵۰ ميلي گرامه هر شپږ ساعته وروسته د اوو ورځو لپاره.

له

- د غوړ په خارجي کانال، پورتنی شونډه او پوزه کې د فورانکل په پېښو کې له سيستمیک انټي بيوتيک څخه برسیره انټي بيوتيک مرحم دې هم تطبيق شي. همدا راز د Saline محلول تاوده تطبيقات په پراخه توګه وکاروئ.

ليږدول

- داعراضو خرابيدل
- د درملنې په ترڅ کې د عمومي اعراضو څرګندېدل.

مخنيوی

- د جلد د بڼې او مناسبې روغتيا ساتنې پاملرنه او د لاسونو مينځل.
- د جلدي پر پکړل شويو ځايونو او ټپونو پاکول او ساتنه.

ناروغ ته لارښونې

- هيڅکله په يو فورانکل لاس مه وهي او پر هغه فشار مه راوړئ په ځانګړې توګه په مخ، د شديدو انتاناتو د خپرېدو د خطر له امله.
- د بيا ارزونې او تعقيب په موخه درې ورځې وروسته او يا هم د ناروغی د زياتيدو او د ناروغ د حالت د خرابيدو په صورت کې دې مراجعه وشي.
- د لومړني درملنې له پيلولو وروسته دې د ناروغ جامې او روجايي هره ورځ و مينځل شي.

Sycosis ۱۳.۴

تشریح

Sycosis vulgaris د ډيری دنا حیی يو پيري فولیکولر ځنډنی، پوستولر سترپتو کوکل انتان دی چې له التهابي پاپولونو او پستولو سره څرګندېږي. دا ناروغي اصلا په نارینه و کې پېښیږي او په ښځو کې يې پېښېدنه ډیره کمه ده. دا ناروغي په پیل کې شديده او سخته و او رغېدنه يې اوږنۍ او مياشتې وخت اخلي او بيرته ستنېدو ته تمايل لري.

تشخيص

- له سوروالي، خفيف سوي او خارښ سره پيليږي. معمولاً په پورتنۍ شونډه کې پوزې ته نږدې ليدل کيږي، ممکن د زني د ږيري ناحيه او ډير کم د وينښانو نوري ناحيې اخته شي.
- په يوه يا دوه ورځو کې يو يا څو پستولونه چې سر يې د سنجاق په کچه وي د وينښانو په وسيله سوري کيږي او پرمختگ کوي.
- دا پستولونه له ږيري خړيلو يا مخ مينځلو وروسته چوي او يو سور رنگه ټکي له ځانه پر ځای پريږدي. چې وروسته د پستول د پيداکېدو لپاره يو مناسب ځای گڼل کيږي. په دې حالاتو کې انتان مقاومت کوي او ورو ورو خپريږي.
- په دې موده کې کېدای شي انتان په ژوره توگه فولیکول ته پراخ شي، چې په پايله کې له وينښو پرته په يوه اترو فيک سکار پستول چې د خيږ په وسيله احاطه شوی وي، بدليږي.
- د ناروغۍ په شديده حالاتو کې کېدای شي د سترگې د ښو التهاب د سترگې د متضمې له التهاب سره يوځای شتون لري.

درملنه

له درملو پرته درملنه

- ناروغ ته بايد لاندي مشورې ورکړل شي:
 - ټولې زيانمنې شوې ساحې دې د انتان ضد صابون (لکه ډيټول) په وا سطره ومنيځي، له پاکو اوبو سره دې په ورځ کې درې ځله ساحه پاکه کړي.
 - پريږدئ چې سطحي پستولونه په خپله وچوي او تخليه شي.
- د اړتيا په صورت کې د جراحي په وسيله ژور اندفاعات تخليه کړئ او ابسي بايد وپيژندل شي (ډير لږ پېښيږي).

د درملو په وسيله درملنه

- درملنه له انتي سپټيک کريم او يا انتي باکټريال کريم څخه او يا له دواړو څخه په گټې سره (هر يوه ته چې لاسرسی ولري).
 - Sulfadiazine کريم (په DHs يا ولسوالۍ په روغتون کې شتون لري) په زيانمن شوي ځای کې په ورځ کې دوه ځله تجويز کړئ.

او يا

- ناروغ ته ۰.۵ سلنه Gentian violet ورکړئ خو په زيانمن شوي ځای کې په ورځ کې تطبيق کړئ.
- که چېرې ناروغ د نرمو نسجونو انتان يا سلوليت ولري د سيستمیک انتي بيوتيک يو لنډمهاله کورس تجويز کړئ چې عبارت ده له:
 - د لومړۍ کړنې درمل: Cloxacillin ۵۰۰ ميلي گرامه (که چېرې د لاسرسي وړ وي) هر شپږ ساعته وروسته د اوو ورځو لپاره.
 - د دويمې کړنې درمل:
 - Chloramphenicol ۲۵۰ ميلي گرامه هر شپږ ساعته وروسته د اوو ورځو لپاره.

او يا

- Ciprofloxacin هر ۱۲ ساعته وروسته د اوو ورځو لپاره.
- احتياط: Ciprofloxacin د اميدوارو ښځو لپاره استېباب نلري او د امکان په صورت کې دې د ماشومانو لپاره هم د هغه له تجويزولو څخه ډډه وشي.
- که چېرې د ناروغانو بانه يا وريزه زيانمنه شوې وي د سترگې مرحم (۱٪) Tetracycline په ورځ کې درې ځله د اوو ورځو لپاره توصيه کړئ.

ليږدول

- د درملنې سره سره د ناروغ حالات خرابيدل. نوټ: sycosis زياتره د درملو په مقابل کې مقاوم وي.

- د ژورو اېسو د رامنځته کېدو په صورت کې د جراحي د مشورې او تخليي لپاره دې وليردول شي.
- او هغه حالات چې له سيستمیکو آفتونو سره څرگنديږي او يا هغه حالات چې د عضويت د معافيتي سيستم په کموالي شکمن اوسو.

مخنيوی

- د وينتانو د خړيلو د توکو د پاکوالي څخه ډاډ تر لاسه کول.
- د جلد د بڼې روغتيا ساتنې پاملرنه.

ناروغ ته لارښوني

- په هغه صورت کې چې د ناروغ حالت خراب شي بيا دې ډاکټر ته مراجعه وکړي.
- له نورو سره د سلمايي د توکو نه شريکول (د وينتانو د خړيلو وسايل)

۱۳.۵ تپي يا لرمي يا (Urticaria)

تشرېح

تپي يو جلدي وعايي غبرگون دی چې له خارښ لرونکو پېولونو او جلدي اذیما سره څرگنديږي. کېدای شي د درملو، د نباتاتو د دورو، د حشراتو د چيچلو او يا نورو تخريشونکو له امله رامنځته شي (له درملو پرته درملنه دې وکتل شي)

تشخيص

- د دانکېو (Wheal) څرگندېدل چې د يوې سرې رنگې کړۍ په وسيله په نامنظمه توگه احاطه شوي دي.
- کېدای شي ناروغ د سخت خارښ، درد او د چوڅېدلو له احساس څخه حکايت وکړي.
- د دانه کې مرکزې برخه کېدای شي پاکه شي او اندفاعات يو له بل سره وصل او يوه حلقوي يا پولې سایکليک منظره وښيي.
- له ناروغ څخه دې د ناروغۍ د تشديدونکو فکتورونو په اړه پوښتنه وشي (له درملو پرته درملنه دې مطالعه شي).
- د انافيلاکسي ډوله حساسيتونه او د وينې د تپې فشار بايد وڅارل وشي.

درملنه

له درملو پرته درملنه

- د ناروغ په همکارۍ د بورتيکاريا د دقيق لامل پېژندنه او د ممکنه لاملونو څخه د هغه ډډه کول چې په دې اړه بايد ناروغ ته لاندې مشورې ورکړل شي:
 - په غالب احتمال درمل د سختې اورتيکاريا لوی لاملونه شمېرل کيږي (لکه زياتره وخت پنیسيلینونه، انټي بیوتیکونه، آسپرین).
 - خواږه هم د سخت اورتيکاريا زيات لاملونه تشکيلوي، حساسيت کوونکي خواږه عبارت دي له: چالکېټ، کب، حبوبات، حسې، روميان، ځمکنی توت، خټکي، پنیر، هورده، پياز، هگۍ، شېدې، مرج او د مصالې ډولونه.
 - کېدای شي انتانونه له اورتيکاريا سره تړاو ولري. کېدای شي سخته اورتيکاريا د پورتنیو تنفسي لارو له انتانونو سره مل وي. چينچي هم کولای شي د اورتيکاريا لامل شي لکه اسکرېس، Echinococcus.
 - روحي لاملونه هم د کولینرجیک اورتيکاريا لامل کېدای شي.
 - انشافي لاملونه لکه د شنو بوټو دورې، حشرې چې د کور په دورو او خاورو کې وي، د الوتنکو بڼکې، د مالوچو دوره او خاوروه، د خاړو يو له پاتې شونو سره تماس، ارايشي او روغتيايي وسايل او يا د هوا ځاڅکي هم د اورتيکاريا په رامنځته کولو کې رول لري.

- ناروغ ته په دې اړه مشوره ورکول خو له سپرو يا تودو تطبيقاتو يا له حمام او شاور څخه د خارش د ارامولو په خاطر گټه واخلي.

د درملو په وسيله درملنه

- د خارش د ارامولو لپاره دې:
 - د Chlorphenamine maleate ټابليټ څخه گټه واخيستل شي. (د سټنډرډ دوز د مطالعې «د لوبانو او کوچنيانو لپاره» دې الف په مل پاڼه کې د الف ۷ جدول ته مراجعه وشي)
 - +
 - د Calamine موضعي محلول (په DHS کې شتون لري) د لنډمهاله ارامولو لپاره.
 - د انافيلکسي په شمول د شديدو غبرگونونو د درملنې لپاره (۱۶.۹ برخه «شاک» دې وکتل شي)

ليږدول

- ۲۴ - ۴۸ ساعتونو پورې د رغېدو په موخه د درملو په وسيله د درملنې نه برياليتوب.
- مزمنه اورتيکاريا
- عمومي اعراض

ناروغ ته لارښونې

- له هغو توکو، موقعيت او ځايونو څخه چې د اورتيکاريا د زياتيدو لامل کيږي بايد ډډه وشي.
- Chlorphenamine کېدای شي د گنگسوالي لامل شي له دې امله بايد له هغه څخه د گټې پرمهال د وسايو له چلولو، د ماشين آلاتو د کارولو او يا په تودوخه او حرارت کې له کار کولو څخه ډډه وشي.

Pediculosis ۱۳.۶

تشرېح

Pediculosis د بدن په په وينښته لرونکو برخو يا جامو کې د سپرو ځای پر ځای کېدلو څخه عبارت دی. د سر سپرې معمولاً په ماشومانو کې د سر د پوستکي په ناحیه او Pubic Lice د عاني په وينښتانو کې موقعيت لري. د بدن سپرې په جامو کې پيدا کيږي او د تغذيې لپاره بدن ته راځي. نوټ: د بدن سپره کېدای شي د تيغوس د تېې د ليردلو لامل شي.

تشخيص

- ناروغان په زيانمنه شوې ناحیه کې له يو شديد خارش څخه شکايت کوي.
- د هغوی کوچنی او سپينې هگۍ چې په وينښتانو کې نغښتي وي کېدای شي د پېژندلو وړ وي.
- د چيچلو نښې يې پر پوستکۍ د کتنې وړ وي په ځانگړې توگه د بدن د سپرو.
- Excoriation يا گرېدلۍ ځای او ثانوي انتانونه کېدای شي د چيچلي ځای د اختلاط له امله منځ ته راشي (ثانوي امپيټيگي، د غاړې د لمفوي عقداتو لويېدل د سر د سپرو سره يا د مغښي لمفوي عقداتو لويېدل د pubic lice سره پيدا کيږي)
- په pubic lice کې به منطقي وي خو جنسي ليرديدونکي انتانونه رد او د اړتيا په صورت کې د جنسي تماس په اړه ناروغ ته مشوره ورکړو، سره له دې چې انتان په اسانۍ د بسترې د شريکولو او نورو نژدې تماسونو په وسيله خپرېدای شي.

درملنه

له درملو پرته درملنه

- د سر يا د وينښتو لرونکو زيانمن شوې ناحيې خرييل د سر او وينښتو له سپرې څخه د خلاصون لامل کيږي، ځکه د

سپړې د ژوندي پاتې کېدو او د هغوی له هکېو څخه خلاصېږي.

- که چېرې د (سپړې ضد) شامپو په یوازې توګه وکارول شي د روغېدو چټکتیا به شاوخوا ۴۰ سلنه وي. نوټ: د یو مناسب غاښ لرونکي پلاستيکي یا فلزي ږمنځ په وسیله ږمنځول یو مل اغیزمن ګام دی.
- د جامو او د خوب د بسترې مینځل د ۶۰ درجې سانتي ګرید ګرمو اوبو په وسیله او د هغو اوتو کول یا د جامو وچول د لمر د شعاع په وسیله د بدن سپړې چې د جامو په قاطونو کې ژوند کوي، له منځه وړي او د تماس پرمهال د هغوی د خپریدو او پیدا راپیدا کېدو مخنیوی کوي.
- د pubic lice په پېښو کې د ناروغ د نږدې تماسونو درملنه اړینه ده.

د درملو په وسیله درملنه

- د سپړې ضد شامپو کارول.
 - د لومړۍ کرښې درمل: Permethrin Cream یو سلنه (۱٪) کریم (چې د BPHS په روغتيايي مرکزونو کې نشته)
 - د دویمې کرښې درمل: Lindane یو سلنه (۱٪) موضعي محلول، لاندې پروسیجرونه باید تعقیب شي:
 - په زیانمنه شوې ساحه کې د شامپو کارول «لکه سر یا د عاني ناحیه» او مینځل د اوبو او صابون په وسیله او پریردئ چې ساحه په بشپړه توګه وچه شي.
 - د Lindane سره په هماغه زیانمنه ساحه کې د شامپو کارول او د هماغې ناحې په وینتو لرونکو ساحو کې د ۱۵ دقیقو لپاره پریښودل.
 - د بدن د ټولو وینتو لرونکو ځایونو په بشپړه توګه مینځل او پر هغو د اوبو تیرول.
 - د وینتاتو شانه کول څو مړې سپړې لرې شي.
- احتیاط: Lindane "ډیر کم" له اختلاج یا نورو عصبي اعراضو سره وي. له دې امله باید له دوه کلونو څخه په کوچنیو ماشومانو کې، په امیدوارو او شېدې ورکونکو ښځو او په کمزوري معافیت لرونکو کسانو کې د هغه له کارولو څخه ډډه وشي. د هغه له کارولو څخه دې په مخاطي غشا او تخریش شوي او خلاص پوستکي کې مخنیوی وشي. او لینډین باید د لارښوونې سره سم وکارول شي. د عصبي اختلاط د خطر سره د مخنیوي لپاره باید درملنه له شپږ میاشتو څخه مخکې بیا تکرار نشي.
- د اړتیا په صورت کې باید د ثانوي انتانونو درملنه د انټي بیوتیک په وسیله وشي (۱۳.۳ برخې ته دې مراجعه وشي).

لیردول

- اختلاطي حالات
- د درملنې پر وړاندې مقاوم حالات

مخنیوی

- ناروغ ته دې مشوره ورکړل شي څو خپلې جامې او د هغه چا جامې چې له هغه سره تماس ولري و مینځي څو د ناروغی له خپریدو څخه مخنیوی وشي (پورته پاملرنه وکړئ).
- په ښوونځیو کې د سپړې په ایډیمیکو حالاتو کې د دې پېښې د ارزونې د معیارونو په اړه د عامې روغتیا پرسونل ته مشوره ورکول.
 - د ماشومانو د خولې، د غاړې د استعمال او جاکټونو په جلا او مناسبو ځایونو کې ساتنه.
 - له نورو سره د جامو د نه شریکولو په اړه ماشومانو ته د پوهاوي ورکول.
 - د ښوونځیو نړسانو ته د سپړې په اړه د تعلیماتو د برابرولو په موخه او د ماشومانو او هغو کسانو د درملنې او استایاتو په موخه د ارزونې په اړه چې د سپړو له یرغل سره مخ کېږي، مشوره ورکول.

ناروغ ته لارښوونې

- د سترګې د ښو د اخته کېدو په صورت کې د Petrolatum يوه پرېره يا ډبله لايه په ورځ کې دوه ځله د اتو ورځو لپاره تطبيقېدای شي چې د هغه څخه وروسته د سپرې پاتې هګۍ په ميخانیکي توګه لرې کيږي.
- د لينډين د کارولو پرمهال ټول کړنلارې په دقيقه توګه تعقيب او د مخنيوي مخامونه په پام کې ونيسئ.

Scabies ۱۳.۷

تشرېح

د سکيبس لامل *Sarcoptes Scabiei* دی چه د خاږښ کوچني موجودات دي. مونث القاح شوی جنس د جلد پورتنی برخه يا طبقې معمولا د جلد په ګونځو کې سوري کوي وي اوخپلې هګۍ هلته ځای پر ځای کوي. سکيبس په اسانۍ د مستقيم تماس په وسيله او يا د منتن شويو جامو له لارې ليردول کيږي او عموما د کورنۍ له يو کس څخه زيات غړي مصا بوی.

تشخيص

- ناروغ له يو ډول دوامداره خاږښ څخه چې د شپې پرمهال ډير زياتيږي، شکايت کوي.
- دجلد ټردي کتنه کوچني سوري (Burrows) ښيي. په انتخابي ناحيو کې يې د ګوتو نسجونه، د لاس بند، ابطني ناحيه، د اړويلا يا د تي شااوخوا، د نامه شااوخوا، د نس ښکتنی برخې، تناسلي ناحې او سرين شامل دي. په شېدو خوړونکو ماشومانو کې اندفاعات معمولا په بشپړه توګه د جلد پر سطحو شتون لري.
- د سکيبس منفذونه د موچ لرونکو کرښو په پټه، لږ وتلې، په خاورين رنگ د جلد له پاسه څرګنديږي چې يوه پولې يا پستول چې په هغه کې د سکيبس عامل يا Mite شتون لري د خالې په وروستۍ برخه کې د ليدلو وړ وي، په ځانګړی توګه په شېدو خوړونکو کوچنيانو او ماشومانو کې.
- د جلد خاږښ کېدای شي د جلد تخريشيدل او ناټوئي انتانونه زيات تحريک کړي.
- د سکيبس د منفذ د پيژندنې لپاره د يو څاڅکي Gentian violet په زيانمنه شوې ناحيه واچوئ او بيا هغه د الکولو په وسيله پاکه کړئ. نري او نڅ ډوله سوري پر جلد باقي پاتې کيږي.
- کېدای شي Lichenification (خړو، پرېر او Repigment جلد)، امپيټيګو او جلدي فورانکلونه شتون ولري.
- په ميرمنو کې د تيو د څوکۍ خاږښ د عمو می خاږښ لرونکي پاپولر Eruption سره څرګنديږي.
- په نارينه و کې خاږښ لرونکي دانګۍ د سفن او قضيې له پاسه ښکاري.

درملنه

پرته له درملو درملنه

- ټول هغه کسان چې له ناروغ سره نږدې تماس لري بايد په يوه وخت کې يې درملنه وشي (لکه د يوې کورنۍ ټول غړي).
- ناروغانو ته بايد لاندي مشورې ورکړل شي:
 - د خپلو ګوتو نوکان اخيستل او پاک يې وساتي.
 - که شونې وي خپلې جامې بستر او زيرپيراني بايد په ګرمو اوبو (د سانتي ګريډ ۶۰ درجې) و مينځي.
 - خپله بستره بايد د لمر په مستقيم شعاع کې کيږدي.
 - ناروغان بايد خپل ټول بدن په اوبو او صابون و مينځي.
 - زيانمنه شوې ناحيه دې د بورس او يو ټوکر په وسيله پاکه شي.
 - د درمل له تطبيق څخه وروسته ناروغان بايد خپلې پاکې مينځل شوی او وچې جامې واغونډی.

د درملو په وسيله درملنه

- د سکيبس د يو وژونکي درمل (Scabicide) تجويز

○ یو سلنه Lindane موضعي محلول

یا

○ Permethrin ۵٪ کریم چې تر اوسه پورې په BPHS کې شتون نلري مگر د دوه کلونو څخه کوچنیو ماشومانو، امیدوارو او شېدو ورکونکو ښځو لپاره خوندي درمل دی.

• ناروغانو ته مشوره ورکړئ چې لاندې کړنلاره د سکيبس د وژونکي درمل د تطبيق پرمهال په پام کې ولري:

- بدن دې له اوبو او صابون سره و مينځي او پريزدي چې په بشپړه توګه وچ شي.
- د سکيبس ضد درمل په مستقیمه توګه د جلد له پاسه د غاړې له ښکتنې برخې څخه تر پښو وميني. (د پښو د ورغويو په شمول). د بدن قاتونه، د مقعد د شاوخوا، د نامه شاوخوا، او د نوکانو تپرو او ازادو برخو او د بدن ګونځو ته په ځانګړي توګه پاملرنه وکړئ.

○ کریم د ماښام له مخې تطبيق کړئ او له ۸-۱۰ ساعتو وروسته يې ومينځئ. (لکه را تلو نکی سهار) احتیاط: ډاډ تر لاسه کړئ چې د سکيبس ضد درمل باید تر ۱۲ ساعتو ومينځل شي څو د هغه د سمیت له رامنځته کېدو څخه مخنیوی وشي. پرمخ او غاړه باید تطبيق نشي. له دوه کلونو څخه کوچنیو ماشومانو لپاره دې د لیندین له تطبيقولو څخه ډډه وشي. او همدا راز په امیدوارو او شېدو ورکونکو ښځو یا هغو کسانو چې معافیت سیستم يې کمزوری دی، هم باید و نه کارول شي.

یادونه: کېدای شي خارش د سکيبس ضد درمل په وسیله له د درملنې څخه وروسته له ۴-۳ اونيو پورې شتون ولري.

ليږدول

ثانوي شديد انتان باید روغتون ته ولېږل شي.

مخنیوی

- د ناروغ جلا کول.
- په تودو اوبو د ناروغ د جامو مينځل او د جامو اوتو کول.
- د لمر په مستقیمه شعاع کې د ناروغ د بستر د جامو ايښودل.
- د ټولو هغو کسانو درملنه چې له ناروغ سره نږدې تماس لري. د ناروغ د نږدې کسانو په درملنه کې ځنډ به د ګڼ شمېر کسانو درملنې ته اړتیا پيدا کړي.
- همدا راز جنسي مقاربتې انتاني ناروغی دې تر ارزونې او کتنې لاندې ونيول شي.

ناروغ ته لارښونې

- ناروغ ته دې لاندې مشورې ورکړل شي:
 - د بسترې او د خپلو جامو مينځل او اوتو کول.
 - له سترګې سره له تماس څخه ډډه کول.
- ناروغ ته مشوره ورکول چې د سکيبس ضد درمل باید په لاندې حالاتو کې تطبيق نه کړي:
 - په ټپونو او يا د جلد په زیانمنو شويو ناحیو کې،
 - په غاړه او مخ کې.
- ناروغانو ته باید دهغې د کورنۍ د درملنې د اړتیا په اړه په يوه وخت کې و ويل شي څو د ناروغی د خپرېدو مخنیوی وشي.
- په دې اړه ناروغ ته د پوهاوي ورکول چې که د سکيبس ضد درمل له ستوني څخه تیر شي د سمیت لامل کېدای شي.

خوارسم څپرکی اسکلتي عضلاتي ناروغۍ MUSCULOSKELETAL CONDITIONS

۱۴.۱ آرتريت (د مفصل التهاب) او آرتراډيا (د مفصلونو درد) (Arthritis and Arthralgia)

تشریح

- مفصلي درد او التهاب د مفصلونو د ناروغیو له جملې څخه دي.
- آرتراډيا هغه مفصلي درد دی چې کېدای شي د خفیفو ترضیضاتو (یعنې ساده وتې «رگ اوښتل یا تاویدل» له امله رامنځته شي او یا هم له حده د ډیرې گټې اخیستې له امله وي. آرتراډيا له پړسوب، سوروالي، تودوالي یا تې سره مل نه وي.
 - آرتريت له التهاب او نا ناخا پې د مفصل له تخریبیدو څخه عبارت ده، چې زیاتره یوازې له درد (یا آرتراډيا) سره پیلېږي او د وخت په تېریدو سره د ناروغۍ علایم زیاتېږي.
 - اوسنیو آرتريت د مفصل هغه التهاب دی چې د مزمنې وروستېدو یا ترضیض څخه وروسته د څو کلونو په ترڅ کې د مفصلي سطحو د تدریجي تخریب په پایله کې رامنځته کېږي.
 - په دې ناروغۍ باندې په وصفی توگه د لوړ عمره کسان اخته کېږي
 - زیاتره له یو ساده درد سره په یوه مفصل کې پیلېږي مگر د وخت په تېریدو سره کېدای شي پرمختګ وکړي او د حرکت د له منځه تللو، پړسوب، په مفصل کې د بڼې د بدلیدو او د نورو مفصلونو د زیانمنولو لامل شي.
 - لوی مفصل (لکه د زنگونو او د وړانه د بیخ مفصل) برسېره پردې د گوتو وروستی مفصلونه زیات زیانمنېږي.
 - اوسنیو آرتريت د مفصل خوځښت محدودوي او د سهار له مخې د شخېدو لامل کېږي چې معمولاً له ۳۰ دقیقو څخه کم وخت نیسي.
 - روماتوئید (اوتوایمون) آرتريت یوه خنډنې سیستمیکه التهابي ناروغۍ له بدلیدونکې کورس سره چې ډیر غړي په ځانگړې توگه مفصلونه زیانمنوي.
 - زیاتره څو مفصلونه په ځانگړې توگه د پښو، د ځنگلو، د پښې د بند او د گوتو د نیردې مفصلونه زیانمنوي.
 - دا ناروغی له درد سره پیلېږي، او د وخت په تېریدو سره پرمختګ کوي او د خوځښت له لاسه ورکولو او پړسوب سره مل وي او د بڼې د خرابېدو لامل کېږي (د لاس د بند انحراف او د گوتو انحراف د اولنا په لوري د دې ناروغۍ کلاسیک او ښه پیژندل شوي علایم دي).
 - په دې ناروغۍ کې کېدای شي له مفصل څخه بهر څرگندونې او یا د اتوایمون د سندرمونو نور عناصر (لکه عضلي ذوب، نوروپاتي، د قرنې او منضې التهاب یا د صلیبي التهاب، پریکارډیت، د پلورا انصباب یا روما تویډي نودولونو سره) شتون لري.
 - د سهار له مخې شخېدل له ۳۰ دقیقو څخه زیات وخت اووډیري.
 - سره له دې چې دا ناروغی دواړه جسونه او د عمر ټول گروپونه اغیزمنوي، مگر دا ناروغی په مېرمنو کې درې ځله له نارینه وو زیات عمومیت لري.
 - دا ناروغی کېدای شي د کورپه نورو غړو که هم ولیدل شي.
 - سپټیک آرتريت چې د مفصل باکتریايي یا د نري رنځ اتانې حالت دي. په وصفی توگه د سپټیک آرتريت په ۹۰ سلنه پېښو کې یوازې یو مفصل زیانمنېږي.
 - پیل یې ناڅاپي درد دی چې له خوځېدو سره زیاتېږي، له پړسوب، سوروالي او تودوالي سره مل وي.
 - په ۵۰ سلنه پېښو کې د یوې خفیفې تروما د مخینې سره یوځای وي.
 - زیاتره ناروغان تېه نلري.
 - د نري رنځ اتان ډیر ورو ورو پرمختګ کوي او د کتنې وړ فزیکي موندنې په هغه کې کمې دي.

- د هر عمر گروپونه کېدای شي په سپټيک آرتريت اخته شي.
- کېدای شي چې د هډوکي له حاد التهاب سره په ځانگړې توگه په ماشومانو کې يوځای وي (۱۴.۲ برخه "اوسټيومايلټ" دې مطالعه شي).
- احتياط: سپټيک آرتريت يوه عاجله جراحي پېښه ده، هغه وخت چې په سپټيک آرتريت شکمن ياست، سملاسي بې روغتيايي مرکز ته وليږدوئ.
- نفرس يا کاذب نفرس د يو مفصل په داخل کې د پوريک اسيد د کرسټلونو رسوب ده چې د حاد پړسوب، درد او غالباً سوروالي تودوالي سره په يو زيانمن مفصل کې پيلېږي. معمولاً د پښو گوتو لومړی Metatarso Phalangeal مفصل زيات زيانمنېږي.
- احتياط: ناروغ دې سملاسي سمبال روغتيايي مرکز ته وليږل شي خو نفرس او د کاذب نفرس له سپټيک آرتريت څخه په توپيريز ډول تشخيص شي.

د مفصلونو د خپرېدونکي يا منشر درد په نورو کمو لاملونو کې سيستمیک انتان يا التهاب شامل دي (۱۵.۷ برخه "بروسلوز" مطالعه کړئ).

تشخيص

د تشخيص موخه دا ده چې وټاکل شي چې ايا د درد طبيعت خفيف يا خنډنی دی چې ترڅو په روغتيايي مرکز کې درملنه پيل شي، او يا دا چې درد شديد او بېړنی دی چې په دې صورت کې اړينه ده خو ناروغ روغتيايي مرکز ته وليږدول شي.

- د نوې يا پخواني ترضيض يا تراوما د يوې مخينې اخيستل، (په مفصلي مسافه کې د نفوذې تراوما په شمول)؛ د درد د پيل چټکتيا او د پړسوب، سوروالي او تودوالي علايم وټاکئ.
- په ماشومانو کې چې د فرنجېټ او يا د ستوني د درد يا د دواړه مخينه لري، د روماتيزمل تېې شونتيا په پام کې ونيسئ، هغه درد چې پرمختگ کوي او څو مفصلونه زيانمنوي (۶.۱ برخه "روماتيزمل تېې" مطالعه کړئ).
- نور مفصلونه او يا له مفصل څخه بهر څرگندېدنې لکه څرنگه چې پورته توضيح ورکړل شوه په روماتويد آرتريت او اتوايمون آرتريت کې ليدل کيږي، هم وارزوئ.
- معلومه کړئ چې ايا د ناروغې اعراض او علايم د سپټيک آرتريت اړوند دي يا نه؛ که چېرې دا ډول وي، درملنه سملاسي پيل کړئ (روغتيايي مرکز ته د ليږلو برخه مطالعه کړئ) او جراحي ځانگې ته د ناروغ د ليږدولو په اړه چمتووالی ونيسئ.
- پاملرنه: که چېرې په ماشومانو کې د مفصلونو د حاد درد پيل يا گډو گډو تلل شتون ولري په سپټيک آرتريت يا حاد اوسټيو مياليت شکمن شئ.

درملنه

- لومړنۍ موخه د آرتريت د ډول لپاره د مناسبې درملنې کارول دي ("د آرتريت تشخيص" مطالعه کړئ).
- د هغو ناروغانو په اړه چې د سپټيک آرتريت يا نفرس (او يا کاذب نفرس) اعراض او علايم ښيي، بايد سملاسي روغتون ته وليږدول شي ("روغتيايي مرکز ته د ليږلو برخه دې" لاندې مطالعه شي).
- د هغو ناروغانو په اړه چې د خفيف اوسټيوآرتريت يا د روماتويد آرتريت اعراض او علايم ښيي، ارامونکې درملنه د روغتيايي کلينيک په کچه پيل کړئ. د دې ناروغانو د ځاړنۍ تمرکز دې د لاندې څيزونو په پام کې نيولو سره وشي.
- د درد کمول
- د التهاب کمول
- د فعاليتونو ښه کول يا ساتل
- د مفصلونو د اوږدمهاله زيانمنېدو مخنيوی

○ د عمومي يا سيستمیک اخته کېدو مخنيوی او کنټرول

له درملو پرته درملنه

- د ناروغ د ارامولو لپاره د گرمو موضعي تطبيقاتو تر سره کول.
- د نرمو حرکتونو او د کم فشار لرونکو تمریناتو ترسره کول خو د ناروغ خوځښت وساتل شي، د اوسنيو آرتريت په استثنا.
- ناروغ ته توصیه وکړئ خو د درانه فشار له راوړلو څخه پر مفصلونو ډډه وکړي.

د درملو په وسیله درملنه

- د درد ارامونکي (انالجيکونه) يا د التهاب ضد درمل تجویز کړئ
- د لومړي کړنې درملنه: Paracetamol ټابلېټ. د معياري دوز د مطالعې لپاره د الف په مل پانه کې د الف ۱۵ جدول ته مراجعه وشي.
- د دويمې کړنې درملنه: Ibuprofen ټابلېټ
- ماشومان: د بدن د وزن پر هر کيلو گرام له ۵-۱۰ ميلي گرامه / هر دوز هر اته ساعته وروسته
- لويان: له ۲۰۰ ميلي گرامه څخه تر ۴۰۰ ميلي گرامه هر اته ساعته وروسته.
- پاملرنه: د امکان تر بريده د درملنې دوره له ۱-۲ اونيو محدوده کړئ.
- احتياط: که چېرې ناروغ د هاضمې د جهاز د وينې راتلونې مخينه او يا د هاضمې د جهاز نورې ستونزې، د پښتورگي ناروغۍ يا د وينې راتلونې ناروغۍ لري د ايبوپروفين له تجویزولو څخه ډډه وکړئ.

ليږدول

- ټول هغه ناروغان چې پر هغو د سپټيک اړتريت يا نفرض (يا کاذب نفرض) شک کيږي، سمبال روغتيايي مرکز ته دې وليږل شي خو سملاسي تشخيص او د اړتيا په صورت کې د هغوی جراحي درملنه وشي.
- له ليږدولو مخکې، د انټي بيوتيک لومړنی دوز ورکړئ.
- د لومړي کړنې درملنه: Ampicillin له Gentamicin سره يوځای.
- Ampicillin (د الف په مل پانه کې الف ۴ جدول دې مطالعه شي). د Penicillin پر وړاندې د حساسيت په حالت کې له Erythromycin څخه ګټه واخلي. (د معياري دوز د مطالعې لپاره د الف په مل پانه کې د الف ۱۲ جدول ته مراجعه وشي)
- ماشومان: ۵۰ ميلي گرامه د بدن پر هر کيلو گرام د عضلې په داخل يا IM کې زرق شي.
- لويان: يو گرام د عضلې په داخل کې زرق يا IM

له

- Gentamicin سره
- ماشومان: له ۵-۷.۵ ميلي گرامه د بدن پر وزن پر هر کيلو گرام د عضلې يا IM په داخل کې زرق
- لويان: ۳۲۰ ميلي گرامه د عضلې په داخل کې زرق يا IM
- يا -
- د دويمې کړنې درملنه (په DHS يا د ولسوالي په روغتونونو کې د لاسرسي وړ دي): Ceftriaxone ويال
- ماشومان: ۸۰ ميلي گرامه / پر هر کيلو گرام عضلي زرق
- لويان: دوه گرامه عضلي زرق
- هغه ناروغان چې د نري رخ (TB) اړتريت شک پرې کيږي او يا له تماس سره مخ دي د دې ناروغۍ د تشخيص لپاره دې روغتيايي مرکز ته وليږل شي.
- هغه ناروغان چې په روماتويد (اوتو اميون) اړتريت شکمن دي د تخصصي څارنو لپاره دې روغتيايي مرکز ته وليږل شي.

- احتياط: ځينې ناروغانو څخه چې روماتويد ارتريت لري کېدای شي د غاړې د مېرو له زيانمنولو څخه برسېره د ثبات نشوالی هم ولري. له دې امله بايد په احتياط وليږدول شي.
- د ډيرو معایناتو او د درملنې د نورو لارو لپاره هغه ناروغان چې د ناروغۍ نوی پېل، شدید خرابه بڼه يا راستنیدونکي او د نه زغملو وړ درد ولري يا که چېرې د تشخیص په اړه شک لري روغتيايي مرکز ته وليږئ.
 - هغه ناروغان چې د څو غړو زيانمنېدنې لري، روغتيايي مرکز ته يې وليږئ. (پورته وگورئ)
 - هر څوک چې ځنډنی درد (په ماشومانو کې له يوې اونۍ څخه زیات او په لویانو کې له دوه اونيو څخه زیات درد) لري، روغتيايي مرکز ته يې وليږئ.

مخنیوی

- چاغو ناروغانو ته چې زیات وزن لري او د دې ترڅنګ د وزن وړونکو مفصلونو زيانمنېدنه يا درد لري د وزن د کمولو توصیه وکړئ.
- د هډوکو د ماتیدنو او د بې ځايه کېدو له مناسبې درملنې څخه ډاډ تر لاسه کړئ خو له تراوما څخه وروسته د ارتريت راپیدا کېدل کم کړي.

ناروغ ته لارښوونې

- ناروغ ته توصیه وکړئ څو له درملو پرته د درملنې په تګلارو ډیره تکيه وکړي چې په دې توګه د درملو له اوږدمهاله کارونې او د هغو له جانيې عوارضو څخه ډډه وکړي. ناروغ ته دې لارښوونه وشي څو يوازې د اړتيا پر مهال له ارامونکي درمل څخه ګټه واخلي.
- ناروغ ته د درملو د مناسبې اخيستې لارښوونه وکړئ (د مثال په توګه ايبوپروفن له خوړو سره وخورې څو ګاستريت (د معدې التهاب) کم کړي).
- ناروغ ته لارښوونه وکړئ څو د درملنې له پيل څخه يوه اونۍ وروسته د بيا معاینې لپاره مراجعه وکړي. که چېرې د ناروغۍ اعراض او علايم د وخت له تېرېدو سره په چټکۍ زیات شي او يا نوي مفصلونه هم زيانمن شي په دې صورت کې ناروغ سمبال روغتيايي مرکز ته وليږدوئ.

۱۴.۲ اوستيوميليت (د هډوکي التهاب) (Osteomyelitis)

تشریح

اوستيوميليت، چې تشخیص يې په لومړنيو پړاونو کې ستونزمن دی د هډوکو شديد انتان دی چې لامل يې باکتریاګانې دي او ناروغ روغتون ته د ليردونې اړتيا لري، غالباً دا باکتریاګانې د وينې د جريان له لارې له میکروبې ځای څخه ليرېږي. ځينې وختونه هډوکي د هغه پرمخ د جلد ټپونو له لارې متن کيږي. دا ناروغي له حاد پړاو سره پيلېږي، که چېرې درملنه يې ونشي، په يوې ځنډنې ناروغۍ به بدل شي. د دې ناروغۍ مسوول عوامل معمولاً طلايي ستافیلوکوک او هيمولاتیک سترپتوکوکونه دي. نری رنځ کولای شي له کمې چټکۍ او شديدو اعراضو او علايمو سره د ناروغۍ لامل وي. زیاتره د وړنو هډوکي، د پښې پلنۍ د دې ناروغۍ له امله اغېزمنیږي.

تشخیص

- که چېرې ناروغ لاندې علايم لري د حاد اوستيوميليت فکر وکړئ
 - له ريرديدو سره لږه تبه؛ کېدای شي شتون ونلري. ددی سره سره که چېرې انتان د هډوکي د پوښونکي جلد د ټپونو له امله وي،
 - د هډوکي موضعي درد او حساسيت، غالباً په ميتافيز کې موقعيت لری.
 - ځينې وختونه د کتنې وړ هر ډول ټپونه د نظر وړ هډوکي د پوښونکي جلد پر مخ شتون لري.
 - پخواني انتان غالباً دستونې انتان يا د جلد ټپونه

- د گاونډي مفصلونو فعال خوځښت معمولاً له درد سره محدودیږي؛ ځینی غیر فعال له درد څخه پرته حرکتونه کېدای شي شتون ولري.
- که چېرې ناروغ لاندې علایم لري په ځنډنی یا مزمن اوستیومیالیت فکر وکړئ:
 - له تېې سره د ځینو هډوکو د درد او حساسیت مخینه
 - د لوړې تېې نشتوالی
 - د نظر وړ هډوکي پړسوب، درد او حساسیت
 - ایسې او یا د قیح تخلیه کول چې غالباً پړسوب او درد له منځه وړي.
- په تفریقي تشخیص کې لاندې څیزونه شامل دي.
 - سپټیک آرتریت (میکروبي یا متنن شوی مفصل)، سلولیت (میکروبي یا متنن جلد)، پایو میوزیت (میکروبي یا متنن شوی عضله) او مو ضعی ترضیض

درملنه

له درملو پرته درملنه

- زیانمن شوی لوری یا غړی بې حرکت وساتئ
- په اوستیومیالیت ټول شکمن حالات ژر تر ژره نږدې روغتون ته ولیږدئ.

د درملو په وسیله درملنه

- روغتون ته له لیږدولو مخکې د Ampicillin لومړنی دوز له عضلي زرق Gentamicin سره یوځای تر سره کړئ
- Ampicillin (د الف په مل پانه کې الف ۴ جدول ته مراجعه وکړئ):
 - ماشومان: د بدن د وزن پر هر کیلو ګرام ۵۰ میلی ګرامه یو دوز. ۴.۵ میلی لیتره مقطرې اوبه په ۵۰۰ میلی ګرامه Ampicillin یو ډر کې (۱۰۰ میلی ګرامه په هر ملي لیتر) کې زیات کړئ او د ورانه د مخې په عضله کې یې زرق کړئ. دوز د وزن او عمر سره سم.
 - لویان: یو ګرام عضلي یا وریدي زرق هر شپږ ساعته وروسته (مګر له لومړني دوز څخه وروسته دې روغتیايي مرکز ته ولیږدول شي)

- یا -

- له Pencillin څخه د حساسیت په صورت کې له Erythromycin څخه ګټه واخلي. د ستندرد دوز د مطالعې لپاره د الف په مل پانه کې الف ۱۲ جدول ته مراجعه وکړئ.

- له -

- Gentamicin سره (د الف په مل پانه کې د الف ۱۳ جدول ته مراجعه وکړئ):
 - ماشومان: له ۵ - ۷.۵ میلی ګرامه پر هر کیلو ګرام د IV یا عضلي IM په داخل کې زرق
 - لویان: ۳۲۰ میلی ګرامه IV یا عضلي په داخل کې زرق یا IM په ورځ کې یو ځل

لیږدول

ټول واقعات د ډیرې څیړنې لپاره (د مثال په توګه لابراتواري معاینات او د راډیوګرافي تر سره کول که چېرې د لاسرسي وړ وي)، په بېړنیو پړاوونو کې وریدي درملنه یا د ناروغۍ په ځنډنیو پړاوونو کې جراحي عملیات (لکه د مړو نسجونو تخلیه، لرې کول او پاکول) او یا هم د اورتنوپېډي د اړینو درملنو لپاره یې تر ټولو نږدې روغتون ته ولیږدوئ.

مخنیوی

- ټول باکتریايي انتانات (۴.۲.۲ برخه "تناسلي باکتریايي التهاب") د انټي بیوټیک په وسیله په مناسبه توګه تر درملنې لاندې ونیسي.
- د جلد ټول ټپونه پاک او تعقیم کړئ.

- د هډوکو خلاص او مات ځایونه سملاسي جراحي ته او د مړو نسجونو لږې کولو ته اړتیا لري؛ ناروغ سملاسي روغتون ته ولیږي.

ناروغ ته لارښونې

- ناروغ قانع کړئ چې ژر تر ژره تر ټولو نږدې روغتون ته مراجعه وکړي.
- ناروغ ته توصیه وکړئ که چېرې د اوستیومیالیت مناسبه درملنه نا کما مه شي د شدیدو اختلاطاتو او د دوامداره معلولیت لامل کیږي.

پنځلسم څپرکی

انتاني ناروغۍ، پرازيتي ناروغۍ او د چينجيو ککرتيا

INFECTIOUS DISEASE, PARASITIC DISEASE AND HELMINTHIC INFESTATION

۱۵.۱ توره ټوخله (Whooping Cough)

تشریح

توره ټوخله د ماشومتوب يوه ډيره ساري ناروغي ده چې د Bordetella باکتریا په وسيله رامنځته کېږي او د هوا د کوچنيو قطرو له لارې خپريږي. د انتان څرگنده نښه شديده ټوخله وي، توره ټوخله د واکسين کولو په وسيله د مخنيوي وړ ده. توره ټوخله کېدای شي د تالي انتانونو (لکه سينه بغل، د غوړ التهاب او د پټ نري رنځ فعاليدل) اختلاج، خوارخواکي يا مړينې لامل شي.

تشخيص

توره ټوخله معمولا د تنفسي لارو له نورو انتاناتو سره مغالطه کېږي، له دې امله تشخيص بايد په هغو ماشومانو کې چې واکسين شوي نه دي په پام کې ونيول شي. د پېښو (تفريحي) د دورې له ۱۲-۶ ورځو په تعقيب توره ټوخله په درې پړاونو وېشل کېږي:

- نزولي پړاو: له يو څخه تر دوه اونيو دوام کوي.

- د پوزې افرازات (نزله)

- تبه

- ناڅرگنده ټوخله

- غبر لرونکي پړاو: له ۴-۳ اونيو دوام کوي.

- په څرگنده توگه بې نظمه شديدي ټوخلې (له لوړ غبر سره ټوخله)

- د ټوخلې بله ځانگړتيا دا ده چې د کانگې، د تغذيې د کمېدو او د خوارخواکي لامل کېږي.

- بله ځانگړتيا يې له سيانوز، هاپوکسيا او له اپني حملو څخه عبارت ده، په ځانگړې توگه په کوچنيو ماشومانو کې.

- اختلاحي پړاو: له يو څخه تر څلورو اونيو دوام کوي.

- ځينې وخت د ټوخلې پړاو دوامداره شي چې د څو اونيو لپاره دوام کوي.

درملنه

له درملو پرته درملنه

- د خوارخواکي مخنيوی وکړئ په پرله پسې توگه ماشوم تغذيه کړئ آن د ټوخلې د سېزمونو په منځ کې او هغه وخت چې ماشوم نه غواړي وخوري. د مور د شېدو په وسيله تغذيې ته دوام ورکړئ.
- اضافي مایعات توصیه کړئ او د ديهایدريشن څارنه وکړئ.

د درملو په وسيله درملنه

- د سيانوزس لپاره اکسيجن توصیه کړئ (د اوټيا او شتون په صورت کې)
- د انټي بيوتيک توصیه: Erythromycin له ۴-۲ اونيو لپاره. د معياری دوز لپاره د الف په مل پاڼه کې الف ۱۲ جدول ته مراجعه وکړئ.
- له ۳۸.۵ درجې سانتي گريد څخه د لوړې تې لپاره د Paracetamol توصیه. د معياری دوز لپاره د الف په مل پاڼه کې الف ۱۵ جدول ته مراجعه وکړئ
- د اوټيا په صورت کې له ۴۸-۲۴ ساعتونو لپاره د نوبلايزر له لارې Salbutamol تطبيق کړئ. د معياری دوز لپاره د الف په مل پاڼه کې الف ۱۷ جدول ته مراجعه وکړئ

ليږدول

- له يو کال څخه کوچني ماشومان. هغه کوچنيان چې د تنفس د دريدو له شديد خطر (Apnea) سره مخ وي او دوامداره څارنې ته اړتيا لري.
- په خواړواکي اخته ماشومان او هغه ماشومان چې د کتنې وړ نورې طبي ستونزې لري.
- هغه ناروغان چې په دورانې بڼه د سيانوز حملې او د تنفس دريدل لري.

مخنيوی

- د ټولو ماشومانو لپاره د DPT د واکسين تطبيقول (۱۹ څپرکي معافيت دې وکتل شي). له ديفتري او تيتانوس څخه د مخنيوي او بڼه کېدو په موخه د مهالوپش سره سم د ماشومانو واکسينولو ته دوام ورکول.
- په توره ټوخله اخته ناروغان له نورو کسانو څخه چې واکسين شوي نه دي د ټوخلې له پيل څخه تر څلورو اونيو جلا وساتي (داننقال دوره) که چيرته نا روغان دانتي بيو ټيک په واسطه تداوی نوی پيل کړی. پرته له دې هغه ناروغان چې د انتي بيو ټيک په وسيله تر درملنې لاندې دي بايد د درملنې له پيل څخه پنځه ورځې وروسته جلا شي.

ناروغ ته لارښوني

- د اضافي تغذيې او د خواړواکي د مخنيوي پر اهميت ټينگار وکړئ. په زياتو څلو کمه اندازه خواړه او د پروتين لرونکو توکو خواړاکي رژيم توصیه کړئ.
- د DPT په شمول د واکسينونو د دوام پر اهميت ټينگار وکړئ
- د ناروغۍ په ترڅ او له بڼه کېدو تر يوې مياشتې وروسته او د اعراضو تر له منځه تللو د ناسمې تغذيې څارنه.

۱۵.۲ ديفتري (Diphtheria)

تشرېح

ديفتريا د تنفسي لارو او د حلقوم حاد او شديد انتان دی چې د *Corynebacterium Diphtheria* په نوم د باکتریا د توکسين له اغيزې څخه پيدا کيږي. د ناروغۍ ليريدل له منتن کس څخه روغ کس ته د هوايي کوچنيو څاڅکو له لارې کيږي. ديفتريا د مړينې لوړه کچه لري مگر کېدای شي چې د واکسين د تطبيق په وسيله بې مخنيوی وشي.

تشخيص

لاندې حالتونو ته پام وکړئ.

- تبه
- د سر درد او کسالت
- کېدای شي تانسليټ او خفيف يا شديد Pharyngitis له سپين رنگه ځانگړو ايره يي داغونو سره د ناروغ په ستوني کې وليدل شي.
- د پوزې د مخاطي غشا التهاب (Rhinitis) غالبا د يوه لوري
- کېدای شي د شديدې ناروغۍ له نورو اعراضو سره لکه:
 - د غاړې اذيميا او سترايدور
 - وينه راتله (پروپورا، د وری وينې کېدل، د پوزې وينې کېدل يا Epistaxis)
 - جلدي ټپونه
 - د زړه د عضلې التهاب (Myocarditis) کېدای شي چې له اړتمی سره يوځای وي.
 - ډير کم سينه بغل، د ادرار د اندازه کمېدل (Oliguria) او نفروپني

درملنه

له درملو پرته درملنه

- تنفسي لارې د بندېدو د علایمو او ستریدور د تشخیص لپاره وڅارئ.
- د خوړو د کافي مقدار او هایدريشن څخه ډاډ تر لاسه کړئ. ځینې وخت په تېرولو کې د ستونزو (Dysphagia) له امله د انفي معدوي ټوپ په وسیله د تغذیې تطبیق ته اړتیا پیدا کیږي.
- ناروغ له هغو کسانو څخه چې واکسین شوي نه دي، جلا کړئ.

د درملو په وسیله درملنه

- ديفتريا anti toxine تطبیق کړئ (په ولایتي او حوزه وي روغتونونو کې شتون لري)
- د انتي بیوتیک په وسیله د درملنې توصیه:
- Pencillin-V (PhenoxymethylPencillin) له ۷ - ۱۰ ورځو لپاره
 - ماشومان: د معیاري دوز د مطالعې لپاره د الف په مل پاته کې الف ۱۶ جدول ته مراجعه وکړئ.
 - لویان: ۵۰۰ میلی گرامه هر شپږ ساعته وروسته.

یا

- Erythromycin Ethylsuccinate (د هغو کسانو لپاره چې د Penicillin پر وړاندې حساسیت لري) له ۷ - ۱۰ ورځو لپاره.
- ماشومان: د معیاري دوز د مطالعې لپاره د الف په مل پاته کې الف ۱۲ جدول ته مراجعه وکړئ.
- لویان: له ۴۰۰ څخه تر ۸۰۰ میلی گرامه هر شپږ ساعته وروسته
- د درد او تبې د کمولو لپاره Paracetamol څخه ځکه واخلئ. د معیاري دوز د مطالعې لپاره د الف په مل پاته کې الف ۱۵ جدول ته مراجعه وکړئ

لیږدول

ټولې جدي او اختلاطي پېښې لیږل کېدای شي په ځانگړې توگه له ۱۵ کلونو څخه کوچني ماشومان چې سینه بغل او میوکارډیت ولري.

مخنیوی او ناروغ ته لارښوونې

- د ټولو ماشومانو له واکسینولو څخه ډاډ تر لاسه کړئ.
- د تماس لرونکو د واکسین د اخیستلو وضعیت تائید کړئ: د واکسین د درې واپرو دورو بشپړوالی یا د یو تقویتی (Booster) دوز ورکول هغو کسانو ته چې د هغوی له واکسین څخه له یو کال څخه زیات تیر شوی وي.
- ناروغ له یوې څخه تر اوو ورځو جلا کړئ.
- هغه کسان چې په کورنۍ کې د ناروغ سره په نژدې تماس کې دی د اړتیا په صورت کې د هغوی څارنه او درملنه وکړئ.
- د ناروغۍ له دورې څخه وروسته د ناروغ د DPT واکسین بشپړ کړئ ځکه باکتریا تل انفي توکسین نه تولیدوي چې له بیا منتن کېدو څخه ساتنه وکړي.

١٥.٣ تیتانوس (Tetanus)

تشریح

تیتانوس د تیتانوسپازمین چې یو نیوروتوکسین دی او د Clostridium Tetani په وسیله تولیدیږي، منځ ته راځي. په یو کس کې چې واکسین شوی نه وي د پوستکي او مخاطي غشا هر ټپ (ټکر، پرې شوی، جراحي، چیچل شوی، د ماشوم د زېږون پر مهال، ستنېدل، ټپونه) له C. tetani د ککړېدو په صورت کې د منتن کېدو د خطر احتمال لري. Clostridium Tetani په خاوره، فاضله موادو کې پیدا کیږي او Spores یې د ډیرو عفوني ضد موادو پر وړاندې

مقاومت لري. ناورغي د واکسين د تطبيق په وسيله په بشپړه توګه د مخنيوي وړ ده چې دا واکسين د کتلوي معافيت د پروګرام په معياري برنامه او له زېرون څخه په مخکې واکسينشن کې شامل وي.

تشخيص

- په دې ډول پېښو کې کېدای شي د جلدی ناپاکو ټپونو يوه مخينه شتون ولري، مګر ناوځ غالباً دا پېښه هيرې کړي دي.
- ناروغي په لاندې توګه پرمختيا کوي:
- د تیتانوس لومړنی نښه د ژامې د عضلو شخېدل دي چې په ژولو کې له ستونزو سره پيليري او د ژامې له تړلو سره تعقيبيري (د مثال په توګه چې ناروځ خپله خوله نشي خلاصولی).
- بيا د مخ د نورو عضلو کرمپ چې د حلق او ستوني د عضلاتو له اخته کېدو سره يوځای ده چې دا خپله د تيريدو ستونزې ته لاره برابروي.
- د ناروغي پرمختيا له دوه ورځو څخه تر درې اوښو وي. ناروځ له يو عضلي سپزم څخه په دوامداره او درد لرونکې بڼه د شا د شخ والي او منځني کېدو، د موټوقيضيدل او غځيدلو پښو څخه شکايت کوي: په ډېره کمه توګه حسې تنبهاټ د دوهم ځلي شديد سپزم درامنځ ته کيدو زمینه برابروي په داسې حال کې چې ناروځ په مکمله توګه شعوری حالت لري. ناروځ په دې حالت کې د اوښو لپاره پاتې کيږي. (په متوسط توګه درې اونۍ).
- له يو کاله په کوچنيو ماشومانو کې، دا کوچنيان نشي کولای چې شېدې وروي او نوم يې متن وي. د ماشوم بدن شخ پاتې وي، نا ارامه وي، تشنج، دقبضيت او د سيانوز حملې پرې راځي. د نوي پيدا شوي ماشومتوب تیتانوس د نامه د پرې کولو له لارې د نانعقيم شويو توکو يا ککړ پانسماڼ په وسيله د نامه له لارې ليريږي.
- مړينې ته د اختلاطاتو په وسيله زمینه برابريږي: اسفکسي د حنجري يا دصدر تشنج يا د کانګو د انشاق په وسيله د اسپاريشن نومونیا له امله پيښيږي. نوي پيدا شوی ماشوم د نه تغذيې له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي.

درملنه

ټول ناروغان د تیتانوس ضد ايمونوګلوبولين د تطبيقولو (د ولسوالۍ په روغتون کې شتون لري) او د ملاتړ لپاره ژر تر ژره روغتون ته وليږئ. ۱۵.۳ جدول ته له تیتانوس څخه د مخنيوي په موخه د درملنې ځانګړو معيارونو لپاره د لوړ خطر يا ټيټ خطر په ټپونو کې، مراجعه وکړئ.

له درملو پرته درملنه

- د هوايي لارو پاک ساتل
- د کافي اندازې مابعاټو او خوراک برابرول د دې لپاره چې د تیتانوس سپازمونه استقلال ته اړتيا لري او ډير تخريب لري. خوراکی ملاتړ د ژوندي پاتې کېدو چانس زياتوي.
- د ټپ ارزونه وکړئ.
- له ټيټ خطر سره ټپونه ډير سطحي وي چې محدود نسجونه ضايع کوي او له شپږو ساعتونو څخه زيات دوام نه کوي.
- د لوړ خطر سره ټپونو کې د جګړې ټپونه، ژور څري شوي ټپونه، د نسجونو د کتنې وړ ضايع کېدو سره ټپونه، پراخې سوزېدنې، پردې جسمونه او نکروز چې له شپږو ساعتونو څخه زيات وخت له هغو څخه تير شوي وي.
- د ټپونو بڼې يا ملرنه او د تیتا نوس مخنيوي ته پاملرنه وکړئ.
- ټول پردې جسمونه د ټپ له داخل څخه لرې کړئ.
- ټپ د عفوني ضد مادې په وسيله پاک او پانسماڼ ن کړئ.

د درملو په وسيله درملنه

- د انټي بيويټک لومړی دوز د ورید د داخل له زرق له لارې روغتون ته له ليرولو مخکې تطبيق کړئ.
- Penicillin G) Penicillin Benzyl

- ماشومان: ٥٠٠٠٠ واحد د بدن د وزن پر هره کیلو گرام هر دوز هر شپږ ساعته وروسته د لس ورځو لپاره.
- لویان: له ٢-٤ میلیونه واحد هر دوز د ورید د داخل له لارې هر شپږ ساعته وروسته د لس ورځو لپاره یا

یا

- هغه ناروغان چې Penicillin پر وړاندې حساسیت لري کولای شي له Metronidazole څخه کار واخلي.
 - ماشومان: ٧.٥ میلی گرامه په کیلو هر دوز هر اته ساعته وروسته د لس ورځو لپاره
 - لویان: ٥٠٠ میلی گرامه دورید له لارې هر اته ساعته وروسته د لس ورځو لپاره
 - داړتیا په صورت کې د لیرد په مهال د اختلاج د آرامو لو لپاره Diazepam سپارښتنه وکړی
 - ماشومان: ٥ میلی گرام د بدن په وزن د مقعد له لارې، داړتیا په صورت کې د هر شپږ ساعته وروسته تکرار شی
 - لویان: هملی گرامه دخولې یا مقعد له لارې، داړتیا په صورت کې د هر شپږ ساعته وروسته تکرار شی
- احتیاط: د تنفسي اضطراب څارنه وکړئ

مخنیوی

- د فعال واکسینولو په وسیله تیتانوس په بشپړه توګه د مخنیوي وړ ده چې واکسین یې د کتلوي معافیت د پروګرام د منظم معافیت ورکولو په برنامه کې شامل دی.
- د ټولو ماشومانو واکسینول د هغو په شمول چې ناروغ یا کمزوري دي وهڅوئ.
 - درې واکسینونه له یو کلنۍ څخه مخکې.
 - له دریم دوز څخه یو کال وروسته یو تقویني دوز.
 - له تقویني دوز څخه پنځه کاله وروسته دویم تقویني دوز.
 - هر لس کاله وروسته یو تقویني دوز
 - د ټولو ناروغانو او ماشومانو د واکسینولو حالت چې روغتون ته یې په هر علت مراجعه کړې ده معاینه او د هغه سره سم یې واکسین کړئ (١٩ څپرکې معافیت دې وکتل شي)
 - د ټولو امیند وارو میندو د واکسینولو حالت چې روغتون ته یې په هر علت مراجعه کړې ده معاینه او د هغه سره سم یې واکسین کړئ (١٩ څپرکې معافیت دې وکتل شي)
 - لږ تر لږه د امیدواری د دورې د میرمنو د تیتانوس واکسین د پنځو دوزونو د یوې بشپړې دورې له تطبیق څخه ډاډ تر لاسه کړئ.
 - زېږون په روغتيايي مرکز کې د یو روزل شوي ماهر څارونکي تر څارنې لاندې دود کړی. پرته له دې، له دقت سره پاک زېږون د نامه د خارلو او روغتیا ساتنې لپاره دود کړئ.
 - د ټپونو ښی پا ملرنی او د تیتا نوس مخنیوي ته پاملرنه وکړئ. (١٥.٣ جدول وګورئ)

۱۵.۳ جدول له ټپ څخه ورسته د تیتانوس د مخنیوي لپاره ځانګړي کړنلارې

د ټپ د خطر ارزیا بی		دنا روغ دواکسین کولو حالت
لور	تیت	
		ناروغ په بشپړه توګه واکسین شوی (درې دوزه یا تر هغه زیات) او وروستی دوزی اخیستی
انتی بیوتیکونه	هیڅ	• له پنځو کلونو څخه په کم اومخکې وخت کې تطبیق شوی
انتی بیوتیکونه TT تقویه کونکي	هیڅ	• له پنځو کلونو څخه زیات او له لس کلونو څخه په کم وخت کې تطبیق شوی
انتی بیوتیکونه TT تقویه کونکي ایمونوګلوبولین تیتانوس لیږل	تقویتی	• له لس کلونو څخه زیات وخت
انتی بیوتیکونه د هغه د واکسینونو پیل یا بشپړول د تیتانوس ایمونوګلوبولین لیږل	واکسینول پیل یا بشپړ کړئ.	ناروغ یا هیڅ نه دی واکسین شوی، یا په بشپړه توګه نه دی واکسین شوی، یا د واکسینېدو حالت یې نه دی معلوم.

د انتی بیوتیک په وسیله درملنه د Penicillin v (Phenoxymethyl Penicillin) په وسیله د خولې له لارې تر سره کیږي. دمعاړی دوز د مطالعې لپاره د الف په مل پانه کې الف ۱۶ جدول ته مراجعه وکړئ. د Penicillin پر وړاندې د حساسیت په پېښو کې له Erythromycin څخه ګټه واخلي. د معاړی دوز د مطالعې لپاره د الف په مل پانه کې الف ۱۲ جدول ته مراجعه وکړئ.

د TT تقویه کونکي دوز: یو دوز ۰.۵ میلی لیتره TT د عضلې د داخل له لارې تطبیق کړئ او په بل لوري کې یې سیروم (لاندې وګورئ). له ناروغ څخه غوښتنه وکړئ خو د تقویه کونکي دوز د اخیستلو او بشپړولو لپاره مراجعه وکړئ.

سیروتراپی: د تیتانوس ایمونوګلوبولین ۵۰۰ نړیواله واحده دعضلې په داخل کې ورکړئ، ناروغ ولیرئ ځکه دا سیروم د ولسوالۍ په روغتون کې شتون لري.

۱۵.۴ پولیو میالیت یا د ماشومانو گوزن (Poliomyelitis)

تشریح

پولیومیالیت یوه حاده وایرسې ناروغي ده چې د پولیو وایروس (Poliovirus) په وسیله منځ ته راځي. د دې ناروغي څرګنده ځانګړتیا کمزورتیا یا نرم فلج په ځانګړې توګه د ماشومانو په پښو کې وي.

• د وایرسونو اصلي منبع انسان دی، له همدې امله مستقیمه یا غیر مستقیمه لیریدنه د انسانانو په وسیله کیږي.

○ مستقیم: د Fecal-oral لاره. وایرس د منتن شویو کسانو په فاضله موادو کې د اعراضو له راپیدا کېدو څخه دوه اونۍ مخکې او له ناروغي څخه اته اونۍ وروسته اطراح کیږي.

○ غیر مستقیم: د ککړو خوړو او اوبو په وسیله.

- د ناروغی د تفریخ دوره له ۱۴-۷ ورځو پوری ده.
- ناروغي د واکسين د سم تطبيق په وسيله د مخنيوي وړ ده (۱۹ څپرکی، معافیت دې وکتل شي)

تشخيص

د پولیومیلیت ډیر انتانات بی عرضه وی یا خفیف اعراض لري. په ډیرو پېښو کې د ناروغی تشخیص د یو لوري له نرم فلج او شلیدو سره ایښودل کیږي چې له یوې سلنې څخه په کمو منتو کسانو کې پیښیږي. د دوه ډوله اتنا نا تو اعراض په لاندی ډول دي:

- د ماشومانو د ګو زڼ غیر فلجی ډول

○ تبه

○ د سر درد

○ د غاړې شخ والی

○ د عضلاتو درد

- د ماشومانو د ګو زڼ فلجی ډول

○ فلج (په یو کم شمېر ناروغانو کې پیښیږي)، چې کولای شي د بدن هر اسکلیتي عضلې ګروپ د تنفسي عضلو په شمول تر اغیز لاندې راولي. فلج یو لوري ته وي یا غیرمتناظره دی چې ډیر معمولاً ښکتنی اطراف اخته کوی چې له ښکته څخه پورته لوري ته پر مختګ کوی

○ د فلج پرمختیا

▪ عضلې نرميږي.

▪ عضلې ریفلکس کميږي.

▪ حس سالم پاتې کیږي.

احتیاط: د تنفسي عضلو د اخته کېدو په صورت کې فلج د ژوند ګواښونکی دی.

درملنه

تر کومه حده چې دا یوه وایرسې ناروغي ده د دې لپاره کومه ځانګړې درملنه شتون نلري. د پولیو په لرلو پر ماشوم د شکمېدو په صورت کې ژر تر ژره ناروغ ثبت کړئ، مسول کس (Focal point) خبر کړئ او ناروغ د پولیو نږدې مرکز ته ولیږئ.

مخنیوی او ناروغ ته لارښوونې

- د OPV د واکسين د څلورو دوزو واکسينول کولای شي چې په ډاډه توګه د انتان مخنیوی وکړي.
- د کتلوي معافیت د برنامې د مهالوېش سره سم د ټولو ماشومانو له واکسيندلو څخه ډاډ تر لاسه کړئ (۱۹ څپرکی، معافیت دې وکتل شي).
- د هرې شکمنې پېښې په اړه رپوټ ورکړئ. تر هغه وروسته د واکسين کمپاین د ملي پروتوکول سره سم پیل کړئ.
- د فاضله موادو له منځه وړلو څخه ډاډ تر لاسه کړئ.
- د څښلو د اوبو او خوړو له خوندي سرچینو څخه ډاډ تر لاسه کړئ.
- د کورنۍ د ټولو غړو او هغو کسانو چې له شکمنې پېښې سره په تماس کې دي روغتيايي وضعیت وګورئ.
- ټولو ناروغانو ته توصیه وکړئ که د زکام ته ورته اعراضو د راپیدا کېدو څخه وروسته کمزورتیا یا فلج پیدا کړی ژر تر ژره روغتيايي مرکز ته مراجعه وکړي.

۱۵.۵ شری (Measles)

د IMCI فلپ چارټ له پنځو کلونو څخه د کوچنیو ماشومانو په هکله وګورئ.

تشریح

شری په خوارخواکی یا په نورو ناروغیو اخته ماشومانو کې د شدیدو اختلاطونو له امکان سره یوه ډیره ساري وایرسي وژونکي ناروغي ده. له درې میاشتو څخه په کوچنیو ماشومانو کې ډیره کمه ده. ناروغي زیاتره له شپږ میاشتو څخه تر درې کلنو ماشومانو کې چې په بشپړه توګه یې خپل واکسینونه نه دي اخیستي، پېښیږي.

تشخیص

- د اعراضو له راپیدا کېدو څخه له یوې یا دوه اوښو مخکې د شري له پېښې سره د تماس لرلو په اړه د ناروغ د مخینې اخیستل.
- لومړنی عرض کېدای شي چې ریزش یا زکام ته ورته وي: خفیفې یا منځنۍ تېې چې غالباً له دوامدارۍ ټوخلې، د پوزې له اوبو، د سترګو له پړسوب (لکه منضمې التهاب) او د ستوني له درد سره مل وي.
- په لومړنیو پړاوونو کې له ۲-۳ ورځې د عمومي اعراضو له رامنځته کېدو وروسته کوچني سپین ټکي دسری قاعدی سره کېدای شي چې د غمبورو په داخلې برخه کې ولیدل شي (Koplik's spots)
- وصفی دانکی له لومړنیو اعراضو څخه له ۱-۳ ورځو وروسته څرګندېږي چې په هغو کې کوچنی سور رنګه ټکي شاملې وي چې غالباً یو څه وتلې وي او ګروبي رامنځته کېدو ته تمایل لري او جلد ته د سرو داغونو منظره ورکوي. دانکی د وینتانو له ټولې څخه پیلېږي او د مخ، غاړې، سینې، نس لوري ته او بیا د متو او پښو لوري ته دوام مومي. د دانکېو له رامنځته کېدو سره ناروغ لویه تبه (له ۳۸.۵ سانتي ګریډ څخه لویه لري) چې پښو ته د دانکېو له رسیدو سره له منځه ځي.
- په ټولو شکمنو ماشومانو کې چې له پنځو کلونو څخه کوچني دي د خطر د عمومي اعراضو موندنه وکړئ.
 - پوښتنه دې وشي چې آیا ماشوم:
 - په خوراک او دمو د شېدو په څښاک کې کمزوری دی.
 - هارو شۍ بیرته ګرځوي.
 - اختلاج یې تېر کړي دی
 - مخرش والی یا د غیر شعوري حالت لرل او یا د اختلاج لرل په ماشوم کې و ارزوئ.
- احتیاط: شری کولای شي چې په نوموینا، د سترګې انتان، د منځني غوړ التهاب، د خولې ټپونه یا قرحۍ، نس ناستی یا دیهایدریشن، شدیدې خوارخواکي په ځانګړې توګه په هغوماشومانو کې چې له کمزورې تغذیې یا نورو ناروغیو سره مل وي اختلاط ورکړي.

درملنه

له درملو پرته درملنه

- د خوراک او څښاک له دوام څخه ډاډ تر لاسه کړئ. خوراکي رژیم د درملنې یوه بنسټیزه برخه ده ځکه چې په شري اخته ماشومان ژر په خوارخواکي اخته کیږي. ماشوم په منظمه توګه وزن کړئ او ثبت یې کړئ. د ماشوم د وزن بدلونونه وڅارئ.
- د ناروغ سترګې د پاکو اوبو په وسیله (د مثال په توګه جوشول شوې سړې اوبه) یا نارمل سلین محلول (۰.۹ سلنه) په ورو توګه هره ورځ درې ځله پاکې کړئ.

د درملو په وسیله درملنه

- په هغه صورت کې چې ماشوم د درې وروستیو میاشتو په ترڅ کې ویتامین A نه وي اخیستی د ویتامین A یو کپسول ورته توصیه کړئ (۱۰.۴ ج جدول وګورئ). لومړی دوز په کلینیک کې تطبیق کړئ او د دویمې ورځې او ۱۴ ورځې دوزونه د ناروغ پایواز ته ورکړئ.
- په هغه صورت کې چې ماشوم تبه، درد، نارامتیا او له تېې څخه د راپېداشوې اختلاج مخنیښ ولري په ورځ کې تر څلور ځله د خولې له لارې Paracetamol توصیه کړئ څو د ناروغ تبه ښه شي. دمعا ری دوز د مطالعې لپاره

د الف په مل پانه کې الف ۱۵ جدول ته مراجعه وکړئ.

- که چېرې د ماشوم د خولې ټیونوپر مخکنګ کړې وي د ناروغ پایواز ته توصیه وکړئ چې هره ورځ څلور ځله د ناروغ خوله د یو گیلایس پاکو اوبو او د چای څښلو له نیمې قاشغې (۲-۳ سی سی) مالګې سره حل کړي او د ماشوم خوله و مینځي. په شدیدو ټیونو کې Gentian violet ۰.۵ سلنه محلول څخه هره ورځ دوه ځله د هغه تر ښه کېدو ګټه واخلي.
- د ماشوم مور ته سپارښتنه وکړئ چې د ماشوم خوراک او څښاک ته دوام ورکړي.
- مور یا پایواز ته لارښونه وکړئ چې ماشوم له دوه ورځو وروسته د تعقیب لپاره تاسو ته راولي.
- له لیږلو مخکې د ماشوم احتمالي اختلالات د IMCI د فلپ چارټ سره سم تر درملنې لاندې ونیسئ.
- د سترګې انتان د سترګې د Tetracycline مرحم په وسیله تداوي کړئ (۵.۱ برخه، د منضمې التهاب [سره سترګه] دې وکتل شي)
- د دیهایدریشن مخنیوی او درملنه وکړئ (۲.۱ برخه "اسهال او دیهایدریشن" دې وکتل شي)
- نومونیا (۳.۳ برخه "په ماشومانو او لویانو کې نومونیا" دې وکتل شي) او د منځني غوږ التهاب (۴.۲ برخه، "د منځني غوږ سخت التهاب" دې وکتل شي) تر درملنې لاندې ونیسئ.
- داختملاج درملنه وکړئ (۱۷.۱ برخه "له تې څخه راپیدا شوې داختملاج" دې وکتل شي)
- د شري د شدیدو اختلالاتو د شتون په صورت کې د درملنې لومړی دوز د ناروغ له لیږلو څخه مخکې توصیه کړئ (تیاره یا مکدره قرنيه او د خولې ژور ټپونه):
- د ویتامین A یو دوز تجویز کړئ.
- او د Ampicillin + Gentamicin لومړی دوز تطبیق کړئ (د الف په مل پانه کې د الف ۴ جدول او الف ۱۳ جدول ته دې مراجعه وشي)
- د قرني د خیره والي په شتون یا له سترګې څخه د زوو د راتلو په صورت کې د سترګې Tetracycline مرحم تطبیق کړئ.
- د ماشوم مور ته د ماشوم د تغذیې او د هغه د لیږدولو په اړه توصیه وکړئ.

لیږدول

- هغه ماشومان چې د خطر علامې او شدید اختلالات لري.
- شدید نومونیا (ستریدور، د سینې ښکته تلل)
- شدید دیهایدریشن
- د استما پیژندل شوی ناروغان
- خوارځواکي یا د معافیتي سیستم په ستونزو اخته ناروغان (لکه د معافیتي سیستم د کمولو په وایرس اخته [HIV]، نری رنځ)

مخنیوی او ناروغ ته لارښوني

- په شري اخته ناروغ له نورو څخه جلا وساتئ (یعنې له وړکتونو، ښوونځیو څخه)
- ټول ماشومان د شري د واکسین لپاره حاضر کړئ (لومړی زرق یې په نهه میاشتني کې او دویم زرق یې په ۱۸ میاشتني کې)
- د خولې او سترګې د روغتیا ساتنې پاملرنه.
- ماشوم دې د تعقیب لپاره دوه ورځې وروسته بیا تاسو ته راولي.
- مور یا پایواز ته توصیه وکړئ چې د ماشوم سمه تغذیه کولای شي چې د ناروغی اختلالات محدود کړي.
- پاملرنه: شری د رپوټ ورکولو وړ یوه ناروغي ده.

۱۵.۶ سپس (Sepsis)

تشریح

سپس د وینې، داخلي غړو او د بدن نورو معقمو ځایونو ته د میکروبونو یا توکسینونو له یرغل څخه عبارت ده. عمده عوامل یې معمولا د گرام منفي باکتریاګانې دي. په سپس کې یو شمېر ناروغۍ شاملې دي چې اعراض یې له یو کوچني زکام څخه د ژوند تر ګواښ، شاک او د غړو عدمې کفایه ده.

تشخیص

- مخینه او د موجود یا نوي راپیدا شوي انتان شواهد
- د طبي پروسیجرونو د مداخلې مخینه (لکه غاښ او ولادي پروسیجرونه)
- د اعراضو او علایمو مجموعه له خفیف څخه تر شدیدې پورې
 - د بدن د تودوخې د درجې زیاتوالی (له ۳۸.۵ سانتي ګرید درجو څخه لوړ) یا کموالی (له ۳۵.۵ سانتي ګرید درجو څخه کم)
 - کمزورتیا
 - ریریدنه
 - د تنفس زیاتوالی (په لویانو کې په یوه دقیقه کې له ۲۰ څخه زیات)
 - د زړه د ضربان زیاتوالی (په لویانو کې په یوه دقیقه کې له ۹۰ څخه زیات)
 - د فشار کموالی
 - شاک
- د غړو د دندو خرابېدل او عدمې کفایه
- احتیاط: د سیستمیک التهابي غبرګون سندروم (Systemic inflammatory response syndrome) یو فزیولوژیک وضعیت دی چی د سپس سره مشابهت لری مګر کېدای شي له انتان څخه پرته د یو شمېر نورو شدیدو طبي حالاتو لکه د پانکراس التهاب (Pancreatitis)، شدیدو سوزیدنو (Severe burn)، ترضیضاتو یا خبیثو سرطانونو (Malignancy) له امله منځ ته راشي.

درملنه

له درملو پرته درملنه

د انتان د هر ډول منع پیژندل او له منځه وړل

د درملو په وسیله درملنه

- له لیږلو څخه مخکې د پراخ اغیز لرونکي یا وسیع الساحه انتي بیوتیک پیل. د Ampicillin, Gentamicin او که چېرې په د معدې او کولمو یا غیر هوازي انتاناتو شکمن یاست د Metronidazol توصیه.
- Ampicillin:
 - ماشومان: دمعیاری دوز د مطالعې لپاره د الف په مل پانه کې الف ۴ جدول ته مراجعه وکړئ.
 - لویان: یو ګرام د ورید د داخل زرق له لارې هر شپږ ساعته وروسته.
- یا
- په هغه صورت کې چې د Penicillin پر وړاندې حساسیت شتون ولري، له Erythromycin څخه ګټه واخلي. د معیاری دوز د مطالعې لپاره د الف په مل پانه کې الف ۱۲ جدول ته مراجعه وکړئ
- Gentamicine:
 - ماشومان: دمعیاری دوز د مطالعې لپاره د الف په مل پانه کې الف ۱۳ جدول ته مراجعه وکړئ
 - لویان: ۸۰ میلی ګرامه د ورید د داخل د زرق له لارې هر اته ساعته وروسته

- Metronidazol، په هغه صورت کې چې د معدې، کولمو یا غیر هوازي پراتان شکمن یاست، د وريد په داخل کې زرق. ماشومان: ۷.۵ میلی ګرامه د بدن د وزن پر هر کیلو ګرام د وريد د داخل د زرق له لارې هر اته ساعته وروسته. لویان: ۵۰۰ میلی ګرامه د وريد د داخل د زرق له لارې هر اته ساعته وروسته.

لیږدول

- د سپسېس ټولې شدیدې پېښې روغتون ته ولیږئ.
- د سپتیک شاک په شتون کې، له لیږلو څخه یې مخکې درملنه وکړئ (د سپتیک شاک په اړه د مباحثې په موخه ۱۶.۹ برخه «شاک» وګورئ)

مخنیوی

- د انتاناتو د محراق مقدمه او مناسبه درملنه وکړئ خو د سپسېس ډېر مختګ مخنیوی وشي.
- د سپسېس څخه کېدای شي چې د یو شمېر پروسیجرونو دکمولو او د رګونو او د مثانې د کټیرونو د کارولود محدودولو په وسیله (او د هغو د ګټې اخیستنې د مودې کموالی) مخنیوی وشي.

۱۵.۷ ملاریا (Malaria)

د IMCI فلپ چارټ د پنځو کلونو څخه د کوچنیو ماشومانو په اړه وګورئ.

تشریح

- ملاریا یوه پرازیتی ناروغي ده چې عامل یې Plasmodium دی. د ملاریا انتان د متن شوي میاشې د چیچلو له لارې لیږدل کیږي. پلازمودیم وایواکس (PV) Plasmodium vivax او پلازمودیم فالسیپارم Plasmodium Falciparum (PF) په افغانستان کې د هغه ډیر معمول دوه ډولونه دي.
- پلازمودیم وایواکس چې په افغانستان کې له ۹۰ سلنه پېښو څخه زیات تشکیلوي زیاتره د شدیدو پېښو (یعنې د ژوند ګواښونکي) لامل نه کیږي. آن د پلازمودیم د پرازیتونو له درملنې وروسته وایواکس په ځګر کې باقي پاتې کیږي او د میاشې له بیا چیچلو څخه وروسته د راتلونکو حملو زمینه برابروي.
 - پلازمودیم فالسیپارم په افغانستان کې معمول نه دی مګر د ناروغۍ د شدیدو حملو لپاره زمینه برابروي.
 - په افغانستان کې یوازې یو شمېر ساحې د ملاریا د کتنې وړ خطر لري (۱۵.۷ جدول دې وکتل شي). تل پر هغه ناروغ چې تبه لري او ملاریا ته په مساعده ساحه کې ژوند کوي یا د تیرو څلورو اونیو په ترڅ کې هغې ساحې ته سفر کړی دی، شکمن شي.

۱۵.۷ جدول. د ولایتونو له مخې په افغانستان د ملاریا د خطر شتون

ولایتونه	د خطر کچه	طبقه بندي
بدخشان، بادغیس، بلخ، فاریاب، هرات، هلمند، کندهار، خوست، کونړ، کندز، لغمان، ننګرهار او تخار	د انتقال خطر له منځني څخه تر شدید	لومړی
دایکندي، فراه، جوزجان، کابل، کاپیسا، لوګر، نیمروز، ارزګان، پکتیا، پکتیکا، پروان، سمنګان، سرپل، وردګ او زابل	د انتقال ټیټ خطر	دویم
دبغلان مرکزي لوړې سطحې، بامیان، غزنی او غور	د انتقال ډیر ټیټ خطر	دریم

تشخیص

- د تېې، ریریدی او خولی کلاسیک ډوله حملې، او د حملو ترمنځ له اعراضو پرته دورې ډاډمنې نه دي. په هغه صورت کې چې ناروغ ملاریا ته په مساعده ساحه کې ژوند کوي یا یې هغې ساحې ته سفر درلود تل پر ناروغ چې له لاندې اعراضو څخه شکایت کوي، د ملاریا په لرلو شکمن اوسی.

○ تبه

○ ریریدنه

○ خولې

○ د سر درد

○ د عضلاتو درد

○ زړه بدوالی

○ هغه ناروغان چې تبه لري او پرته له کوم روښانه دلیل څخه مراجعه کوي باید په هغو کې ملاریا وکتل شي.

- په هغه صورت کې چې ماشوم له پنځو کلونو څخه کوچنی وي د IMCI فلپ چارټ (په ماشوم کې د تېې شتوالی) د خطر د علایمو او د نورو ناروغیو د ردولو لپاره د هغه په هکله وکاروئ.

• تل د شدیدې ملاریا (یعنې د ژوند گواښونکي) احتمالي علایم وگورئ.

○ دیهایدریشن

○ خراب شعوري حالت، سرگنگس والی، هزیان، یا غیر شعوري حالت.

○ کمزورتیا (مثلا عمومی کمزورتیا چې د دې لامل کیږي څو ناروغ په لاره نشي تلای او د دریدو لپاره د نورو مرستې ته اړ وي).

○ ژور تنفس، تنفيسي ستونزې.

○ اختلاج.

○ د وینې د جریان کولایس یا شاک؛ د وینې سیسټولیک فشار له ۷۰ ملي متر ستون سیماب په لویانو کې کم او له ۵۰ ملي متر ستون سیماب څخه په ماشومانو کې کم وي.

○ زېړی

○ تور رنگه ادرار (د کوکاکولا په رنگ) چې په ادرار کې د وینې یا هیموگلوبین شتون دی.

○ ناڅاپي غیر نورماله وینه تلنه.

• په دې برخه کې لابراتواري تائید تر لاسه کړئ. د امکان تر بریده ټول هغه کسان چې د ملاریا شک پرې کیږي د Dipstick له چټکې معاینې، د وینې د محیطي بیلگې د میکروسکوپیکې معاینې یا دواړو معاینو په وسیله له درملنې څخه مخکې تائید شي.

○ د وینې د بیلگې میکروسکوپي معاینه د لابراتواري تائید لپاره یو معیار دی او آن کولای شي چې د ملاریا ډول هم پیدا کړي، د هغه دقیق والی د تکنیشن له تجربې سره تړاو لري.

○ د Dipstick چټکې معاینې د ملاریا لپاره په افغانستان کې د لاسرسي وړ دي.

■ د Dipstick زیاتره معاینې یوازې کولای شي چې پلازموډیم فالسیپارم وښیي، له دې امله که ناروغ د پلازموډیم وایوکس پر ملاریا اخته وي له دې معاینې سره پایله منفي ښیي.

■ د Dipstick ځینې چټک تستونه کولای شي چې پلازموډیم فالسیپارم او نور ډولونه پیدا کړي له دې امله غوره ده ځان د روغتيايي کارکوونکي په وسیله د کارول شوي تست په اړه ډاډه کړئ.

• که چېرې هیڅ ډول لابراتواري تائید شونی نه وي د ناروغ درملنه د کلینیکي شکمنډو پر بنسټ وکړئ.

درملنه

له درملو پرته درملنه

- د دیهایدریشن مخنیوی وکړئ. د مایعاتو اخیستل د لویانو او ماشومانو لپاره او د شېدو ورکول د ماشومانو لپاره وهڅوئ.
- تبه (له ۳۸.۵ درجې سانتي گریډ څخه لوړه) د ناروغ د جامو له ویستلو او د سړو کامپرسونو له تطبیقولو سره ټیټه کړئ.

د درملو په وسیله درملنه

- د امکان تر بریده هڅه وکړئ چې د ملاریا تشخیص د ډاډمنو لابراتواري معایناتو په وسیله (د وینې میکروسکوپي بیلگه، د Dipstick چېکې معاینې یا ډواړو) تائید کړئ.
- په یاد ولرئ چې: پلازموډیم وایوکس ۹۰ سلنه پېښې په افغانستان کې تشکیلوي.
- د تې پاره Paracetamol تجویز کړئ. د ستندرد دوز د مطالعې لپاره د الف په مل پانه کې الف ۱۵ جدول ته مراجعه وکړئ.

۱۵.۷.۱ د لومړۍ کرښې درملنه (First-Line-Therapies)

د ملاریا تائید شوې پېښې (د لابراتوار په وسیله) (Confirmed Laboratory cases of Malaria)

- PV. که چېرې د پلازموډیم وایوکس لابراتواري تشخیص مثبت تائید شوی وي او ناروغ د ژوند کومه ګواښونکې نښه ونلري درملنه یې د ملي لارښود پر بنسټ 'غیر اختلاطي تائید شوی پلازموډیم وایوکس ملاریا' تر سره کیږي. (۱.۷.۱۵ الف جدول د ماشومانو لپاره او ۱۵.۷.۱ ب جدول د لویانو لپاره وګورئ). له څلورو کلونو څخه لویو ماشومانو او لویانو ته Chloroquine (بشپړ دوز ۲۵ میلی ګرامه د بدن د وزن پر هر کیلو ګرام، اعظمي دوز ۱۵۰۰ میلی ګرامه په دریو ویشل شویو ډوزونو) په ورځ کې یو دوز د دریو ورځو په ترڅ کې له Primaquine (۰.۲۵) میلی ګرامه د بدن د وزن پر هر کیلو ګرام، اعظمي دوز ۱۵ میلی ګرامه) په ورځ کې یو دوز د ۱۴ ورځو په ترڅ کې (۱۵ میلی ګرامه ټابلیټونه په بشپړ روغتيايي کلینیکونو او د ولسوالیو په روغتونونو کې شتون لري) توصیه کیږي. احتیاط: Primaquine باید لاندې ناروغانو ته توصیه نشي:

- امیدواره میرمنې
- شېډې ورکونکې میندې، پرته له هغو څخه چې تر طبي څارنې لاندې دي.
- له څلور کلنو څخه کوچنیو ماشومانو ته (د IMCI فلپ چارټ د ناروغانو د درملنې لپاره وګورئ)
- هغوی چې د G6PD په کموالي شکمن وي (ګلوکوز شپږ فاسفیت دېهايدروجنېاز).

٢.٢

۲۰-۲۹ کیلو گرامه (له ۵ خضه تر لس کتلو)	۲۰-۲۹ کیلو گرامه (له ۵ خضه تر لس کتلو)	۱۵ خضه تر- ۲۰ له ۱۵ کیلو گراوم کم (له ۳ کتلو خضه تر له ۵ کتلو خضه کم)	۱۰ خضه تر- ۱۵ له ۱۰ کیلو گراوم کم (له ۳ کال خضه تر- له ۲ کتلو خضه کم)	۱۰-۱۵ خضه تر- ۱۰ له ۱۰ کیلو گراوم کم (له دري مياشتو خضه تر- له يو کال خضه کم)	۲ خضه تر له ۶ کتلو گراوم کم (لوي پيداشوي ناشومان له ۲ مياشتني خضه کوچني)	دودز بيه او دودوز
لومړی ورځ يو نيم ټالېټ	لومړی ورځ يو نيم ټالېټ	لومړی ورځ يو نيم ټالېټ	لومړی ورځ نيم ټالېټ	لومړی ورځ نيم ټالېټ	-	د خولې له لارې، په ورځ کې يو ځل • بيه: ټالېټ ۱۵۰ میلی گرامه • موده: درې ورځې
دويمه ورځ يو نيم ټالېټ	دويمه ورځ يو نيم ټالېټ	دويمه ورځ يو نيم ټالېټ	دويمه ورځ نيم ټالېټ	-	-	• دودز د بدن د وزن پر هر کيلو گرام • ۱۰ میلی گرامه به لومړی او دويمه ورځ کې، د بدن د وزن د هر کيلو گرام ۵ میلی گرامه درېيمه ورځ
درېيمه ورځ يو ټالېټ	درېيمه ورځ يو ټالېټ	لومړی ورځ نيم ټالېټ	لومړی ورځ ۷.۵ میلی لیتره	لومړی ورځ ۷.۵ میلی لیتره	لومړی ورځ ۵ میلی لیتره	• بيه: ۵۰ میلی گرامه په هر ۵ میلی لیتره شربت کې.
-	-	لومړی ورځ ۱۵ میلی لیتره	دويمه ورځ ۱۵ میلی لیتره	دويمه ورځ ۷.۵ میلی لیتره	دويمه ورځ ۵ میلی لیتره	
-	-	دويمه ورځ ۱۵ میلی لیتره	درېيمه ورځ ۱۰ میلی لیتره	درېيمه ورځ ۵ میلی لیتره	درېيمه ورځ ۲.۵ میلی لیتره	

۱۵.۷.۱ ب جدول. د Chloroquine په وسیله د لویانو درملنه

لومړۍ ورځ	دویمه ورځ	درېمه ورځ
۱۰ میلی گرامه د بدن د وزن پر هر کیلو گرام لومړنی دوز. له پنځه میلی گرامه د بدن د وزن پر هر کیلو گرام له هر شپږ ساعتونو تر اته ساعته وروسته	پنځه میلی گرامه د بدن د وزن پر هر کیلو گرام	پنځه میلی گرامه د بدن د وزن پر هر کیلو گرام
یا		
۱۰ میلی گرامه د بدن د وزن پر هر کیلو گرام = ۴ ټابلیټه ۱۵۰ میلی گرامه	۱۰ میلی گرامه د بدن د وزن پر هر کیلو گرام = ۴ ټابلیټه ۱۵۰ میلی گرامه	۵ میلی گرامه د بدن د وزن پر هر کیلو گرام = ۲ ټابلیټه ۱۵۰ میلی گرامه

- PF. که چېرې په لابراتواري تشخیص کې پلازمودیم فالسیپارم تائید شوی وي او ناروغ د ژوند کومه ګواښونکې علامه ونلري درملنه یې د ملي لارښود پر بنسټ د غیر اختلاطي تائید شوي پلازمودیم فالسیپارم ملاریا په بڼه تر سره کېږي. (۱۵.۷.۱ ج جدول دې د ماشومانو لپاره وکتل شي). د لویانو لپاره د Sulfadoxine-Pyrimethamine (fansidor) ۲۵ میلی گرامه د بدن د وزن پر هر کیلو گرام د سلفا عنصر، اعظمي دوز یې په ورځ کې درې ټابلیټه یو واحد دوز له Artesunate (خلور میلی گرامه د بدن د وزن پر هر کیلو گرام، اعظمي دوز یې په ورځ کې ۲۰۰ میلی گرامه) په ورځ کې یو ځل د درې ورځو لپاره.
- مختلط پلازمودیم وایوکس او پلازمودیم فالسیپارم. درملنه یې د پلازمودیم فالسیپارم په شان او د ملي لارښود پر بنسټ تر سره کېږي. (۱۵.۷.۱ ج جدول د ماشومانو لپاره). د لویانو لپاره د Sulfadoxine-Pyrimethamine (فانسیدار) ۲۵ میلی گرامه د بدن د وزن پر هر کیلو گرام د سلفا عنصر، اعظمي دوز یې په ورځ کې درې ټابلیټه یو واحد دوز له Artesunate (خلور میلی گرامه د بدن د وزن پر هر کیلو گرام، اعظمي دوز یې په ورځ کې ۲۰۰ میلی گرامه) په ورځ کې یو ځل د درې ورځو لپاره.

۱۵.۷.۱ ج جدول. په ماشومانو کې د Sulfadoxine-Pyrimethamine له Artesunate سره

عمر په کال	وزن په کیلوگرام	Sulfadoxine-Pyrimethamine (۲۵mg + ۵۰۰mg ټابلیټ) یوازې یوه ورځ			Artesunate ۵۰ میلی گرامه ټابلیټ	
		لومړۍ ورځ	دویمه ورځ	درېمه ورځ		
له یو کال څخه کوچنی	له ۱۰ کیلو ګرامو څخه کم	۱/۲	۱	۱	۱	۱
له ۱ څخه تر له ۳ کلونو کوچنی	له ۱۰ څخه تر له ۱۴ کیلو ګرامه کم	۱	۱	۱	۱	۱
له ۳ څخه تر له ۵ کلونو کوچنی	له ۱۷ څخه تر له ۱۹ کیلو ګرامه	۱	۲	۲	۲	۲

۳	۳	۳	۲	له ۲۰ څخه تر ۳۵ کيلو گرامه	له ۵ څخه تر ۱۱ کلونو
۴	۴	۴	۳	له ۳۶ کيلو گرامو څخه زيات	له ۱۲ کلونو څخه لوی

نا تائيد شوي ملاریا (Unconfirmed Malaria)

په هغه صورت کې چې لابراتواري تائيد شونی نه وي او که چېرې کلينيکي شکمنوالی د کتنې وړ وي او يا دواړه په يوه پېښه کې شتون ولري د ملي لارښود سره سم دا پېښه د ناتائيد شوې ملاریا په بڼه تر درملنې لاندې ونیسي.

• Chloroquine (مجموعي دوز د بدن د وزن پر هر کيلو گرام ۲۵ ميلي گرامه، اعظمي دوز يې ۱۵۰۰ ميلي گرامه په درې ورځني کسري دوز) د درې ورځو لپاره (۱۵.۷.۱ الف د ماشومانو لپاره او ۱۵.۷.۱ ب جدول د لويانو لپاره وکتل شي) توصیه کړي.

• له Primaquine څخه د ناتائيد شوې ملاریا لپاره گټه مه اخلي. تر هغه چې پلازموډيم وايوکس د لابراتواري معایناتو په وسيله تائيد شوی نه وي درملنه د Primaquine په وسيله مه تر سره کوئ. په هغه صورت کې چې تاسو په پلازموډيم وايوکس شکمن بياست ناروغ د تشخيص د تائيدولو او تعقيبي څارلو لپاره روغتون ته وليږئ.

شدیده ملاریا (Severe Malaria)

په هغه صورت کې چې تشخيص يا يوازی شکمنډل د ژوند گواښونکې يا شديد ملاریا وي د امکان تر بريده ناروغ روغتون ته وليږئ. د ليرلو د ناشونتيا په صورت کې يا د ليرولو د نه خونديتوب په صورت کې د ملي لارښود سره سم يې درملنه وکړئ.

• Artemether (۳.۲ ميلي گرامه د بدن د وزن پر هر کيلو گرام، اعظمي دوز يې ۱۶۰ ميلي گرامه په ورځ کې) د عضلي زرق له لارې لومړی ورځ يې ۱.۶ ميلي گرامه د بدن د وزن پر هر کيلو گرام (اعظمي دوز يې ۸۰ ميلي گرامه په ورځ کې) د عضلې د داخل د زرق له لارې هره ورځ د پنځو ورځو لپاره.

• هغه وخت چې ناروغ د خولې له لارې درملنه زغملای شي، يا لږ تر لږه دوه ورځې د Artemether درملنې وروسته، د Artesunate+Sulfadoxine-Pyrimethamine يو بشپړ فعی کورس تجويز کړئ.

• ټولې اميدواريه ميرمنې چې شديد ملاریا لري بايد د امکان په صورت کې ژر تر ژره روغتون ته وليږل شي.

په اميندواری کې ملاریا (Malaria in Pregnancy)

• له اختلاط څخه پرته د تائيد شوې ملاریا يا پلازموډيم وايواکس ملاریا لپاره درملنه د ملي لارښود سره سم تر سره او د امکان په صورت کې يې د تائيدولو لپاره لابراتوار ته وليږئ.

• Chloroquine (مجموعي دوز د بدن د وزن پر هر کيلو گرام ۲۵ ميلي گرامه، اعظمي دوز يې ۱۵۰۰ ميلي گرامه په درې ورځني کسري دوز) د درې ورځو لپاره (۱۵.۷.۱ ب جدول د لويانو لپاره وکتل شي) توصیه کړي. احتياط: Primaquine اميدواريه ميرمنو، شېډو ورکونکو ميندو، له څلور کلونو څخه کوچنيو ماشومانو او هغوی ته چې د G6PD انزایم په کموالي شکمن وي (گلکوز شير فاسفيټ ديهایدروجينا)، بايد توصیه نشي.

• د پلازموډيم فالسپياري تائيد شوې ملاریا دې په اميدواری کې د ملي لارښود سره سم تر درملنې لاندې ونیول شي.

• Quinine (۶۰۰ ميلي گرامه) هر اته ساعته وروسته د اوو ورځو لپاره له Clindamycine (۱۰۰ ميلي گرامه) هر ۱۲ ساعته وروسته د اوو ورځو لپاره.

يادښت: Clindamycine د روغتيايي اساسي خدمتونو په ټولگه او د اساسي درملو (BPHS/EDL) په لست کې شامل نه دي. له دې امله ناروغ بايد وليږل شي.

- O لومړی ترایمستر له شدیدې ملاریا سره (د ژوند ګواښونکې): کېدای شي د ملي لارښود سره سم د ورید د داخل د زرق له لارې د یو دوز Quinine اخیستلو ته اړتیا ولري.
- O دویم او دریم ترایمستر: Artesunate له Sulfadoxine-Pyrimethamine د غیر حامله ناروغانو د درملنې په شان احتیاط: په ملاریا ټولې اخته میرمنې د امکان په صورت کې روغتون ته ولیږي.
- له پنځو کلونو څخه په کوچنیو ماشومانو کې ملاریا (Malaria in Children Younger than 5 Years) د IMCI فلپ چارټ ته مراجعه وکړي.

۱۵.۷.۲ د دویمې کرښې درملنه (Second-Line-Therapies)

- د دویمې کرښې درملنه یوازې هغه وخت وکاروی چې پرازیتولوژي د پلازموډیم یاوکس یا پلازموډیم فالسیپارم پېښې تائید کړی وی. د دویمې کرښې سره درملنه په لاندې پېښو کې په پام کې ونیسی:
- هغه ناروغان چې د لومړۍ کرښې له دوه ورځو درملنې سره نه روغیږي.
 - مقاوم ناروغان یا هغوی چې له ۲۸-۳ ورځو له درملنې وروسته د ناروغۍ د بیرته راګرځېدو اعراض ښیي.
 - په پلازموډیم فالسیپارم اخته په لومړي ترایمستر کې امیدواره میرمنې.
 - له دوه میاشتني څخه کوچني ماشومان (د ملاریا د درملنې لپاره د IMCI فلپ چارټ وګورئ)
 - هغه ناروغان چې د درملنې په ټوله دوره کې دخرا بیدو اعراض ښیي.
 - هغه ناروغان چې د Sulfadoxine-Pyrimethamine پر وړاندې څرګنده الرژي ولري.

درملنه

د درملو په وسیله درملنه

- لاندې درمل د اوو ورځو لپاره توصیه کړئ.
- Quinine (د خوړلي له لارې) ۱۰ میلی ګرامه د بدن پر وزن پر هر کیلو ګرام (اعظمي دوز ۶۰۰ میلی ګرامه) هر اته ساعته وروسته.
 - Doxycycline (۳.۵ میلی ګرامه د بدن دوزن پر هر کیلو ګرام) هره ورځ احتیاط: له Doxycycline څخه د امیدواره میرمنو او د اتو کلونو څخه د کوچنیو ماشومانو لپاره ګټه مه اخلی.
 - Clindamycin (۱۰ میلی ګرامه د بدن دوزن پر هر کیلو ګرام) هر ۱۲ ساعته وروسته

لیږل

- د ملاریا شدیدې پېښې (د ژوند ګواښونکې) د امکاناتو د شتون په صورت کې
 - O د لیږدولو په وخت کې دې د امکان په صورت کې روغتیايي کارکوونکي ناروغ ولیږدوي.
 - O د ناروغ له لیږدولو څخه مخکې د ملاریا د لومړي دوز درملنه توصیه کړئ.
 - O مرستندویه څارنې د اړتیا له مخې له لیږدولو مخکې او د لیږدولو په ترڅ کې په پام کې ونیسی (لکه اکسیجن، د ورید د داخل مایعات)
- د امکان په صورت کې په ملاریا اخته امیدواره میرمنې.
- هغه ناروغان چې د دویمې کرښې درملنې ته اړتیا لري.
- د درملنې نه خواب ورکول.
- هغه ناروغان چې له درملنې سره سره په دوه ورځو کې ښه والي نه مومي.
- هغه ناروغان چې د درملنې په ترڅ کې یې وضعیت خرابیږي.
- هغه ناروغان چې د ملاریا شدید اختلاطات لري.

مخنیوی کیمیایي

- له اوږد مهاله حشره وژونکوسره ککړ شوی ماش لومی یا د حشره وژونکو سره ککړ شوی ماش لومی څخه، ګټه واخلي.
- د کور په داخل کې له پا ټی کیدونکو سپرې ګانو څخه ګټه واخلي.
- له دفع کوونکو، په هوا کې ګاز خپرونکو او مارپیچو سپرې ګانو څخه د شخصي ګټې لپاره کار واخلي.

فزیکي

- د ماشو د هګۍ ایښودو له ساحو څخه مخنیوی وکړئ یا هغه له منځه یوسئ چې د ماشو د چیچلو خطر کم شي.
- د ماشو د چیچلو د مخنیوی لپاره محافظوي جامې واغوندئ، په ځانګړې توګه د مابنام په وخت کې چې د ماشو د چیچلو خطر زیاتېږي.
- هغه ساحې چې ماشي په هغو کې هګۍ ږدي، لکه ولاړې اوبه، د اوبو څنډې یا د اوبو د خالي کولو ځایونه له منځه یوسئ. موخه د اوبو له منځه وړل او پر ځای یې د تیرې یا خاورې اچول دي.

ناروغ ته لارښوني

- ناروغ یا د ناروغ پایواز ته په روښانه توګه د درمل د مقدار په اړه چې هره ورځ یې د عمر یا وزن سره سم چې په پورته جدول کې ذکر شوي دي، لارښونه وکړئ. د ناروغ یا د هغه د پایواز پوهول ستاسو د لارښونو په اړه د هغه له تکرارولو سره آزمیئ.
- د درملو د لومړي دوز څارونکي یا شاهد اوسئ. ناروغ د ۳۰ دقیقو لپاره وګورئ او په هغه صورت کې چې ناروغ کانګه وکړي، لومړی دوز بیا تکرار کړئ.
- په هغه صورت کې چې درملنه د Primaquine په وسیله تر سره کیږي (تجویز شوې وي) وړاندیز وکړئ چې ناروغ هغه له خوړو سره وڅوري ځکه په تشه معده کې د بطني نارامتیا لامل کیږي.
- له ۳۸.۵ درجې سانتي ګرید څخه لوړه تبه د Paracetamol په وسیله (له ۱۰ - ۱۵ میلی ګرامه د بدن د وزن پر هر کیلو ګرام هر دوز شپږ ساعته د تې تر ښه کېدو) او سرو کمپرسونو په وسیله تر درملنې لاندې ونیسئ.
- د دیهاډریشن مخنیوی وکړئ. لویان او ماشومان د مایعاتو اخیستلو ته وهڅوئ او د شېدو خوړونکو ماشومانو شېدو ورکولو ته دوام ورکړئ.
- د شدیدې ملارېا د خطر په علایمو د ناروغ کورنۍ وپوهوئ او لارښونه وکړئ چې د خطر د علایمو د رامنځته کېدو په صورت کې ناروغ روغتون ته راولي.
- د ناروغ کورنۍ ته لارښونه وکړئ چې په دوه ورځو کې له درملنې سره د نه ښکېدو په صورت کې ناروغ بیا راولي.

۱۵۸ هیپاتیت (د څگر التهاب) (Hepatitis)

تشریح

هیپاتیت د څگر له التهاب او انتان څخه د بیلابیلو لاندې لاملونو له امله عبارت ده:

- وایرس (ډیره معمول ده)
- O د هیپاتیت A,B,C,D,E ځانګړي ډولونه (څگر ته متمايل) چې تر اوسه پېژندل شوي دي. دا وایرسونه کولای شي چې د Fecal-oral یا د Parenteral یا د عضویت د مایعاتو له لارې (۱۵۸ جدول دې وکتل شي) ولیږدي.
- O نور وایرسونه کېدای شي چې د څگر د التهاب لامل شي (لکه هرپس، د سا ټیټو مېګال وایرس، ایپسټان-بار وایرس چې د مونو نوکلیوزس مسول دی، واریسلا، آډینو وایرس، انټیرو وایرس، پارو وایرس).
- توکي
- د ملارېا ضد درمل (Chloroquine, Paracetamol)، (لوړ دوزونه)، انسټیزي توکي.
- O الکول

O د (Autoimmune) ناروغۍ هیپاتیت کېدای شي چې سختو ناروغیو ته اختلاط ورکړي لکه د سیروز اړوند د څگر د حجرو تخریب، د څگر عدم کفایه او د څگر د حجراتو کارسینوما.

۱۵۸ جدول: څگر ته متمايلو وایرسونو ځانګړتیاوې چې د زیري لامل کېږي.

د وایرس څپړنه	د هیپاتیت A وایرس RNA	د هیپاتیت B وایرس DNA	د هیپاتیت C وایرس RNA	د هیپاتیت D وایرس RNA	د هیپاتیت E وایرس RNA
تفریخي دوره (د ورځې په حساب)	۱۵ تر ۴۰	۶۰ تر ۱۸۰	۱۴ تر ۱۶۰	۲۱ تر ۴۲	۲۱ تر ۶۳
لیرېدېدل یا انتقالیدنه	Parenteral	ډیر کم	هو	هو	نه
	Fecal-oral	هو	نه	نه	هو
	جنسي اړیکې	نه	هو	هو	نه
	Perinatal	نه	هو	ډیر کم	نه
	مزمین انتان	نه	هو	هو	نه
	سختې ناروغۍ	ډیر کم	هو	ډیر کم	هو

تشخیص

سره له دې چې د وایرسې هیپاتیت د ناروغۍ شدت او اختلاطات د هغه د بېلابېلو لاملونو له امله ممکن توپیر ولري مګر د هیپاتیت د بېلابېلو ډولونو عمومي اعراض او علایم یوشان دي. د انتان بېکاریدل کېدای شي څرګند نه وي (لکه غیر عرضي، د څګر د انزایمونو نورمال والی) Subclinical (لکه غیر عرضي د څګر د انزایمونو له لوړیدو سره)، پرته له زیرې (عرضي د زیرې له شتون پرته) او زیرې لرونکې (د زیرې شتون یا هغه څرګندېدنې چې د زیرې په لوري پرمختګ کوي). په معمولو اعراضو کې لاندې څیزونه شامل دي.

- ستړیا، تبه، د یوې اونۍ څخه تر یوې میا شې لپاره زکام ته ورته اعراض د زیرې له رامنځته کېدو څخه مخکې، هر یو چې څرګند شي.
- د اشتها نشتوالی، زړه بد والی، کانګې.
- د نس د بڼې پورتنۍ څلورمې برخې حساسیت له یا پرته د جس وړ څګر سره.
- خارېن.
- د ناروغۍ له پرمختګ سره کېدای شي زیرې پیدا شي.
- د B او C ډول د هیپاتیت لپاره د معایناتو چټکه څپړنه (د وینې په بانک لرونکو مرکزونو کې) کېدای شي د ناروغ پخواني مخ کېدل له دې ډولونو سره وېشي دانتې یا ډی دمو جو دیت پیژندنه (مګر د ناروغۍ فعال والی یا بشوالی نه تاییدوي).
- شدید اختلاطات چې د ناروغۍ د سخت پړاو څخه وروسته کېدای شي پیدا شي، لکه سیروز، یا د څګر عدمې کفایه، Encephalopathy، جین (Ascites)، کوما، وینه راتلنه یا د وینې د ګلوکوز د کچې ټیډل (Hypoglycemia).

درملنه

له درملو پرته درملنه

- د A ډول د هيبايت لپاره کومه ځانگړې درملنه شتون نلري، د ساندويه څارنو (Supportive care) سپارښتنه وکړئ.
- په ساندويه څارنو کې لاندې څيزونه شامل دي:
 - د اړتيا سره سم د وريد د داخل له لارې د مايعاتو ورکول.
 - په بستر کې استراحت تر هغه وخته چې د ترانس اميناز د انزايمونو کچه لوړه ده.
 - له کاربو هايډرېټونو څخه د بډايه رژيم په وسيله کافي تغذيه او د پروټين کافي مقدار بايد ورکړل شي.
 - کېدای شي د غوړو ورکول محدود شي مگر اړينه نه ده چې قطع شي.

د درملو په وسيله درملنه

د امکان په صورت کې د درملو د توصیې څخه د ناروغۍ په حاد پړاو کې ډډه وکړئ، کېدای شي د درملو جذب له خطر سره مخ شي يا درمل د ځگر د ناروغیو د شدت د زیاتیدو لامل شي.

ليږدول

- د ناروغی له اختلاطاتو سره ټول ناروغان لکه شديد زيری، Encephalopathy، کوما، وينه راتلنه، او د وينې د گلوکوز د کچې ټيډل.
- هغه اميدواری ميرمنې چې د هيبايت B په فعاله بڼه اخته دي نوی زيريدلی ما شوم ته له ايمونوگلوبولين سره درملنې لپاره له زيریون څخه ژر تر ژره وروسته.
- ټول ناروغان چې له معایناتو او د هيبايت د چټکو ټسټونو له څيړنې وروسته په هغو کې HBV او HCV مثبت ثابتیږي.

مخنيوی او ناروغ ته لارښوونې

- د کتلوي معافيت د پروگرام د تجویز سره سم د واکسين له اخيستلو څخه ډاډ تر لاسه کړئ (د هيبايت B واکسين د پنځه گونو واکسينونو يوه برخه ده "Pentavalent"، (۱۹ څپرکي، معافيت دې وکتل شي).
- هغو ټولو کسانو ته چې له ناروغ سره تماس لري د لاسونو د مينځلو لارښونه وکړئ.
- د کا ندوم استعمال هغه کسانو ته سپارښتنه وکړی چه د هيبا تيت ناقلين دی
- له يو ځل کاريدونکي سورنجونو او تعقيم شويو توکو څخه د هر ځل جراحي مداخلې يا اندوسکوپي معایناتو لپاره گټه واخلي (د کلورين له محلولونو څخه دې د تعقيمولو لپاره گټه واخيستل شي)
- ناروغ ته لارښونه وکړئ چې د اعراضو د خرابيدو په صورت کې کلينیک ته مراجعه وکړي.
- ناروغ ته لارښونه وکړئ چې هر دوه اونۍ وروسته د خپل وضعیت تر ښه کېدو پورې کلينیک ته مراجعه وکړي.
- شېډې ورکونکي مينډې کولای شي چې خپلو ماشومانو ته شېډې ورکړي.

۱۵.۹ محرقه يا وچکي Typhoid (Enteric) Fever

تشریح

د محرقې يا وچکي تبه د سلمونيلا تافي (Salmonella typhi) باکټريا سره د ککړو خوراکو يا اوبو د خوړو سره (Fecal-Oral) پيدا کيږي. باکټريا د کولمو په ديوال بريد کوي او کولای شي چې د وينې د جريان له لارې ټولو غړيو ته خپور شي. وچکي غالبا له يوې غبروصفې يا ناځانگړې ناروغۍ او تبې په شان شروع کيږي چې کولای شي شديد شي او د اختلاطاتو لکه پريټونيت، د دماغ د نسج التهاب او مړينې لامل شي. په هغه ناروغ کې چې له اوو ورځو زياته دوامداره تبه لري او د هغه ملاریا نه وي ثبیته شوې بايد محرقه په پام کې نيول شي.

تشخيص

- لوړه او بيرته راگرځېدونکې تبه چې په ورو توگه پيل او د اونيو لپاره دوام لري.

- د نبض چېکښا له متوقع کچې څخه ټيټ وي.
- خوښجن حالت.
- ضعیف خوراک
- په لومړنيو پړاونو کې قبضيت، په وروستيو پړاونو کې نس ناستی او کانگې.
- ټوخله (زیاتره وچ)
- د خټيې درد د خټيې له پړسوب سره.
- د سر درد
- کېدای شي چې د غاړې شخ والی پيدا شي.
- سرگنگس والی او رواني ناروغی، په ماشومانو کې کېدای شي اختلاج پېښ شي.
- د ماشومانو د بطن په سپین روښانه پوستکی سره ښکته داغونه.
- د توري او ځگر غټوالی.
- په اختلاطونو کې د کولمو څخه وینه راتلنه چې په غایطه موادو کې د تازه یا تیاره وینې له اطراح سره څرگندېږي، د کولمو تنقب، د صفرا کڅوړې التهاب، نفريت، د سحایا التهاب، د میوکارډ التهاب، د مفصلونو التهاب او د هډوکو التهاب شامل دی.

درملنه

له درملو پرته درملنه

- د ناروغ جلا کول
- له دیپټاډریشن څخه د مخنیوي لپاره د مایعاتو تجویز (۲.۱ برخه "نس ناستی او دیپټاډریشن" دې وکتل شي)
- د خولې له لارې د کافي خوراک اخیستنه او دوام (لکه ساده او پوست رژیم)
- پر وینې راتلنې، د وینې پر کموالی (انیمیا)، د پریټوان التهاب، اختلاج، شاک، یا د وچکي پر نورو پیژندل شویو اختلاطونو ځانړنه.

د درملو په وسیله درملنه

- د ټيټ تر ښه کېدو د ټيټ ضد د یو درمل توصیه: Paracetamol: دمعیاری دوز د مطالعې لپاره د الف مل پانه کې الف ۱۵ جدول ته مراجعه وکړئ.
- د یو انټي بیوتیک توصیه.
- د لومړي کرښې درملنه: Chloramphenicol د ۱۴ ورځو لپاره
 - ماشومان: دمعیاری دوز د مطالعې لپاره د الف مل پانه کې الف ۵ جدول ته مراجعه وکړئ.
 - احتیاط: د Chloramphenicol له ورکولو څخه له وخت مخکې پيدا شویو ماشومانو ته ډډه وکړئ او وې لیرئ.
 - لویان: ۲ کپسوله ۲۵۰ میلی گرامه هر ۸ ساعته وروسته

یا

- د دویمې کرښې درملنه: Amoxicillin د ۱۴ ورځو لپاره
 - ماشومان: د معیاری دوز د مطالعې لپاره د الف مل پانه کې الف ۳ جدول ته مراجعه وکړئ.
 - لویان: ۵۰۰ میلی گرامه هر اته ساعته وروسته
 - یادښت: د Amoxicillin توصیه د امیدوارو او شېدو ورکونکو میرمنو لپاره غوره گڼل کیږي.

یا

- د Penicillin پر وړاندې د حساسیت د شتون په صورت کې له Erythromycin څخه استفاده. د معیاری دوز د مطالعې لپاره د الف مل پانه کې الف ۱۲ جدول ته مراجعه وکړئ
- د درېیمې کرښې درملنه (د مقاومت لرونکو شکمنو پېښو لپاره، کېدای شي د ناروغ لیرلو ته اړتیا وي ځکه په جامع

- کلینیکونو کې او د ولسوالیو په روغتونو کې شتون لري: Ciprofloxacin د ۱۴ ورځو لپاره
- ماشومان: ۱۵ میلی گرامه د بدن د وزن پر هر کیلو گرام پر هر دوز هر ۱۲ ساعته وروسته
- لویان: ۵۰۰ میلی گرامه هر ۱۲ ساعته وروسته

احتیاط: Ciprofloxacin د امیدواره میرمنو لپاره مضاد استسباب دی او د امکان تر بریده د ماشومانو لپاره د هغه له سپارښتنې مخنیوی وشي.

لیږدول

- ټول ناروغان چې شدیداً ناروغ دي.
- ټول ناروغان چې د عمر په وروستیو کې وي (ډیر کوچني او ډیر زاړه) یا امیدواره میرمنې
- د کولمو په تثقب او د پریټوان په التهاب له شکمنیدو سره اختلاطي پېښې.
- تر هر څه لومړی جراحي مرکز ته چې په هغه کې سمه څارنه او درملنه شتون ولري، ولېږئ.
- د ورید خلاصول، د ناروغ له لیږولو مخکې د ورید له لارې د مایعاتو او انټي بیوټیک ورکول.

مخنیوی او ناروغ ته لارښوونې

- د لاسونو مینځل او ښه روغتیا ساتنه
- د ټولنې روغتیا ساتنه او د Sanitation د معیارونو مراعات

۱۵.۱۰ نری رنځ (Tuberculosis)

تشریح

نری رنځ یو باکتریايي انتان دی چې د مایکوباکتریم ټوبرکلوزس (*Mycobacterium tuberculosis*) په وسیله راپیدا کیږي. زیاتره خلک چې د باکتریا په لومړني انتان (Primary infection) متن شوی کېدای شي هېڅ کله فعال نري رنځ ته پرمختیا ونه کړي. په یوه کمه سلنه خلکو کې لومړنی انتان وده کوي او په فعاله بڼه په سږو کې باقي پاتې کیږي چې د ناروغۍ لامل کیږي او نورو ته د ناروغۍ د خپریدو وړتیا پیدا کوي. انتان معمولاً د هوايي قطرو له لارې د هغو ناروغ د ټوخلې په وسیله چې د سږي په فعال نري رنځ اخته وي، نورو ته لیږدي.

د نري رنځ په ډیرو پېښو کې سږي اخته کیږي (یعنې د سږو نری رنځ). د ناروغۍ په نورو لږ معمولو بڼو کې د هډوکو انتانات (د ملا تیر ډیر معمول ځای دی)، لمفوايي عقدات، مفصلونه، سحایا یا بطن او یا یو خپریدونکی انتان (لکه جاروسي نری رنځ) شامل دی.

هغه ناروغان چې د معافیت کمزوری سیستم لري لکه ډیر عمره یا لږ عمره کسان، ناکافي خوراک یا طبی د زمینې برابرېدونکي ستونزې لکه د انسان د معافیت د کمېدو وایرس (Human immunodeficiency virus) باندې اخته کسانو په شمول زیاتره د فعال نري رنځ د پرمختیا له خطر سره مخ وي. ځینې وخت دا ناروغان د نري رنځ د غیرې فعالو بڼو بیا فعالیدنه لري. د نري رنځ فعال انتان په لاندې بڼو ویشل شوی دی:

- د بلغم مثبته بیلگه (+SS) د نري رنځ لپاره: دا د سږي نری رنځ ښیي او ترهغه وخته چې توصیه شوې درملنه لږ تر لږه تر دوه اونيو پورې اخیستل شوې وي، ډیر ساري وي.
- د نري رنځ لپاره د بلغم منفي بیلگه (-SS). دا د دې څرگندونه کوي چې د سږي د نري رنځ تشخیص په ناروغ کې د ډاکټر له لوري د هغه د اعراضو له امله شوی دی سره له دې چې د بلغم درې منفي پایلې لري. دا ناروغان کېدای شي لږ ساري وي مګر بیا هم کولای شي ناروغي خبره کړي څو دا چې د دوی د درملنې لږ تر لږه دوه اونۍ پای ته ورسېږي.
- له سږي څخه بهر نری رنځ د ډاکټر له لوري تشخیصیږي او له سږو څخه بهر د فعال نري رنځ په ناروغۍ د اخته کېدو څرگندونه کوي.

په افغانستان کې د نري رنځ د کمولو کلي په وخت تشخیص او په فعال نري رنځ د ټولو اخته کسانو درملنه ده. ټول روغتیايي کارکوونکي باید نری رنځ په هر ناروغ کې چې له دوه اونيو څخه زیاته ټوخله لري په پام کې ونيسي. ټول

ناروغان چې په افغانستان کې په نري رنځ اخته دي بايد د ډاټس تر پروگرام لاندې درملنه وشي چې مقصد يې د نري رنځ د درملنې له منظموالي او دوام څخه ډاډ دی د نري رنځ ضد درمل په هغه موده کې چې درملنه اړينه ده او د نري رنځ ضد درملو له بندولو څخه له ډډې کولو سره د مقاوم نري رنځ د رامنځته کېدو مخنيوی دی.

تشخيص

د نري رنځ تشخيص بايد د يو مسلکي ډاکټر په وسيله د لاندې شاخصونو پر بنسټ وشي:

- کلينيکي څرگندېدنې (اعراض او علايم)
- د بلغم ميکروسکوپي معاینه (لومړی لومړيتوب)
- کبنت يا کلچر (د شتون په صورت کې)
- له سړي څخه د بهر نري رنځ د تشخيص پر مهال د ډاکټر قضاوت له کلينيکي څرگنديدنو برسيره تر ټولو عمده عنصر دی. لاندې څيزونه د نري رنځ د تشخيص او تصنيف پر مهال وگورئ:
- د سړي په نري رنځ په هغو ټولو کسانو کې چې له دوه اونيو څخه زياته توخله لري شکمن شی.
- د سړي د نري رنځ نورو اعراضو او علايمو کې کېدای شي لاندې څيزونه شامل وي:

○ د وزن بايلل.

○ تبه (په وصفی توگه کمه درجه)

○ د شپې خوله

○ په توخله کې د وينې شتون (هيموپټريا)

○ کمزورتيا د اشتها کموالی

○ د سينې درد

○ دتنفس لنډوالی

- د سړي د نري رنځ تشخيص په کوچنيو ماشومانو کې په ځانگړې توگه ډير ستونزمن دی ځکه کلاسيک اعراض نشي شودلای (په ځانگړې توگه په خوارخواکۍ اخته ماشومان). په ټولو هغو کوچنيو ماشومانو کې چې لاندې څيزونه لري د سړي په نري رنځ شکمن شی.

○ له دوه اونيو ډيره توخله

○ د کورنۍ له غړو سره مخ کېدل يا ټولنيز نږدې تماس له يو ناروغ سره چې فعال نری رنځ لري.

○ د خوارخواکۍ مخينه چې اضافي رژيمونو سره سره ښه نشي.

○ د کمزورې ودې يا کمزورې وزن اخيستني مخينه

○ ځنډنې تبه (ډير کم له ۳۸ درجې سانتي گريد څخه زيات)، سستی، د اشتها کموالی.

يادښت: د بي سي جي واکسين کېدای شي چې په ماشومانو کې د نري رنځ د شديدو بڼو چانس محدود کړي، مگر د ناروغۍ مخنيوی نه تضمینوي.

- فزیکي معاینات معمولا په نري رنځ په اخته ناروغانو کې نورماله وي سره له دې چې ځينې موندنو کې چې د اخته غړي له مخې څرگنديږي لاندې څيزونه شامل دي:

○ د سړو نری رنځ - د تنفسي غړونو کموالی، د تبولار په بڼه تنفسي اواز، کراکلونه (Crackles).

○ له سړي څخه بهر نری رنځ - ۱۵.۱۰ الف جدول وگورئ.

- لابراتواري معاینات کولای شي چې تشخيص روښانه کړي.

○ د نري رنځ لپاره د بلغم بيلگه (Acid fast bacilli) - د بلغم درې بيلگې د ټولو ناروغانو لپاره چې د نري

رنځ شک پرې کيږي او هغه برابرولی شي.

○ د سينې اکسري - هغه وخت چې د منفي بلغم د بيلگې له امله د نري رنځ د موندنې لپاره د ډاکټر له لوري غوښتل کيږي.

○ نورې اکسري گانې - هغه وخت چې له سړي څخه د بهر نري رنځ د موندنې لپاره د ډاکټر له لوري غوښتل کيږي.

○ د نسجونو بيوپسي - هغه وخت چې له سړي څخه د بهر نري رنځ د موندنې لپاره د ډاکټر له لوري غوښتل کيږي.

۱۵.۱۰ الف جدول: له سړي څخه د بهر نري رنځ د ډولونو کلينيکي څرگندېدنې

کلينيکي څرگندېدنې	له سړي بهر د نري رنځ احتمالي تشخيص
د لمفاوي عقداتو لوييدل يا په لمفاوي عقداتو کې جريان په ځانگړې توگه د غاړې په ناحيو کې ځينې وخت فستولونه (يعنې د مايعاتو جريان له يوې پړسيدلې لمفاوي عقدې څخه د جلد پرمخ)	د لمفاوي عقداتو نری رنځ يا TB lymphadenitis
پلوريزي د سينې درد، تبه، ستونزمن تنفس	د پلورا نری رنځ
د شا درد، پرله پسې ټول، ستونزمن ټول، يا پرته له درد هيموچوريا	د پښتورگو نری رنځ
کيفوزس (لکه د فقراتو د جسم قبضيدل چې بهر لوري ته زاويه جوړوي) د شا درد د څېرمه فقرو پړسوب، د فقري پر جسم يا د فقري پر شاوخوا کې حساسيت او يا Para-vertebral "cold" abscess	د فقراتو نری رنځ چې د Pott's د ناروغۍ په نوم هم ياديږي.
کمزورتيا د بڼکتنيو خواو فلج	د ملا د تير نری رنځ
د مفصلونو پړسوب	د مفصلونو نری رنځ
موضعي پړسوب يا د اوږدو هډوکو له سينوس څخه د مايع خالي کېدل	د نري رنځ اوستيوميلايټ يا TB osteomyelitis
د خيټې پړسوب يا خفيف درد، تبه، د شپې خولې، د وزن له لاسه ورکول، نس ناستی، بطني کتله، مقعدي فستولونه، حن	بطني معدوي نری رنځ، ډيره معموله بڼه يې د پريتوان د نري رنځ التهاب
د سر درد او د غاړې شخېدل، رواني بدلونونه او مغشوش والی تبه او بې علاقه گي.	د سحايان نری رنځ يا اېسي

درملنه

له درملو پرته درملنه

- په نري رنځ ټول شکمن کسان بايد د روغتيايي مرکز په را جستر يا د تير کلوز په څارنيز راجستر کې ثبت شي. (يعنې د روغتيايي مرکز او لا برا توار په را جستر نو کی)
- ټول ناروغان چې د نري رنځ لپاره يې بلغم مثبت دی بايد د ډاټس پروگرام ته وليږل شي.
- له مثبت بلغم پرته د نري رنځ په لرلو ټول شکمن ناروغان د ډاکټر په وسيله د بلغم د منفي والي د ارزونې لپاره روغتون ته وليږل شي.
- له سړي بهر په نري رنځ ټول شکمن کسان دې د ارزونې لپاره ډاکټر ته وليږل شي.
- ټول ناروغان بايد د بشپړ استراحت له پروتين څخه د بډايه رژيم اخيستلو له يوې بڼې هوا سره په يو چاپيريال کې ژوند کولو او د لمړيه شعاع کې د لمر زيات اخيستلو ته وهڅول شي.
- ټول کورني او ټولنيز تماسونه بايد وځيرل شي په ځانگړې توگه هغه ناروغان چې له ډير خطر سره مخ دي لکه کوچني ماشومان، زړه کسان، خواړخواکي ماشومان، يا هغوی چې په مزمن ناروغيو اخته دي (د اچ آی وي په

شمول) څکه دوی له ډیر خطر سره مخ دي.

د درملو په وسیله درملنه

- ټول ناروغان چې د نړۍ رنځ تشخیص پرې وضع کیږي باید تر ډاټس لاندې یې درملنه وشي.
- د نړۍ رنځ ضد درمل
 - مهم درمل چې د نړۍ رنځ د ډیرو پېښو په درملنه کې کارول کیږي، Rifampicin (R)، Isoniazid (H)، Ethambutol (E)، Streptomycin (Z)، Pyrazinamide دي.
 - ځینې درمل د ثابتو ترکیبي دوزونو په بڼه شتون لري لکه Rifampicin (R)، Isoniazid (H)، Ethambutol (E)، Pyrazinamide (Z)، Rifampicin (R)، Isoniazid (H) او Ethambutol (E).
 - په عامه توګه د نړۍ رنځ لپاره دوه ډوله درملنه په پام کې ده.
 - لومړۍ کټګوري: 2RHZE \ 4RH (۱۵.۱۰ ب جدول وګورئ)
 - دا کټګوري د نړۍ رنځ د ټولولو پېښو لپاره د ماشومانو په شمول د تطبیق وړ ده (لکه د سړي، د سړي بهر، SS + او -) او د هغوی لپاره چې د نړۍ رنځ درملنه یې لږ تر لږه یوه میاشت مخکې نه وي اخیستې.
 - ډاټس د درملنې د دواړو پړاوونو لپاره اړین دی.
 - د درملنې موده شپږ میاشتې وي: دوه میاشتې لومړنۍ پړاو له RHZE، (۵۶ دوزه) چې د څلور میاشتې تعقیبي پړاو سره د RH (۱۱۲ دوزه) په ورځنۍ توګه دوام ورکول کیږي.
 - دویمه کټګوري: 12RHZE / 18RHZE \ 24RHZE (۱۰.۱۵ ج جدول وګورئ).
 - دویمه کټګوري د دویم ځل درملنې د ټولو پېښو لپاره (لکه بیرته راکړېدل، له انقطاع وروسته درملنه له مثبت باکټریولوژي سره، د لومړۍ کټګوري د درملنې ناکامي او نور) د تطبیق وړ دي.
 - ډاټس د درملنې په دواړو پړاوونو کې اړین دی.
 - د درملنې موده اته میاشتې ده، لومړۍ پړاو درې میاشتې د RHZE په وسیله هره ورځ برسیره پرې سترپتومايسين د دوه میاشتو لپاره هره ورځ، چې له تعقیبي پړاو پنځه میاشتو لپاره دې RHE سره دوام ورکول کیږي.

۱۵.۱۰ ب جدول لومړۍ کټګوري: لویان او له لس کلنو څخه لوی ماشومان، ورځنۍ دوزونه، ثابت ترکیبي دوزونه (FDC) د بدن د وزن د هر کیلو ګرام سره سم

تبعیبي پړاو (څلور میاشتې یا ۱۱۲ دوزه)	لومړنۍ پړاو (دوه میاشتې یا ۵۶ دوزه)	د ناروغ د بدن وزن (په کیلو ګرام)
هره ورځ تر ډاټس لاندې (د جمعې او رخصتیتوله ورځو پرته)	هره ورځ تر ډاټس لاندې (د جمعې او رخصتیتوله ورځو پرته)	
ترکیبي دوز ثابت دوز FDC -RH (۱۵۰ میلی ګرامه + ۷۵ میلی ګرامه)	ترکیبي دوز ثابت دوز FDC -RHZE (۱۵۰ میلی ګرامه + ۷۵ میلی ګرامه + ۴۰۰ میلی ګرامه + ۲۷۵ میلی ګرامه)	
۲	۲	۳۰ تر ۳۹
۳	۳	۴۰ تر ۵۴
۴	۴	۵۵ تر ۷۰
۵	۵	له ۷۱ څخه زیات ≥

۱۵.۱۰ ج جدول دویمه کټګوري: لویان او له لس کلنو څخه لوی ماشومان، ورځني دوزونه، ثابت ترکیبي دوزونه (FDC) د بدن د وزن د هر کیلو ګرام سره سم

تعمیبي پړاو (۱۴۰ دوزه)	لومړنی پړاو (درې میاشتي یا ۸۴ دوزه) RHZES + سټریټومايسين		د ناروغ د بدن وزن (په کیلو ګرام
	۱ او ۲ میاشتي	۱، ۲ او ۳ میاشتي	
هره ورځ تر ډاټس لاندې (د جمعې او رخصتیه ورځو پرته)	هره ورځ تر ډاټس لاندې (د جمعې او رخصتیه ورځو پرته)	هره ورځ تر ډاټس لاندې (د جمعې او رخصتیه ورځو پرته)	
ترکیبي دوز ثابت دوز RHE FDC (۱۵۰ میلی ګرامه + ۷۵ میلی ګرامه + ۲۷۵ میلی ګرامه)	د سټریټومايسين زرقي دوز (په میلی ګرام)	ترکیبي دوز ثابت دوز -RHZE FDC (۱۵۰ میلی ګرامه + ۷۵ میلی ګرامه + ۴۰۰ میلی ګرامه + ۲۷۵ میلی ګرامه)	
۲	۵۰۰	۲	۳۰ تر ۳۹
۳	۵۰۰	۳	۴۰ تر ۵۴
۴	۱ ګرام*	۴	۵۵ تر ۷۰
۵	۱ ګرام*	۵	له ۷۱ څخه زیات یا مساوی

* له ۶۰ کلونو څخه د لوړ عمر لرونکو ناروغانو لپاره ۷۵۰ میلی ګرامه
۱۰، ۱۵ او ۱۰، ۱۵ ی جدولونه، لاندې ستاسو د معلوماتو لپاره ورکړل شوي څو چې د نري رنځ ټولې پېښې باید د ډاټس
په مرکزونو کې تعقیب او تداوي کړی.

۱۵.۱۰ د جدول، د بدن د وزن پر هر کیلو ګرام ورځنی دوز د لویانو او ماشومانو لپاره د نري رنځ ضد درملنې د لومړۍ
کړنې درمل

ورځني وړاندیز شوي دوزونه		درمل
اعظمي (میلی ګرام)	دوز او حد (د بدن د وزن پر هر کیلو ګرام په ملي ګرام)	
۳۰۰	۵ (۴ تر ۶)	Isoniazid
۶۰۰	۱۰ (۸ تر ۱۲)	Rifampicin
-	۲۵ (۲۰ تر ۳۰)	Pyrazinamide
-	۲۰ (۱۵ تر ۲۵)	Ethambutol
-	۱۵ (۱۲ تر ۱۸)	Streptomycin

۱۵.۱۰ ی جدول دتوبر کلوز ضد د مل د ما شو ما نو لپاره د بدن د وزن پر هر کیلو گرام ورځنی دوز

تعقیبي پړاو		لومړنی پړاو			د بدن وزن (په کیلو گرام)
E	RH	S	E	RHZ	
(۱۰۰ میلی گرامه)	(۳۰/۶۰ میلی گرامه)	(۱۰۰۰۰ میلی گرامه)	(۱۰۰ میلی گرامه)	(۱۵۰/۳۰/۶۰ میلی گرامه)	
۱/۲	۱/۲	۵۰ میلی گرامه (۰.۲۵ میلی لیتره)	۱/۲	۱/۲	له ۴ څخه کم
۱	۱	۱۰۰ میلی گرامه (۰.۵ میلی لیتره)	۱	۱	۴ تر ۶
۲	۱ ۱/۲ (یو نیم)	۱۵۰ میلی گرامه (۰.۷۵ میلی لیتره)	۲	۱ ۱/۲ (یو نیم)	۷ تر ۹
۲ ۱/۲ (دوه نیم)	۲	۲۰۰ میلی گرامه (۱ میلی لیتره)	۲ ۱/۲ (دوه نیم)	۲	۱۰ تر ۱۲
۳ ۱/۲ (دری نیم)	۳	۲۷۵ میلی گرامه (۱.۴ میلی لیتره)	۳ ۱/۲ (دری نیم)	۳	۱۳ تر ۱۸
۵	۴	۳۵۰ میلی گرامه (۱.۷۵ میلی لیتره)	۵	۴	۱۹ تر ۲۴
۶	۵	۴۵۰ میلی گرامه (۲.۳ میلی لیتره)	۶	۵	۲۹ تر ۳۵

ليږدول

ټول لاندې ناروغان روغتون ته وليږئ.

- د ډاټس د درملنې لپاره د مثبت بلغم بيلگه
- د ډاکټر په وسيله د ارزونې په موخه د نري رنځ لپاره د منفي بلغم د بيلگې له لرلو سره ټول شکمن، هغه کسان چې کېدای شي د ځانگړو معایناتو لپاره لکه اکسري او نورو لابراتواري معایناتو لپاره غوښتنه وکړي.
- له سيري څخه بهر د نري رنځ لرل د جاريوسي نري رنځ يا د سحایا د التهاب د نري رنځ په شمول يا د نري رنځ د اختلاطاتو لرل (لکه د بدن د څو سيستمونو نری رنځ يا تنفسي عدهې کفایه)
- د عود شوی نري رنځ په لرلو شکمن يا ناکامه درملنه.
- د نورو زمينې مساعدونکو طبي وضعيتونو د ناروغيو له امله د نري رنځ پر ضد د وقايوي درملنې د په پام کې نيولو لپاره (لکه اچ آی وي، خوارخواکي، يا د شکرې وروستي پړاوونه)
- د ناروغی له لوړ خطر سره مخ ناروغ سره چې په فعال نري رنځ اخته وي د مخ کېدلو په صورت کې (لکه کوچني ماشومان، زارې کسان، خوارخواکي، او هغوی چې خنډنی ناروغی لري)
- د نري رنځ له درمل څخه شديد جانبي عوارض ورته پيدا شوی وي.

مخنيوی

- د کسانو (فرد) لپاره
 - د نويو پيدا شويو ماشومانو واکسينول يا لومړی تماس کېدای شي د نري رنځ کچه يا شدت کم کړي مگر دا نشي کولای چې مخنيوی تضمین کړي.
 - وقايوي درملنه (ايزونيازيد) د هغو کسانو لپاره چې له لوړ خطر سره مخ دي.
 - مقدمه موندنه، تشخيص او درملنه
- د ټولنې لپاره
 - په افغانستان کې د نري رنځ د کمولو لپاره بنسټيزه کلي، شکمنېدل، لومړنۍ موندنې او لومړنۍ درملنه ده.
 - د نري رنځ په اړه د ټولنې د پوهاوي زياتول.
 - د ناروغانو او ټولنې ترمنځ د توخلې د اخلاقو په اړه د پوهاوي زياتول
 - د فعال نري رنځ ناروغانو ته د نږدې تماس لرونکو معاینه او څپل.
 - روغتيا ساتنې او بڼې تغذي ته هڅول.
 - په نري رنځ د شکمنو او هغو ناروغانو چې نوي تشخيص شوی دي له کورنۍ يا د ټولنې له کسانو په ځانگړې توگه له کوچنيو ماشومانو يا له هغوی څخه چې د نري رنځ د اخيستلو له لوړ خطر سره مخ دي، د لرې ساتلو لپاره هڅه.
 - د نري رنځ د ناروغانو مقدمه درملنه - د هوايي لارې خپرېدل په نورماله توگه له دوه اونۍ درملنې څخه وروسته له منځه ځي.

ناروغ ته لارښوې

- ناروغ ته يادونه وکړئ چې نری رنځ د روغېدو وړ دی په هغه صورت کې چې ناروغ خپل درمل په سمه توگه واخلي او د درملنې ټول کورسونه بشپړ کړي.
- په ډاټس کې شامل شوی او خپل ټول درمل د هغه له ټولې بشپړې درملنې سره ومنئ.
- ناروغ ته يادونه وکړئ چې د نري رنځ تشخيص او درملنه وړيا ده.
- ناروغ ته لارښونه وکړئ چې:
 - د توخلې او پرېنجې پرمهال خپله وړه پټه کړي خو نورو ته د ناروغۍ د خپرېدو مخنيوی وشي.
 - هيڅکله دې پر ځمکه لاړې نه توو کوي او د هغه پر ځای دې له يوځل مصرفېدونکې قطي څخه چې سربونښ ولري گټه واخلي.

- بڼې تغذیې ته دوام ورکړي
- په کافي اندازه استراحت وکړي.
- د سگړت له ځکولو څخه ډډه وکړي.
- ناروغ ته سپارښتنه وکړئ چې د نري رنځ درملنه کېدای شي ځینې وخت د جانبي عوارضو لامل شي. ناروغ پوه کړئ چې د لاندې څیزونو د پیدا کېدو پر مهال ژر تر ژره هغه روغتیایی مرکز ته چې خپل درمل ترې اخلي، مراجعه وکړي.
- زبړی
- جلدې ناروغی
- د اوریدو اختلاطات
- د لیدو ستونزې.

۱۵.۱۱ دکوی اوبه (Chickenpox)

تشرېح

دکوی اوبه (آب چیچکن) د ماشومتوب د دورې یوه معمولي او ساري ناروغي ده چې د واریسیلا زوسټر (Varicella zoster) وایرس په وسیله پیداکيږي. انتان په خپله له یوې لنډې مودې تقریباً یوې اونۍ څخه وروسته بڼه والی مومي. انتان له مخ کېدو څخه وروسته له ۲-۳ اونیو وروسته څرگندیږي.

تشخیص

- احتمالي مخ کېدو په صورت کې پوښتنه وکړئ او لاندې څیزونه وپلټئ.
- خفیفه تبه، د سر درد، او د دانکیو له راپیدا کېدو څخه مخکې کسالت، له لومړۍ اونۍ څخه وروسته د تېې له منځه تلل.
- د ځانګړو اندفاعاتو او ویزیکولونو پیدا کېدل چې د بدن او مخ پر شاوخوا پیليږي او بیا د متو او پښو لوري ته خپرېږي.
- د جلدې Macules, Papules او پولو (Vesicles) ګروپونه
- بیلایېلې پولې (تاکې) چې په بیلایلو پړاوونو کې په خیر بدلیږي. پراخ تپونه کېدای شي په ټولو وختونو کې شتون ولري.

• خاربن

د کوی اوبه په کوچنیو ماشومانو، زړو کسانو او هغو ناروغانو کې چې د معافیتي سیستم کمزورتیا ولري ډیر شدید وي. د هغه ډیر کم اختلاطات چې زیاتره په لویانو کې معمول دي نوموینا، د سحایا التهاب (Meningitis) د دماغ د نسج التهاب (Encephalitis) دي.

درملنه

له درملو پرته درملنه

د کافي اندازې مایعاتو او تغذیې له اخیستلو څخه ډاډ تر لاسه کړئ.

د درملو په وسیله درملنه

- زیاتره تبه په ټیټه درجه وي او د Paracetamol له سپارښتنې سره بڼه والی مومي. دمعیا ری دوز د مطالعې لپاره د الف په مل پاته کې الف ۱۵ جدول ته مراجعه وکړئ.
- احتیاط: له پنځو کلنو څخه کوچنیو ماشومانو ته Aspirin مه توصیه کوی ځکه په هغوی کې Reye's د سندروم خطر لري.
- کېدای شي چې د Calamine محلول د تطبیق په وسیله شدید جلدې خارښتنه کم شي.
- د شدیدو خارښتونو لپاره له Chlorphenamine maleate ټابلیټونو څخه ګټه واخلي. دمعیا ری دوز د مطالعې لپاره د الف په مل پاته کې الف ۷ جدول ته مراجعه وکړئ.

- احتياط: له وخت څخه مخکې پيدا شويو ماشومانو او له يوې مياشتې څخه کوچنيانو ته يې سپارښته مه کوئ.
- له انتي بيوتيکو څخه يوازې د تالي انتان د شتون په صورت کې ګټه واخلي (د رخوه نسجونو التهاب يا زوې)
 - Cloxacillin د اوو ورځو لپاره (په جامع روغتيايي کلينيکونو او د ولسواليو په روغتونونو کې شتون لري)
 - ماشومان: ۱۵ ميلي ګرامه د بدن د وزن پر هر کيلو ګرام هر دوز شپږ ساعته وروسته
 - لويان: ۵۰۰ ميلي ګرامه هر شپږ ساعته وروسته

يا

- د هغو ناروغانو لپاره چې د Penicillin پر وړاندې حساسيت لري Erythromycin ايتايل سکسينات د اوو ورځو لپاره. د معيارى دوز د مطالعې لپاره د الف په مل پانه کې الف ۱۲ جدول ته مراجعه وکړئ

ليږدول

- هغه ناروغان چې د معافيت سيستم يې له خطر سره مخ وي او ناروغي يې شديده وي.
- په اوو ورځو کې نه ښه کېدل
- ډير شديد ناروغان
- د نوموتيا، د سحاي التهاب (Meningitis) يا د دماغ د نسج التهاب (Encephalitis) اختلاطات
- له شپږو مياشتو څخه کوچني ماشومان
- اميدواره ميرمنې
- د کوي اوبه بياستېدنه

مخنيوی

ناروغ په انتاني پړاو کې چې د ټپونو له رامنځته کېدو شپږ ورځې وروسته څرګنديږي يا تر دې چې ټول ټپونه په پوليو وپوښل شي، جلا کړئ

ناروغ ته لارښوني

- د درملو لارښوني ولولئ او له ناروغ يا پايواز څخه يې غوښتنه وکړئ چې هغه بيرته تکرار کړي.
- ناروغ يا د هغه پايواز ته د لاندې څيزونو په اړه سپارښتنه وکړئ:
 - خپل جلد پاک وساتئ. زياتره په اوبو او صابون ځان و مينځي.
 - نوکان پرې کړئ او د ټپونو له ګرولو څخه ډډه وکړئ چې کېدای شي منتن شي.
 - د روغتيا ساتنې عمومي معيارونه په پام کې ونيسئ.

۱۵.۱۲ د لیوني سپي ناروغي (Rabies)

تشریح

ريز د دماغ د نسج يو وایرسى (Rhabdovirus) التهاب دی چې د منتنو څارويو د خولې د لارو په وسيله ليردي. انتان کولای شي چې د څاروي د دارلو يا که چېرې څاروی د پوستکي تخريش شوې ساحه يا مخاطي غشا وختي، ليردي. منتن څاروي په دوی کې د علايمو له څرګندیدو څخه ۱۴ ورځې مخکې کولای شي چې انسان ته ساري وي، په عامه توګه ريز وژونکی وي پرته له دې چې پر خپل وخت يې درملنه وشي.

تشخيص

په افغانستان کې دهر څاروي (لکه سپی، پيشو يا وحشي څاروي) ډاډل بايد د ممکنه ريز په شان تداوی شي، تر هغه چې په ډاګه شي چې نومړی څاروی ريز نلري. که چېرې مشکوک څاروي (لکه سپی، پيشو، غوی، پسه، وزه) د پوستکي تخريب شوې ساحې وختي ذکر شوی تماس بايد ريز وګنل شي او د ممکنه ريز په شان دې تداوی شي،

- تر هغه چې په ډاگه شي چې نومړی څاروی ریز نلري، د امکان تر بریده څاروی د سرویلانس لپاره ۱۵ ورځې وساتئ.
- ناروغ زیاتره د څارویو د ډاډلو یوې مخینې څخه حکایت کوي، مگر ډاډل کېدای شي نوي پیژندل شوی یا هیر شوی وي ځکه د تفریخ دوره یې له ۱۲-۳ اونيو زیاته وي.
 - په مقدماتي سندروم کې یې په ډاډل شوې برخه کې درد او بې حسي شامله وی چې له تې، کسالت، سردردی، دزړه بدوالی او کانگو سره مل وي. دا پړاو په څو ورځو کې پای ته رسیږي.
 - د ناروغی په حاد پړاو کې ناروغ کولای شي چې لاندې څیزونه وښيي:
 - نا ارامتیا یا تهيج (Agitation)
 - تر بریده زیات تحریکیدل (لکه جلد د هوا پر وړاندې حساس وي)
 - د خښلو پر مهال د حنجري درد لرونکی سیزم (لکه له خښلو څخه ویره یا Hydrophobia)
 - د خولې د لاړو زیاتوالي (Hypersalivation)
 - صاعده فلج او اختلاج

درملنه

- د ریز د کلینیکي بڼو لپاره کومه درملنه شتون نلري: کېدای شي چې ناروغ مړ شي. له مخ کېدو وروسته درملنه کولای شي چې د ناروغی د پرمختیا مخنیوی وکړي او حیاتي ارزښت لري.
- احتیاط: د لوړ خطره سره مخ پېښو کې، ټپ د ریز د Immunoglobulin سره ارتشاح کړی.
- څاروی د ریز د علایمو لپاره تر کتنې لاندې ونیسئ. څاروی د امکان تر بریده ۱۴ ورځې تر کتنې لاندې ونیسئ.
- د ټپ څارنه
 - د تماس ساحه په پاکو اوبو او صابون و مینځی.
 - د تماس ساحه د عفوني ضد توکو (chlorhexidine+ Cetrimide solution) په وسیله لږ تر لږه د ۱۵ دقیقو لپاره ومینځی.
 - د کوچنیو ډاډلو لپاره ناروغ د واکسین اخیستلو لپاره ژر تر ژره ولیږئ.
 - په شدیدو ډاډلو کې ناروغ د ریز د Immunoglobulin د اخیستلو لپاره ژر تر ژره ولیږئ.
- د تېتانوس ضد واکسین ناروغ ته بیا زرق کړئ: ۰.۵ میلی لیتره د عضلي زرق له لارې (۱۹ برخه، معافیت وگورئ)
- له ریز سره له مخکېدو وروسته له وقایوي درملنې څخه ښه واخلئ چې دا په خپله هم کولای شي د ریز د انتان له پایلو څخه چې د مړینې لامل کیږي، مخنیوی وکړي. د واکسین لرونکو روغتونیزو اساسي خدمتونو د ټولګې مرکزونو ته له Immunoglobulin یا له هغه پرته مراجعه وکړئ.

لېږدول

ټول چیچل شوي شکمن کسان له Immunoglobulin یا له هغه پرته واکسین لرونکو مرکزونو ته ولیږئ.

مخنیوی

- له مخ کېدو وروسته د درملنې لپاره له بشپړ لېږد څخه ډاډ تر لاسه کړئ.
- ټولنه د شکمنو څارویو د کنټرول لپاره وهڅوئ.

ناروغ ته لارښونې

- ډاډ تر لاسه کړئ چې ناروغ د ریز له وژونکې پایلې څخه د نه درملنې په صورت کې پوه شوی او په درملنې له مخ کېدو وروسته چې د مخنیوي یوازینی لاره ده، پابند دی.
- ټولنه د شکمنو څارویو د کنټرول لپاره وهڅوئ.

تشرېح

- لشمانيا د ناروغيو له يوې ډلې څخه عبارت ده چې د يو ډول پرازيت په وسيله چې لشمانيا نومېږي راپيدا کېږي. انتان د يو ډول کوچني مياشي (Sand flies) په وسيله لېږدي. په عامه توګه لشمانيا درې ډوله عمده کلينيکي څرګندېدنې لري.
- جلدي لشمانيا (په افغانستان کې معمول ده) چې په هغه کې يو يا ډير ټپونه د بدن په غير پوښل شويو برخو کې شامل وي، زياتره پيل يې د Papule په بڼه وي چې بيا ناسوري ټپونه جوړوي.
 - د داخلي غړو لشمانيا يا کلا-زار (په افغانستان کې ډير کم ليدل کېږي) کېدای شي سيستمیک علايم لکه تبه، د تورۍ غټېدل، د وزن له لاسه ورکول يا د لمفاوي عقداتو غټېدل ولري.
 - جلدي مخاطي لشمانيا (په ځانګړې توګه په افغانستان کې نه ليدل کېږي). هغه وخت پېښېږي چې ټپونه مخاطي غشا ته خپاره شي او د تخريباتو او خړاپې بڼې لامل شي.

تشخيص

- جلدي لشمانيا
 - په هغه ناروغ کې چې له ۱۴ ورځو څخه په زيات وخت کې له لاندې نښو څخه يو يا څو له ځانه نښي، شکمن شي:
 - يو سور رنگه Papule (مثلا د جلد له پاسه يو کوچنی او داېروي وتلی ځای) معمولاً بدن پر بربنډو ځايونو. دا پېول درد نلري مګر ځينې وخت خارېش کوي. نوموړی پېول پراخېږي او ژورېږي چې سوروالی يې د ساحې شاوخوا ته پراخېږي او د ناحې جلد پریږيږي.
 - وچ ټپ له کلک خيړ سره پر پړسېدلي سور والي چې اندازه يې له ۳-۲ سانتي متره وي او شاوخوا يې غير منظمه وي، پيدا کېږي.
 - لونډ ټپ له ترشحاتو سره چې اکثراً پراخ وي او له ځانه ژور داغونه پر ځای پریږدي.
 - په څرګنده توګه ناروغ درد نلري ځينې وخت خارېش شتون لري. ټپ د وخت په تېرېدو سره له څو مياشتو وروسته په خپله بڼه کيږي مګر يو سطحي داغ د جلد له نورماله رنگ سره له ځانه پریږدي.
 - د بدن د داخلي غړو لشمانيا
 - د درملنې د نه کولو په صورت کې کولای شي چې وژونکی وي.
 - په هغه ناروغ کې چې تبه، غټېدونکې تورۍ، د وزن کمېدل يا غټېدونکې لمفاوي عقدات لري د بدن د داخلي غړو په لشمانيا شکمن شي.
 - کېدای شي نور علايم ونښي: وينه راتلنه، د څګر غټېدل، انيميا او نس ناستی.

درملنه

له درملو پرته درملنه

ټپ پاک وساتئ

د درملو په وسيله درملنه

ناروغ د لشمانيا د درملنې لپاره يو اختصاصي روغتيايي مرکز ته وليږئ.

ليږدول

په جلدي لشمانيا ټول شکمن ناروغان د ارزونې او درملنې په موخه د لشمانيا مرکز ته وليږئ. دې مرکزونو ته د ناروغ په تللو ټينګار وکړئ او ناروغ پوه کړئ چې درملنه به يې وخت واخلي.

مخنيوی

د جلدي لشمانيا مخنيوی عموماً له مياشو سره د مخامخ کېدو محدوديت دی چې د هغوی د چپچلو ډير وخت د لمر له

- پريوتو د شپي تر لومړنيو ساعتونو پورې وي. ناروغ ته سپارښته وکړئ چې -
- د لمر پريوتو پر مهال له هغو جامو څخه ګټه واخلي چې د بدن ډيرې ليرې برخې برېښې پاتې شي.
- په کړکيو کې دې له مچ نيونکو جاليو څخه ګټه واخيستل شي.
- له حشره وژونکو توکو سره د ککړ شويو جاليو څخه چې زيات دوام لري يا له حشره وژونکو توکو سره د ککړ شويو جاليو څخه چې د مياشو له چيچلو سره د مخکېدلو زمينه کموي، ګټه واخلي.
- د څارويو د مخزن د له منځه وړلو څخه چې په هغو کې د ناروغي ناقل ژوند کوي ځان ډاډه کړئ.
- د ناروغي پر خپل وخت تشخيص او درملنه د ناروغ له بيا متن کېدو څخه مخنيوی کوي.

ناروغ ته لارښونې

- ټولو ناروغانو ته د زميني برابرول چې له هغو جلدي ټپونو سره چې درد نلري او له ۱۴ ورځو څخه زيات دي د معاینې لپاره د لسمانيا د تشخيص مرکز ته لار شي.
- پر خپل وخت په تشخيص او درملنې ټينګار د داغ له پيدا کېدو او د بدن د نورو غړو د متن کېدو مخنيوی کوي.

۱۵.۱۴ گرد چينجي (Round worm) Ascariasis

تشرېح

- Ascariasis يوه ډيره معموله پرازيټي ناروغي ده چې غالباً عرض نلري. ليرديدل يې Fecal-Oral له لارې وي.
- Ascariasis کېدای شي د تغذيې د کمولو، د بطن د لويولو يا د کولمو د بندولو لامل شي.

تشخيص

- د معدې او کولمو پړاو - په کلمو کې د لويو چنچيو د شتون له امله
 - درد، نا ارامتيا، تخرشيت
 - د گېډې پرسوب
 - نس ناستی
 - په ماشومانو کې د تغذيې له کمېدو سره نيمگړې وده.
 - په غايظه موادو کې په قسمي يا بشپړه توګه د ليدلو وړ چينجي.
 - ډير کم د چينجي ليدل دخولې يا پوزی له لاری اویا کانگو کی
 - ډير کم کانګي يا د صفرا يا کولمو انسداد (د Ascariasis په وسيله) د چنچيو د کتلې له امله را مينځ ته کيږي
 - تشخيص د ځانگړو هگيو يا چينچيو د ليدو پر بنسټ چې د غايظه موادو په ميکروسکوپي معاینه کې د ليدو وړ وي (په کوم ځای کې چې معاینات شتون لري)
 - په انتقالي دوره کې کيدای شی په غايظه موادو کې په بارزه توګه ايزونوفيل ښکاره شی (د مثال په توګه رپوی Ascariasis)
 - د الټراسونډ معاینات کېدای شي چې کاهل چينجي په کولمو يا د پانقراس او دصفرا په مجرا کې پيدا کړي.
- د ليرديدو پړاو - کله چې لاروا له مخامخ شوې ساحې څخه د سپرو په لوري ليرېږي.
 - له مخ کېدو څخه وروسته په لومړني پړاو کې، اعراض ډير کم د ليدو وړ دي.
 - د الرژی علايم
 - په جلد کې: خارش، سور والی، او يورتيکاريا
 - په سږي کې:
 - وچه ټوخله، ويزنگ، استما ته ورته اعراض (د لوفلر سندروم)
 - د سږي ارتشاح

درملنه

له درملو پرته درملنه

د انیمیا او خوارخواکي د شتوالي شواهد وپلټئ.

د درملو په وسیله درملنه

- د خولې له لارې Mebendazole (۱۰۰ میلی گرامه ټابلیټ) د درې ورځو لپاره توصیه کړئ.
 - له یو کلن څخه تر دوه کلنو ماشومان: ۵۰ میلی گرامه هر دوز هر ۱۲ ساعته وروسته.
 - لویان او له دوه کلونو څخه لوی ماشومان: ۱۰۰ میلی گرامه هر دوز هر ۱۲ ساعته وروسته.
 - بدیله درملنه د albendazole په وسیله (د ولسوالۍ په روغتون کې شتون لري)
 - له یو کلن څخه تر دوه کلن ماشومان: ۲۰۰ میلی گرامه یو دوز
 - لویان او له دوه کلونو څخه لوی ماشومان: ۴۰۰ میلی گرامه یو دوز.
- احتیاط: Mebendazole او Albendazole د امیندواری د لومړي ترایمستر او شېدو ورکولو په ترڅ کې نه توصیه کیږي.
- احتیاط: په هغه صورت کې چې ناروغ د کولمو پر انسداد شواهد ولري د Ascariasis درملنه مه کوئ بلکې ناروغ ولیږئ.
- د انیمیا درملنه، د اړتیا په صورت کې د خولې له لارې د Ferrous sulfate په وسیله (۶۰ میلی گرامه آیرن ټابلیټ) د ۳۰ ورځو لپاره
 - له ۱۲ کلونو څخه کوچني ماشومان: ۱.۵ میلی گرامه د بدن د وزن پر هر کیلو گرام هر دوز ۱۲ ساعته وروسته (له ۶۰ ملي گرامو څخه دې زیات نشي)
 - لویان: یو ټابلیټ (۶۰ میلی گرامه) هر ۱۲ ساعته وروسته.

لیږدول

- د درملنې پر وړاندې د منفي ځواب په صورت کې د ډیرو معایناتو لپاره.
- د بطن شدید حساسیت، د کولمو د انسداد یا د صفراوي لارو د انسداد پر شتون د شواهدو په صورت کې.

مخنیوی او ناروغ ته لارښوونې

ناروغ ته لارښونه وکړئ څو:

- د لاسونو د روغتیا ساتنې او مینځلو عملي کول (یعنې له خوړو مخکې او له ټټې څخه وروسته لاسونه په اوبو او صابون و مینځي)
- ماشومانو ته د لاسونو مینځل او روغتیا ساتنه وښیئ.
- د ټټې (کناراب) په اسانتیاو کې ښه والی.
- د روغتیايي خوړو د برابرولو عملي کول (یعنې د خوړو ښه مینځل او پاخول)
- د نوکانو لندول

۱۵.۱۵ کدودانه چینجی Taenia Saginata او هیمنولیس نانا Hymenolepis Nana (پلن چینجی)

تشریح

د انسانانو منتدیل د کدو دانه چینجی په وسیله د غوږي متننې خامې یا نیمه خامې غوښې د خوړلو له لارې پېښیږي. د هیمنولیس نانا لیږدېدل د انسانانو په منځ کې د Fecal-Oral د تماس په وسیله راپیدا کیږي.

تشخیص

زیاتره متنن کسان عرض نلري، مگر پټ بطني درد، نس ناستی، او د وزن ضایع کېدل کېدای شي شتون ولري. د

ماشومانو شکایت کېدای شي په غیر څرګنده توګه لکه زړه بدوالي، د ګېډې درد او نس ناستی وي. زیاتره تشخیص په غایطه موادو کې د ځانګړو هګیو یا د (Proglottids) چینجیو د پارچو په پېژندلو سره کیږي چې مستقیمې یا میکروسکوپي لیدنې ته اړتیا لري.

درملنه

له درملو پرته درملنه

په هغه صورت کې چې ناروغ نس ناستی ولري لومړی د نس ناستي درملنه وکړئ (۲.۱ څپر کې، دیهایدریشن او نس ناستی وګرځوئ). د خوارخواکي درملنه وکړئ او له دیهایدریشن څخه مخنیوی وکړئ.

د درملو په وسیله درملنه

د تشخیص له بنسټیز تائید څخه وروسته، Niclosamide تجویز کړئ (په هغه صورت کې چې په بازار کې شتون ولري، اوس مهال د بنسټیزو درملو په لست کې نه دی شامل)

- که چېرې کدو دانه چینجی (T. Saginata) وي

- ماشومان چې له ۱۱ څخه تر ۳۴ کیلو ګرامه وزن لري: یو ګرام دې د یو دوز په بڼه وژول شي (د اړتیا په صورت کې درملنه له اوو ورځو څخه وروسته تکرارولی شو)
- هغه ماشومان چې له ۳۴ کیلو ګرامو څخه زیات وزن لري: ۱.۵ ګرامه د یو دوز په بڼه وژول شي (د اړتیا په صورت کې درملنه له اوو ورځو څخه وروسته تکرارولی شو)
- لویان: دوه ګرامه د یو دوز په بڼه (د اړتیا په صورت کې درملنه له اوو ورځو څخه وروسته تکرارولی شو)
- که هیمونلیس نانا وي.

- هغه ماشومان چې له ۱۱ څخه تر ۳۴ کیلو ګرامه وزن لري: یو ګرام دې په لومړۍ ورځ کې وژول شي بیا دې ۵۰۰ میلی ګرامه په ورځ کې یو ځل د شپږ راتلونکو ورځو لپاره. د اړتیا په صورت کې کولای شو درملنه له اوو څخه تر ۱۴ ورځو وروسته تکرار کړو.
- له ۳۴ کیلو ګرامو څخه زیات وزن لرونکي ماشومان: ۱.۵ ګرامه دې په لومړۍ ورځ کې وژول شي بیا دې یو ګرامه په ورځ کې یو ځل د شپږ راتلونکو ورځو لپاره. د اړتیا په صورت کې کولای شو درملنه له اوو څخه تر ۱۴ ورځو وروسته تکرار کړو.
- لویان: یو ګرامه دوز دوو څو دوه ځله د اوو ورځو لپاره. د اړتیا په صورت کې کولای شو درملنه له اوو څخه تر ۱۴ ورځو وروسته تکرار کړو.

مخنیوی

- د غوږي د غوښې له بشپړ پخېدو څخه ډاډ تر لاسه کړئ.
- عمومي وقایي روغتیا ساتنه پلي کړئ.
- د غوښې معاینه
- په سمه توګه د انسانانو د فاضله موادو پټول.
- د انسانانو له فاضله موادو څخه د کود په توګه استفاده ونشي.

۱۵.۱۶ انتراکس (Anthrax)

تشریح

یو توکسیک انتان دی چې د واښه خوړونکو څارویو Bacillus anthracis د Herbivores پواسطه منځ ته راځي (د مثال په توګه پسونه، غوای، اوزی، څوګ). د ناروغی لیددیل د مستقیم تماس (جلدي انتراکس)، انشاق (د سږي انتراکس) یا تیرول (د کولمو انتراکس) په وسیله کیږي. جلدي انتراکس په افغانستان کې عمومیت لري چې لیددیل یې د میکروب

د سپور له لارې صورت مومي، مړه څاروي یا د هغوی د پوستکي هم کولای شي ناروغي وليردوي.

تشخيص

- لومړۍ یو سور پېول وي چې په یو څارښ لرونکی ویزیکول باندې بدلیږي او بیا چې د ټپ بڼه غوره کوي او یو تور داغ پر ځای پریږدي.
- تور داغ درد نلري مګر د اذیمې، د لمفوي او عینې التهاب او د لمفوي عقداتو پړسوب پواسطه سره احاطه کیږي.
- د انتراکس ټپ زیاتره د بدن په برینډو برخو کې لکه لاسونو، متو، پښو، غاړې، سر او لښکیو کې وي.
- عمومي علایم (لکه تبه، کسالت، د لمفوي او عینې التهاب او د لمفوي عقداتو پړسوب) څرګندیږي.
- د ناسمې درملنې په صورت کې اذیمې پراخېږي او کېدای شي سپټسمیا پرمختیا وکړي.

درملنه

- د جلدې انترکس د ساده درملنې لپاره
- د موجوده داغ پوستکي مه اړوئ او مه یې خلاصوئ. هره ورځ پاک او وچ پانسمان پرې کیږدئ.
- د خولې له لارې لس ورځې Doxycycline واخلي. د معیاری دوز د مطالعې لپاره د الف په مل پانه کې الف ۱۰ جدول مطالعه کړئ.
- احتیاط: Doxycycline له اتو کلونو څخه د کوچنیو ماشومانو امیندوارو او شېدو ورکونکو میرمنو لپاره مه توصیه کوئ.
- یا
- د خولې له لارې Amoxicillin توصیه کړئ. د معیاری دوز د مطالعې لپاره د الف په مل پانه کې الف ۳ جدول مطالعه کړئ.

یا

- له اتو کلونو څخه د کوچنیو ماشومانو، امیندوارو او شېدو ورکونکو میرمنو او هغو ناروغانو لپاره چې د Penicillin پر وړاندې حساسیت لري د خولې له لارې له Erythromycin څخه ګټه واخلي. د معیاری دوز د مطالعې لپاره د الف په مل پانه کې الف ۱۲ جدول مطالعه کړئ

لیږدول

- ټول ناروغان چې په سر او غاړه کې زخم لري.
- له عمومي علایمو سره ټول ناروغان
- هر هغه ناروغ چې تاسو د سېري او کولمو د انترکس پر شتون پر هغه شکمن یاست

مخنیوی

د ټولو څارویو د جسدونو ښځول یا سوزول چې د انترکس له امله مړه کیږي.

د ناروغ لارښوونې

- د انترکس د وژونکي حالت په اړه د ناروغ له سمې پوهېدنې څخه ډاډ تر لاسه کول او د اتني بیوتیکونو په وسیله د درملنې د دورې بشپړول.
- د غوډجلو ارزونه او د ناروغۍ پیژندنه او د هغه د خپریدو کنټرول

۱۵.۱۷ بروسیلوزس (Brucellosis)

تشریح

بروسیلوزس یو سیستمیک باکتریايي ګرام منفي انتان دی چې کېدای شي خنډنې (مزمن) شي. د ناروغۍ لیږدېدل انسان

ته له منتښې غوښې سره د تماس له لارې (د مثال په توګه د هغو کسانو ترمنځ چې په مسلخ کې کار کوي) د خامې غوښې، شېدو، یا پټیر د خوړلو یا د تخریش شوي جلد تماس د څارویو یا منتنو توکو له لارې صورت مومي.

تشخیص

- د ناروغی تشخیص د هغه د علایمو د نه ځانګړتیا او بدلیدونکي حالت له امله ستونزمن دی.
- بروسیلوزس په لاندې شرایطو کې باید په پام کې ونیول شي.
 - په ناروغ کې د تې بدلون (یعنې کله پورته کله ښکته) چې له لس ورځو څخه زیات دوام کوي، شپې خولې، ریږدېدنې یا عمومي بې حالي سره د مفصلونو او عضلاتو له درد یا له هغه پرته. زکام ته یو ورته سندروم چې له یوې اونۍ څخه زیات دوام کوي باید پر بروسیلوزس فکر وکړی.
 - ملاریا ته په مساعدو سیمو کې د بروسیلوزس شتون په هغو ناروغانو کې چې د ملاریا ضد درملو له اخیستلو سره سره هم مقاومت ته لري، په پام کې ونیسی.
- د بروسیلوزس اختلالات وپلټئ.
 - په هغه صورت کې چې درملنه یې ونشي، د هډوکو او مفصلونو درد څرګندېږي او د سحایا او د دماغ د نسج التهاب کېدای شي پېښ شي، باید دا ناروغ ولېږل شي.
 - بروسیلوزس کېدای شي د هډوکو او مفصلونو له ورو درد سره یوځای د سحایا د عصبي علایمو په ملتیا د مزمن کېدو په لوري پرمختګ وکړي.
- د شتون په صورت کې لابراتواري معاینات تر سره کړئ. تشخیص زیاتره د سیرولوژیک تستونو په وسیله کیږي. د سیرولوژیکو معایناتو د سوبې لوړېدنه یا د اګلوتینیشن د کچې په مطلقه توګه لوړېدل یو په نسبت د ۱۶۰ څخه له تشخیص سره مرسته کوي.
- تفریقي تشخیص چې له سیرولوژیکو معایناتو څخه پرته ستونزمن دی د لاندې ناروغیو سره وشي.
 - د محرقې تبه
 - نری رنځ
 - د انسان د معافیتي سیستم کمزورونکی وایرس (اچ آی وي)
 - ملاریا

درملنه

د درملو په وسیله درملنه

- له اتو کلونو څخه لویو ناروغانو ته
 - د خولې له لارې Doxycycline (۱۰۰ میلی ګرامه) هر ۱۲ ساعته وروسته د شپږو اونیو لپاره
- احتیاط: Doxycycline له اتو کلونو څخه د کوچنیو ماشومانو، امیندوارو او شېدو ورکونکو میرمنو لپاره مه توصیه کوئ. له
 - Rifampicin د خولې له لارې (۱۰ میلی ګرامه د بدن د وزن پر هر کیلو ګرام) اعظمي دوز ۶۰۰ میلی ګرامه په ورځ کې یوځل د شپږو اونیو لپاره.
 - د اتو کلونو څخه کوچنیو ماشومانو ته
 - Co-trimoxazole د شپږو اونیو لپاره. د معیاري دوز د مطالعې لپاره د الف په مل پانه کې الف ۸ جدول مطالعه کړئ
 - له
 - زرقی Gentamicin په ورځ کې یوځل (۷.۵ میلی ګرامه د بدن د وزن پر هر کیلو ګرام) د دوه اونیو لپاره
- بادنښت: د دوه یا درې درملو ترکیبي رژیم ډیر اغېزمن دی.

لېږدول

- له دې امله چې د بروسیلوزس تشخیص ډیر ستونزمن دی او اوږدمهالې درملنې ته اړتیا لري ټول ناروغان د

- سیرولوژیکو او ټاڼیډي معایناتو لپاره د امکان تر بریده ولیږئ.
- برسیره پردې لاندې پېښې ولیږئ:
 - ټولې اختلاطي پېښې لکه میوکارډیت، د مفصلونو التهابات، اوستومیالیت، او د سحایا التهاب
 - ټولې امیندواری میرمنې.

مخنیوی

- د غیر پاستوریزه پنیر، ناجوش کړو شیدو یا نیم خامې (سرې) غوښې له خوړلو څخه ډډه کول.
- له څارویو یا د هغوی محصولاتو سره له تماس وروسته د اوبو او صابون په وسیله د لاسونو مینځل

۱۵.۱۸ بغې (Mumps)

تشریح

بغې یوه حاده، ساري او وایرسې ناروغي ده چې د لعابیه غدواتو له درد لرونکي غټېدو سره په ځانگړې توگه د پاروتید غده چې د غوړلاندې او د ژامې په زاویه کې موقعیت لري، وي. ډیر کم د خصیو د اخته کېدو (Orchitis) لامل کیږي چې په پایله کې یې عقامت منځ ته راځي.

تشخیص

- د ناروغی د تفریخ دوره له ۱۴ څخه تر ۲۴ ورځو ده.
- زیاتره ناروغان د لعابیه غدواتو له پېسوب پرته لږ اعراض ښيي.
- پېسوب زیاتره له درد سره مل وي.
- د نرم تالو او حلقوم اذیما کېدای شي ولیدل شي.
- ناروغ کېدای شي تبه ونلري یا ټټه تبه ولري
- له ۷-۳ ورځو په ترڅ کې پېسوب ورو ورو کمیږي.

درملنه

- په عامه توگه ساتندویه درملنه تر سره کیږي
- وایرسې ضد کوم ځانگړی درمل شتون نلري
- د مایعاتو اخیستل تشویق او له دیهایدریشن څخه ډې مخنیوی وشي.
- نیمه جامد یا مایع خوراکي رژیم کېدای شي په درد لرونکي ژولو کې گټور وي.
- د بستر استراحت کېدای شي اړین وي.
- موضعي ملاتړ (پورته ساتل) کولای شي د خصیو د التهاب په صورت کې توصیه شي.
- د Paracetamol توصیه خو تبه او درد ښه کړي.
- د معیاري دوز د مطالعې لپاره د الف په مل پانه کې الف ۱۵ جدول مطالعه کړئ

لېږدول

- لوړه تبه
- د سر شدید درد
- د خټې درد
- درد لرونکې خصیې یا Orchitis
- د دماغ د نسج التهاب (Encephalitis) او د پانقرانس التهاب (Pancreatitis) باندې شکمنېدل.
- په لس ورځو کې نه ښه کېدل.

مخنیوی او ناروغ ته لارښوونې

- د لیردېدلو په پړاو کې له نورو څخه د ناروغانو جلا کول (یعنې د پاروتید د غدې له پړسوب څخه درې ورځې وړاندې او د ناروغی له پیلیدو څخه اوه ورځې وروسته)
- د تې په پړاو کې د بستر د استراحت توصیه
- ماشومان کولای شي له لومړني پړسوب څخه یوه اونۍ وروسته ښوونځي ته لاړ شي.

۱۵.۱۹ مقاربتی ساري ناروغی (Sexually Transmitted Infections)

تشریح

مقاربتی ساري ناروغی (STI) د یو شمېر پراخو پتوجنونو له امله څخه راپیدا کیږي چې د فزیکي، روحي او ټولنیزو ناتوانیو لوړه کچه لري. په باکتریاگانو او وایرسونو کې چې د مقاربتی ساري ناروغیو تر ټولو زیات عوامل دي گونوریا، سفلیس، د انسان پاپیلوما ویروس (HPV)، د انسان د معافیتي سیستم کمزورونکی وایرس (HIV)، او د (Herpes simplex - ۲) وایرس شامل دي.

تشخیص

- د HPV وایرس او د تناسلي بهرني ناحیو زخمي
 - زیاتره وخت عرض نلري پرته د Cosmetic له څرگندیدو څخه.
 - خارش، سوی، ویني کېدل، مهبلي یا احليلي افزاات، درد لرونکی مجامعت
 - به ګلابي، سره، نصواري او د جلد په رنګ
 - مستعدې ناحیې
 - په نارینه و کې: Frenulum, Corona, glans penis, prepuce, Shaft, scrotum
 - په ښځو کې: احليل، مقعدي ناحیې، د احليل شاوخوا، مثانه، احليلي څوکه، مقعدي کانال، کلیتوریس، خوله او حلقوم او Labia
- د توخال وایرس او د تناسلي ناحیې توخال
 - لومړنۍ تناسلي وایرس
 - زیاتره کسان له لومړني انتان سره عرض نلري.
 - هغه کسان چې اعرض لري له تې، د سر له درد، کسالت، د عضلاتو له درد څخه شکایت کوي چې د ټپونو له رامنځته کېدو څخه له ۳-۴ ورځو په ترڅ کې اعظمی شدت ته رسیږي او له درې څخه تر څلورو راتلونکو ورځو ښه کیږي.
 - په نورو معمولو اعراضو کې چې زیاتره له ساحې سره تړاو لري، درد، خارش، د ټبول ستونزه، رادیکولیت، مهبلي یا احليلي افزاات شامل دي.
 - د دویمې او درېیمې اونۍ په ترڅ کې د مغیني ناحیې د لمفاوي عقداتو حساس غټیدل.
 - د مخاطي - جلدي ټپونو راپیدا کېدل: سور رنګه پلاکونه چې بیا ژرد ویزیکولونو، ایروژن او ټپونو د ټولګې په وسیله سره تعقیب کیږي.
 - مساعدې ناحیې
 - په نارینه و کې: ورنونه، سفن یا Scrotum او Glans
 - په ښځو کې: د ورنونو منځ د عاني ناحیه او Labia
- سفلیس
 - لومړنۍ سفلیس Primary syphilis
 - سور رنګه خیره نوډول چې د ټپونو د جوړیدو په لوري پرمخ ځي (شانکر)
 - د هغو قاعده ګلابي بخن نارنجی رنګ لري خو شاوخوا ناحیې یې زیاتره سور رنګ لري.

- مساعدې ناحيې:
 - په نارينه و کې: Glans penis, Prepuce په همجنس بازانو کې د مقعد شاوخوا او مقعد
 - په ښځو کې: مقعد او د مقعد شاوخوا ناحيې، مهبل يا د رحم غاړه، کليتوريس او Labia
 - په دواړو جنسونو کې: په بهرنيو تناسلي ناحيو کې زخم: شونډې، ژبه، تالو، گوټې.
- ثانوي سفلېس Secondary syphilis
 - يو شمېر هغه کوچني جلدي او د مخاطي غشا دانکي چې د تصور وړ نه دي له ثانوي سفلېس سره تړاو لري. دانکي زياتره خارجي نلري.
 - په سيستمیکو بدلونونو کې د لمفاوي عقداتو غټېدل، د سحايه التهاب يا Glomerulonephritis شامل دي.
- دريم سفلېس Tertiary syphilis
 - Tuberculous syphilis: د پېول گروپونه په سره نصواري رنگ، او ندولونه چې په زياتره پېښو کې د مټو په پورتنیو برخو، شا، او مخ کې څرگنديږي
 - په اختلاطاتو کې لاندې خيزونه شامل دي.
 - د اسکلتي يا عضلي سيستم ناروغي
 - قلبي وعايي ناروغي
 - د مرکزي عصبي سيستم ناروغي
- ولادي سفلېس
 - لومړنی ولادي سفلېس: ټپ يې د ژوند په لومړيو دوو کلونو کې پيدا کيږي.
 - د زېږون پر مهال شتوالی: د زېږون پر مهال د ماشوم د وزن کموالي، غیرنورمال لوی پلاست، د توري او څگر غټ والی، ټپونه او موړي زياتره د لاسونو او پښو په ورغوبو کې.
 - په لومړنيو مياشتو کې په نه تداوی شوی ماشوم کې منځ ته راځي: د پوزي مزمنه بهېدنه چې معمولا وينه لرونکې وي، د مرکزي عصبي سيستم ناروغي، گلوبولولينفريت، د نفروتيک سندروم سره
 - وروستی يا موخړه ولادي سفلېس: ټپونه يې زياتره د ژوند له دويم کال څخه وروسته څرگنديږي.
- Interstitial Keratitis
 - د حسي کونوالي
 - عصبي سفلېس
 - پوزه د آس د زين په شان Saddle nose
 - لينگي د توري په شان Saber shins
 - په لويو مفصلو کې انصباب
 - تالو پر لمخيا کړي وي (گوټيک) Gothic palate
 - Hutchinson يا د ارې د غاښو په شان غاښونه
- شانکروئيد Chancroid
 - حاده مقاربتی ساري ناروغي ده چې په تناسلي برخو کې دردناک ټپونه او د لمفاوي عقداتو غټېدل پکې شتون لري او د Haemophilus ducreyi له امله منځ ته راځي.
- مساعدې ناحيې
 - په نارينه و کې: Glans penis, Frenulum, Prepuce د جلد داخلي سطحه
 - په ميرمنو کې: د مقعد شاوخوا ناحيې، د رحم غاړه او Labia
- د لمفاوي عقداتو غټېدل: حاد او درد لرونکي، زياتره يوې خوا ته، ۵۰ سلنه پېښو کې له لومړۍ او دويمې اونۍ څخه وروسته په وصفی توگه اېسي جوړوي چې د څيريدويا رېچر سره د فيستولونو د پيدا کېدو لامل کيږي.
- نرم او درد لرونکي ټپونه
- Gonorrhea
 - په نارينه و کې

- احليلي افرازات چی له لږو او رڼو څخه تر ډیرو او قیحي پوری تغییر مومی.
- اذیما: Meatus, Prepuce یا قضیب
- ژور جوړښتونه: د پروستات التهاب، Epididymitis، د مثاني التهاب
- په میرمنو کې،
- د احلیل د شاوخوا اذیما، د احلیل التهاب
- د رحم غاړی څخه زوې یا قیحي افرازات مگر مهبل التهاب نلري.
- د بلوغ له عمر څخه په کوچنیو نجونو کې Vulvovaginitis، د بارتولین د غدواتو اېسې.
- ژور جوړښتونه: د حوصلې التهابي ناروغی (Pelvic inflammatory disease) او Endometritis
- مقعدي ناحیې: د مقعد درد لرونکی او له افرازاتو ډک التهاب
- بلعوم: د بلعوم التهاب (Pharyngitis) او سور والی
- Granuloma inguinale (Granuloma venereum)
- د مقعد په شاوخوا او تناسلي ناحیو کې له درده پرته پرمختلونکي تپ، چې له ډیر کم تماس سره وینې کیږي.
- مساعدې ناحیې-
- په نارینه و کې، Prepuce or glans, Penile Shaft, Scrotum
- په ښځو کې، Labia minora, Mons veneris, Fourchette
- په دواړو جنسونو کې: د تناسلي ناحیو څخه بهر تپونه: خوله، شونډی، ستنی، مخ، هضمي جهاز، او هډوکي
- Lymphogranuloma venereum
- لومړني تپ له ۵-۸ ملي مترو چې درد او تخریش نلري او په څو ورځو کې روغیږي.
- د لمفاوي عقداتو غټوالی متباز، دوه اړخیزه وي او د مغبنې وتر پورتنی او ښکتنی دواړه برخې رانغاړي. زیاتره د فستول د جوړېدو سره خپرې کیږي. له درملنې پرته له ۳-۲ میاشتو روغیږي.
- د مقعد انتان په میرمنو او همجنس بازو نارینه و کې ډیر معمول دی. وینې لرونکي افرازات له درد سره.
- د خولې په انتاناتو کې د غاړې د لمفاوي عقداتو غټوالی شامل دي چې وروسته د ابطني او سینې ناحیو عقداتو ته هم رسېږي. باید له لمفوما څخه تفریقي تشخیص شي.
- د ناروغی د حاد پړاو په ترڅ کې په سیستمیکو اعراضو کې تبه، د سر درد، د عضلاتو درد او په جلدې موندنو کی Erythema nodosum. Enanthems او د رڼا پر وړاندې حساسیت شامل دي.

درملنه

- د تو خال او HPV پېښو لپاره ناروغ ولیدوئ
- د سفلیس لپاره
- د مقدم یا مخکېني سفلیس لپاره توصیه
- زرقی Benzathine Penicillin (۲.۴ میلیون واحد) عضلي زرق یو دوز
- یا
- Penicillin پر وړاندې د حساسیت په پېښو کې د دوه اونیو لپاره Erythromycin څخه ګټه واخلي. د معیاری دوز د مطالعې لپاره د الف په مل پایه کې الف ۱۲ جدول ته مراجعه وکړئ
- یا
- Doxycycline ۱۰۰ میلی ګرامه ټابلیټ هر ۱۲ ساعته وروسته د دوه اونیو لپاره
- احتیاط: Doxycycline له اتو کلونو څخه د کوچنیو ماشومانو امیندواړو او شېدو وړکونکو میرمنو لپاره مه توصیه کوئ.
- مؤخر یا وروستني سفلیس لپاره توصیه
- زرقی Benzathine Penicillin (۲.۴ میلیون واحد) عضلي زرق په اوله ورځ، اتمه ورځ او پنځلسمه ورځ
- توصیه کړی

یا

- Doxycycline ۱۰۰ میلی گرامه ټابلیټ هر ۱۲ ساعته وروسته د ۲۸ ورځو لپاره. د عصبي سفلیس په صورت کې Doxycycline ۲۰۰ میلی گرامه هر ۱۲ ساعته وروسته د ۲۸ ورځو لپاره.

یا

- د امیندواری پرمهال ۵۰۰ میلی گرامه Erythromycin هر شپږ ساعته وروسته د دوه اونیو لپاره.

○ ولادي سفلیس ولړدوئ

• د شانکروئید لپاره توصیه

○ Ceftriaxone (۲۵۰ میلی گرامه) عضلي په واحد دوز

یا

○ د خوډلي له لارې Erythromycin د یوې اونۍ لپاره. د معیاري دوز د مطالعې لپاره د الف په مل پانه کې له الف ۱۲ جدول څخه ګټه واخلي.

• د ګونوریا لپاره ورکړی

○ Ceftriaxone (۲۵۰ میلی گرامه) عضلي زرق په واحد دوز

یا

○ Ciprofloxacin ۵۰۰ میلی گرامه ټابلیټ په واحد دوز (یوازې جامع روغتیايي کلینیکونو او د ولسوالۍ په روغتون کې شتون لري، کېدای شي لیرلو ته اړتیا ولري)

• د *granuloma inguinal* او *lymphogranuloma venereum* لپاره

○ د لویانو لپاره Co-trimoxazole ټابلیټ (۴۸۰ میلی گرامه) دوه ټابلیټه هر ۱۲ ساعته وروسته د درې اونیو لپاره

یا

○ د امیندواری میرمو لپاره د خوډلي له لارې Erythromycin ۵۰۰ میلی گرامه هر ۶ ساعته وروسته د درې اونیو لپاره

لیردول

- هغه ناروغان چې په هغوی کې د معافیتي سیستم کمزوری کونکې وایرس نوی تشخیص شوی وي (اچ آی وي) (۲۰ څیرکې، د ایلز انتان دي وکتل شي)
- هغه ناروغان چې په دوامدار توګه مقاوم وی یا پرله پسې مقاربتی انتان لري په ځانګړې توګه چې ددرملو په مقابل کې په مقاومت باندې مشکوک وي.

مخنیوی او ناروغ ته لارښوې

- د ټولو پېښو په اړه سیمه ییزو روغتیايي چارواکو ته راپور ورکړئ.
- د ۲۴ ساعتونو لپاره د میکروبې ضد اغیز لرونکې درملنې او د هغه تر تطبیق پورې د بلوغ له عمر څخه ټول مخکې ماشومان او نوي پیدا شوي ماشومان چې د ګونوکوک په انتان اخته دي، جلا کړئ.
- واکسین یا معافیت
- د تماسونو څېړنه او د انتان د سرچینو موندنه او د تماس لرونکو درملنه
- د وینې له ناوینې تطبیقولو څخه ډډه وکړئ.
- د ټولو وینه وروکونکو څېړنه چې د وینې د ورکولو لپاره حاضر شوي دي چې تر څو ډاډمن وینه ورکونکې پیدا شي.
- د اوبو او صابون په وسیله د لاسونو منځل په ځانګړې توګه د بدن له مایعاتو او ټپونو سره له تماس وروسته
- د محافظوي دستکشو او جامو څخه ګټه اخیسته هغه وخت چې له وینې یا نورو منتو مایعاتو سره د تماس خطر په پام کې وي.
- د خوندي تګلارو په لاره اچول او د ضایعاتو او موادو دفع کول لکه ستن او نورې چرې په سمه توګه.
- ټولو روغتیايي کارکوونکو ته د مشورې او معاینې له لاسرسي څخه ډاډ ترلاسه کول.
- د نارینه و لپاره له کانډم څخه ګټه خو د اچ آی وي په شمول د مقاربتی انتان د لیریدو مخنیوی وشي.

شپاړسم څپرکی عاجلي پېښې او ترضیضات EMERGENCIES AND TRAUMA

۱۶.۱ د سړي حاده اډيما (Acute Pulmonary Edema)

تشریح

د سړي حاده اډيما یو عاجله او د ژوند گواښونکې پېښه ده چې په سږو کې د غیر نورماله مایعاتو له تولیدو څخه د راپیدا شوې شدیدې سالتوې سره مل وي. د زړه حاده احتشا یې معمول لامل دی. (۶.۵ څپرکی "د میوکارډ حاده احتشا")

تشخیص

ناروغ لاندې څیزونه بیانوي:

- تنفسي ستونزې چې زیاتره په ناڅاپي توگه راپیدا کیږي او له روحی فشار سره تړاو نلري.
- د تنفس چټک کېدل
- د نبض چټک کېدل
- د سیانوز علایم
- معمولاً هیجان او خوله
- د غاړې دورید توسع یا د زړه ناروغیو یا عدم کفایې نور علایم
- زیاتره د وینې لوړ فشار
- د سږو اصغا یا اوریدل معمولاً په دواړو سږو کې د رال (Crackles) او ویزنگ څرگندونکي وي.
- یادښت: د ناروغ د مخینې له اخیستلو سره د استما د حادثې حملې توپیر (۳،۱ څپرکی، «استما» دې وکتل شي)

درملنه

- د حادو اعراضو د ښه کېدو په موخه عاجله درملنه او بیا د لامل درملنه او د ناروغ لیرل.
- په نیم ناستي حالت ناروغ ته د موقعیت له ټاکلو سره د ناروغ د تنفس اسانول.
- د امکان په صورت کې د اکسیجن د ۷۶۰ ملي میتر ستون سیماب د فشار د ساتلو په موخه د ماسک په وسیله د اکسیجن تطبیقول.
- د ورید له لارې ژر تر ژره د Furosemide تطبیقول
- ماشومان: د بدن د وزن پر هر کیلو گرام یو میلی گرام هر دوز
- یادښت: په هغه صورت کې چې د ۳۰ دقیقو په ترڅ کې ټول ونشي او د وینې فشار ثابت وي د ورید له لارې Furosemide د بدن د وزن پر هر کیلو گرام دوه میلی گرامه بیا تطبیق کړئ.
- لویان: هر دوز ۴۰ میلی گرامه او د ناروغ پر ټول څارنه چې باید له ۲۰-۱۵ دقیقو تعقیب شي.
- یادښت: په هغه صورت کې چې د ۳۰ دقیقو په ترڅ کې ټول ونشي او د وینې فشار ثابت وي د ورید له لارې Furosemide ۸۰ میلی گرامه تطبیق کړئ.
- په هغه صورت کې چې ناروغ ښه نشو دوه میلی گرامه Morphine په ورو وریدي زرق (یعنې په یوه دقیقه کې یو ملي گرام) تطبیق کړئ. مورفین د ولسوالۍ په روغتون کې شتون لري.
- احتیاط: په استما اخته ناروغانو او د وینې ټیټ فشار لرونکو ته Morphinine مه توصیه کوی.
- په هغه صورت کې چې د میوکارډ په حاده احتشا شکمن یاست (۶.۵ څپرکی "د میوکارډ سخته احتشا") یو ټابلیټ ۳۲۵ میلی گرامه Aspirin ناروغ ته تجویز کړئ او ناروغ په عاجله توگه د روغتیايي اساسي خدمتونو د ټولگې روغتون ته (EPHS) چې هلته لاندې درمل شتون لري ولیږئ.
- د لویانو لپاره، ۰.۵ میلی گرامه Nitroglycerine تر ۲ې لاندې له ۳-۲ ټابلیټه هر څلور ساعته وروسته توصیه

کړئ. (په سیمه یز روغتون کې شتون لري)
 ○ که چېرې ناروغ بحراني لوړ فشار Hypertensive crisis لري له ۲۵ میلی ګرامه Captopril ټاپلیټ څخه ګټه واخلي (په سیمه یز روغتون کې شتون لري)

لېږدول

ناروغ د ناروغۍ د پیژندنې او د لامل د درملنې په موخه روغتون ته ولیږئ. د امکان په صورت کې د لېږدولو پرمهال د اکسیجن تطبیق ته دوام ورکړئ.

۱۶.۲ د بطن حاد درد: (Acute Abdominal Pain)

تشریح

د بطن درد یوه معمولي او غیر جدي ستونزه ده چې په خپله بڼه کیږي. د بطن حاد درد یا حاد بطن له شدید او ناڅاپي درد (له ۲۴ ساعتونو څخه کم) څخه عبارت ده چې زیاتره دا پېښې عاجلې جراحي مداخلې ته اړتیا پیدا کوي. د بطن حاد درد په ماشومانو یا زړو کسانو کې تل د خطر یو عرض دی. زیاتره ناروغۍ د بطن له درد سره مل وي له دې امله اړینه ده څو په ارزونه کې دقت وشي چې په دې توګه تصمیم ونیول شي چې کومې پېښې باید په عاجله توګه روغتون ته ولیږل شي. د شک په حالت کې ناروغ د جراحي ارزونې لپاره روغتون ته ولیږئ. جراحي ناروغۍ چې معمولا لامل یې د بطن حاد درد وي په ۱۶.۲.۱ څخه تر ۱۶.۲.۷ برخو کې بیان شوي دي.


تشخیص

- د عاجلو پېښو علایم وګورئ
 - لومړی د ژوند پر ګواښونکو عاجلو علایمو تمرکز وکړئ.
 - د امیدواری په عمر کې په مېرمنو کې امیدواري رد کړئ.
 - شدید درد وپلټئ.
 - د شک علایم وګورئ (د مثال په توګه تګي کاردي، د وینې ټیټ فشار، له حده زیات خولی کېدل او ګټکس توب). (۱۶.۹ څپرکي، "شاک" وګورئ)
 - د پریټونیت علایم وګورئ (د مثال په توګه شدید ثابت درد، له حرکت سره د درد پیریدل)
 - د بطن توسع معاینه کړئ. یوه دقیقه مخینه واخلي. لاندې پوښتنې وکړئ.
 - درد په کوم ځای کې دی (۱۶.۲ بڼه وګورئ)
- احتیاط: ماشومان زیاتره په دقیقه توګه د درد ځای نشي ښودلای

Right or Left Upper Quadrant
Acute pancreatitis
Myocardial ischemia
Pneumonia of lower lobe

Right Upper Quadrant
Liver: Hepatitis, liver abscess,
congestive hepatomegaly
Gallbladder: cholecystitis,
biliary colic
Perforation of duodenal ulcer

Left Upper
Quadrant
Abscess of spleen
Rupture of spleen
Gastritis



Right Lower
Quadrant
Appendicitis
Constipation

Left Lower
Quadrant
Sigmoid
diverticulitis

Right or Left Lower Quadrant
Gynecological pelvic pain: PID, ectopic
pregnancy, endometriosis, dysmenorrhea
Kidney stones, ureter colic, urinary tract
infections
Inguinal hernia
Inflammatory bowel disease

Diffuse Abdominal Pain

Gastronenteritis	Acute pancreatitis
Peritonitis	Intestinal obstruction
Typhoid fever	Beginning appendicitis

۱۶.۲ بڼه. د بطن د درد ځای او د هغه احتمالي لاملونه

- درد څه شي ته پاتې کيږي؟ (احتمالي لاملونه يې د قوس په داخل کې ذکر شوي دي)
 - د قبضونکي او سيخ وهونکي درد حاد موجه "روح له تنه بيلوي" (د صفرا او پښتورگو کولیکونه)
 - د مېهم درد موجه له کانگو سره مل (د کولمو انسداد)
 - کولیکي درد چې ثابتېږي (د اپنډکس التهاب، د کولمو مختنق انسداد، Mesenteric ischemia)
 - ثابت او سيخ وهونکي درد چې له خوزيدو سره زياتيږي (د پريتوان التهاب)
 - څيړونکي درد (Dissecting انوريزم)
 - مېهم درد (اپنډيسيت، ډايورتیکوليت، پيالونفريت)
- ايا دا ډول درد مو مخکې درلود
 - د هو په صورت کې، د پخوانيو ستونزو بيرته راکړخېدل لکه د پېتيک ټپ ناروغي، د صفرا د ډبرو کولیک، دايورتیکوليت يا Mittelschmerz (د تخمې په آزادېدو يا د حيض د منځنۍ دورې درد) په پام کې ونيسئ.
- آيا حمله په ناڅاپي توگه وه؟
 - د هو په صورت کې، "لکه د څراغ سوچول" د پېتيک ټپ ثقب، د پښتورگو ډبرې، له رحم څخه د بهر حمل رېچر، د تخمداني يا خصيو تاويدل يا ځينې وخت د انوريزم رېچر دې په پام کې وي.
 - د نه په صورت کې نور لاملونه په پام کې ونيسئ.
- درد په کوم شدت کې دی؟
 - شديد درد (د داخلي احشا سوري کېدل، د پښتورگو ډبرې، د پريتوان التهاب، د پانقرانس التهاب)
 - د فزيکي معاینې له ساحې څخه بهر درد (مزاتير اسکيمي)
- کوم ډول ارامونکي درمل مو اخيستي دي؟
 - قوي مسکنات کولای شي چې د درد د شدت په ارزونه کې مداخله وکړي مگر د پريتوان د شديد التهاب په علايمو کې بدلون نه راولي.
- آيا درد د بدن نورو غړو ته ليږدي؟
 - د بڼې لوري سکېولای هډوکي (د صفرا کڅوړې درد)
 - د چپ مټ ساحه (د توري څيريدل، د پانقراس التهاب)
 - د عاڼې يا مهبل ساحه (د پښتورگي درد)
 - شا (د ابهر د انوريزم څيريدل)
- څه شی د درد د بڼه کېدو لامل کيږي؟
 - انتي اسيدونه (د پېتيک ټپ ناروغي)
 - د زنگنونوله قاطولو سره ډير آرامه وضعيت نيول (د پريتوان التهاب)
- له درد سره نور کوم اعراض مل دي؟
 - کانگې چې د درد څخه دمخه شتون ولری او له نس ناستي سره تعقيب شی (گاستروانتریت)
 - موخره کانگې، د کولمو د خوځښت نشتوالی، او د گاز نه خارجيدل (د کولمو حاد انسداد، د ځنډ يا تاخير د مودې زياتېدل د کولمو Distal يا لرې انسداد يې بڼي)
 - شديدې کانگې د اېبي گاستريک، د سينې د چېي ناحیې د درد او يا د اوړی د درد دمخه شتون ولری (د کانگو له اغيزې څخه د بطن په داخل کې د مري څيريدل)
- دقيقه فزيکي معاینه تر سره او لاندې څيړونه وپلټئ:
 - د حياتي علايمو ټاکل
 - د تنفس چټکتيا کيدای شي نومونیا وښيي.
 - تکی کارديا او د وينې ټيټ فشار شاک وښيي.
 - د معدې او کولمو په تقېقاتو کې د بدن د تودوخې درجه لوړيږي او زياتره د کولمو په انسداد کې نورماله وي.
 - په ميرمنو کې اميدواړي تر هغه چې بل شی ثابت شی په نظر کې ولری. د امکان په صورت کې د اميدواړۍ تېسټ تر سره کړئ.

- د کولمو غړونو ته غوړ کيږدئ.
- د غړونو نشتوالی د پړیتوان د التهاب یا د ایلیم د انسداد نښه ده.
- د اوازونو لوړ غږ انسداد څرگندوي.
- بطن جس کړئ.
- د حساسی ساحې، له لیرې فاصلې څخه پیل کړئ
- تومورونه او کتلې معاینه کړئ.
- تر ټولو د زیات حساسیت لرونکې ساحه وپېژنئ.
- د بطن کلک والی معاینه کړئ.
- تل یې په معاینه کې په پام کې ونیسئ:
- د مغبنی ناحیه د التصاقی فتحه لپاره
- ریکتم د ترضیض، اېسه، له رحم څخه بهر حمل، د دوگلاس د جوف پراخ والی د علایمو لپاره
- په هغو میرمنو کې د حوصلې معاینه چې د بدن د ښکتنې برخې له درد څخه شکایت لري (د هغې د محرم په حضور کې)
- د بدن هر بل سیستم چې له هغه سره تړاو لري (لکه تنفسي او قلبي وعایي)
- د بطن توسع یا پراخوالی ته پاملرنه وکړئ: د قرعې پواسطه له مایعاتو څخه ګازات تفکیک کړئ.
- د شتون په صورت کې نور لابراتواري معاینات
- د وینې د کرویاتو شمیر د بطن د داخلي احشا په التهاب کې لوړیږي.
- د ادرار معاینه – د ګلوکوز، کیتونونو او د وینې د سپینو حجراتو د شتون لپاره.
- د امیدواری تېسټ د ټولو هغو میرمنو لپاره چې د امیدواری په عمر کې دي.

درملنه

له درملو پرته درملنه

- د خولې له لارې ناروغ ته د خوړو له ورکولو څخه ډډه وکړئ.
- د انفي معدې ټیوب هغه ناروغ ته چې شدیدې کانګې لري یا د کولمو د انسداد علایم لري یا د ناروغ عمومي وضعیت ښه نه دی او د اسپایریشن خطر یې زیات دی، تطبیق کړئ.

د درملو په وسیله درملنه

- د اکسیجن تطبیقول که مناسبه وی
- د شاک په پېښو کې د ورید له لارې د مایعاتو د تطبیقولو پیلول (۱۶.۹ برخه، "شاک" وګورئ) د ناروغ وینه
- Cross-match او نور ټیسټونه تر سره کړئ.
- د سیسټمیک سپس، د پړیتوان د التهاب، د بولي لارو د شدیدو انتاناتو یا پیالونفریت په شکمنو پېښو کې له انټی بیوټیکونو څخه ګټه واخلي. د لومړۍ کرښې درملنه له Ampicillin + Gentamicin څخه پیل کړئ. ناروغ د درملو د لومړي دوز له تطبیقولو څخه وروسته روغتون ته ولېږدوئ.
- ماشومان:

- Ampicillin: د معیاري دوز د مطالعې لپاره الف ۴ جدول ته مراجعه وکړئ
- یا –

- Penicillin پر وړاندې د حساسیت په پېښو کې له Erythromycin څخه ګټه واخلي. د معیاري دوز د مطالعې لپاره د الف په مل پاڼه کې د الف ۱۲ جدول ته مراجعه وکړئ

– له –

- Gentamicin د بدن پر هر کیلو ګرام وزن پنځه میلی ګرامه پر دوز په زرقي توګه په یوه ورځ کې.

O لویان

▪ Ampicillin: یو گرام وریډي زرق هر شپږ ساعته وروسته

یا

د Penicillin پېنسیلین پر وړاندې د حساسیت په پېښو کې له Erythromycin څخه ګټه واخلي. د معیاري دوز د مطالعې لپاره د الف په مل پاته کې د الف ۱۲ جدول ته مراجعه وکړئ
-له-

▪ Gentamicin ۳۲۰ میلی ګرامه وریډي زرق هره ورځ

• د امکان په صورت کې انلجزيک له ورکولو څخه د پرمختلونکو اعراضو د تر پوښښ لاندې نیولو له امله ډډه وکړئ.

لیږدول

- د ناروغ عمومي وضعیت Stable یا ثابت کړئ او
- ناروغ د ډېرو معایناتو او جراحي ته د احتمالي اړتیاو لپاره ولیږئ.

مخنیوی:

د ناروغانو په وخت لیر د د حاد بطن دشکمنیدو په صورت کې د جراحي روغتیايي مرکز ته دارزیا بی او بر سی لپاره

ناروغ ته لار ښوئ:

- د ډاکټر له تجویز پرته یا له قطعي تشخیص څخه مخکې ناروغ ته انلجزيک توصیه نه کړئ.
- په ټولو بطني پېښو کې دې د یوناني (دودیزو) درملو له توصیه څخه ډډه وشي.

۱۶.۲.۱ حاد پریټونیت (Acute Peritonitis)

تشریح

د پریټون التهاب له یو حادثې د ژوند ګواښونکي ناروغی څخه عبارت ده چې د باکټریاو یا کیمیاوي توکو په وسیله د پریټون د جوف د ککړیدو له امله راپیدا کیږي. د پریټونیت درملنه د زمینی د مساعدونکي ناروغی د درملنې پر بنسټ وي. د پریټون د التهاب زیاتره پېښې د اپنډیسیت، د پیټیک ټپ د ثقب، د کولمو د اختناق، د پانقرانس د التهاب (پانکراتیت)، د صفرا د کڅوړې التهاب، د بطن د ننه اېسې، له محرقې څخه په کولمو کې د راپیدا شوي ثقب، د نفیرو نو التهاب یا له زیږون څخه وروسته د انتاناتو له امله پیدا کیږي.

تشخیص

- د بطن څړیکه وهونکی یا شدید درد چې له خوځیدو او ټوځلې سره زیاتېږي.
- د بطن پراخیدل یا توسع
- د بطن حساسیت او دعضلا ټو Guarding
- د کولمو د اوازونو له منځه تلل یا کمیدل
- د مقعد او مهبل د معاینې پرمهال حساسیت (د حوصلې پریټونیت)

درملنه

له درملو پرته درملنه

- د خولې له لارې د تغذیې او درملنې بندول
- د انفي معدوي تیوب داخلول

د درملو په وسیله درملنه

- د رینگر لکتات (Ringer's lactate) یا نارمل سالین (۰.۹% Saline solution) په وسیله د ورید له لارې د مایعاتو ورکول.
- د ورید له لارې د انټي بیوتیکونو ورکول
 O Ampicillin (۲ ګرامه)
 - له -
 O Gentamicin (۵ میلی ګرامه د بدن د وزن پر کیلوګرام)
 - له -
 O Metronidazol (۵۰۰ میلی ګرامه) (په جامع روغتیايي کلینیکونو او د ولسوالیو په روغتونونو کې شتون لري)
 • د ناروغ لیر دول

لیږدول

ټول ناروغان د هغوی د عمومي وضعیت له بابتاته کولو او د انټي بیوتیک د لومړني دوز له تطبیقولو وروسته ولیږئ. لیږل کېدای شي چې د ناروغی دلا ملونو په تشخیص او جراحي درملنه کې ګټوره وي.

۱۶.۲.۲ حاد اپنډیسیت (Acute Appendicitis)

تشریح

حاد اپنډیسیت تر ټولو ډېره عامه عاجله جراحي پېښه ده. په خپل وخت د جراحي مداخلې په وسیله ګام ښې پایلې لري.

تشخیص

- درد د نامه په شاوخوا کې پیليږي او بیا یې موقعیت د څو ساعتو په ترڅ کې د بطن ښی ښکتنی څلورمې ربعي (RLQ) ته بدلون مومي.
- زړه بدوالی او د اشتها نشتوالی
- ظاهراً ناروغ مالومیري او پر بستر آرامه پروت وي
- د ډیر درد او حساسیت احساس په ډیره معموله توګه د Mcburney's په ناحیه کې وي (د حرقفې علوي قدامي دروي څخه د نامه په لوري د مستقیمې کرښې له وېستلو سره درد د هغه په یو په درېیمه وحشی برخه کې شتون لري)
- هر حرکت د ټوڅلې یا د ښي پښې د غزولو په شمول کېدای شي د درد د زیاتیدو لامل شي.
- په زیاتره ناروغانو کې لابراتواري معاینات د وینې د سپینو حجرو د شمېر لوړوالی او د تروفیلونو د شمېر زیاتوالی (له ۷۵ سلنې څخه زیات) ښیي.

درملنه

درملنه یې جراحي ده.

۱۶.۲.۳ د صفرا د کڅوړې حاد التهاب (Acute Cholecystitis)

تشریح

د صفرا د کڅوړې حاد التهاب معمولاً د صفرا د کڅوړې له ډېرو سره مل وي چې د صفراوی قنات د مجرا د بندیدو له امله د صفراوي ډیرو په وسیله پیدا کیږي.

تشخیص

- په ناروغ کې حاده حمله غالباً د زیات یاغور خوراک له اخیستلو سره راپیدا کیږي.

- د ناروغۍ حمله له ناڅاپي او ثابت درد سره د اپي گاستریک (Epigastrium) یا د بڼي هايپوکاندر (Hypochondrium) په ناحیه کې چې د بڼي لوري پورتنی ربع (RUQ) ته غږیږي.
- تبه، زړه بدوالی او کانګې شتون لري.
- د بڼي لوري د پورتنی ربع حساسیت نږدې تل شتون لري چې له عضلي مقاومت او بیرته راستنیدونکي حساسیت سره وي.

درملنه

د صفرا کڅوړې له لرې کولو سره انتخابي درملنه بې جراحي ده (په ۷۲ ساعتونو کې) یا محافظوي درملنه + بیا وروسته د صفرا د کڅوړې موخه لرې کول د جراحي له لارې (له شپږ څخه تر لس اوښو وروسته)

محافظوي درملنه

- د خولې له لارې د تغذیې بندول
- د وريد د داخل له لارې د مایعاتو په وسیله د تغذیې پیلول
- د وريد د داخل له لارې د انټي بیوټیک ورکول
- Ampicillin O: له یو څخه تر دوه ګرامه هر شپږ ساعته وروسته له ۱۴-۱۰ ورځو لپاره
- +
- O مترونیدازول (Metronidazole): ۵۰۰ میلی ګرامه هر شپږ ساعته وروسته له ۱۴-۱۰ ورځو لپاره
- د درد د له منځه وړلو لپاره د مورفین (Morphine) توصیه (د شتون په صورت کې)

۱۶.۲.۴ د پیپټیک ټپ تثقب (Perforated Peptic Ulcer)

تشریح

د پیپټیک قرحی تثقب یو جدي حالت دی چې په هغه کې د معدې تیزاب او خوراكي توکي د بطن جوف ته داخلېږي.

تشخيص

- د حملو پیل ناڅاپي او د بطن شدید درد
- د درد له حادو حملو څخه وروسته د بطن په پورتنی برخه کې شدید سوزېدونکی درد
- د هر حرکت سره د درد زیاتېدل
- د حساسیت زیاتوالی او د ګیډې کلکوالی
- د کولمو د اوازونو له منځه تلل یا کمېدل
- د بطن د اکسري د معایناتو په وسیله د بطن په جوف کې د آزادې هوا شتون
- وروسته د سپټیک شاک منځ ته را تلل

درملنه

درملنه بې عا جله جراحي ده.

۱۶.۲.۵ د کولمو انسداد (Bowel Obstruction)

تشریح

- د کولمو انسداد کېدای شي چې په میخانیکي یا غیر میخانیکي (Paralytic ileus) توګه وي.
- میخانیکي انسداد کولای شي چې یو له بل سره د نغښتو بندونو Adhesion bands، مختنق فتن، Volvulus، سرطانونو،

- د کولمو تغلف (Intussusception) په ځانګړې توګه په ماشومانو کې یا د کولمو د اسکیمي له امله پيدا کيږي.
- غیر میخانیکي انسداد د پريتونا یتس، د نخاع د ټپونو، د مخدره توکو یا درملو یا د وینې د پوتاشیم (Hypokalemia) د کمیدو له امله پيدا کيږي.

تشخيص

- په کولیکي بڼه د بطن درد
- د کوچنیو کولمو په انسداد کې د بطن متوسط درد
- د لویو کولمو په انسداد کې تر نامه لاندې درد
- کانګې، د کولمو د انسداد له شدیدوالي سره د کانګو پرله پسې والی زیاتيږي.
- قیضیت او د غایطه توکو بند پاتې کېدل Obstipation (د کولمو د حرکتونو او د ګاز د جریان د نشتوالي له امله)
- د بطن پراخېدل یا توسع، هر څومره چې د انسداد ناحیه لرې وي په هماغه اندازه د بطن پراخېدل زیات وي.

د کولمو انسداد له کلینیکي نظره تشخیصیدلای شي مګر په ولاړه پلان اکسري کولای شي چې له دې تشخیص سره بڼه مرسته وکړي. د کوچنیو کولمو د لوپونو پراخوالی د هوا او مایعاتو سرحد سره په اکسري کې د کوچنیو کولمو انسداد ښیي، او د کولمو پراخوالی او د Haustral نښې د لویو کولمو انسداد ښیي.

درملنه

- د خولې له لارې درملنه او خوراک ودرؤی (د خولې له لارې د هیڅ شي توصیه مه کوئ)
- د ورید د داخل له لارې مایعات پیل کړئ.
- د پوزې او معدې ټیوب تطبیق کړئ.
- د ډیرو معایناتو او جراحي لپاره ناروغ ولیږئ.

۱۶.۲.۶ له رحم څخه بهر د حمل ریچر (Ruptured Ectopic Gestation)

تشریح

د تشریحاتو لپاره ۹.۶ برخه، "له رحم څخه بهر حمل" ته مراجعه وکړئ.

له رحم څخه د بهر حمل لوی خطر د هغه ریچر دی چې د بطن د جوف په داخل کې د وینې تلنی یا هیموراژ، شاک او آن د مړینې لامل کیږي. له رحم څخه د بهر حمل ریچر یوه عاجله جراحي پېښه ده.

تشخيص

- د میاشتنی عادت د نشتوالی مخینه
- تر نامه لاندې ناڅاپي، تیز او چا قو وهونکی درد.
- د امیدواری د عمر په میړمنو کې له کانګو سره مل کولاپس، ضعف
- له ځملاستو سره درد اوږو ته خپريږي.
- د وینې راتلنې د نه بندیدو په صورت کې په تدریجي توګه د فشار ټیټیدل
- د امیدواری ټسټ مثبت وي،
- د الټراسونډ معاینه کېدای شي د بطن د جوف په داخل کې مایع وښايي.

درملنه

درملنه يې عاجله جراحي ده.

۱۶.۲.۷ حالي کولیک (Ureteric Colic)

تشرېح

حالي کولیک د ډېرې له وتلویا تیریدلو سره له درد څخه عبارت ده. دا یوه شدیدې پېښه ده او پر خپل وخت درملنې ته اړتیا لري.

تشخيص

- د فلانک يا loin د ناحې درد چې د مغبنې او د خصیو يا ورنو منځ او Labium ته خپريږي.
- درد تر دې حده شدید دی چې ناروغ خوځښت ته اړ باسي او د ښه کولو لپاره خوځښت ته په آرامه کښېناستو يا ځملاستو ترجیح ورکوي.
- د پښتورگو د زاوې حساسیت شتون لري.
- ټوخله د درد لامل نه کیږي.
- د تبول تکرر کېدای شي شتون ولري.
- ناروغ کېدای شي چې په خپله مخینه کې په ادرار کې د ډېرې له خارجیدو څخه حکایت وکړي.
- د ادرار مایکروسکوپي معاینې د ریم له حجرو (Pus cell) سره د وینې سرې حجرې ښيي.
- د پښتورگي، حالب او مثانې (KUB) اکسري هایدرونفروز (يا ډېره) ښيي.
- د الټراسونډ معاینه په تشخیص کې مرستندویه ده.

درملنه

- د بطن په حاد درد کې باید:
- ناروغ د خولې له لارې له خوړلو څخه منع کړئ.
- د وريد د داخل له لارې مایعات پیل کړئ.
- په هغه صورت کې چې د بولي لارو په شدید انتان يا عمومي سپسېس شکمن یاست انټي بیوتیک تجویز کړئ. معمولاً د وريد د داخل له لارې انټي بیوتیکونه توصیه کیږي (نا روغی وگورئ) (۱۱.۱۱ برخه، "حاد پالونفریت" وگورئ).
- دسپزم ضد درمل سپارښتنه وکړي

لېږدول

- اختلاطي پېښې (لکه سپسېس، هغوی چې د درملو د توصې په وسیله نه روغیږي)
- ډیر معایناتو ته اړتیا لري.
- جراحي ته اړتیا لري.

ناروغ ته لارښوونې

د ډاکټر له سپارښتنې پرته او د حاد بطن د تشخیص مخکې هېڅ کله د درد ضد درملو څخه ګټه مه اخلی

۱۶.۳ د انسان او څاروي داړل (Animal and Human Bites)

تشرېح

د څاروي داړل کېدای شي له اهلي څارويو سره په مخ کېدو کې لکه سبې، پشو يا آس يا وحشي څارويو سره پېښ شي. د څارويو لخوا زیاتره داړل د څارويو د لمسولو له امله پېښیږي. هغه څاروي چې له مخکیني لمسیدلو څخه پرته انسان داړي د لیوني سېي (Rabies) د وایرس د لیریدو خطر په هغوی کې زیات وي. د انسان په وسیله په غاښول زیاتره

- د د جنگونو په ترڅ کې د کس په خوله کې د سوک وهلو په شمول چې خوله یې خلاصه وي پېښیږي چې په دې ځای کې د گوتود بندونو د ټپي کېدو خطر زیات شتون لري.
- د انسان یا خواروي په وسیله په غاښول کېدای شي لاندې پایلې ولري:
- انتان، په ځانگړې توگه د لاس یا پښې داړلو څخه دا ناحیه له هوازي او غیر هوازي انتاناتو سره ککړیږي.
- په حیاتي جوړښتونو کې ټپونه لکه اوتار، عصب، د وښې اوغیه، یا مفصلونه یا مجمه
- تیتانوس (۱۵.۳ برخه، تیتانوس دې وکتل شي)
- د لیوني سپي وایرس (۱۵.۲)، د لیوني سپي ناروغي دې وکتل شي)

تشخیص

- سوري شوي نافذه ټپونه، کوبل شوي ټپونه (Crush injuries)، څیریدنې، د بدن د حیاتي جوړښتونو ټپونه او په ټپونو کې د پردیو جسمونو شتوالی دې وکتل شي.
- د ټپ د ککړتیا کچه او د انتان لومړنی علائم لکه سور والي، حرارت، او قیق و ارزوئ.
- ناروغ د تیتانوس د خطر له پلوه د هغه د معافیت د وضعیت په پام کې نیولو سره (۱۵.۳ برخه، تیتانوس او ۱۹ څپرکي معافیت وگورئ) و ارزوئ.
- ناروغ د داړلو د مخینې په پام کې نیولو او د داړلو د ډول په پام کې نیولو سره د لیوني سپي د وایرس لپاره و ارزوئ.

درملنه

له درملو پرته درملنه

- لومړنی گام چې په درملنه کې لوړ لومړیتوب لري د انتان د مخنیوی لپاره د ټپ مینځل او پاکول دي. ټپي شوې ساحه او د هغه شاوخوا جلد د پاکو اوبو یا نارمل سلاين اویا د ایوډین محلول په وسیله ښه او په نرمه توگه و مینځی او پاک یی کړئ.
- پردی جسمونه له ټپي ساحې څخه لرې کړئ.
- په عامه توگه داړل شوی ټپ باید و نه گنډل شي ځکه کونونه د انتان لامل او خطر زیاتوي.
- O د لویو ټپونو لپاره او په عمومي توگه پاک څیري شوي ځایونه چې د ښایست له پلوه مهم وي لکه مخ باید گنډل په پام کې و نیول شي.
- O دهغو داړلو درملنه چې له اتو ساعتونو څخه زیاته ځنډیدلې وي Delayed primary closure دی (له درې ورځو وروسته باید و گنډل شي)
- O د گنډلو لپاره پاملرنه غوره ده چې د یو مجرب ډاکټر په مشوره یا یو روغتیايي مرکز ته د ناروغ په لیږلو سره تر سره شي.
- احتیاط: هیڅکله هغه څیرې ځایونه چې د لاس پر مفصلونو موقعیت ولري و نه گنډل شي ځکه د انتان د لیږدېدو خطر مفصلونو ته زیاتېږي.
- یو پاک پانسمان تطبیق کړئ.

د درملو په وسیله درملنه

- د درد د له منځه وړلو لپاره Paracetamol توصیه کړئ د معیاري دوز د مطالعې لپاره د الف په مل پانه کې الف ۱۵ جدول ته مراجعه وکړئ.
- O د تیتانوس واکسين په هغه صورت کې چې ناروغ مخکې نه وی اخیستی، ورکړئ (۱۵.۳ برخه، تیتانوس او ۱۹ څپرکي معافیت وگورئ)
- O د تیتانوس واکسين دوز (۰.۵ میلی لیتره) د عضلي زرق له لارې د اړتیا په صورت کې توصیه کړئ.
- O د هغو ناروغانو لپاره چې معافیت نلري یا بشپړ معافیت یې نه دی اخیستی د انساني تیتانوس د Immunoglobulin څخه (یا د تیتانوس د انټي سیروم) د عضلي لارې گټه واخلي او د اړتیا په صورت کې ناروغ د ولسوالۍ

روغتون ته وليږئ.

- وقايوي انتي بيوتيک له ۵-۳ ورځو ناروغ ته توصیه کړئ (۱۶.۳ جدول وگورئ):

○ د پېشو داړل – په هره ساحه کې چې داړل شتون لري.

○ په لاس کې د انسان يا نورو څارويو داړل

يادښت: هغه ناروغ چې له ۲۴ ساعتونو څخه مخکې داړل شوی او کومه انتاني نښه نه ښيي، د انتي بيوتيک په وسيله وقايوي درملنې ته اړتيا نلري.

- معالجه‌وي درملنه دې د هغو ناروغانو لپاره چې د نرمو نسجونو التهاب او اېسه لري توصیه شي؛ د هغو ټپونو لپاره چې متن شوي دي انتي بيوتيکونه ښه ښودل شوي دي او بايد له ۳-۲ اونيو دوام وکړي (الف ۱۶.۳ او ب ۱۶.۳ جدول دې وکتل شي)

۱۶.۳ الف جدول: د انسان يا خاړوي په وسيله له ډاړلو وروسته په لويانو کې د ټپ د انتاناتو درملنه يادښت: د اړتيا لوړ درملنه له دوه څخه تر درې اونيو وي.

د ډاړلو ډول	غوره انټي بيوتيک	د Penicillin د حساسيت په مقابل کې بدېل
سهي	گرامه د خولې له لارې هر اته ساعته وروسته Clavulanate/Amoxicillin له ۲۵۰-۵۰۰ ميلي	له Clindamycin له ۱۵۰ - ۳۰۰ ميلي گرامه هر شپږ ساعته وروسته Co-trimoxazole ۲ ټاېپته (۴۸۰ ميلي گرامه) هر ۱۲ ساعته وروسته يا له Ciprofloxacin ۵۰۰ ميلي گرامه د خولې له لارې هر ۱۲ ساعته وروسته *
پيشو	گرامه د خولې له لارې هر اته ساعته وروسته Clavulanate/Amoxicillin له ۲۵۰-۵۰۰ ميلي	له Clindamycin له ۱۵۰ - ۳۰۰ ميلي گرامه هر شپږ ساعته وروسته Co-trimoxazole ۲ ټاېپته (۴۸۰ ميلي گرامه) هر ۱۲ ساعته وروسته يا له Ciprofloxacin ۵۰۰ ميلي گرامه د خولې له لارې هر ۱۲ ساعته وروسته *
دانسان دغاښ ډاړل	گرامه د خولې له لارې هر اته ساعته وروسته Clavulanate/Amoxicillin له ۲۵۰-۵۰۰ ميلي	Erythromycin ۵۰۰ ميلي گرامه هر شپږ ساعته وروسته يا Ciprofloxacin ۵۰۰ ميلي گرامه د خولې له لارې هر ۱۲ ساعته وروسته *
انسان - سوک وهل	دا پېښې بايد وليږدول شي.	

* Ciprofloxacin د اميندواړو مېرمنو لپاره مضاد استطاب دی او د امکان تر بريده دې ماشومانو لپاره توصيه نشي.

۱۶.۲ ب جدول: د انسان یا څاروي په وسیله له دارلو وروسته په ماشومانو کې د ټپ د اټانولو درملنه
یادښت: د اړینا وړ درملنه له دوه څخه تر درې اونیو وي.

د دارلو ډول	انټي بیوتیک	دوز
سږی	Clavulanic acid/Amoxicillin شریت: ۱۵۶ میلی ګرامه په پنځه میلی لیټره کې (۱۲۵ میلی ګرامه Clavulanic acid/Amoxicillin ۳۱:۲۵ میلی ګرامه په پنځه میلی لیټره کې) یا ټالینټ: ۶۲۵ میلی ګرامه (۵۰۰ میلی ګرامه Clavulanic acid/Amoxicillin ۱۲۵:۱۲۵ میلی ګرامه په پنځه میلی لیټره کې)	نوي پیدا شوي ماشومان او له یو کلن څخه کوچني ماشومان: ۰.۸ ملي لیټره د بدن وزن پر هر کلو ګرام هر اته ساعته وروسته. له ۶-۱۲ کلن ماشومان: د چای څښلو یو کاغچه x هر اته ساعته وروسته له ۱۲-۶ کلن ماشومان: دوه کاغذي x هر اته ساعته وروسته یا نیم ټالینټ ۶۲۵ ملي ګرامه هر اته ساعته وروسته
پښو	Erythromycin له ۱۰-۱۵ میلی ګرامه د بدن د وزن پر هر کلو ګرام هر شپږ ساعته وروسته شریت: ۲۰۰ میلی ګرامه په پنځه میلی لیټره کې	نوي پیدا شوي ماشومان او له پنځو میاشتو څخه کوچني ماشومان: د چای څښلو نیمه کاغچه هر ۱۲ ساعته وروسته. له ۶ میاشتو څخه تر یو کلن ماشومان: د چای څښلو یو کاغچه x هر ۱۲ ساعته وروسته له ۱-۶ کلن ماشومان: د چای څښلو یو کاغچه x هر اته ساعته وروسته له ۱۲-۶ کلن ماشومان: د چای څښلو دوه کاغذي x هر اته ساعته وروسته
د انسان، دغاښ د اړل	(Trimethoprim + Sulfamethoxazole) Co-trimoxazole شریت: ۲۴۰ میلی ګرامه په پنځو میلی لیټرو کې ټالینټ: ۶۸۰ میلی ګرامه	له ۶-۱۲ میاشتو ماشومان د چای څښلو نیمه کاغچه هر ۱۲ ساعته وروسته له ۶ میاشتو څخه تر ۵ کلن ماشومان: د چای څښلو یو کاغچه x هر ۱۲ ساعته وروسته له ۱۲-۶ کلن ماشومان: د چای څښلو دوه کاغذي x هر دولس ساعته وروسته یا یو ټالینټ ۶۸۰ میلی ګرامه هر ۱۲ ساعته وروسته
انسان - سوک وهل	دا پېټي باید ولیدول شي.	

* د چای څښلو یو کاغچه = ۵ میلی لیټره

ليږدول

- کېدای شي د څاروي ډاډل له ريز وایرس سره مل وي (د واکسينولو لپاره)
- هغه ناروغان چې له لوړې تې، سپس او د نرمو نسجونو له خپرېدونکي التهاب سره مل وي.
- په مفصلونو کې په نفوذ (penetration) شکمنېدل چې له موټ پواسطه په ټپونو کې یی امکان لوړ دی، د اوتار خپرېدل، د هډوکي ماتېدل، د پردیو جسمونو شتون او د لاس او پښو شدید ټپونه.

مخنیوی

- کورني اهلي څاروي یا وحشي څاروي د ۱۴ ورځو لپاره د لیوني سپي د وایرس (Rabies) د علایمو د لیدلو لپاره وگورئ.
- زیانمنه شوې ساحه له ډاډلو وروسته ژر تر ژره په اوبو ومینځئ او پاکه یې وساتئ.

ناروغ ته لارښوونې:

- ناروغ د ټپ د پانسمان لپاره له ۴۸ ساعتونو وروسته بیا راولئ او د انتان د علایمو د رامنځته کېدو په صورت کې (لکه سور والی، د درد زیاتوالی، حرارت، تې او د زوو زیاتوالی) ژر تر ژره باید راوستل شي.
- د خپلواکي بیوټیکونو اخیستلو ته د لارښوونې سره سم دوام ورکړئ.
- د څاروي د راپارولو او له هغوی سره د جگړې خطر محدوده کړئ.
- هیڅکله گیاهي یا دودیز درمل پر ټپ مه ږدئ.

۱۶.۴ د حشراتو چيچل يا نیش وهل (Insect Bites and Stings)

۱۶.۴.۱ د شا تو د مچي، یا د غمبسو نیش وهل (Wasp and Bee Stings)

تشریح

ټپ یا آفت د موضعي غبرگون، زهر او انافلکسیس له امله منځ ته راځي. د انافلکسیک غبرگون د نیش وهلو یا چيچلو پر وړاندې د زهر او مستقیمو اغیزو په پرتله له معمول څخه زیات د مړینې لامل کیږي.

تشخیص

- په غیر حساسو کسانو کې نیش وهل یوازې د درد، سوروالی، حرارت او موضعي پړسوب اغیز تولیدوي. موضعي اغیزې هغه وخت خطرناکه کیږي چې پړسوب د هوایی تنفسي لارو د تړلو لامل شي (د ژبې له نیش وهلو وروسته).
- سیستمیک توکسيستي کولای شي چې له څوڅلو نیش وهلو وروسته (معمولا له لس څلوڅخه زیات) د مړینې لامل شي. د کتلوی زهری کید لو (مسومیت) کلینیکي لویه له ټیټ فشار، کانگو، نس ناستي، د سر درد او کوما څخه عبارت دي.
- په یو حساس کس کې په سیستمیکو اعراضو کې د سرد جلد سوی (Tingling scalp)، د مخ د جلد سوروالی (Flushing)، سرگنگسوالی، د لیدو تشوشات، سنکوپ (د شعور گذری ضیاع)، یورتيکاریا، ویزنگ، بطني کولیکونه، نس ناستی او تکی کاردی چې کولای شي له نیش وهلو څخه څو دقیقې وروسته راپیدا شي، شاملی دی. له ۱۵-۲۰ دقیقو وروسته انافلکسیک شاک هم څرگندېدای شي (۱۶.۹ جدول دې وکتل شي).

درملنه

له درملو پرته درملنه

- په ځای کې پاتې شوی نیش د یو پاک پنس په وسیله وباسئ.
- ساحه له اوبو صابون او عفوني ضد توکو سره ورو پاکه کړئ.

د درملو په وسیله درملنه

- د درد ضد درمل توصیه Paracetamol. د معیاری دوز د مطالعې لپاره د الف په مل پاته کې الف ۱۵ جدول ته مراجعه وکړئ.
- د شدید خارش په پېښو کې توصیه:
○ Calamine lotion (په موضعي توګه)
یادښت: په هغه صورت کې چې نیش وهل په ډیر و برخو یا خو ساحو کې وي له Calamine څخه ډې استفاده ونشي.
- ○ د خوږې له لارې انټی هیستامینونه: Chlorpheniramine. د معیاری د دوز د مطالعې لپاره د الف په مل پاته کې الف ۷ جدول ته مراجعه وکړئ.
- موضعي پراخ غبرګونونه د Glucocorticoids سیستمیک کورټیکوسټیرویدونو په وسیله د ورید د داخل د ورو زرق له لارې لنډمهالې درملنې ته اړتیا لري (۱۰۰ میلی ګرامه Hydrocortisone اېمول).
○ ماشومان: د خواب له مخې لومړنی دوز یې ټاکل کیږي.
■ له یو کال څخه کوچني ماشومان: لومړنی دوز ۲۵ میلی ګرامه هر اته ساعته وروسته
■ له یو څخه تر پنځو کلونو ماشومان: لومړنی دوز ۵۰ میلی ګرامه هر اته ساعته وروسته
■ له ۶ څخه تر ۱۲ کلونو ماشومان: لومړنی دوز ۱۰۰ میلی ګرامه هر اته ساعته وروسته
■ له ۱۲ څخه تر ۱۸ کلونو ماشومان: لومړنی دوز ۲۰۰ میلی ګرامه هر اته ساعته وروسته
○ لویان: ۲۵۰ میلی ګرامه هر شپږ ساعته وروسته چې د اړتیا له مخې له ۴-۲ څله تکرارېدای شي.
- انافلکسیس تر جلد لاندې یا د عضلې د داخل د زرق په وسیله Epinephrine Adrenaline hydrochloride (۰.۱٪، سلنه (یو په زرو کې) په یو میلی لیتر اېمول کې) دوز، ۱۶.۹ C جدول ډې وکتل شي.
احتیاط: ناروغ د تکراریدونکي انافلکسیس د پیدا کیدو لپاره د ۲۴ ساعتونو په موده کې تر څارنې لاندې ونیسی.

لیردول

- ټول ناروغان چې په خپله مخینه کې شدید حساسیت او انافلکسیس غبرګون لري.
- د سیستمیک سمیت له علایمو سره پېښی
- ټول ناروغان چې څو څله چیچل شوي وي (له ۱۰ څخه زیات)
- ټولې اختلاطي پېښی

ناروغ ته لارښوونې

- د هر ډول اعراضو او علایمو د پیدا کیدو په صورت کې کلینیک ته مراجعه وکړئ.
- پر نیش وهل شوي ځای کې هیڅ ډول د بوټو یا دودیز درمل مه ږدئ.
- غمبې په ځانګړې توګه د هغوی ځاله مه راپاروی

۱۶.۴.۲ د لړم نیش وهل (Scorpion Stings)

تشریح

افغانستان ډول ډول لړم لري چې غالباً هغوی په تیارو او پټو ځایونو کې اوسي. لړم په خپله لکۍ کې یو نیش لری.

تشخیص

موضعي

- په کوم ځای کې چې نیش وهل کیږي له ځانه یوه نښه پریږدي
- کیدای شي له کړاوه ډک درد ولري.
- کیدای شي پړسوب، سوروالی، تیاکه او موضعي نکروز پېښ کړي.

سیستیمیک

- په لومړنیو سیستمیکو اعراضو او علایمو کې کیدای شي د بطن درد، د خولې له حده د زیاتو لایو افرازدل، د سترګې غیر نورماله حرکتونه، له اندازې زیاته خوله، د بدن د حرارت لوړیدل، کانګې او نس ناستی شامل وي.
- په وروستیو یا موخړه څرګندونو کې کیدای شي لوړ فشار، د زړه اریتمیا، د عضلاتو قبض او سپازم، ریریدنه، تنفسي ستونزې او نادراً شاګ شامل وي.

درملنه

له درملو پرته درملنه

- زخم له اوبو، صابون او عفوني ضد توکو سره په وړو توګه پاک کړئ.
- ناروغ ته ډاډ ورکړئ.
- په کومه ساحه کې چې نیش وهل شوی د سړو تطبیقاتو په وسیله یې ساهه کړئ خو د زهر د جذب د کمیدو لامل شي.
- هغه ناروغ چې یو نیش یې خوړلی او د زهر د تسمم سیستمیک اعراض او علایم نلري، کور ته یې واستوئ.

د درملو په وسیله درملنه

- د خفیف درد لپاره Paracetamol توصیه کړئ. د معیاری دوز د مطالعې لپاره د الف په مل پانه کې الف ۱۵ جدول ته مراجعه وکړئ.
- له (Epinephrine) adrenaline پرته یو سلنه lidocaine موضعي زرق د نیش خوړلي ځای پر شاوخوا د شدید درد د له منځه وړلو لپاره تجویز کړئ.
- که چیرې لوړ فشار شتون ولري د Amlodipine یا Fydralazine له توصیه کولو سره د شتون په صورت هغه کنټرول کړئ (۶.۱ برخه، سیستمیک لوړ فشار دې وکتل شي)

لیږدول

- هغه ناروغ چې موضعي شدید اعراض یا عمومي اعراض لري
- هغه ناروغ چې د انفالکسي کومه نښه لري باید د روغتیايي کارکونکي تر نظر لاندې وي او Epinephrine (adrenaline) زرقیات ورته تطبیق کړئ.
- هغه ناروغ چې برادي اریتمیا لري.

مخنیوی

- د لېم د تماس څخه ځان وساتی
- د شپې له مخې له کور څخه بهر لوڅې پښې مه ګرځئ.
- خپل لاس په هغو سوریو کې چې په سترګو یې نشي لیدلی مه داخلوئ.

ناروغ ته لارښوې

- د وضعیت د خرابیدو یا د سیستمیکو اعراضو د راپیدا کیدو په صورت کې روغتیايي مرکز ته مراجعه وکړئ.
- د دودیزو درملو له کارولو څخه پر نیش خوړل شوې ساحې ډډه وکړئ.

۱۶.۴.۳ د غنډل چپچل (Spider Bite)

تشریح

زیاتره غونډلونه زهر نلري یا لږ زهر لري. دوه لوی سندرومونه یې عصبي سمیت (Neurotoxic) او نکروز دي.

- عصبی سمیت: د عضلاتو درد، لوړ فشار، زړه بدوالی، کانګې، د سر درد، خولې کیدل.
- نکروز (نصواري رنگه جلا شوی یا منزوی غونډلونه): د نسجونو نکروز او ټپي کیدل، تبه، کمزورتیا او په نادره توګه هیمولیز (Hemolysis)

تشخیص

- د پوستکي ټپونه د شدت له مخې فرق کوی د مو ضعی سوروالی او ټپاکې کید لو څخه نیولی د نسجونو تر پراخه نکروز پوری کیدای شی شتون ولری.
- سیستمیک اعراض او علایم یی کیدای شی کمزوری، د سر درد، زړه بدوالی، کانګې، د مفصلونو درد او جلدی دانګی شامل وی.

درملنه

له درملو پرته درملنه

- ساحه د اوبو، صابون او عفوني ضد توکو په وسیله پاکه کړئ او د اړتیا په صورت کې تعقیم شوی پا نسمان تطبیق کړئ.
- د اړتیا په صورت کې اغیز من شوی غړی پورته ونیسئ او په ارامه توګه یې غیر فعال کړئ.

د درملو په وسیله درملنه

- د درد لپاره له انلجریک درملو څخه ګټه واخلي: Paracetamol. د معیاری دوز د مطالعې لپاره د الف په مل پاته کې الف ۱۵ جدول ته مراجعه وکړئ.
- انټی هیستامینونه توصیه کړئ: Chlorpheniramine malete. د معیاری دوز د مطالعې لپاره د الف په مل پاته کې الف ۷ جدول ته مراجعه وکړئ.
- په هغه صورت کې چې ناروغ د تیتانوس پر وړاندې معافیت نه وي اخیستی د تیتانوس ضد واکسین تطبیق کړئ: د عضلې په داخل کې زرق ۰.۵ میلی لیتره تیتانوس ضد واکسین

لېږدول

- هغه ناروغان چې له سیستمیکو علایمو سره اغیزمن دي: لکه د زړه ضربان، د وینې د فشار لوړیدل، عضلې کمزورتیا یا عضلې سپازم، تنفسي ستونزې، اختلاجات باید ولیږل شي.
- هغه ناروغان چې د نسجونو شدید نکروز لري کیدای شي وروستی یا موخړه جراحي عملیات په وسیله لرې کولو (Surgical excision) ته اړتیا پیدا کړي.
- احتیاط: د جراحي عملیاتو په وسیله ژر لرې کول استطباب نلری کیدای شي زیان رسونکي وي.
- امیدواری ناروغانې باید په سمه توګه و ارزول شي څو ماشوم ته د ستونزې له نشتوالي څخه ډاډ تر لاسه شي.

ناروغ ته لارښوې

- پر غونډلونو څارنه په کور، دنده او د تشنابونو په برخو کې د هغو له چیچلو څخه ډډه کول.
- روغتیايي مرکز ته د لاندې څیزونو د راپیدا کیدو په صورت کې مراجعه وکړئ.
- د سیستمیک اغیزمنیدو اعراض او علایم
- د موضعي انتان علایم (د درد زیاتیدل، سور والی، حرارت یا ریم یا قیج)
- د حشراتو ضد سپرې ګانو څخه ګټه

تشریح

- زهر لرونکي ماران لکه افغي مار (واپير)، کفچه مار (کوبرا مار) او هندي مار (کریټ) او هغه ماران چې زهر لري لکه پیتون مار او د موریډ په شان مار په افغانستان کې ژوند کوي. مار چیچل کولای شي د نرمو نسجونو د تخریب او په بدن کې د هغه د زهر د داخلیدو لامل شي چې کیدای شي دوه ډوله سندروم پیدا کړي.
- عصبي اختلالات (کفچه مار) او له ممکنه کوما سره، عضلي کمزورتیا، تنفسي خطرونه
 - د وینې کیدو او د وینې د علقه کیدو اختلالات (افغي مار) د اوریو، پوزې او کولمو له وینې کیدو سره یوځای.

تشخیص

- د پېښې له جزئیاتو او د مار له خصوصیاتو او ډول سره یوه د قیقه مخینه په چټکۍ واخلئ. دا معلومات د ناروغ د درملنې لپاره ډېر ارزښتناک دي.
 - د مار چیچلو د پېښې د وخت په اړه پوښتنه وکړئ. له ۱۲-۶ ساعتونو د اعراضو نشتوالی د مار د زهر نشتوالی ښیي یا دا چې مار نه دی توانیدلی چې خپل زهر بدن ته داخل کړي.
 - د غاښ نښه یا د ټپ سوري وگورئ. زهر لرونکي ماران زیاتره له خپلو دوه انیاب غاښونو په وسیله پر جلد یوه یا دوی نښې پریږدي؛ د غاښ د څو نښو شتوالی د مار د زهر د نلرلو څرگندونه کوي.
 - هغه علایم چې د زهر د داخلیدو څرگندونه کوي وپلټئ.
 - د نرمو نسجونو پړسوب، موضعي درد، او احتمالا ټنګۍ چې دا ټول په بدن کې د زهر د داخلیدو څرگندوی دي.
 - د وریو، پوزې او کولمو وینې کیدل هم د زهر داخلیدل روښانه کوي. په هغه صورت کې چې وینه راتلنه شتون ولري د وینې علقه کیدل معاینه کړئ. له ۲-۵ میلی لیتره وینې له اخیستو او د ۳۰ دقیقو لپاره د انتظار له وېستلو سره معاینه تر سره کيږي.
 - بشپړه علقه د وینې راتلنې د سندروم د نشتوالي په معنی ده.
 - د وینې نه علقه کیدل یا نابشپړه علقه د وینې راتلنې د سندرومونو د شتون په معنی ده.
 - همدا راز کمزورتیا، تنفسي ستونزې، د تیږولو ستونزې، د ښو د پورته ساتلو لپاره بې وسي (Ptosis) یا د یوه شي دوه لیدل عصبي اختلال (Neurologic disorder) هم په بدن کې د زهر د داخلیدل ښیي.
 - د زهر د اغیزو لپاره معاینات تر سره کړي. په هغه صورت کې چې زهر داخل شوی وي د ټپ شدت د مار له ډول، د داخل شویو زهرو له اندازې، د ټپ له موقعیت (لکه سر او غاړه ډیره خطرناکه دي) د مار له جسامت او د ناروغ له عمر (په ماشومانو کې مار چیچل ډیر جدي وي) سره تړاو لري.
 - د ناروغ روحي وضعیت و ارزوئ. وارخطايي یا نارامتیا کیدای شي د چیچل شوي زهرجنوالي وښيي.
 - په هغه صورت کې چې ناروغ یا د هغه خپلوانو مار وژلی وي او هغه بې روغتیايي مرکز ته راوړی وي، مار د هغه د ډول د ټاکلو لپاره معاینه کړئ.
- احتیاط: د هر مار په لاس کې نیولو سره چې روغتیايي مرکز ته له ناروغ څخه راوړل شوی وي د پیژندنې پرمهال احتیاط وکړئ ځکه مې مار او د هغه له منځه تللی سر کولای شي تر یوه ساعت وروسته هم د چیچلو وړتیا ولري.

درملنه

له درملو پرته درملنه

- ټپ له غیر الکولیک محلول (پاکو اوبو) او صابون په وسیله ورو و مینځی.
- له دودیزو درملنو څخه ډډه وکړئ.
- د ناروغ او د هغه د چیچل شوي غړي د حرکت مخنیوی وکړئ. له سپلینت یا سختو شیانو څخه په ګټې سره نه حرکت کول په ساحه کې تامین کړئ (لکه کلکه تخته یا لرګی).
- په چیچل شوې ساحه کې له بې خایه لاس وهلو څخه ډډه وکړئ.

- سوزیدلی خای په چټکۍ له ۷-۵ ورځو د اپیتل نسج له جوړېدو سره پرته له سکاره روغیږي.
 - دویمه درجه - ژور له قسمي پریړوالي سره
 - زیانمنه شوې ساحه داغ لرونکې، سره، درد لرونکې او ټپاکې لري.
 - سوزیدلی خای د اپیتل نسج له تشکیل سره له ۲۱-۱۴ ورځو د جلد په رنگ کې د بدلون له پیدا کېدو او ځینې سکار له جوړېدو سره روغیږي.
 - درېیمه درجه - بشپړ پریړوالي
 - زیانمنه شوې ساحه توره، د کاغذ په ډول، درد او احساس نلري د سطحي اوعبې له ترومبوز سره وي.
 - توره ساحه، غیر طبعي، له احساسه پرته، منقبض شوې له بشپړ پریړوالي او سوزیدني سره د جلد ټپ یا "Eschar" نومیږي.
 - دا ډول ټپونه د ټپ له شاوخوا څخه د اپیتل نسج له بیا تشکیل (Re epithlization) یا د جلدې پیوند په وسیله باید روغ شي.
 - څلورمه درجه - پیچلی، بشپړ پریړوالی
 - زیانمنه شوې ساحه لاندیني نسجونه، عضلات، هډوکي یا مغز له ځان سره په ټپ کې شاملوي.
- د سوزیدني شدت د سوزیدود سطحي، ژور تیا او خای، د مترافقه ټپونو، د ناروغ د پخواني صحي وضعیت او د ناروغ له عمر پر بنسټ ارزول کیږي.
- خفیف (کوچنی)
 - قسمي پریړوالی: په لویانو کې له ۱۵ سلنې څخه کم
 - قسمي پریړوالی: په ماشومانو کې له ۱۰ سلنې څخه کم
 - بشپړ پریړوالی: له ۲ سلنې څخه کم
 - منځنی
 - قسمي پریړوالی: په لویانو کې له ۱۵ - ۲۵ سلنې سوزیدنه
 - قسمي پریړوالی: په ماشومانو کې له ۱۰ - ۲۰ سلنه
 - بشپړ پریړوالی: له ۲ - ۱۰ سلنه
 - لوی
 - قسمي پریړوالی: په لویانو کې له ۲۵ سلنې څخه زیات
 - قسمي پریړوالی: په ماشومانو کې له ۲۰ سلنې څخه زیات
 - بشپړ پریړوالی: له ۱۰ سلنې څخه زیات
 - هغه سوزیدني چې مخ، سترګه، غوړ، پښې، لاسونه او عجان په هغه کې شامل وي.
 - ټولې انشافي او بریښنايي سوزیدني.
 - هغه سوزیدني چې له لویو ټپونو یا پخوانیو طبي ستونزو سره مل وي.

تشخیص

- یوه دقیقه مخینه د پښې وخت او ډول ته په ښې پاملرنې سره واخلئ.. لاندې یادښتونه ولیکئ.
 - آیا دود شتون درلود.
 - آیا پښه په تړلي چاپیریال کې وشوه.
 - ناروغ څه ډول جامې اغوستې وې.
 - کومې لومړنۍ مرستې شوې وې.
- ناروغ معاینه کړئ او د انشافي سوزیدني نښې وپلټئ:
 - د ناروغ د خولې او پوږې پر شاوخوا د دود او کاربن شتوالی.
 - د ناروغ د خولې او ستوني د نسجونو پړسوب.
 - تنفسي ستونزې او ستونزمن تنفس.
- د سوزیدو خپریدل، پراخیدل، سطحي والی او د سوزیدني بشپړ پریړوالی ثبت کړئ. د سوزیدو د ژورتیا د تثبیت لپاره

- غوره لارښود د سوزیدو د میکانیزم د دقیقې مخینې اخیستل دي.
- له گاز څخه راپیدا شوې حرارتي سوزیدنې زیاتره د سطحې سوزیدنو لامل کیږي.
 - د مایعاتو په وسیله حرارتي سوزیدنې زیاتره د جلد د درم د ژورې طبقې د سوزیدو لامل کیږي. جوش شوې اوبه او جوش شوي غوړی کولای شي چې له بشپړ پریوالي سره د سوزیدو لامل شي. (په ځانګړې توګه په کوچنیانو کې)
 - له جامدو اجسامو او د اور له وړانګو سره تماس زیاتره کولای شي چې له بشپړ پریوالي سره د سوزیدو لامل شي.
 - د بریښنا په وسیله سوزیدنې زیاتره د جلد له ضایع کیدو سره د بشپړ پریوالي د سوزیدنې لامل کیږي.
 - د شعاع په وسیله سوزیدنې زیاتره په سطحې بڼه وي.
 - کیمیاوي سوزیدنې کولای شي چې سطحې یا ژورې وي.
- د بدن د سوزیدو ټولې کچې له "نېو ۹ قانون" څخه په ګټې چې په ۱۶.۶ جدول کې لیکل شوي دي اټکل کړئ. هغه معلومات چې په دې جدول کې ورکړل شوي دي کولای شي چې د روغتيايي مراقبت کارکوونکي ته د بدن د سوزیدو د سلنې په محاسبه او اداره کې لارښونه وکړي (لاندې څیزونه وګورئ). په تیتو سوزیدنو کې د لاس ورغوی د بدن د سوزیدو د یوې سلنې بیلګه ده.
- ناروغ معاینه کړئ خو نور ټپونه او د هغه پخوانی طبي وضعیت رد شي.

۱۶.۶ جدول. د نېو مقررات (د Wallace ډلهو مقررات)

د بدن غړي		لوېان		ماشومان		نوی زیږیدلی کوچنیان	
سر او غاړه		۹٪		۱۸٪		۲۰٪	
د سینې مخکې برخه او د بطن جدار		۱۸٪		۱۸٪		۱۰×۲= ۲۰٪	
د سینې شا او د بطن جدار		۱۸٪		۱۸٪		۱۰×۲= ۲۰٪	
ښکتنی برخې		۳۶٪		۲۷٪		۱۰×۲= ۲۰٪	
پورتني برخې		۱۸٪		۱۸٪		۱۰×۲= ۲۰٪	
عجان		۱٪		۱٪			
د بدن ټولې سطحې ساحې		۱۰۰٪		۱۰۰٪		۱۰۰٪	

درملنه

- له درملنې څخه موخه عبارت ده له:
- د سوزیدو شدت و ارزوی او عاجله درملنه برابره کړئ او له کوچنیو ټپونو پرته ټولې سوزیدنې روغتون ته ولیرئ (لکه د بدن د کچې له پنځه سلنې څخه کم شمولیت چې په هغه کې د لاسونو، پښو، مخ او عجان حساسی ساحې شاملې نوي)
 - د درملنې د پروسې په ترڅ کې د کوچنیو سوزیدنو د متن کېدو خطرات صغري حد ته ورسوئ.

له درملو پرته درملنه

- ناروغ د پېښې له ځای څخه لرې کړئ.
- د ناروغ تنفسي لارې، تنفس، د وینې جریان، معلولیت او وروستی برخې د ABCDE د پروتوکول سره سم معاینه کړئ.

- د ناروغ ټولې جامې لرې کړئ او ناروغ له سر څخه د پښې تر گوتو معاینه کړئ.
- د ناروغ ټولې گانې په ځانگړې توگه گوتې ویا سئ.
- که چېرې د سوزیدو پراختیا د ټول بدن له ۲۰ سلنې څخه کمه وي او پر ټپونو له یوه ساعت څخه کم وخت تیر شوی وي په سوزیدلو برخو کې د سږو او پاکو اوبو له اچولو سره په ۲۰ دقیقو کې د ټپونو پراختیا نه کمه کړئ.
- ناروغ په یوه پاک او وچ ټوکر کې تاو کړئ. هایپوترمی تر ارزونې لاندې ونیسئ.
- د درد د کنټرول لپاره د درملو له تجویز څخه وروسته (د درملو په وسیله درملنه لاندې وگورئ)، سوزیدلې ساحه له پاکو اوبو سره جوش شوې (چې سړې شوې وي) او یا د Salin محلول او صابون په وسیله ورو ورو ومینځئ.
- کوچنۍ ټپاکې پریږدئ او لویې ټپاکې چې کېدای شي رېچر وکړي، لرې کړئ.
- له ورځني پا نسمن سره پر ساحې د یو سلنې Silver sulfadiazine مرحم یوه نازکه طبقه تطبیق کړئ.
- په هغه صورت کې چې په انشافي سوزیدنې باندې شکمن یاست، اکسیجن تجویز کړئ.
- احتیاط: ناروغ چې پر هغه د انشافي سوزیدنې شکمن یاست، روغتون ته ولیږئ.
- د لویو سوزیدنو لپاره (د بدن له ۲۰ سلنې زیات یا دویمه او دریمه درجه سوزیدنې)، د مایعاتو اعاده له لیږلو مخکې پیل کړئ (لکه څرنگه چې د مایعاتو له شدید ضایع کېدو سره مل دي).
- د ناروغ ورید خلاص کړئ او د ورید د داخل له لارې مایعات پیل کړئ (یعنې Ringer lactates له Glucose پنځه سلنه سره، Normal saline له Glucose پنځه سلنې سره یا نیمه نارمل Saline له Glucose پنځه سلنې سره)
- د مایعاتو اړتیا د اړینو مایعاتو Maintenance fluid له ساتنې سره محاسبه کړئ (د ۱۰ لومړیو کیلو گرامو لپاره د بدن د وزن پر هر کیلو گرام ۱۰۰ میلی لیتره، د دویمو لسو کیلو گرامو لپاره ۵۰ میلی لیتره، وروسته د بدن د وزن پر هر کیلو گرام ۲۵ میلی لیتره) جمع له د اړتیا وړ اضافي اعاده کونکو مایعاتو سره (حجم مساوي د بدن د وزن پر هر کیلو گرام ۴ میلی لیتره د سوزیدنې د هرې یوې سلنې پر وړاندې) اسا نه محاسبه په لاندې توگه تر سره کیږي.
- یو ماشوم چې ۲۰ کیلو گرامه وزن لري او ۲۵ سلنه سوزیدلی دی، د مثال په توگه، د اړتیا وړ مایعاتو اندازه (۱۰۰ میلی لیتره پر کیلو گرام ۱۰۰ x کیلو گرامه + ۵۰ میلی لیتره x پر کیلو گرام ۱۰ کیلو گرامه = ۱۵۰۰ میلی لیتره) له معاوضي مایعات (۴ میلی لیتره پر کیلو گرام ۲۰ کیلو گرامه د بدن د سوزیدنې ۲۵ سلنه = ۲۰۰۰ میلی لیتره) = ۳۵۰۰ میلی لیتره مایعات د ۲۴ ساعتونو په ترڅ کې باید ناروغ ته تجویز شي. د دې مایعاتو نیمايي (۱۷۵۰ میلی لیتره) دې په لومړیو ۸ ساعتونو کې او پاتې د شدیدې سوزیدنې د ټپونو لپاره په ۱۶ نورو ساعتونو کې تجویز یږي.
- د مثال په توگه، یو لوی کس چې ۷۰ کیلو گرامه وزن لري او د هغه د بدن عمومي سطحه ۲۰ سلنه سوزیدلی ده د دې ناروغ مایعاتو د ساتنې اندازه (۱۰۰ میلی لیتره پر کیلو گرام ۱۰ کیلو گرامه + ۵۰ میلی لیتره پر کیلو گرام ۱۰ کیلو گرامه = ۲۵۰۰ میلی لیتره ضرب ۲۵ = ۶۲۵۰ میلی لیتره) + له معاوضي مایعات (۴ میلی لیتره ۷۰ کیلو گرامه ۲۰ سلنه سوزیدنه = ۵۶۰۰ میلی لیتره) = ۸۳۵۰ میلی لیتره د ۲۴ ساعتونو په ترڅ کې چې د دې حجم نیمايي (۴۱۷۵ میلی لیتره) باید په لومړیو ۸ ساعتونو کې تجویز شي او پاتې د ۱۶ راتلونکو ساعتونو په ترڅ کې.
- د دویمو ۲۴ ساعتونو په ترڅ کې د لومړۍ ورځې د مایعاتو د حجم له ۱/۲ تر ۳/۴ برخو ناروغ ته تجویز کړئ او د ناروغ نبض، د تنفس چټکتیا، د وینې فشار او د ادرار اطراح کېدل وڅارئ.
- د Foley catheter د تطبیقولو په وسیله د ادرار اطراح کېدو سره د معاوضي مایعاتو دقیقه ارزونه محاسبه کېدای شي.
- د ورځني پاک پا نسمن تطبیق د هغو ناروغانو لپاره چې کوچنۍ سوزیدنې لري او په لومړني روغتيايي مرکز کې یې درملنه کیږي.

د درملو په وسیله درملنه

- لاندې مناسب درمل تجویز کړئ

○ مناسب انلجریک

- د خوځلي له لارې د Paracetamol تجويز: دمعيا رى دوز د مطالعې لپاره د الف په مل پاڼه کې الف ۱۵ جدول ته مراجعه وکړئ.

يا

▪ Ibuprofen ټايلېټ

- ماشومان: له ۱۰-۵ ميلي گرامه د بدن د وزن پر هر کيلو گرام هر دوز د خوځلي له لارې هر اته ساعته وروسته د اړتيا سره سم
- لويان: له ۴۰۰-۲۰۰ ميلي گرامه د خوځلي له لارې هر اته ساعته وروسته د اړتيا سره سم.
- احتياط: سوزيدنه کيدای شي د معدې د التهاب خطر (Gastritis) يا فشاري ټپونه (Stress ulcer) زيات کړي. د H_2 د آخډو د منع کونکو تجويز (لکه Ranitidine ۱۵۰ ميلي گرامه هر ۱۲ ساعته وروسته) چې په بشپړ روغتيايي کلينیک (CHC) او د ولسوالۍ په روغتون (DH) کې شتون لري.
- په هغه صورت کې چې د تيتانوس د وقايوي واکسين تطبيق اړتيا وي يا د ناروغ د واکسين اخيستلو وضعيت معلوم نه وي د عضلي د داخل د زرق له لارې د TT د ۰.۵ ميلي ليتره واکسين تطبيقول.
- خارش د ناروغانو يو لوی شکایت دی چې د سوزيدنو ټپونه يې روغيزي او د شديدو خارشونو درملنه ډيره ستونزمنه ده.
- Chlorpheniramine تجويز کيدای شي د خارش د بڼه کيدو لپاره مرستندوی وي. دمعيا رى دوز د مطالعې لپاره د الف په مل پاڼه کې الف ۷ جدول ته مراجعه وکړئ
- احتياط: له وخت څخه د مخکې پيدا شويو ماشومانو او له يوې مياشتې څخه د کوچنيو ماشومانو د Chlorpheniramine له تجويزولو څخه ډډه وکړئ.
- د مرطوبونکو کريمونو تطبيقول هم تر يوه حده کولای شي د خارش په بڼه کولو کې مرسته وکړي.
- انټي بيوتيکونه په وقايوي بڼه سوزيدلو ناروغانو ته تجويز نه کړئ بلکې هغه د ناروغ له ليړلو څخه وروسته وساتي. يادښت: سيستمیک انټي بيوتيکونه د کوچنيو سوزيدنو لپاره ډير کم استېلاب لري، ځکه چې کيدای شي د فرصت غوښتونکو انتاناتو لکه باکټرياکاني، فنگسونه او واپرسونو لپاره زمينه برابره کړي.

ليږدول

- منځنى او لويې سوزيدنې (تصنيف دي وکتل شي)
- د دويمې او دريمې درجې ټولې سوزيدنې چې په هغه کې د بدن د سطحې له پنځه سلنې څخه زيات شامل وي يا د بدن حساسې ناحې لکه لاسونه، پښې، مخ، عجان يا مفصلونه په هغه کې شامل وي، د ليړلو په ترڅ کې انلجزيکونه او معاوضوي مايعات تطبيق کړئ.
- ټولي انشافي سوزيدنې.
- اختلاطي کوچنۍ سوزيدنې لکه متنن کيدل يا د خوځښت له لاسه ورکول.

مخنيوی

- له ۹۰ سلنې څخه زياتې سوزيدنې د سليم عقل له کارولو او د احتياط له رعايتولو سره د مخنيوی وړ دي.
- ټول سوزونکي وسايل (لکه د گاز بالونونه، تبلي وسايل، سندلی، د سکرو منقل، برقي او کيمياوي تجهيزات) بايد په دقيقه توگه وکارول شي او د ماشومانو له لاسرسۍ څخه لرې وي. په ژمي کې لوڅې پښې و نه غځځي.
- د اور، جوش اوبو او بخارۍ پر شاوخوا د ماشومانو څارنه وکړئ.

ناروغ ته لارښونې

- ټولو ناروغانو ته د سوزيدنې د ټپونو د ساتنې د اساساتو د تعقيب په موخه د هغو له پاک ساتلو او له روغيدو وروسته د ساتنې توصيه وکړئ.
- په ورځنيو تعقيبي څارنو کې شامل دي:
 - د پاکو اوبو او پوست صابون په وسيله د ټپ مينځل (جوش کړې سړې شوې اوبه)

- له پاک او وچ ټوکر سره د ټپ وچول.
- د شتون په صورت کې د ټپ له پامه د یو سلنې سلورسلفادایزین مرحم د یوې نرۍ طبقې تطبیقول.
- ناروغ ته لارښوونه وکړئ خو د کیمیاوي توکو له ګټې اخیستنې څخه لکه (Mafenide acetate (Sulfamylon یا Povidone-iodine (Betadine د سوزیدو د ټپونو له پامه ډډه وکړي ځکه دا توکي د ټپ د روغیدو د خنډ لامل کیږي.
- په نورماله توګه، تعقیبي درملنه د کلینیک د ننه کیږي تر دې چې سوزیدنه په بشپړه توګه روغه شي او ناروغ د اختلاطي کیدو کوم شواهد ونلري. په هغه صورت کې چې د سوزیدو د پراختیا او ژورتیا، یا د ناروغ او د هغه د کورنۍ د ډاډ په اړه کومه پوښتنه شتون ولري تعقیب هره ورځ کیدای شي.
- د تعقیب په ترڅ کې د سوزیدنو رغیدل وګورئ او ناروغ د اړتیا په صورت کې د جلدی پیوند یا فزیکي درملنې لپاره و ارزوئ.

۱۶.۷ د سترګې ټپونه (ترضيض، پردې جسمونه او سوزیدنې) Eye Injuries (Trauma, Foreign Bodies, and Burns)

تشریح

- د سترګې او د هغې د شاوخوا جوړښتونو ټپونه د لیدواو د حرکت د لاسه ورکولو یا د بشپړ ډنډېدو لامل کیږي. ټپونه څوګوني لاملونه لري.
- پخ ترضيضات: زیاتره وخت د سړک له پاسه د ترافیکي پیښو یا د سوک یا یوې آلې په وسیله
- نافذه ترضيضات (له یا پرته له پردې جسم سره)
- سطحي – د سترګې د ګاټې په پوښښونو پورې محدود (لکه منضمه، صلیبه او قرنيه)
- ژور – د سترګې ګاټې یا کری ته نفوذ
- د سوزیدو ټپونه
- مستقیم حرارتي ټپونه (لکه جوش شوې اوبه یا د اور وړانګه)
- له کیمیاوي توکو سره مخ کیدل
- القلي توکي – معمولاً په پاکونکو توکو کې کارول کیږي. القلي کیدای شي چې د نسجونو تخریبول تر یوې اوږدې مودې پورې له مخ کیدو څخه وروسته دوام ورکړي.
- تیزابي محتویات – لکه د موټر د بطري د ننه او په صنعت کې د کارونې په موخه.

تشخیص

- د سترګې ترضيضات کیدای شي چې له درد، اوبښکې توییدو، سوروالی، د رڼا څخه له ډار، څر لیدل یا د سترګې د ننه د پردې جسم د شتون احساس یا د سترګې له تخریش سره مل وي. د سترګې د ټپونو په ارزولو کې د لومړیتوب ورکول د اوږد مهاله تخریباتو د اصغري حد ته د رسولو لپاره هڅه ده. د سترګې ټول جوړښتونه او د هغه شاوخوا نسجونه په لاندې توګه معاینه کړئ.
- د سترګې ګاټې او د هغه پوښښونه
- تل د لیدنې فعالیت معاینه کړئ. د لیدو کمیدل یا ډنډیدل سملاسي لیرلو ته اړتیا لري.
- Snellen له چارټ څخه ګټه واخلي، یا له ناروغ څخه غوښتنه وکړئ چې ولولي یا شمیر وپېژني پابلې بې په هره سترګه کې پر تله کړئ.
- دوه ګونې لیدنه معاینه کړئ (لکه د یوه شي دوه لیدل)
- د سترګې ګاټې او د هغې مخکې جوړښتونه د ټپ د علایمو د شتون لپاره وپلټئ.
- د قرینې خیره کیدل کیدای شي د ټپ د شدت یا سوزیدنې څرګندونه وکړي چې د ناروغ چټک لیرلو ته اړتیا لري.
- د قرینې ټپي کیدونکي حالت د ټپ شدت ښیي چې د ناروغ چټکې لیرنې ته اړتیا لري.

- د سترګو ګاټی په ورو توګه جس کړئ او یو له بل سره یې پرته کړئ.
- که چیرې د یوې سترګې ګاټی د بلې څخه نرمه ښکاره شي په نفوذې ټپ شکمن شی چې د سترګې پر ګاټي وارد شوی او د زجاجي مایع د ضایع کیدو لامل ګرځیدلی دی، ناروغ چټکې لیرینې ته اړتیا لري.
- که چیرې د یوې سترګې ګاټی د بلې څخه کلکه په پام راغله په حاد ګلوکوما یا د سترګې د ګاټي پر داخلي وینې راتلنې شکمن شی او ناروغ چټک لیرلو ته اړتیا لري.
- د پردې جسم د شتون شواهد وپلټئ (لکه لرګي، فلز، کثافت، یا مایعات او یا کیمیاوي پوډرونه)
- له ناروغ څخه د وروستیو پېښو په اړه پوښتنه وکړئ.
- منظمه د ښو د سطحي ساحې په شمول د ټپ یا یو پردې جسم د شتون لپاره معاینه کړئ.
- د وینې شواهد معاینه کړئ.
- د سترګې په سپین والي کې د وینې یوه داغ کیدای شی تر منظمې لاندې وینه کیدنه یا هیموراژ چې غالباً دحجاج د جوف له کسر سره مل وي، وښيي.
- د سترګې په مخکینۍ برخه کې وینه کیدای شي په مخکینۍ خونه کې (یعنې یوه Hyphema) وي او کولای شي چې د لیدو د ضایع کیدو لامل شي. ناروغ چټکې لیریدنې ته اړتیا لري.
- د سترګې د اطرافو رخو نسجونه معاینه کړئ.
- باڼه د څیریدلو، پړسوب او یا د اجنبي جسم لپاره معاینه کړی.
- د سترګې بصری عضلات د سترګې له نورماله حرکتونو سره معاینه کړئ؛ د سترګې د نورماله حرکتونو ضایع کیدل کیدای شي د عضلاتو ټپ وښيي یا د عضلاتو له نیول کیدو سره احتمالاً د حجاج جوف ماتیدل وي.
- په ورو توګه د حجاج غظمی جوف د حجاج د جوف دیوال د ماتیدو یا د کسر د شتون لپاره جس کړئ.

درملنه

د درملنې موخه د سترګې د لید او حرکتونو ساتل دي.

له درملو پرته درملنه

- د منځلو په وسیله کولای شو له سترګو څخه کیمیاوي مواد یا پردې جسمونه لرې کړو.
- په سترګو کې کیمیاوي ټپونه چې په احتمالي توګه د مایع یا پوډر له امله وي کیدای شي له مخ کیدو څخه وروسته د دايمي تخریب لامل شي نو ژر تر ژره لرې کول یې باید تر سره شي. په هغه صورت کې چې تاسو د کیمیاوي مایع یا پوډر د شتون شواهد په سترګه یا د هغه پر شاوخوا ګورئ لاندې پروسیجرونه د هغو د لرې کولو لپاره تر سره کړئ.
- په ورو توګه د سترګې د شاوخوا کیمیاوي توکي د یو پاک ټوکر په وسیله له منځلو مخکې لرې کړئ.
- په ورو توګه سترګه د Saline محلول یا پاکو مقطرو اوبو په وسیله د پردې جسم یا کیمیاوي سوزیدنو په ټولو شکمنو پېښو کې و منځئ.
- احتیاط: کیمیاوي سوزیدنې لږ تر لږه د ۲۰ دقیقو لپاره منځلو ته اړتیا لري په هغه صورت کې چې د القلي په وسیله په سوزیدنه شکمن یاست، لږ تر لږه ۴۰ دقیقې منځلو ته دوام ورکړئ. القلي سوزیدنې (یعنې له پاکونکو توکو څخه) د هغه سره له لومړنۍ مخ کیدو وروسته هم د دوامدارو تخریبونو لامل کیږي. او اصغري حد ته د تخریبونو د رسیدلو لپاره اوږدمهاله منځلو ته اړتیا لري.
- په نرمه توګه د ناروغ سترګه خلاصه وساتئ او د سترګې ټولې برخې و منځئ.
- ناروغ ته لارښونه وکړئ خو خپلې سترګې ته هر لوري ته حرکت ورکړي.
- د ښو لاندې ځایونو له منځلو څخه ډاډ تر لاسه کړئ.
- له یوې سترګې څخه بلې سترګې ته د اوبو د جریان په اړه احتیاط وکړئ.
- که چیرې یو پردی جسم د منځلو په وسیله ونه ویستل شو هڅه وکړئ چې د سواب د یو لرګي څخه په ګټې اخیستنې هغه وباسئ.
- پاملرنه وکړئ چې د سواب لرګي څخه استفاده د سترګې د ګریدو یا تخریش لامل نشي.

○ که چیرې تاسو پردې جسم نشی ویستلی ناروغ ولیږئ.

د درملو په وسیله درملنه

- ناروغ چې په سترګه کې په سطحي ټپ یا سطحي تخريش شکمن دی کولای شي له انټي بیوتیکو مرحمونو څخه ګټه واخلي. د سترګې یوه سلنه Tetracycline مرحم تجویز کړئ. هر اته ساعته وروسته د اوو ورځو لپاره دې تطبیق شي. د ناروغ کورنی ته لارښوونه وکړئ چې څرنگه نوموړی مرحم استعمال کړي. له لاندې نګلارو څخه ګټه واخلي:
- له ناروغ څخه وغواړئ چې پورته لوري ته وګوري.
- په ورو توګه د ناروغ ښکتنی لیمه د خپلې ګوتې په وسیله کش کړئ.
- د مرحم یوه فینه په ښکتنی فورنیکس کې تطبیق کړئ.
- ناروغ ته لارښوونه وکړئ څو خپلې سترګې ته حرکت ورکړي چې مرحم خپور شي.
- ځینې ناروغان کیدای شي د چسپ (Patch) له تطبیق سره د څو ورځو لپاره د آرامتیا احساس وکړي (له رڼا څخه د ویرې له امله) په لاندې توګه یې تطبیق کړئ:
- له ناروغ څخه غوښتنه وکړئ چې خپله سترګه په ارامه توګه وتړي.
- چسپ له کافي فشار مګر په نرمه توګه د تړلې سترګې له پاسه تطبیق کړئ مګر فشار دومره مه زیاتوئ چې پر سترګې د فشار د زیاتوالي لامل شي.
- د خولې له لارې د Paracetamol تجویز: د معیاري دوز د مطالعې لپاره د الف په مل پانه کې الف ۱۵ جدول ته مراجعه وکړئ

لیږدول

- ټول ناروغان چې د سمې لیدنې کموالی څرګندوي.
- ټول ناروغان چې پر هغو د ژورو ټپونو یا د حاد ګلوکوما شک کیږي.
- ژر تر ژره یې ولیږئ په هغه صورت کې چې:
 - په آسانې پردې جسم نشی ویستلی (ژور پردې جسمونه)
 - په دواړو سترګو کې د حادو بدلونونو موندنه (د سنیلین چارټ د معاینې په وسیله ۱۲/۶ یا له هغه کم)
 - د یوه شي د دوه لیدلو تشخیص (Diplopia)
 - د لیمو د ځیری کیدلو او پړسوب لیدل
 - له حده د زیاتې پړسیدنې موندنه چې د سمې معاینې خنډ کیږي.
 - د قرینې یا صلیبې د څیریدنې یا د تنقب لیدل.
 - په مخکینۍ خونه کې د وینې لیدل یا د سترګې د ګاټې د ننه وینه راتلنه
 - تر منظمې لاندې د دوامدارې وینې راتلنې د شواهدو لیدل
 - له ترضيض څخه وروسته د Pupil توسع، د ښې بدلون او د نور په وړاندې د ورو غبرګون موندنې
 - د قرینې نیمګړتیا یا د قرینې د خیره والی یادښت.
 - د سترګو د حرکتونو د محدودیت موندنه
 - د Enophthalmos تشخیص (د سترګې ګاټې ډوب شوی ښکاري) چې کیدای شي د حجاج جوف د سقف ماتیدل وښيي.

مخنیوی

- د سترګو له ټپونو څخه د مخنیوي لپاره له خوندي کړنو څخه کار واخلي.
- په موټر کې د سوارۍ پر مهال د موټر له امنیتي کمربند څخه ګټه واخلي.
- ټول کیمیاوي توکي په خوندي، بې خطر ځای کې، د ماشومانو له لاسرسي څخه لرې او د لیبونو په لګولو په دقیقه

- توګه ځای پر ځای کړئ.
- له ماشین الاتو څخه د ګټې پرمهال له محافظوي عینکو څخه ګټه واخلي.

ناروغ ته لارښوونې

- ناروغ ته توصیه وکړئ چې:
- د لارښوونې سره سم له مرحم څخه ګټه واخلي.
- د هغه سمه استفاده دې د روغتيايي کارکوونکو لخوا وښودل شي.
- له دوه دوزو څخه وروسته دې بیا تعقیب شي.
- د درد له زیاتوالي، پړسوب یا د لیدو د له لاسه ورکولو په صورت کې دې ژر تر ژره مراجعه وکړي.
- د درملو د تطبیق پرمهال پر سترګه یا د هغه پر شاوخوا یا د سترګو د پاکولو پرمهال دې له پاکو لاسونو یا پاک ټوکر څخه استفاده وشی.

۱۶۸ د وینې د شکرې کمېدل یا هایپوګلا سیمی (Hypoglycemia)

تشریح

- د وینې د ګلوکوز ټیټیدل د هغه له نورماله حد څخه (۶۰ میلی ګرامه په هر ډیسی لیتر کې) کولای شي چې خفیف، منځني یا شدید وی چې په چټکۍ د شعوري حالت د بدلون یا د دماغ د بیرته نه ستندونکي تخریباتو لامل کیږي. د وینې د شکرې د کمښت یا هایپوګلا سیمی لپاره د خطر په لاملونو کې لاندې څیزونه شامل دي:
- د شکرې ناروغان چې تر درملنې لاندې وي په لاندی حالاتو کی –

- د خوړو کمول
- د تمرین زیاتوالی
- په درملنه یا د انسولین په تطبیق کی په لاندی دلایلو اشتباه کوی:
- د ګلوکوز په برعکس تنظیم کې کموالی
- د خپلې وینې د شکرې له کموالي څخه بی خبری
- یادښت: د پوهاوي نشوالی کېدای شي د شپې له مخې د وینې د ګلوکوز د کمېدو لامل شي.
- نوي پیدا شوي ماشومان یا له وخته مخکې پیدا شوي ماشومان
- خوارځواکي یا ناروغ ماشومان یا هغوی چې په خپله وینه کې له حده زیات پرازیت لري. (لکه ملاریا)
- سپټیک ناروغان
- زاړه کسان
- هغه ناروغان چې د پښتورګو او څګر په ناروغیو اخته وی (د څګر عدم کفایه)
- اختلاجاتی ناروغان، غیر شعوري حالت، یا د شاک ناروغان
- هغه ناروغان چې له حده زیات الکول څښي.
- هغه ناروغان چې د اندوکراین غداواتو په نا معلومو تشوشتو اخته وی لکه (Addison's disease) یا تومور (Insulinoma)

تشخیص

- اعراض او علائم یې د وینې د ګلوکوز د کموالي له شدت سره تړاو لري. هغه وخت چې د شکرې کچه په وینه کې له ۶۰ ملي ګرامو څخه په هر ډیسی لیتر کې کميږي خفیف اعراض څرګندیږي. په کلینیکي څرګندونو کې یې لاندې څیزونه شامل دي:
- لوړه، خټافت، اضطراب، زړه بدوالی، او د لید خیره کېدل.
- تمرکز اختلالات، سر دردي، تخرشیت، غیر نورماله چلند، سرګنگسوالی، او د همغږۍ یا Coordination کموالی.

- خولې کېدل، ریریدېدل، تکی کاردیا او د بطن درد
- اختلاج
- کوما
- اعراض کېدای شي په لاندې کسانو کې کم وي
- زاړه کسان، خواړخواکي، یا ډیر ناروغ
- هغه ناروغان چې له ډیرې مودې څخه د شکرې ناروغي لري
- هغه ناروغان چې له بیتا بلاکرونو یا نورو درملونو څخه چې اتونوم په عصبي سیستم کې د اختلال لامل کیږي، استفاده کوي.

درملنه

د وینې د شکرې د کچې معلومول د ګلوکومتر یا Dextrostix په وسیله کېدای شي د پېښې د تثبیتولو او ښه کولو لپاره ګټور وي، مګر درملنه باید هیڅکله د وینې د شکرې د کچې د پایلو د انتظار لپاره ونه ځنډول شي. بریالۍ درملنه ژر ځواب ورکوي او بشپړ ښه والی د ۵-۱۰ دقیقو په ترڅ کې منځ ته راځي او آن د ګلوکوز د کچې د نه پوهېدو په صورت کې د تشخیص په تایید کې رول لوبوي.

له درملو پرته درملنه

شعور واله ناروغان چې خفیف او څرګند اعراض لري د خوراک په خوړلو په ځانګړې توګه نشایسته لرونکو خوړو او شکرې سره ښه ځواب ورکوي.

- هغه کوچنیان چې د مور شېډې خوري: د مور شېډې
- لویان او ماشومان: شېډې، پنیر، بسکویت Crackers، وریجې، خوړ چای

د درملو په وسیله درملنه

شعور واله ناروغان چې د ښکاره اعراض لري باید د شکرې له ښو منابعو څخه ګټه واخلي. هغوی چې په نیمه شعوري حالت کې دي د ورید د داخل له لارې ګلوکوز ته اړتیا لري.

• شعور واله ناروغان

- ماشومان: د خولې له لارې د چاي څښلو دوه قاشغې شکره یا ګیبن. د نه ښه کېدو په صورت کې له ۱۰ دقیقو وروسته بیا تکرار شي.
- لویان: د خولې له لارې د چاي څښلو درې قاشغې شکره یا ګیبن. د نه ښه کېدو په صورت کې له ۱۰ دقیقو وروسته بیا تکرار شي.

• هغه ناروغان چې غیر شعوري حالت لري

- ماشومان: Dextrose ۱۰ سلنه، پنځه میلی لیتره د بدن د وزن پر هر کیلو ګرام د ورید د داخل له لارې په چټکۍ (۸.۱۶ جډول دې وکتل شي) بیا د Dextrose درې میلی لیتره د بدن پر هر کیلو ګرام وزن په هر ساعت کې تر هغو چې ناروغ د نورماله خوراک وړتیا پیدا کړي.
- لویان: Dextrose ۵۰ سلنه (یا ګلوکوز ۵۰ سلنه) ۵۰ میلی لیتره په درې دقیقو کې د ورید د داخل له لارې، بیا د Dextrose محلول ۱۰ سلنه (یا ګلوکوز ۱۰ سلنه)، ۵۰۰ میلی لیتره د ورید د داخل له لارې هر څلور ساعته وروسته تر دې چې ناروغ د نورماله خوراک وړتیا پیدا کړي.
- یادښت: الکولیک ناروغ باید ۱۰۰ میلی ګرامه Thiamine (د شتون په صورت کې) د ورید د داخل له لارې له ۵۰ سلنې Dextrose سره د انفوزیون په بڼه واخلي.
- یاد ونه: هغه ناروغ ته چې د ورید د داخل له لارې تطبیق د لاسرسي وړ نه وي یا د Dextrose محلول (یا ګلوکوز) شتون ونلري تا سو کېدای شي چې له لاندې لارو ګلوکوز تطبیق کړي:
- انفي معدوي تیوب: د شکرې تر ۴ قاشغو (۲۰ ګرامه) د یو ګیلاس په داخل کې له ۲۰۰ میلی لیټرو پاکو اوبو یا

شیدو سره مخلوط کړئ.

- په کمه اندازه شکره د buccal sulcus کې کیږدئ.
- د مقعد له لارې د (۳۰ میلی لیتره) کبین یا شکرې تجویز؛ د رپوټونو له مخې دا تگلاره بریالۍ کېدای شي.

۱۶۸ جدول: د لس سلنې ګلوکوز محلول حجم د وینې د ګلوکوز د اندازې په کمېدو د اخته ماشومانو د عمر او وزن سره سم

عمر (وزن)	د ۱۰ سلنې ګلوکوز محلول حجم په یوځایي (bolus) بڼه توصیه کیږي (پنځه میلی لیتره پر هر کیلو ګرام)
له دوه میاشتو څخه کوچنی (له ۴ کیلو ګرامو کم)	۱۵ میلی لیتره
له ۲ میاشتو څخه تر له ۴ میاشتو کوچنی (له ۴ څخه تر له ۶ کیلو ګرامو څخه کم)	۲۵ میلی لیتره
له ۴ میاشتو څخه تر له ۱۲ میاشتو کوچنی (له ۶ څخه تر له ۱۰ کیلو ګرامو څخه کم)	۴۰ میلی لیتره
له ۱ کال څخه تر له ۳ کلنو کوچنی (له ۱۰ څخه تر له ۱۴ کیلو ګرامو څخه کم)	۶۰ میلی لیتره
له ۳ کلنو څخه تر له ۵ کلنو کوچنی (له ۱۴ څخه تر له ۱۹ کیلو ګرامو څخه کم)	۸۰ میلی لیتره

لېږدول

- ټولې پېښې چې نوې پېل شوي یا د وینې د شکرې ناڅرګند کموالی ولري.
- هغه ناروغان چې دوامداره شعوري اختلال لري
- هغه ناروغان چې کومه بله عصبي ستونزه لري
- هغه ناروغان چې جدي روغتيايي وضعیت لري
- هغه ناروغان چې د شکرې د رژیم یا درملو د بیا ارزونې لپاره اړتیا لري.

مخنیوی او ناروغ ته لارښوونې

- د شکرې ضد درملو له سم برابروالي څخه ډاډ تر لاسه کړئ
- د شکرې ناروغانو ته چې تر درملنې لاندې دي توصیه وکړئ چې تل د شکرې یوه منبع له ځان سره ولري (د بورې ټابلیټونه یا خوړ جوړ) خو د وینې د شکرې د کچې د ټیټېدو په لومړنۍ څرګندېدنه کې په خپل وخت له هغه څخه ګټه واخلي.
- په شکرې اخته ناروغ سره د هغو د ناروغۍ، د درملو څخه د ګټې اخیستنې، د مناسب خوراکی رژیم او د ورزش د رژیم په اړه مشوره وکړئ.
- تر خطر لاندې ناروغانو کې د شکرې د کچې له سمې څارنې څخه ډاډ تر لاسه کول

تشرېح

شاګ د ژوند یو ګواښونکی حالت دی چې د دوراني عدم کفایي له امله منځ ته راځي او د وینې د جریان له ناکافي ویش سره انساجو ته د اړتیا وړ آکسیجن او مغذي موادو انتقال او د زهري او استقلابي موادو خارجول مختل کیږي. په هغه صورت کې چې په چټکه توګه تشخیص او درملنه یې ونشي غیرکافي پرفیوژن (شاګ) د حیاتي غړو د عدمې کفایي او مړینې لامل کیږي.

د شاګ عمده ډلبندی او لاملونه:

- هایپوولیمیک شاګ (Hypovolemic)
 - د وینې د حجم کموالي: ترضیضات، د معدې او کولمو وینې راتلې.
 - شاګ د ډیهایدریشن: نس ناستی، د وینې د شکرې له لوړیدو څخه راپیدا شوی کیتواسیدوز، شدیدې سوزیدې نې.
- قلبی یا انسدادې شاګ (Cardiogenic or obstructive)
 - د قلبې عضلې ناکافي فعالیتونه: د زړه احتشاء، د زړه دسامی ناروغی، د زړه عدمې کفایه، په زړه ضربه، توکسینونه، د سرو امبولیزم، قلبی تمپونادونه، فشاري پنوموتوراکس
- سپټیک شاګ (Septic)
 - یو ابتدایي انتاني یرغل کوونکی چې کولای شي معافیت سیستم مختل کړي (بیو کیمیکال مسینجرونه کیدای شي د رګونو د پراخولو یا توسع او د جریان د کولاپس لامل شي)
- عصبي شاګ ()
 - شوکي نخاع ته زیان رسیدنه چې رګونو ته د سیمپاتیکو منبهاتو د مختلیدو او د رګونو د پراخوالي او د جریان د کولاپس لامل کیږي.
- انافلکتیک شاګ (Anaphylactic)
 - یو انتي جین چې د الرژیک غبرګون د راپارولو لامل کیږي؛ کیدای شي د سیستمیک وعاوی مقاومت د کمولو او د دوراني کولاپس لامل شي.
 - کیدای شي د حنجرې د اذیمه له امله د تنفسي لارو د بندښت لامل شي.

تشخیص

- عمومي شاګ لاندې اعراض او علایم لري:
 - د فشار ټیډل (د وینې سیسټولیک فشار له ۸۰ ملي متر ستون سیماب څخه ټیټ)
 - د محیطي نبض کمیدل.
 - د نهایتو خسافت، غالباً سیا نوتیک د شعریو له ضعیفې بیرته ډکیدنې (Refill) سره (بیرته ډکیدل یې له درې ثانیو څخه زیات وخت نیسي)
 - تکی کارډ یا
 - چټک تنفس
 - د ادرار کموالي
 - شدیدې خولې
 - د حسیت کمیدل، ګنګس والی، مخرش والی
- د شاګ نور اعراض او علایم د ډول له مخې توپیر لري (۱۶.۹ الف جدول دې وکتل شي)

۱۶۹ الف جدول. د شاک د ډول سره سم ځانګړي اعراض او علايم

د شاک ډول	جلد او نځایات	د غاړې ورید	نبض	تنفس او د سښې معاینه	نور علايم
هایپوولیمیک شاک (Hypovolemic)	زږو، سوړ، مرطوب	هوار	ګمزوری		
له قلبي منشأ سره شاک (Cardiogenic)	سوړ، مرطوب، خوله لړوګی	براخ یا متوسع		تنفسي ستوزو، سالتوي، د سښې درد، فشار، رالونه، ویزینګ، د ریتان په قاعده کې د Dull اوازونه، ۳-۵ ګالوپ	
سپټیک شاک (Septic)	توده، سوړوالی، ډډن د حرارت لوړوالی، د بدن د حرارت ټیټوالی پریورډ، او دانګی		خړاګمن یا قوي		
انافلکټیک شاک (Anaphylactic)	توده، سوړوالی، دانګی، پوریتیکز یا		ټکي کارډیا	نیولی سټوټي، خړاب اوازونه، ویزینګ	
عصبي شاک (Neurogenic)	نرم فالج		ټیټ فشار کېدای شي له برادي کارډیا سره مل وي		د ریکیم د مقویټ له لاسه ورکول

درملنه

د شاګ د درملنې موخه د بدن محیطی انساجو ته د وینې او اکسیجن د جریان بیا رسونه ده. د کار په پیل کې د شاګ د لامل او ډول پیژندنه مهمه ده.

- لاندې دندې د لومړني ثبات او د مایعاتو د چټکې معاوضې لپاره تر سره کړئ: د هوايي لارو له خلاص والي او مناسبې تهوېې څخه ځان ډاډه کړئ او بیا:
 - د یو لوی ورید پراېنسل.

یادښت: لږ تر لږه وریدي دوه لارې (۱۶-۱۸ ګېجه ستنې) پیل کړئ.

- په هایپوولیمیک شاګ یا په غیر قلبي شاګونو کې د وینې د ټیټ فشار لپاره، وروسته له دې چې د قلبي شاګ لاملونه مو رد کړل د مایعاتو د معاوضې تر سره کول.

■ دوز

ماشومان: د بدن د وزن په هر کیلو ګرام د ۲۰ میلی لیټرو تجویز (۱۶.۹ ګرام جدول دې وکتل شي) Normal saline (۰.۹ سلنه) یا Ringers lactate د امکان تر بریده په سرعت سره او بیا معاینه وکړئ. د ښه کېدو علایم وګورئ: نبض ورو کېږي، د وینې د سیسټولیک فشار لوړیدل او د ادرار کچه نورماله کېدل. په هغه صورت کې چې کوم ښه والی رامنځته نشو تر درې ځله یې تکرارولی شئ او له هر تطبیق څخه وروسته بیا یې معاینه کړئ. احتیاط: په خوارځواکو ماشومانو کې دوز د بدن د وزن پر هر کیلو ګرام ۱۵ ملي لیټرو ته کم کړئ (۱۰.۳ برخه، خوارځواکي وګورئ)

- په هغه صورت کې چې ناروغ د مایعاتو د معاوضې په وسیله ښه نشي د دیهایدریشن درملنه د Ringers lactate یا Normal saline (۰.۹ سلنه) په وسیله تجویز کړئ: ۷۰ میلی لیټره د بدن د وزن پر هر کیلو ګرام له ۱۲ میاشتو څخه د کوچنیو ماشومانو لپاره په پنځو ساعتونو کې او له یو څخه تر پنځه کلنو ماشومانو لپاره په دویمو ساعتونو کې.

له

- د ORS پکتونه (تېردې پنځه میلی لیټره د بدن د وزن پر هر کیلو ګرام په هر ساعت کې) ژر تر ژره وروسته له دې چې ماشوم یې په ځنبلو برلاسی شي. له شپږ ساعتونو وروسته یې بیا معاینه کړئ. دیهایدریشن تصنیف کړئ او د ABC پلان د درملنې د دوام لپاره تر لاسه لاندې ونیسئ (۲.۲ برخه، نس ناستی او دیهایدریشن دې وکتل شي) - لویان: یولتر Normal saline (۰.۹ سلنه) یا Ringers lactate به چټکې او بیا معاینه ترسره کړئ. د ښه کېدو علایم وپلټئ: د نبض ورو کېدل، د وینې د سیسټولیک فشار لوړیدل له ۱۰۰ ملي متر ستون سیماب ته او نورماله ادرار. په هغه صورت کې چې ناروغ ښه نشو درې ځله یې تکرارولای شئ او له هر تطبیق وروسته یې بیا معاینه کړئ.

- که چېرې ناروغ د څلور ځله کرسټالوئید محلولاتو له تطبیق سره ښه نشو، د شتون په صورت کې هغه ته وینه تجویز کړئ (۲۰ میلی لیټره د بدن د وزن پر هر کیلو ګرام په ۳۰ دقیقو کې)

- پر تپ د مستقیم فشار له راوستلو سره د وینې راتلنې کنټرول او پر نبض یا پروکسیمال رګ د ګوتې په وسیله فشار

- د اکسیجن په وسیله درملنه

- د ادرار د اطراح کېدو د ارزونې لپاره د Foley catheter تطبیقول

- د ناروغ د پښو لوړ ساتل

- د ناروغ تود ساتل

- د نه اړتیا په صورت کې د مات ځای نه خوځول.

- له سېلټ څخه د اوږدو هډوکو لپاره ګټه واخلي

- له بالښت او د روجايي له پارچو څخه د حوصلې د ماتیدو لپاره کار واخلي.

- له سختې تختې، Cervical collar، بالښت یا د شګې له کڅوړې څخه د نخاعي ماتیدنو لپاره ګټه واخلي.

- د شاګ د ځانګړو ډولونو د درملنې لپاره ۱۶.۹ ج جدول ته مراجعه وکړئ.

۱۶.۹ ب جدول. د ورید د داخل د مایعاتو حجم د شدیدې خوارخواکۍ، د شتون څخه پرته د ماشومانو د بدن د مایعاتو د بیا احیا لپاره د وزن او عمر سره سم.

د عمر (وزن)	د Ringers lactate یا Normal saline د محلول حجم (۲۰ میلی لیتره پر هر کیلو گرام)
دوه میاشتنی (له ۴ کیلو گرامو کم)	۷۵ میلی لیتره
له ۲ میاشتو څخه تر له ۴ میاشتو کوچنی (له ۴ څخه تر له ۶ کیلو گرامو څخه کم)	۱۰۰ میلی لیتره
له ۴ میاشتو څخه تر له ۱۲ میاشتو کوچنی (له ۶ څخه تر له ۱۰ کیلو گرامو څخه کم)	۱۵۰ میلی لیتره
له ۱ کال څخه تر له ۳ کلنو کوچنی (له ۱۰ څخه تر له ۱۴ کیلو گرامو څخه کم)	۲۵۰ میلی لیتره
له ۳ کلنو څخه تر له ۵ کلنو کوچنی (له ۱۴ څخه تر له ۱۹ کیلو گرامو څخه کم)	۳۵۰ میلی لیتره

۱۶.۹ ج جدول. د شاک خانګړو دولونوپاړه درملنه

د شاک ډول	درملنه	کټي
هایپوولیمیک شاک (Hypovolemic)	• د مایعاتو د ضایع کېدو د منبع پیدا کول. • پر ټپ د مستقیم فشار د راوستلو په وسیله د ونډې راتللي درول د یا پر بنډۍ یا پروکسیمال رګ د ګوټي په وسیله فشار. • د مایعاتو بیا معاوضه (الېټي لارښوونې پورته او په ب ۱۶.۹ جدول کې وګورئ) • ناروغ د اساسي درملنې لپاره ژر تر ژره ولیږئ.	ګڼ شمېر ناروغان د ترضیضاتو، (لګ وټنې راتلې یا نس ناستي لګه دیوا بدېښ) له امله په شاک کې ګوټي.
شاک له قلبي منشا سره (Cardiogenic)	• د ناروغ رګ خلاص کول. • کمه اندازه مایعات تجویز کول. • احتیاط: په قلبي شاک اخته ناروغ ته د مایعاتو معاوضه تجویز نه کول. ژر تر ژره ناروغ ولیږئ	• ۶.۲ د زړه عادي ککایه او ۶.۵ د میوکار حاده احتشا برنځي وګورئ. • د قلبي شاک ناروغان په هغه مرکز یا مرجع کې درملنې ته اړتیا لري چې درمل یې شتون لري.
سپټیک شاک (Septic)	• تر ټولو لومړی او په ټوټې څپکي د کرسټالي مایعاتو معاوضه پیل کول (الېټي لارښوونې پورته او په ۱۶.۹ جدول کې وګورئ) • د مایعاتو اندازه د ادرار د تخنیک سره سم برابر کول: • ماشومان: د بدن د وزن پر هر کیلو ګرام ۱-۰.۵ میلی لیتره په هر ساعت کې. • O لویان: په هر ساعت کې له ۳۰ میلی لیټرو څخه زیات • د میکروب ضد درملنه په مقدمه توګه پیل کول. متن شوي ساحه په پام کې ونیسئ او د ناروغ له لیږلو مخکې د هغه لومړی دوز تجویز کول. - د شیدیدو انتانیون لپاره د Ampicillin دوز. دمخاری دوز د مطالعې لپاره د الف به مل باهه کې الف ۴ جدول ته مراجعه وکول. +	۱۵.۶ برخه، سپیس Sepsis دي وکل شي.

	د شیدو اتانوزېن لپاره د Gentamicin دوز: دمعاری دوز د معالجي لپاره د الف به مل پاته کي الف ۱۳ جدول ته مراجعه وکړي. + په هغه صورت کي چي د معدي او کولمو په انتان شکمن یاست، Metronidazole- د معاری دوز د معالجي لپاره د الف به مل پاته کي الف ۱۴ جدول ته مراجعه وکړي. • لیریدول	
بادښت: د شیدو ترضحاتو په حالاتو کي کېدای شي کي شمبر ناروغان د شوی کي نڅاخ له ټونو برسيره د هیرو شویو ټونو او داخلي وښي راتلني د ترضحاتو له امله په شاکی کي وي. د هغوی درملنه د هاپیروولیسیک شاکی په څیر کيږي.	• حصایو درملنه برابره کيږي. • نڅاخ بڼانه یا Stabilize کيږي. • معاوضي مایعات تجویز کيږي (لږني لاریوني پورته او په ۹/۶ آب جدول کي وگوري)	عصبي شاکی (Neurogenic)
	• د بدن د الرژیک غبرگون کم کيږي. • O ایپفرین (Epinephrin adrenaline) تجویز کيږي ۱:۱۰۰۰۰ محلول (یو میلی لیتره ۰.۱ سلنه ویالونه چي یو ملي گرام Epinephrin لري) ■ تر جلد لاندې زرق: ۰.۱ میلی لیتر د بدن د وزن پر هر کیلو گرام هر دوز (اصلي دوز ي ۰.۵ میلی لیتره)؛ په هغه صورت کي چي د ناروغ نبض له ۱۴۰ څخه کم وي کېدای شي د ۱۰ دقیقو په تیریدو تر دري ځله تکرار شي. یا ■ د عصبي په داخل کي زرق: ۰.۱ میلی لیتر د بدن د وزن پر هر کیلو گرام هر دوز کېدای شي د ۵ دقیقو په تیریدو تر دري ځله تکرار شي. د دوز تکرار د نبض، د وښي له فشار او د ناروغ له تنفسي فعالیت سره تړاو لري که چیري د ناروغ د وښي دوران ناگاني وي، د Epinephrin ۱:۱۰۰۰۰ محلول د ورید له لاری تجویز کيږي (د بیلگي په توگه یو ویال ۰.۱ سلنه یو میلی لیتر ۹ میلی لیتر Normal saline سره دقیق کيږي	انافلکسیک شاکی (Anaphylactic)

	او پر مېلي لېتر په يوه دقيقه کې تجويز کړي) دوز يې ۰.۱ مېلي لېتر د بدن پر هر کيلو گرام وزن • د ناروغ حياتي فعاليتونه باثباته کړي. تنفسي هوايي لاري خلاصې وساتي، د ماسک په وسيله ناروغ ته اکسيجن تجويز کړي خو د ناروغ تنفسي محدوديت معاوضه شي، د وضعت په ورکولو سره د ناروغ فشار وساتي په داسې توگه چې ناروغ هوار خملوی او د ناروغ بېني لږدې وساتي. د تنفسي لارو التهاب کم کړي خو د ناروغ تنفس ټپه شي لاندي درمل په دې موخه تجويز کړي: انټي هيسټامينيک لکه Chlorphenamine (۱۰ مېلي گرامه وبال په ۱۰ مېلي لېتره کې) د ورېد د داخل د زرق له لاري په يوه دقيقه کې. کرچيان او ماشومان: د الف په مل بابه کې الف ۷ جدول ته مراجعه وکړي، دوز د اړتيا په صورت کې هره ورځ تر څلور جله تکراريږي شي (منظمي دوز د کرچيانو او له يو کال څخه کرچيو ماشومان ته په ۲۴ ساعتونو کې ۰.۴ مېلي لېتره) لوياڼ: له ۲۰-۱۰ مېلي گرامه، تکراريږي شي د اړتيا په صورت کې (منظمي دوز په ۲۴ ساعتونو کې ۲۰ مېلي گرامه) له کورتیکوسټيروئيدونه لکه Hydrocortisone د ورو ورېدي زرق له لاري له يو کال څخه کرچني ماشومان: ۲۵ مېلي گرامه له ۱-۵ کلن ماشومان: ۵۰ مېلي گرامه له ۶-۱۲ کلن ماشومان: ۱۰۰ مېلي گرامه لږيان او له ۱۲ کلنو څخه لوی ماشومان: له ۱۰۰ څخه تر ۳۰۰ مېلي گرامه د بدن د مېدانو د حجم د کموالي لپاره (هيپووليميا) دي د مېدانو معاوضه تر سره شي. (لږېني لارښوني پورته او په ب ۱۶.۹ جدول کې وگوري) يادښت: په هغه صورت کې چې ناروغ اعراض لکه اسهتا ولري يا Salbutamol (۲.۵ څخه تر ۵ مېلي گرامه) د نوبلايزر له لاري يا Aminophylline (۵ مېلي گرامه د بدن د وزن پر هر کيلو گرام) د ورېد د داخل د ورو زرق له لاري (پر تر لږه د ۲۰ دقيقو په ترڅ کې) تجويز کړي.	
--	---	--

ليږدول

د شاګ ټول ناروغان د عا جلولو څارنو له اخیستلو وروسته لوړو روغتیايي مرکزونو ته ولیږئ.
د شاګ د درملنې د تعقیبولو او د شاګ د پیدا کېدو د لامل د درملنې لپاره د ناروغ باندې کول. مخکې د لیږلو څخه لاندې کړنې ترسره کړئ.

○ د وینې د راتلنې کنټرول

○ د مایعاتو تجویز

احتیاط: د هغه ناروغ لپاره چې قلبي شاګ لري د مایعاتو له ورکولو څخه ډډه وشي.

○ په سپټیک شاګ کې د انټي بیوټیک پیلول

○ د کسر تثبیتول

• په قلبي شاګ اخته ناروغ یوازې په هغه مرکزي درملنې ته اړتیا لري چې ورته لیږل شوي وي.

مخنیوی

- د هاپوولیمي پر وخت پیژندنې په وسیله په شاګ د اخته کېدو کموول
- یادښت: په زیاتره ناروغانو کې تر هغه وخته چې د وینې حجم له ۲۰ سلنې څخه کم نشي د وینې فشار کوم کموالی نه ښيي.
- د شاګ په درملنې ژر تر ژره پیل وکړئ.

د ناروغ لپاره لارښوونې

د ناروغ کورنۍ ته د لیږدولو په ترڅ کې د مرستې او څارنې په اړه لارښوونه وکړئ.

۱۶.۱۰ خلع یا بې ځايه کېدل (Dislocation)**تشریح**

خلع د هډوکو د دوه وروستیو برخو ترمنځ د بشپړ اړیکو له منځه تلو څخه عبارت ده. د بې ځايه کېدو لوی لامل ترضیضات دي مګر کولای شي له نورو لاملونو سره (لکه د وړانه مفصل بې ځايه کېدل په ولادي توګه) هم رامنځته شي. د بې ځايه کېدو ټولو پېښې عاجلې دي او پر وخت لیږلو او د هغه د اختلاطونو د مخنیوي لپاره پر وخت درملنې ته اړتیا لري. ماشومان د بې ځايه کېدو د روغیدو د کتنې وړ یا فوق العاده وړتیا په هغه حالت کې لري چې هډوکي په سمه توګه پر ځای شوي وي.

تشخیص

- د ترضیض مخینه (لکه ترافیکي ټکر)
- درد، د شکل خرابیدل یا Deformity، پړسوب او د مفصل د حرکتونو له لاسه ورکول.

درملنه**له درملو پرته درملنه**

- بې له درملو درملنه په هغه صورت کې چې بې ځايه کېدل له یوې خلاصې ماتیدنې یا کسر سره وي، ټپي ځای په یو پاک بانسمان وتړئ.
- زیانمنه شوې ساحه غیر متحرکه کړئ او ناروغ ولیږئ.

د درملو په وسیله درملنه

د درد د آرامولو لپاره انالژیک توصیه کړئ د بیلګې په توګه د Paracetamol تجویز: د معیاري دوز د مطالعې لپاره د الف په مل پاته کې الف ۱۵ جدول ته مراجعه وکړئ.

تشرېح

- يوه اېسه په پوستکي يا په نرمو نسجونو کې د زوو يا قيح موضعي ټوليدل دي او معمولاً لامل يې طلايي ستافيلوکوک وي. هغه ناروغان چې معافيتي سيستم يې له خرابوالي سره مخ دي (د شکرې، د انسان د معافيتي سيستم کمزورونکي وایرس [HIV] خوارځواکي يا سرطان له امله) کېدای شي ګډ انتانونه ولري (مثبت ګرام، منفي ګرام، غير هوازي). کېدای شي پېچلي ټپونه (لکه چيچل شوي، شديد ککړ شوي) هم ګډ انتان ولري. اېسي لاندې درې ډولونه لري.
- ساده اېسي - د جلد د درم په طبقه، د وېښتانو په فولیکولونو، يا د جلد په سطحي غدواتو کې پيدا کيږي.
 - پېچلې اېسي - په ژورو نسجونو، معمولاً زياتې پېښې يې په تي يا د عجان په ناحیه کې ځای نيسي.
 - سړې اېسي - په رخوه يا نرمو نسجونو کې له نري رنځ څخه راپيدا شوی موضعي انتان

تشخيص

- هغه وخت چې اېسه سطحي وي موضعي اعراض يې په روښانه توګه شتون لري:
 - درد يا حساسيت
 - موضعي حرارت يا تودوالی.
 - سوروالی
 - د جلد ځلانده ښکارېدل
 - په پخه شوې اېسه کې موج لرونکي کتله
- په عمېقه يا پېچلې اېسي کې يوازینی نښه کېدای شي د څړېکي درد Throbbing pain شتوالی وي او نور ځانګړي اعراض په هغه کې شتون ونلري.
- يوه سره اېسه کېدای شي په بې درده او متموجه پړسوب پرته له نورو نښو څرګنده شي
- د شکمنو پېښو د تشخيص لپاره له ۱۸ ګيجه ستنې او د قيح له وېستلو څخه په استفادې تشخيص تائيد کړئ.
- احتياط: يوازې د سطحي کتلو لپاره يې وکاروئ. د بطن په جوف او سينه کې د ستنې له داخلولو څخه ډډه وکړئ.
- هغه ناروغان چې د اېسو د تکرارېدو مخينه لري د شکرې يا د معافيتي سيستم د انحطاط لپاره هغوی معاینه کړئ.

درملنه

له درملو پرته درملنه

- د تصلي لومړني پړاو په ترڅ کې چې له تقیحي پړاو (د زوو يا قيح موج لرونکي ټوليدنه) څخه دمخه شتون لري په ساحه کې توده کمپرسونه هر شپږ ساعته وروسته تطبيق کړی. کېدای شي د کمپرس تطبيق د زوو يا قيح د پيدا کيدو مخنيوی وکړي او کېدای شي له درملنې پرته په خپله د دريناژ يا ددواړو لامل شي.
- د پخې اېسي خلاصول يا تخليه کول. دا پروسيجر د درملنې لپاره بنسټ دی.
- احتياط: سړې اېسي خلاصې او تخليه نه کړئ، وې ليرئ.
- د يو انټي ستيک په وسيله د پوستکي اماده کول، او ناروغ ته د کافي انستيزی تطبيق. له موضعي انستيزی سره د ساحې بلاک (لکه يو سلنه Lidocaine) چې د شااوخوا د غيرو منتو نسجونو د ارتشاح لامل کيږي د اېسي لپاره اغيز لرونکی دی.
- لومړنۍ تخليه د ۱۸ ګيجه لوې ستنې په وسيله د زوو يا قيح د شتون د تائيد لپاره تر سره کړئ.
- د اېسي په يو وتلې ساحه کې د شق اجرا کول، او يا ساحې ته د لارښوني لپاره له يوې ستنې څخه استفاده چې بايد خلاصه شي. شق په کافي توګه خلاص کړئ څو د اېسي له جوف څخه بشپړه تخليه تر سره شي. ډير کوچنی شق د بيرته ګرځيدو لامل کيږي.
- په اېسه کې د شرياني پنډ د څوکې د داخلولو په وسيله هغه په نرمه توګه خلاص کړئ. جوف ته د خپلې ګوتې په وسيله چې د سکتش لري ښه پرمختيا ورکړئ او ټول نغښتی ځايونه پرې کړئ.

- شق ته د اړتيا په صورت کې د بشپړې تخلیې لپاره بشپړه پراختیا ور کړئ مگر روغ او صاف نسجونه د اېسی پر شاوخوا خلاص نه کړئ.
- اېسه د Normal saline په وسیله ښه ومینځئ او په خلاصه توګه یې پانسمان کړئ. موخه یې د تپ د شاوخوا له تړلو څخه مخنیوی او د تپ د پورتنۍ برخو روغیدل دي. د جوف په ژور ځای کې د لاتیکس ډرین (Latex drain) یا د یوې پلټې ګاز په ایشودلو د تخلیې زمینه برابردای شي. ډرین یا د ګاز پلته د زخم پر شاوخوا وتړئ او هغه د تخلیې کولو لپاره ځای پر ځای کړئ معمولاً له دوه څخه تر درې ورځو.
- له ککړتیا څخه د مخنیوی لپاره یو لوی پانسمان کیردئ هره ورځ پانسمان په روغتیايي مرکز کې بدل کړئ.

د درملو په وسیله درملنه

- د Paracetamol تجویز: د معیاری دوز د مطالعې لپاره د الف په مل پاڼه کې الف ۱۵ جدول ته مراجعه وکړئ یوازې په ټاکلو شرایطو کې انټي بیوتیک توصیه کړئ. د معمولي اېسو درملنه د هغو له خلاصولو او د زوو یا قیح له تخلیه کولو سره تړاو لري نه له انټي بیوتیک سره. د انټي بیوتیک د توصیې لپاره ځانګړي استنباطات په لاندې توګه دي:
- د کلک والي په لومړني پړاو کې له تموج او د زوو یا قیح له ټولیدو مخکې
- په هغه صورت کې چې ناروغ د شاوخوا ساحو د نرمو نسج التهاب ولري.
- په هغو پېښو کې چې له انتان څخه د راپیدا شوې تېې او سیستمیک علائم شتون ولري.
- په هغه صورت کې چې لمفاوي عقدات حساسې یا پړسیدلي وي یا ستاسو تشخیص د لمفاوي اوعیې التهاب وي.
- په هغه صورت کې چې ناروغ د معافیت د سیستم انحطاطي حالت لري.
- د استنباط په صورت کې انټي بیوتیک د ۷ ورځو لپاره تجویز کړئ.
- Penicilline V تابلېت: د معیاری دوز د مطالعې لپاره د الف په مل پاڼه کې الف ۱۶ جدول ته مراجعه وکړئ

یا

- Erythromycin تابلېت (د هغو ناروغانو لپاره چې د Penicilline پر وړاندې حساسیت لري): د معیاری دوز د مطالعې لپاره د الف په مل پاڼه کې الف ۱۲ جدول ته مراجعه وکړئ

یا

- په هغه صورت کې چې تا سو د غیر هوازي انتاناتو په شتون شکمن یاست (مثلاً د مقعد دشاوخوا اېسی)، Metronidazole تابلېت: د معیاری دوز د مطالعې لپاره د الف په مل پاڼه کې الف ۱۴ جدول ته مراجعه وکړئ

لیردول

- په سړو اېسو ټول اخته شکمن ناروغان (نری رنځ) د اېسی له تخلیې پرته ولیږئ.
- په حساسو یا ژورو برخو کې پېچلې اېسی (لکه سینه، د بطن جوف، حنجره، عجان ناحیه)

مخنیوی

ناروغ ته د شخصي روغتیا ساتنې، د فاضله اوبو د تخلیې ښه سیستم او د ښې تغذیې رعایتول توصیه کړئ.

ناروغ ته لارښوونې

ناروغ ته توصیه وکړئ چې:

- د پانسمان لپاره هره ورځ مراجعه وکړي
- د ساحې د ډیرې ککړیدنې مخنیوی وکړي
- ښه تغذیه واخلې

تشرېح

زهر له هغې يوې مادې څخه عبارت دي چې بدن ته د خوړلو (درمل يا مخدره مواد، سوزوونکي کيمياوي توکي يا نور خطرناکه توکي) يا له جلد سره د تماس (لکه حشره وژونکي) يا د انشاق (لکه دود، بخار، سپرې) په صورت کې، بدن ته د زيان يا گواښ لامل کيږي. زياتره تسمعات په ماشومانو کې تصادفي او د مخنيوي وړ وي. مسمومیت کېدای شي قصدي، ځان وژنه يا دواړه وي. د ناروغ روحي رواني مخينه واخلي. په ټولو ناروغانو چې مخکې روغ وي او اوس يوه غير واضح ناروغی لری بايد په تسمم شکمن شی.

تشخيص

- د ناروغ د مخ کېدو مخينه له زهرياتو سره د خوړلو په وسيله، د تنفس کولو يا تماس نيولو په وسيله واخلي. د مخ کېدو جزئيات وپلټي.
 - زهري ماده تشخيص کړئ اندازه، د خوړلو وخت او د نورو کسانو مخ کېدل ځانگړي کړئ.
 - د زهر د شتون په صورت کې هڅه وکړئ چې د سمی مادې اصلي ډول د بوتل يا ليبل له مخې پيدا کړئ. له شاهدانو څخه پوښتنه وکړئ.
 - احتیاطي معلومات که د قطي يا ليبل تر شا شتون ولري، تر لاسه کړئ.
 - د لاس رسي وړ منابعو ته د مادې د مشخصاتو په اړه دا چې زهري ده او د هغه انټي دوت څه شی دی، مراجعه وکړئ (طبي کتابونه يا د درملو جدول)
 - اعراض او علايم معاینه کړئ چې د زهري مادې د ډول له مخې توپیر لري.
 - عاجل علايم چک کړئ (مثلا انسدادی تنفس، شدید تنفسي ديسترس، سيانوز، کوما، اختلاج، او د شاک علايم لکه د لاسونو سور والی، کمزورتيا يا چټک نبض او د شعريه رگ په څنډ کېدل له درې ثانيو څخه په زيات وخت کې)
 - د وينې د شکرې کمېدل معاینه کړئ.
 - د خولې او پوږي د شااوخوا جلد سوزيدلي ځايونه چې کېدای شي د خوړل شويو موادو په تسمعاتو کې شتون ولري، معاینه کړئ.
 - تنفسي ستونزې، ستریدور او په خبرو کولو کې بدلون چې د انشاق يا تنفس شوي توکي څرگندوی دی، معاینه کړئ.
 - عصبي بدلونونه، د پراسيمپاتيک د سيستم فعالیتدل يا دواړه معاینه کړئ چې کېدای شي دعضوي فاسفيټونو او د کاربوميټ ترکيباتو چې په حشره وژونکو کې شتون لري د خوړلو، تماس يا انشاق څخه ورسته منځته راشي. لاندې څيزونه پيدا کړئ.
 - د خولې د لاړو زياتوالي
 - خولې کېدل
 - د اوښکو تويدل
 - کمزوری نبض
 - د حدقي تقبض
 - اختلاج
 - د عضلاتو کمزورتيا، د عضلاتو قبض يا د هغوی فلج
 - د سپرو اذيما
 - تنفسي انحطاط
 - ډیر خوړل شوي زهريات د زړه بدوالي، کانگې، د شعوريه سويه کې د بدلونونو يا د دوی د ترکیب لامل کيږي.

درملنه

له درملو پرته درملنه

له زهريانو څخه راپيدا شوې څرگنديدنې د زهري مادې له مخې توپير لري. د درملنې انتخاب د هغو وړاندیزونو تعقيبول دی چې په مآخذو کې د ځانگړې مادې په اړه پرې ټينگار شوی وي. د روغتيايي خدمتونو د اساسي ټولگې (BPHS) د طرزالعمل ټينگار په خوندي او پر خپل وخت د سببي مادې پر لرې کولو، خنثی کولو او نري کولو (۱۶.۱۲ الف جدول دې وکتل شي)، ساتندويه څارنو او ليرولو دی.

په هغه صورت کې چې زهري ماده تيره شوې وي له ککړتيا څخه د معدې پاکول د کانگو يا د معدې د لواژ په وسيله په عامه توگه مرستندويه وي هغه هم په هغه صورت کې چې د مادې له تيرولو څخه د دوه ساعتونو په موده کې وشي مگر غوره لومړۍ ساعت دی. په همدې ترتيب د زهري مادې خنثی کول په هغه صورت کې چې ناروغ له تيرولو وروسته د دوه ساعتونو په ترڅ کې مراجعه وکړي او د کانگو امکانات شتون ونلري او د خنثی کولو لپاره مضاد استطباب شتون ونلري، تطبيق کيږي.

يادښت: غالباً د سببي مادې له منځه وړل يا خنثی کول په روغتيايي مرکز کې شونې ندی ځکه چې ناروغ له دوه ساعته څخه وروسته تر خورلومراجعه کوی.

د درملو په وسيله درملنه

- په هغه صورت کې چې ناروغ سالنډي يا په شعوري لوحه کې بدلونونه ولری يا دا چې به کاربن مونو اکسايډ معروض شوی وي، اکسيجن تطبيق کړئ.
- د زهريانو انټي دوت بايد د ليل او موجودو وړاندیزونو پر بنسټ د شتون په صورت کې تطبيق شي. په هغو حالاتو کې چې د بيسټيزو روغتيايي خدمتونو د ټولگې په مرکزونو کې د درملنې امکانات نه وي زياتره پېښې لوړو مراجعه ته د ناروغ ليرولو ته اړتيا لري.
- د ځانگړو زهريانو د درملو د اهتماماتو لپاره ۱۶.۱۲ ب جدول ته مراجعه وکړئ.

احتياط او کښي	له درملنې پرته اهميات	د سښي مادې وول
- احتياط: هيڅ کله په لاندې حالاتو کې د کانگو تحرېک او د معدې لواړ ترسره نکړئ. - په شعوري سره په کې بدلون يا د هر بل لامل له امله چه نشي کولای خپلې تنفسي لارې خلاصې وساتي. - سوزونکي توکي، محرش، يا پطروليم نېي اخستې وي. - د خولې او پوزي پر شااوخوا د سوزېدو شواهد ولري. - د کانگو د راپارولو او د معدې د لواړ د ترسره کولو له پيل څخه مخکې نفت او نور توکي تشخيص کړئ لکه: - نفت يا د پطروليم نور محصولات - زياتره حشره وژونکي - تيزاب يا القلي پاکونکي يا حلونکي (محلات) - د بطري تيزاب	- د سوزونکو توکو د لري کولو يا له منځه وړلو موخه - د سټاينول يا نرمې قاشقې په وسيله د بلعوم د شاتنې برخې له تحرېکو سره د کانگو توليد - احتياط: هيڅکله له مالګې څخه د کانګي د توليدونکي مادې په توګه کار وړانۀ خپلې کولای شي چې ډير خطرونه وي. - د معدې لواړ يوازې په لاندې شرايطو کې ترسره کړي. - کارکوونکي دي له تګلارې سره بلدتيا ولري. - کارکوونکي دي هغه په خوندي توګه ترسره کړي. - ناروغ ونشي کولای چې کانګي وکړي يا کانګي کول د هغه لپاره خوندي نه دي. - د معدې له لواړ څخه يوازې د لاندې څيزونو په تيرولو کې ګټه واخلي. - تير بېل يا خوړل يوازې خو ساتنه مخکې پېښ شوی وي. - د ژوند ګواښونکي وي. - تير شوي توکي د پطروليم له محصولاتو څخه او محرش نه وي. - لاندې پړاو ته د معدې د لواړ د ترسره کولو لپاره په پام کې ونيسئ. - د سګښ د يوې وسيلې له شتون څخه هغه مهال چې ناروغ کانګي کوي، ډاډه اوسئ. - ناروغ ته په چپ لوري وضعيت ورکړئ په داسې توګه چې د ناروغ سر ښکته لوري ته وي. - د ټيوب اړوندوالی چې په معدۀ کې نېي داخلوي اندازه کړئ خو معدې ته د ټيوب له داخلولو څخه ډاډه شئ. - لواړ د ۰.۹ سلنه Normal saline په وسيله د بدن د وزن پر هر کيلو ګرام ۱۰ ميلي ليتره ترسره کړئ. د مايع اندازه چې سګښ کيږي بايد په اټکلې توګه هماغه اندازه داخلي شوي وي. لواړ ته تر هغه وخته دوام ورکړئ چې په سګښ شوي مايع کې د تيري شويو توکو کومه پارچه پاتې نشي.	عاجلې پېښې او ترخيصات

روغتيايي کارکوونکي باید پاملرنه وکړي خو ځانونه د پېش بند او دسکټور د اغوستلو په وسیله له بیا ککړ تیا څخه وساتي.	• تېرو شمېرو توکو د خټی کولو لپاره چارکول (Charcoal) د شتون په صورت کې د سڅولي یا د پوزي او معدلي د ټیوب له لارې توصیه کړی. دا عمل هغه وخت ترسره کړی چې ناروغ د توکو له تېرولو څخه د دوه ساعتونو په ترڅ کې ناستو ته راوستل شوی وي یا د کانکرو د تولید امکانات شتون ولري او کوم مضاد استعجاب د هغه لپاره شتون ولري. • احتیاجات: فعال شوی Charcoal هغه وخت و کاروی چې کارکوونکي د هغه له پروسیجر سره بلل وي. • د امکان په صورت کې یو واحد دوز تجویز کړی له هغه پرته هري د ۳۰ دقیقو په واکن په کسری دوزونو کې تطبیق کړی. د Charcoal د لاندې مقدارونو څخه هر یو کرام Charcoal له کال څخه کوچني ماشومان: یو کرام د بدن د وزن پر هر کیلو کرام له ۱۲-۱۰ کلونو ماشومان: له ۲۵-۳۵ کرامه. لویان او له ۱۲ کلونو څخه لوی ماشومان: له ۲۵-۱۰۰ کرامه • پاملرنه: Charcoal کېدای شي د زړه بندوالی د پیدا کېدو لامل شي. پاملرنه وکړی او مراقب اوسې چې تېره شوي ماده د سوزیدونکو موادو یا نورو موادو له جملې څخه چې کارکي په هغه کې مضاد استعجاب ده، نه وي. • هغه وخت چې د کانکرو تحریک یا د Charcoal په وسیله خټی کولو استعجاب یا امکان ته درلودل ناروغ ته د موادو نري کېدو په موخه د شېدو یا پاکو اوبو توصیه وکړی.
	• له ناروغ څخه ټولې جامې او شخصي توکي لرې کړی • یادښت: د ناروغ لري شوي جامې او شخصي توکي باید د یوې شناني کڅوډې په داخل کې وساتل شي خو وروسته پاکې شي. • د ناروغ د جلد پرمخ پورې یا مایعات له یو پاک اوبو ټوکر سره پاک کړی. • ټولې معروض شوي ساحې له نیم کمو ډیر وایو سره و مینځي. په هغه صورت کې چې مواد غوړ ولري له صابون او اوبو څخه ګټه واخلئ. • منپلونه له لږ تر لږه ۲۰ دقیقې دوام درکړی په هغه صورت کې چې مسمومونکي ماده اقلې وي، د منپل موده زیاته کړی ځکه دا ټول مواد د ډیر وخت په تېریدو سره د ډیرو تحریکاتو لامل کیږي.
له زهري توکو سره د جلد او سترګو څرخ کېدل یا عمروضیدل	

	• په هغه صورت کې چې سترګه معروضه شوې وي هغه له Normal saline سره لږ تر لږه د ۲۰ دقیقو لپاره میخلې شي (د القلي موادو لپاره ۴۰ دقیقې). لږې سترګې ته د میخلې شویو اوبو نه لږیدو ته پاملرنه وکړئ (۱۶۷ برخه، د سترګې پټونه [ترضیضات، پردې جسمونه او سوزیدنې] دې وکړل شي).	
د سوزوونکو توکو یا زهریانو انشاق	• د مخو شو ګازونو انشاق کېدای شي د پورتنیو تنفسي لارو د پړسوب او بندیدو، د قصبانو د سټازم او وروسته د سینه پخل لامل شي. • د انوریکس، د قسبي توسع وړتوکو او مصنوعي تهوې تجربیزولو ته ممکن اړتیا پیدا شي.	

۱۶.۱۲ ب جدول: د ځانگړو نسمحانو د درملو په وسيله درملنه

د زهري مادې ټولونه	د درملو په وسيله اضمحانات	پاملرنه او کتنې
مخړش تر کييات • سوديم هايډروکسايډ • پتاشيم هايډروکسايډ • تيزابونه • سينټونکي (Bleaches) توکي • عفوني ضد توکي	• د نري کولو لپاره بايد تر ژر ژر شپايي يا اوږه توصيه شي • بيا ناروغ ته د خوړلي له لاري هېڅ شي مه ورکوزئ، د اړتيا په صورت کې ناروغ جراحي ډاکټر ته د مړي د تخريباتو يا رېچر د معالجه لپاره وليږئ.	پاملرنه: • کانگې مه تحريکوزئ. • که چيرې سوزونکي توکي تېر شوي وي Charcoal تجويز نه کړئ ځکه ددې توکي تر سره کول د خوړلي، ستوني، تنفسي لارو مړي او معددي د زيات تخريب لامل کيږي.
د پېطروليم ترکييات • نفت • د تورينټن ترکييات • پټرول	• په ناروغ کې د تنفسي زحرت د شتون په صورت کې د اکسيجن د تطبيق په شمول ځانگړي درملنه.	احتياط: • کانگې مه تحريکوزئ • فعال Charcoal تجويز نه کړئ ځکه انسان کېدای شي د تنفسي زحرت، د سږي د اډېما يا نوبويا له امله را پېدا شوي هايپو کسي لامل شي. • Encephalopathy هم يو خطر دی.
عضوي فاسفيټونه يا ارگانوفاسفيټ او د کاربايمټ ترکييات: • عضوي فاسفورسونه يا ارگانوفاسفورس • (مالاتين، پراټين، TEPP، Mevinphos او Methiocarb او کاربايمټ (که Cabaryl –Pesticides	• دا توکي کولای شي د جلد له لاري جذب شي يا تېر يا هم انسان شي. • زهر لري کړئ د ناروغ سترگي او جلد په سمه توگه و مينځئ. • په هغه صورت کې چې د مادي تيزونکي د يوه ساعت په ترڅ کې راوستل شوي وي، فعال Charcoal تجويز کړئ. • په هغه صورت کې چې ماشوم د پراسيمپاتيک زيات فعالوالي ولري (لکه د خوړلي د لايو زياتوالي، له اوښکې ډکې سترگې، تېره، غوږ، د معددي اختلالات او کانگې) د شتون په صورت کې له Atropine وال څخه گټه واخلي: ۰.۰۵-۰.۱ ميلي گرامه د بدن د وزن پر هر کيلو گرام د عضلي په داخل کې رږق کړئ (اصلي دوز يې يو ملي گرام دی).	احتياط: کانگې مه تحريکوزئ ځکه زياتره حشره وژونکي په خپل ترکيب کې پېطروليم توکي لري.

	• ناروغ د Pralidoxime د اخیستلو په موخه د عضلي کمزورتیا لپاره ولیږي. دا اتري دوت له کیمیاوي توکو یا حشره وژونکو (حشرات) سپري کولو څخه د را پیدا شویو سمسماتو لپاره یا د عضلي کمزورتیا د درملنې لپاره کارول کیږي.	
Paracetamol	• په هغه صورت کې چې ناروغ له تیرولو څخه تر یوه ساعت پورې ولېدل شي کانګې راوباروي. په هغه صورت کې چې کانګې تولید نشي د معدې له لړزا یا فعال شوي Charcoal څخه ګټه واخلي. • د ځګړي د معدې کانګې د مخنیوي په موخه ناروغ د اتري دوت، Methionine یا acetyl cysteine د اخیستلو لپاره ولیږي. • ناروغ د بدن د وزن پر هر کيلو ګرام د ۱۵۰۰ میلی ګرامه پازياتو Paracetamol د تیرولو په خاطر حوزو وي روغتون ته ولیږي.	اسپتال سالیسیک اسید (آسپرین) او تور سالیسیلیک اسید Acetylsalicylic acid (Aspirin) Salicylates
	• دا ماده کولای شي چې په تنګیو ماشومانو کې جدي وي ځکه دا زړ تر زړه تیرلای کیږي او بالاخره کولای شي د خپلو توکمونو اغیزو له امله مرکزي عصبي سیستم کې د شپږمې تخریباتو لامل شي. Aspirin د اسیدي تنفس، کانګې او په غوږو کې د غیر طبیعي اوازونو (Tinnitus) لامل کیږي. کانګې راوباروي، که چیرې کانګې ونشوی پدې صورت کې د معدې لړزا یا فعال Charcoal استعمال کړي • د اسیدوزس د له مینځه وړلو لپاره ناروغ زیاتو مایعاتو اخیستلو ته و هڅوي تر څو تیرول زیات شي د زیاتي درملنې (لکه Sodium Bicarbonate، Vitamin K) لپاره ناروغ روغتون ته ولیږي	اوسپنه (Iron) • د اوسپنې زهري کلینیکي څرګندېدنې معاینه کړی. ○ زړه بدوالی، کانګې، بېلن درد او نس ناستی ○ تصوراتي یا تور رنګ کانګې یا غایطه مواد ○ د معدې او کولمو دینې راتلنې، تېټ فشار، سر ګډګس والی، اختلاج،

	او په شلډېدو تسمي حالاتو کې مېټابولېک اسېډوز رامنځ ته کېږي. پادېست: د معدي او کولمو خړګندېدنې په لومړيو شپږو ساعتونو کې پېښېږي، ناروغ چې په دې موده کې عرض ولري د اتيي دوت تطبيق ته اړتيا لري • که چېرې له سميت له وخت څخه له دوه ساعتونو کم وخت تېر شوی وي کانګي تحريک کېږي. • عرضي ناروغان د اتيي دوت د تطبيق د کتنې لپاره روغتون ته وليږي	
کېدای شي ناروغ کلادي بېکاره شي مګر لا هم هاپيروکسي ولري.	د اکسيجن تطبيق سل په سلو کې کولای شي چې د کاربن مونو اکسايډ لري کول چټک کړي او د هاپيروکسي تر له منځه تللو دې تطبيق شي.	کاربن مونو اکسايډ
Naloxone hydrochloride کېدای شي چې په يوشان دوز د عضلي يا تر پوستکي لاندي زرق له لاري تطبيق شي مګر يوازې په هغو حالاتو کې چې د ورېد د داخل له لاري شوي نه وي. د عضلي د داخل او تر جلد لاندي زرق ورو اغېزې لري.	• د نارکوټيکونو د سميت کلينيکي خړګندېدنې معانيته کړي. ○ حقيقت تسمم له اوفورېد سر څرګند والی او د حقيقي تقبض سره مل دي. ○ ښډېد تسمم کېدای شي د قتيما فشار، برادرېکاردېا، د بدن د تودوخې د کمېدو، د اختلاج، د سپو د زديما، کوما او د تنفسي سيستم د انحطاط او د هغه د درېدو لامل شي. ○ هوبنه د تنفس د درېدو (Apnea) يا سپو ته د معدي د محتوياتو داسياېرېشن (Aspiration Pneumonia) له امله پېښېږي. • تنفسي لاري د اکسيجن او مصنوعي تهوې د ورکولو په وسيله خلاصې وساتي. • په هغه صورت کې چې د کانګو تحريک، د معدي لوړ او د Charcoal تطبيق په خوندي توګه اجرا کېږي، بل وګړي. • ناروغ د Naloxone د اخيستلو لپاره چې د مقداراتو لپاره يو ځانګړی انټاګونيست دی د شتون په صورت کې (د ولسوالي په روغتون او لور) ته وليږي. ۴۰۰ مايکروګرامه ويال (۴۰۰ ميلي ګرامه) په يو ميلي لټر کې، دوز د ورېد د داخل د زرق له لاري. ○ ماشومان: ۱۰ مايکروګرام په بدن په پر کېلو ګرام وزن تجويز کړی که چېرې بېه والی رامنځ ته نشو دوز يې په دوه دقيقو کې بيا تکرار کړی ○ لويان: ۴-۲ ميلي ګرامه چې له دوه څخه تر درې دقيقو وروسته نکر لريږي خړ اعصابي دوز ۱۰ ميلي ګرامو ته ورسېږي. په تنفسي فعاليتونو کې د نه پېښېدو په صورت کې تېمخيض تر پورې پېښې لاندي راځي.	نارکوټيکونه، تړباک (لکه مورفين، هيروفين، کودين، ترامادول، پروپو کسفين)

	فلورمازېنېل (Flumazenil) د Benzodiazepine د اخنډو يو ځانگړی انتاگونيست دی (د لوسوالي په روغتون او له هغه څخه په لوړو روغتونونو کې شتون لري) ۰.۲ ميلي گرامه د بدن د وزن پر هر کيلو گرام د ورید د داخل د زرق له لارې په دوه دقيقو کې تطبيقیږي (اصلي دوز يې دوه ميلي گرامه دی)	Benzodiazepines
--	--	-----------------

ليردول

- په څرگند سمیت ټول شکمن ناروغان د تر کتنې لاندې نیولو لپاره لږ تر لږه د شپږو ساعتونو لپاره روغتون ته ولیرئ. تر کتنې لاندې نیول کولای شي چې تر ۲۴ ساعتونو دوام وکړي چې په زهرو له معروض والي، د روغتیايي مرکز له واټن او نورو لاملونو سره تړاو لري.
- هغو ناروغانو چې د پطروليم محصولات او سوزونکي توکي تیر کړي دي، کور ته مه لېږئ ترڅو چې د شپږو ساعتو لپاره د کتنې لپاره نوي ساتل شوي. سوزونکي توکي د مري د سوزولو لامل کیږي چې څرگندیدنې یې ژر نه معلومیږي. د پطروليم محصولات هغه وخت چې انشاق شي د سږي د اذیمو لامل کیږي چې د پرمختیا لپاره څو ساعته وخت نیسي.
- لاندې ناروغان د لوړې کچې روغتون ته په مناسب وخت او په خوندي توګه ولیردوئ.
 - هغه ناروغان چې شعور یې مختل وي یا شعوري کچه یې مخ په خرابیدو وي.
 - یادښت: هغه ناروغانو ته چې شعور یې مختل وي ریکوري وضعیت ورکړئ.
 - هغه ناروغان چې ستونی او خوله یې سوزیدلې وي.
 - د شدید تنفسي زحمت ناروغان
 - هغه ناروغان چې د هغوی د وینې جریان په خطر کې دی.
 - هغه ناروغان چې د سترګې د ګاټې څرګند ټپونه لري.
- هغه ناروغان چې قصداً یی زهریات تیر کړي وي یا قصداً زهر ورکړل شوي وي.

مخنیوی

- په درملو، مخدره موادو او زهریاتو په سمه توګه لیبیل ولګوئ او په پیژندل شویو قطبو کې کیږدئ.
- احتیاط: دا توکي د ماشومانو له لاسرسۍ څخه لرې وساتئ.
- د هغو ناروغانو لپاره چې روحي رواني ستونزې لري او د ځان وژنې له خطر سره مخ دي ملاتړیز ګامونه تر لاس لاندې ونیسئ.

ناروغ ته لارښوونې

- د ځانګړو زهرو وروستی موندنې او اختلاطات وګورئ. د خطر له علایمو سره د مخ کېدو په صورت کې کلینیک ته مراجعه وکړئ.
- والدينو ته د لومړنیو مرستو د رسولو په اړه په راتلونکې کې د مخ کېدو په صورت کې توصیه وکړئ.
 - ماشومان په لاندې حالاتو کې کانګو ته مه اړ کوئ.
 - په هغه صورت کې چې ماشوم سوزیدونکي توکي، نفت، پطروليم یا پطرولي محصولات تیر کړي وي.
 - په هغه صورت کې چې د ماشوم خوله او ستونی سوزیدلې وي.
 - هغه ماشوم چې سرګنګس والی ولري
 - که چېرې ماشوم درمل، مخدره مواد یا زهریات تیر کړي وي هڅه وکړئ څو د ستوني د شا د برخې له تحریکولو سره کانګې تولید کړئ.
 - ژر تر ژره ماشوم روغتیايي مرکز ته تر مناقشې لاندې مادې په اړه د معلوماتو له جزئیاتو سره (د مادې قطب، لیبیل، یا د زهري مادې بیلګه) ولیردوئ.

اولسم څپرکی اعراض او علايم SIGNS AND SYMPTOMS

۱۷.۱ له تېې څخه راپیدا شوې اختلاج (Febrile Convulsion)

تشریح

له تېې څخه راپیدا شوې اختلاج (Febrile convulsion)، دهغه اختلاحي بریدونو څخه عبارت دی چې د لوړې تېې (له ۳۸.۵ درجې سانتي گرید څخه یا ددی نه لوړ) له امله منځته راځي. دا اختلاج په وصفي توګه د مرکزي عصبي سیستم (CNS) د انتان له شتون څخه پرته له درې میاشتې څخه تر پنځه کلنۍ پورې پیښیږي. په عامه توګه له تېې څخه د راپیداشوې اختلاج انزار ښه وی.

- له تېې څخه یوه پیدا شوې اختلاج کېدای شي ساده یا پیچلې وي.
 - له تېې څخه راپیدا شوې ساده اختلاج (Simple febrile convulsion)
 - یو عمومي واحد اختلاج دی چې زیاتره د تېې لرونکو حالاتو په لومړیو کې پیښیږي.
 - اختلاج له دوه څخه تر درې دقیقو پورې پای ته رسیږي او تل له ۱۵ دقیقو څخه کم دوام کوي.
 - کومې عصبي ستونزې سره ارتباط نه لري
 - زیاتره د تېې څخه راپیدا اختلاج یوه کورنۍ مخینه لري.
 - معمولاً اختلاج حملې بیرته نه راګرځي ښه انزار لري او له صرعې یا میرګۍ سره مل نه وي.
 - له تېې څخه راپیدا شوې پیچلې اختلاج
 - کولای شي محراقي، تکراري یا دواړه ښي ولري.
 - اختلاج له لسو دقیقو څخه زیات دوام کوي
 - عصبي اېنارملۍ، بعدې یا وروستی صرعې یا دواړه پیدا کیږي.
 - دا حالت معمولاً د قحف د داخل له انتاناتو یا د مرکزي عصبي سیستم له نورو ستونزو سره مل وي.
- له تېې څخه د راپیدا شوې اختلاج د تفکیک لویه ستونزه له هغو اختلاجو سره چې له لاندې حالاتو سره مل وي، ده
 - د قحف د داخل جدې ناروغۍ (لکه د سحایا التهاب)
 - له قحف څخه بهر ناروغۍ لکه سینې بغل، وایرسې ناروغۍ، ملاریا، یا کوم بل ځانګړی انتان د مثال په توګه د بولي لارې انتان او د وینې د ګلوکوز کمېدل (Hypoglycemia)

تشخیص

- تل له پنځو کلونو څخه کوچنی ماشوم د خطر د نښو لپاره د IMCI د فلیپ چارټ سره سم معاینه کړي.
- له ۳۸.۵ درجې سانتي گرید یا ددی نه لوړد حرارت د درجې څارنه وکړي.
- اختلاج معمولاً تونیک – کلونیک دی چې کېدای شي د شعور له ضایع کېدو او د ادرار او غایطه موادو د کنترول له لاسه ورکولو سره مل وي.
- د تېې اود اختلاج د راپیښېدو لامل:
 - وایرسې انتانات (لکه دبلعوم وایروسي التهاب)
 - باکتریايي انتانات
 - د قحف په داخل: د سحایا التهاب/د عصبي نسج التهاب یا د دماغ اېسې.
 - له قحف څخه بهر: د پورتنیو تنفسي لارو انتانات، د منځني غوړ حاد التهاب، د بلعوم باکتریايي التهاب یا د بولي لارو انتان.
 - استقلایي: د وینې د ګلوکوز کمېدل
 - ملاریا

درملنه

د درملنې موخه د تنفسي لارو خلاص ساتل، د اختلاج درول، د تېې کنټرول، د تېې د لاملونو پیژندل او د هغې درملنه ده.

له درملو پرته درملنه

- د تنفسي لارو خلاص ساتل
 - یوه لوري ته د ماشوم ځملول چې د انشاق (Aspiration) څخه مخنیوی وشي.
 - په هغه صورت کې چې ژبه یا شونډې شنې وي د ناروغ خوله پرانیسي او د هوايي لارو د پاکوالي څخه ډاډ تر لاسه کړئ او ناروغ ته اکسیجن ورکړئ.
 - د افرازانو پاکول.
 - ناروغ ته چې اختلاحي حالت لري باید د خولې له لارې څه شی ور نه کړل شي.
- له ټپونو څخه ساتل
 - د لویډو یا موضعي ترضیضاتو مخنیوی
 - د ژبې د پیچلو ساتنه
- د تېې کمول
 - له ماشوم څخه د جامو ویستل
 - د ساړه او نم لرونکي ټوکر ایښودل یا تریندول (یعنې په نیم گرمو اوبو سره تریندول).
 - د مایعاتو د اخیستلو تشویق هغه وخت چې د ناروغ اختلاج ښه شي.

د درملو په وسیله درملنه

- لومړیتوب: د Diazepam په وسیله د اختلاج درملنه
 - احتیاط: په هغه صورت کې چې ناروغ اختلاج لري، درملنه یې وکړئ. په هغه صورت کې چې اختلاج درېدلې وي یوازې تېې کنټرول کړئ.
 - Diazepam توصیه: د بدن پر یو کیلو ګرام وزن ۰.۵ میلی ګرامه د مقعد له لارې. د دوز تکرار په لسو دقیقو کې په هغه صورت کې چې حملې دوام ولري.
 - د لاندې پروسیجر تطبیق تعقیب کړئ:
 - د Diazepam د محلول مناسبه اندازه د Insulin یا نري رنځ د یو سورنچ په داخل کې برابر کړئ. د الف په مل پانه کې الف ۹ جدول ته د معیاري دوز لپاره مراجعه وکړئ.
 - له سورنچ څخه ستن لرې کړئ او سورنچ له تخلیه کولو مخکې له ۵-۴ سانتي مترو د ناروغ په مقعد کې داخل کړئ.
 - د ناروغ سرین ته له ۳-۲ دقیقو یو پر بل فشار ورکړئ.
- دویم لومړیتوب: د تېې درملنه د Paracetamol د توصیه په وسیله د تېې تر ښه کېدو. د الف په مل پانه کې الف ۱۵ جدول ته د معیاري دوزونو لپاره مراجعه وکړئ.
 - په هغه صورت کې چې ماشوم په خوړلو پرلاسی نه وي Paracetamol د پوزې او معدې د تیوب له لارې تجویز کړئ.
- احتیاط: له پنځو کلونو څخه د کوچنیو ماشومانو لپاره د Reye's Syndrome د رامنځته کېدو له امله باید Aspirin توصیه نشي.
- دریم لومړیتوب: هغه انتان چې د حرارت د درجې د لوړیدو لامل شوی دی تر درملنې لاندې ونیسي. هغه وخت چې په باکتریايي ناروغیو مشکوک شوی او د خطر کومې نښې یا د کومې بلې شدیدې ناروغۍ د خطر نښې شتون ونلري د وضع شوي تشخیص پر بنسټ باید درملنه د مناسب انټی بیوټیک په وسیله تر سره شي. که چېرې ستاسو تشخیص د پورتنیو تنفسي لارو انتانات یا د بولي لارو انتانات وي -
 - Co-trimoxazole تجویز کړئ. د الف په مل پانه کې الف ۸ جدول ته د معیاري دوز لپاره مراجعه وشي.

یا

○ په هغه صورت کې چې ناروغ د Co-trimoxazole پر وړاندې حساسیت ولري یا له درملنې څخه د ۴۸ ساعتونو له تېریدو وروسته کوم ښه والی نه وي پیدا شوی دویم انتخاب Amoxicillin دی. د الف په مل پانه کې الف ۳ جدول ته د معیاری دوز لپاره مراجعه وشي.

یا

- Penicillin پر وړاندې د حساسیت یا الرژۍ په پېښو کې له Erythromycin څخه ګټه واخلي. د الف په مل پانه کې الف ۱۲ جدول ته د معیاری دوز لپاره مراجعه وشي.
- د وینې د ګلوکوز له کمېدو (Hypoglycemia) څخه د مخنیوي په موخه یا په ماشومانو کې د هغه د درملنې لپاره د بورې له اوبو څخه ګټه واخلي.

د ناروغ لیریدول

- د ډیرو څیړنو لپاره باید ژر تر ژره د اختلاج ټولې پېښې او غیر وصفي ډولونه (د مثال په توګه د اختلاج پرله پسې حملې، د اختلاج له حملې څخه وروسته بشپړ شعور پیدا نشي) روغتون ته ولیردول شي.
- له پنځو کلونو څخه ټول کوچني ماشومان چې مشکوک مننژیت (د سڅا یا التهاب) یا Encephalitis، د IMCI د خطرعمومي نښې یا د شدید ناروغیو نښې ولري، له تثبیت او د انټي بیوټیک د لومړني دوز له تطبیق څخه وروسته دې (Ampicillin له Gentamicin سره، د الف په مل پانه کې الف ۴ او الف ۱۳ جدول ته د معیاری دوز لپاره مراجعه وشي) روغتون ته ولیردول شي.

مخنیوی

د ماشومانو د حرارت د درجې له لوړیدو څخه مخنیوی (له ۳۸.۵ درجې سانتي ګرید یا ددی څخه لوړ) د مرطوبو سفنجونو په وسیله د سرو تطبیقاتو او Paracetamol د توصیه له لارې، په ځانګړې توګه د هغو لپاره چې د اختلاج د حملو پخوانۍ مخینه لري.

ناروغ ته لارښوونې

- د شعور لرونکو ماشومانو لپاره د تغذیې د دوام په موخه د مور یا د ماشوم د څارونکي هڅول
- د شیرګرمو اوبو د تړند او Paracetamol په وسیله د سرو تطبیقاتو له توصیه سره د تېې د تکرار مخنیوی.
- په تود ځای کې د ماشومانو ځای پر ځای کول چې ښه هوا ولري. د ماشوم د اضافي جامو ویستل، د یوې روځای په وسیله د ماشوم پوښول. په هغه صورت کې چې ماشوم د یخې احساس کوي له یوې نازکې لفافې سره د هغه پوښل.
- د بیا ارزونې په موخه له دوو ورځو څخه وروسته د بیا مراجعې لپاره د ماشوم کورنۍ ته توصیه.
- په هغه صورت کې چې په ماشوم کې نوي اعراض پیدا شي یا د ماشوم حالت خراب شي ژر تر ژره د بیا مراجعې لپاره د ماشوم کورنۍ ته توصیه.

۱۷.۲ توخی (Cough)

تشریح

توخی د تنفسی سیستم یوه عکسه یا غبرګون دی چې زیات وخت د تنفسی سیستم د تخریش له امله د انتان، پردی اجسامو یا مزمنو ناروغیو په وسیله را مینځ ته کیږي. توخی د ماشومانو او لویانو یوه معموله نښه ده. توخی زیاتره خفیه وي او په خپله ښه کیږي (زکام). سره له دې چې کېدای شي توخی د جدې یا د ژوند ګواښونکو ناروغیو یوه نښه وي. توخی کېدای شي د یو حاد حالت نښه (لکه د تنفسی لارو حادثانات، پردی جسمونه، سینه بغل، استما یا د زړه د عدهې کفایې له امله د سپري اډیما) یا د مزمن حالت یوه نښه (لکه نری رنځ، د سپري مزمنې استسادي ناروغی یا سرطان) وي.

تشخیص

- یوه مخینه دی واخیستل شي چې د توخي موده او نوری مل موندنی څرگندونکی وي،
 - له دوه اونیو څخه د زیاتي دوامدارې توخی په اړه خبرنه وکړئ.
 - د بلغم د تولیدولو، تېې او کانگو په اړه معلومات واخلي.
 - د توخي ځانګړتیا و ارزوئ (لکه انفرادي توخی، دوامداره توخی، نوبتي توخی "توره توخه")
 - په نري رنځ یا نورو ساري ناروغيو له اخته ناروغ سره د تماس لرلو په اړه پوښتنه وکړئ
 - د ناروغ د معافیت اخیستنې (واکسين) د مخنيې په اړه معلومات واخلي.
- یوه معاینه ترسره کړئ، په ځانګړې توګه له پنځو کلونو څخه په کوچني ماشومانو کې. د IMCI فلپ چارټ ته مراجعه وکړئ څو د شدیدو ناروغيو د خطر علایم او د شدید سینه بغل علایم لکه لاندې څیزونه وپلټئ:
 - د شپږو په څېنلو او رودلو کې کمزورتیا
 - د نه کنټرولیدلو وړ کانګې
 - د اختلاج وروستی حملې
 - بی علاقه توب او د شعور له لاسه ورکول
 - د سینې ننوتل
 - په ارام ماشوم کې ستریدور
 - له دوه میاشتو څخه په کوچنیو ماشومانو کې سینه بغل
- نورې تنفسي موندنې وپلټئ
 - د تنفس عسرت یا Dyspnea: په خپل ساه لږدی باندی پوهه
 - چټک تنفس
 - ۰-۲ میاشتي کوچنیان: په یوه دقیقه کې ۶۰ یا له ۶۰ څخه زیات تنفس
 - ۲-۱۱ میاشتي ماشومان: په یوه دقیقه کې ۵۰ یا له ۵۰ څخه زیات تنفس
 - ۱-۵ کلن ماشومان: په یوه دقیقه کې ۴۰ یا له ۴۰ څخه زیات تنفس.
 - سیانوز، خړېدل، د پوزې الوتل، د غاړې پرسوب، ستریدور، د سینې د ښکني دیوال ننوتل (ماشومان) یا په خوړلو کې کمزورتیا.
 - په مل حالاتو کې لاندې څیزونه شامل دي:
 - ریزش یا والګې
 - سینه بغل: تېه، قیحي بلغم، د سینې رالونه، د تنفسي غړونو کموالی، د "Percussion" یا د قرع په واسطه اصمیت (dullness) (پلورايي انصباب او امپیماید په پام کې وي)
 - ویزنګ: کېدای شي له استما سره یوځای وي یا د سینه بغل، برانشو لیت، ګریپ او د سړي نورو ناروغيو، یا پر سپرو د چینجیو یا پرازیټونو د برغل پړاو (لکه د لوفلر سندروم) یو اختلاط وي.
 - د زړه عدم کفایه: په سړي کې د اضافي مایعې توشون د توخی لامل کېږي.
 - ستریدور: د شقیق په ترڅ کې د هوا د لویو لارو د تنګېدو له امله یو خشن غږ چې د لاندې څیزونو له امله منځته راځي:
 - د پردي جسم انشاق یا ترضیض
 - پیدا شوې اذیمه له: وایرسونو (لکه ګریپ او شری) دیفټري، توره توخه، د حلقوم د شا اېسې، یا انافلکسي.

درملنه

د توخي لامل او له هغه سره د مل حالاتو تشخیص. د عاجلو اهتماماتو آماده کول اود ناروغ لېږدول په هغه صورت کې چې د خطر علایم یا د شدیدو ناروغيو علایم مطرح وي. د نري رنځ د خطرونو پېژندل. د ټولو هغو ناروغانو چې له دوو اونیو څخه زیات توخی لري د نري رنځ د معاینې ټول لپاره روغتون ته استول.

یادښت: باید د پردي جسم په شتون، د حنجرې له اذیمې په ځانګړې توګه هغه ناروغان چې ستریدور لري، ځان ډاډه کړئ.

له درملو پرته درملنه

- ناروغ ته د مایعاتو د اخیستلو، د کافي تغذیې او د مور د شېدو په وسیله د تغذیې دوام په اړه لارښوونه وکړئ.
- د اړتیا په صورت کې ناروغ ته د بستر استراحت.

د درملو په وسیله درملنه

- د اړتیا په صورت کې اکسیجن ورکړئ.
- د زمینه برابرونکې ناروغۍ درملنه وکړئ.

لیږدول

- په سینه بغل اخته له دوه میاشتو څخه کوچني ماشومان
- ټول ناروغان چې دخطر نېنې او تنفسي زجرت لري او هغوی چې:
 - په شدید سینه بغل اخته دي
 - په شدیدې استما اخته دي
 - ټولې پېښې چې د ژوند گواښونکي دي (لکه پردې اجسام)
- ټولې پېښې چې له نري رنځ سره مخ دي یا د هغه اعراض لري په ځانگړې توگه د ناروغ په بلغم کې د وینې شتون یا له دوو اوښو څخه زیات ټوخیدل.
- ټوخی د وزن له کمېدو سره یا د ناروغ په وده کې له کمزورتیا سره.
- هغه ناروغان چې له درملنې سره سره روغ نشي.

مخنیوی

- د ناروغ گوښه کول یا تجرید چې په سینه بغل یا نورو ساري ناروغیو مشکوک وي.
- د معافیت (واکسین) له ورکولو څخه ټولو ماشومانو ته ډاډ (۱۹ څپرکی واکسینونه دې وکتل شي)

ناروغ ته لارښوونې

- د ټوخی کولو د اجتماعي نزاکتونو رعایتول
- د ټوخی پرمهال له نورو څخه د مخ تاوول
- په یوه پاک ټوکر کې ټوخل
- د مایعاتو او ښې تغذیې اخیستل.
- د چای، تودو اوبو، یا ښوروا څښل چې د ستوني د تسکین او د اعراضو د آرامتیا لامل کیږي.
- د پنځو ورځو په ترڅ کې د ارزونې لپاره بیرته راتگ یا د حالاتو د خرابیدو په صورت کې د پنځو ورځو څخه مخکې راتگ
- د ټوخی له ارامونکي درمل یا دودیزو درملو څخه گټه مه اخلئ.

١٧.٣ تبه (Fever)**تشریح**

تبه یو معمول عرض دی چې زیاتره مگر نه تل له انتان سره تړاو لري. تبه په بل عبارت د بدن د حرارت د سانتي گراد له ۳۸ درجو (په مقعدې ناحیه کې) یا د سانتي گریډ له ۳۷،۵ درجو (د خولې او ابطنې په ناحیه کې) لوړیدل تعریف شوې ده. د یوه تشخیص څخه مخکې باید تل د شدیدو ناروغیو نښو ته پاملرنه وشي. تبه یو طبیعي حالت او په ځینو حالاتو کې د انتان پر وړاندې یو کنټر ځواب دی. تبه په یوازې توگه نشي کېدای چې یو تشخیص وي. تبه کولای شي د درد، د عضلاتو درد، د مفصلونو درد، سردرد، بې خوابۍ او په ماشومانو کې د اختلاج لامل شي.

تشخيص

- د تبه موده او ډول مشخص کړئ.
- د موضعي انتان شتون او نښې چې د تبه لامل شوی دی تعین کړی.
- د بدن د تودخې درجه په دقت سره تعین کړی. په هغه صورت کې چې له سیمایي ترمایتر څخه استفاده کوئ د حرارت درجې د معلومولو لپاره لږ تر لږه تر پنځو دقیقو دوام وړکړئ.
- که چېرې ناروغ له پنځو کلونو څخه کوچنی ماشوم وي د IMCI فلپ چارټ تعقیب کړئ او د ډیرو شدیدو ناروغیو علایمو ته پاملرنه وکړئ (مثلاً د خطر د عمومي علایمو نشتوالی) لکه:
 - خوړلو او څښلو ته د ماشوم د لېوالتیا نشتوالی
 - ماشوم په غیر نورماله توګه خویجن وي او په سختی سره وینښیږي.
 - ماشوم شعوري حالت نلري.
 - ماشوم اختلاج لري یا د اختلاج حمله یې تېره کړې ده.
 - ماشوم کانګې کوي یا یې کانګې کړي او د دیهایدریشن له خطر سره مخ دی.
- که چېرې ناروغ له پنځو کلونو څخه کوچنی ماشوم وي د IMCI فلپ چارټ تعقیب کړئ او د شدیدو ناروغیو علایمو ته پاملرنه وکړئ
 - له دوه میاشتني څخه په کوچني ماشوم کې د تنفس چټکوالی (په یوه دقیقه کې ۶۰ نفسه یا تر هغه زیات)
 - د سینې ښکته نوتل: د سینې ښکتنی برخې د ماشوم د تنفس پرمهال داخل لوري ته ځي.
 - د ماشوم د تنفس پرمهال خشن تنفسي اوازونه.
 - بې علاقګي، ژورې شوې سترګې، په څښلو کې کمزورتیا، د جلد یوه ناحیه له کښیکولو وروسته په ورو توګه خپل حالت ته راستنېږي.
 - د غاړې څڅ والی
 - تیاره یا مکدره قرینه یا په خوله کې ژور ټپونه
 - د غوړ تر شا د حساس پړسوب شتوالی
 - د وزن شدید یا د کتنې وړ کموالی یا د پښو اذیمې
 - د لاس د ورغوي د جلد شدید خسافت
- د تبه د لامل او د ستونزې د تشخیص د پیدا کېدو په موخه د موضعي علایمو پلټنه وکړئ. (احتمالي تشخیصونه د قوسونو په داخل کې لیکل شوي دي).
 - د سر شدید درد، د غاړې څڅ والی، کوما (د سحابیا التهاب، د سینوسونو التهاب)
 - د ستوني شدید درد (د بلعوم التهاب، اېسې)
 - د غوړ یا د مستویید هلوکي درد یا د قیق شتوالی (د منځني غوړ التهاب، د مستویید د هلوکي التهاب "Mastoiditis")
 - ټوخی، د سینې د ښکتنی برخې نوتل، چټک تنفس (سینه بغل)
 - ټوخی، دکام (د پورتنی تنفسي لارو وایرسې انتان)
 - د خټې درد، نس ناستی، قضیت (د کولمو او معدې د لارو ستونزې، د پریټان التهاب، محرقه)
 - د ټول پرمهال درد، د ورونو د ناحیې درد، یا دواړه یوځای (د بولي لارو انتان)
 - د مفصلونو یا د هغه شاوخوا درد (اوسټیومیالیتس، د مفصلونو انتاني التهاب)
 - درد، موضعي پړسوب (Cellulitis، اېسه)
- هغه لاملونه چې کېدای شي موضعي علایم ونلري وګورئ.
 - ملاریا - د ملاریا په اندیمیکه ساحه کې ژوند یا د تیرو څلورو اونیو په ترڅ کې سفر کول، پرله پسې تبه، زیری، د وینې کموالی (وینه دې د ملاریا لپاره و ازمایل شي).
 - سپټیمیا - شديده او واضح ناروغی د یو واضح لامل څخه پرته (پروپورا، Petechia، په کوچنیو ماشومانو کې شاک، یا شدید خوارځواکي ماشومان)
 - نری رنځ

- سرطان
 - اندوکارديت، روماتيزم له تبه
 - بروسيلوز
 - د تبه لاملونه چې له جلدي کوچنيو اندفاعاتو سره وي، ودي کتل شي.
 - شری: له ځانگړو کوچنيو اندفاعاتو سره
 - د مننگو کوکال انتان: د Petechial کوچني اندفاعات يا پرپورا
 - وایرسې سندرومونه
- يادونه: په نويو پيدا شويو ماشومانو او زړو کسانو کې کېدای شي تبه شتون ونلري يا د نورو اعراضو لکه گنگسوالی او په تغذيه کې کمزورتيا تر پوښښ لاندې راشي.

درملنه

د تبه د لاملونو د پيدا کولو او د هغه سره سم د هغو د درملنې په موخه د ټولو تبه لرونکو ناروغانو د اعراضو او علايمو معاینه کول.

له درملو پرته درملنه

- په يو تود مگر ښه تهويه شوی ځای کې د ناروغ ساتل.
- له ناروغ څخه د اضافي جامو ويستل.
- ناروغ په يوه روغايي يا يوه سپکه لفافه وپوښی.
- د ناروغ بدن د شيرگرمو اوبو په وسيله تر بند کړی که د کوتی د حرارت درجه د سانتي گريد له ٤٠ درجو څخه لوړه وی.
- په هغه صورت کې چې ناروغ د یخنی احساس کوي يا ريزدي د يوې سپکې لفافې په وسيله د هغه پټول.
- د مايعاتو د ضايع کېدو (Dehydration) مخنيوی، د خوړلي له لارې د مايعاتو اخيستو ته هڅول او د مور د شېدو په وسيله د ماشوم تغذیې ته دوام ورکول.

د درملو په وسيله درملنه

- هغه ماشومان چې له پنځو کلونو څخه کوچني دي او د شديدو اويا ډيرو شديدو ناروغيو علايم ښيي بايد د هغوی د درملنې لومړی دوز د IMCI د فليپ چارټ سره سم تطبيق شي او ناروغ ژر تر ژره روغتون ته وليږدول شي.
- درملنه د ناروغی د لامل له مخې تجویز کړئ (د پيژندو په صورت کې)
- په هغه صورت کې چې تبه له ٣٨.٥ څخه لوړه وي Paracetamol ته د تبه تر کمېدو پورې دوام ورکړئ. د الف په مل پانه کې د الف ١٥ جدول کې دې د معیاری دوز ته مراجعه وشي.
- احتیاط: له پنځو کلونو څخه کوچنيو ماشومانو ته بايد د Rey's Syndrome د رامنځته کېدو له امله Aspirin توصیه نشي.
- انټي بيوتيک يوازې د اړتيا په صورت کې تجویز کړئ.
- د تبه پيژندل شوی لامل د مناسب انټي بيوتيک په وسيله تر درملنې لاندې ونیسئ.
- د تبه د ناپيژندل شويو لاملونو له درملنې څخه د انټي بيوتيک په وسيله ډډه وکړئ.

ليږدول

- د ټولو نويو پيدا شويو ماشومانو ليږدول.
- له پنځو کلونو څخه ټول کوچني ماشومان چې شديد ياد ډيرو شديدو ناروغيو علايم و لری (IMCI)
- ټول ناروغان چې علايم يې په احتمالي توگه شديد وي يا له تبه سره د سحایا د التهاب، زیرې، کوما، سرگنگسوالی، اختلاج يا خبيثه ناروغی و لري.

- د هغو ماشومانو لیردول چې د درملنې سره سره د درې ورځو په موده کې د هغوی تبه نه وي کمه شوې.
- هغه ناروغان چې د سینه بغل شدید علایم ولري.
- هغه ناروغان چې د ژورو برخو د انتان علایم یا اېسه لري - کېدای شي جراحي ته اړتیا ولري.
- توکسیک ناروغان (یعنې هغه ناروغان چې ډیر نا ارامه ښکاري یا د ناارامتیا په لوري پرمخ ځي)
- هغه تنې چې په تکراري توګه رامنځته کیږي (یعنې کمپیري او بیا بیرته زیاتیری)
- هغه ناروغان چې د بطن شدید درد او یا Guarding لري (یعنې د پریټوان التهاب)

مخنیوی

- د شخصي روغتیا ساتنې رعايتول او د لاسونو مینځل.
- د ټوخي د اخلاقو رعايتول (یعنې د ټوخي پرمهال د خولې او پوزې پوښول) څو د ناروغی د هوايي څاڅکو له خپرېدو لکه د پورټیو تنفسي لارو انتانات، سینه بغل، نری رنځ یا شرې څخه مخنیوی وشي.

ناروغ ته لارښونې

- په منظمه توګه د بدن د حرارت د درجې معاینه کول
- کلینیک ته بیا مراجعه کول که چېرې
 - نوی اعراض پرمختیا وکړي.
 - په هغه صورت کې چې له لومړنۍ درملنې سره سره تبه له درملنې وروسته تر درې ورځو دوام پیدا کړي.
- په هغه صورت کې چې د تې لپاره د برابرې ناروغیو لامل پیداشي تر دوه اتلونکو ورځو پورې باید بیا مراجعه وشي. یادښت: هغه ناروغان چې د بیا راتلو توان نلري هغوی تر ۴۸ ساعتونو پورې په کلینیک کې تر خپلې څارنې لاندې وساتئ.

۱۷.۴ د سر درد او نیم سیری (Headach and Migrine)

۱۷.۴.۱ د سر درد (Headache)

تشریح

- د سر درد کېدای شي سلیم یا جدي وي. د سر درد کولای شي جدي وي کله چې یو د لاندې لاملونو سره یوځای وي.
- د سحایا التهاب او انسفالیت
- د وینې د لوړ فشار عاجل حالات
- مغزي سکته (Stroke)
- د مستوتید هډوکي او د منځنۍ غوړ التهاب
- د دماغ تومور
- د وینې کموالی

تشخیص

- د سر دردونه چې د شدیدو نارغیو له امله منځته راځي وي زیاتره له لاندینو عصبي اعراضو او علایمو سره یوځای وي:
- شعوري اختلال
- د حالت یا سلوک بدلون
- د سترګو اختلالات
- ګڼګسوالی
- د سترګې د حدقي بدلونونه او په اندازه کې یی توپیر
- محراقي فلجونه

• اختلاج

• د غاړې شخ والی

• کانګې

• تبه

فشاري (تشن) سردرد د عضلي سېزم او نیم سری (۱۷.۴، ۲) څپرکی "میګرن" له امله د سر د درد د معمولي او بې خطرې له ډلې څخه دی.

درملنه

د درملنې موخه د اصلي لامل پیدا کول او د هغه درملنه او همدارنګه د سر معمولي او بې خطرې دردونو درملنه او عرضی ملاتړ دی.

• ارامونکي تګلارې تدریس کړئ.

• ناروغ ته د کافي مایعاتو د اخیستلو لارښوونه وکړئ.

• د خولې له لارې د Paracetamol د اخیستلو توصیه وکړئ. د الف په مل پاته کې د الف ۱۵ جدول ته د معیاري دوز لپاره مراجعه وکړئ.

لیدول

- د سحایا په التهاب (Meningitis) د شکمن کېدو په صورت کې د درملنې د لومړي دوز له تطبیق څخه وروسته ژر تر ژره روغتون ته ولیرل شي (۷.۲ څپرکی «انسيفالیت او د سحایا التهاب» دې وکتل شي).
- د ماشومانو د سر درد چې له درې ورځو زیات دوام وکړي.
- له عصبي څرګندونو سره د سر درد.
- نوې پیدا شوې سر دردي چې په کاهلانو کې له یوې اونۍ څخه زیات دوام وکړي.

ناروغ ته لارښوونې

ناروغ باید د سر د درد د لاندې ډولونو په اړه له روغتیايي مرکز سره مشوره وکړي:

- چې د معمول په پرتله په پرله پسې توګه پېښ شي.
- د معمول په پرتله ډیر شدت ولري.
- د Paracetamol له مناسبې استفادې سره سره ښه نشي او زیات شي.
- ناروغ پر وړاندې له کار کولو، استراحت یا په نورماله ورځنیو فعالیتونو کې د ګډون خنډ شي.

۱۷.۴.۲ نیم سری (Migraine)

تشریح:

کلاسیک میګرن د سر د اړخونو په ضرباني توګه د درد یوه بڼه ده چې حملې یې په وقفوي توګه پېښیږي او زیاتره په لویانو او تنکیو ځوانانو کې رامنځته کیږي، سره له دې چې د سر ټول ضرباني دردونه د میګرن ځانګړتیا نلري. ناروغان د میګرن یوه کورنۍ مخینه لري. حملې کولای شي له احساساتو او فزیکي فشارونو، کم خوبي یا له بریده زیات خوب، د یو وخت غذا نه خوړل، ځانګړې خوراک لکه چاکلیټ، الکولی مشروبات، د حیض دوره، یا د حمل ضد د ټابلیټونو د ګټې اخیستنې په وسیله شدت پیدا کړي (۱۸ څپرکی «کورنۍ تنظیم» دې وکتل شي).

تشخیص

- د سر څرېکه وهونکې دردونه (ضرباني).
- زړه بد والی، کانګې، له رڼا او غږ څخه ویره.

- کېدای شي چې ژر تیریدونکي عصبي اعراض هم شتون ولري (ممو لا بصري اعراض).

درملنه

له درملو پرته درملنه

ناروغ ته له تشدیدونکو لاملونو څخه د لرې والي لپاره توصیه.

د درملو په وسیله درملنه

د درملو په وسیله په احتمالاتو کې د حملو مخنیوی او د ناروغی د حادو حملو درملنه شامله ده (یعنې عرضي درملنه)

- د ناروغی د یوې حادی حملې درملنه

○ Aspirin له ۳۰۰-۹۰۰ میلی گرامه له هرو څلورو ساعتونو څخه تر شپږو ساعتونو وروسته د اړتیا پر مهال.

احتیاط: له پنځو کلونو څخه کوچنیو ماشومانو ته د Reye's syndrome د راپیدا کېدو له امله باید Aspirin توصیه نشي یا

○ Paracetamol. د الف په مل پانه کې الف ۱۵ جدول ته د معیاری دوز د مطالعې لپاره مراجعه وکړئ.

یا

○ Ibuprofen (۴۰۰ میلی گرامه ټابلیټ): د لویانو لپاره د اړتیا پر مهال هر شپږ ساعته وروسته یو ټابلیټ.

له-

○ له قحف څخه بهر درگونو د تقبض (Extracranial vasoconstriction) وړکولو په وسیله درملنه Caffeine ۱۰۰ میلی

گرامه له Ergotamine tartrate یو میلی گرام: د سر دردی د حملې پر مهال یو یا دوه ټابلیټه چې له هرو ۳۰ دقیقو

وروسته تعقیبېږي، د اړتیا په صورت کې د هرې حملې پر وړاندې تر شپږو ټابلیټونو یا د یوې اونی په ترڅ

کې ۱۰ ټابلیټونه اخیستل کېدای شي. (په هغو روغتیايي مرکزونو کې چې بنسټیز روغتیايي خدمتونه وړاندې کوي،

شتون نلري).

- وقایوې درملنه: په هغه صورت کې چې په یوه میاشت کې له ۲-۳ بریدونو نه زیات شمېر بریدونه وشي او د کس

نورماله ژوند له ګواښ سره مخ کړي، وقایوې درملنې ته اړتیا پیدا کېږي. درملنه باید د یو متخصص په وسیله تر سره

شي چې ناروغ ورته ولېږل شي. معمولاً لاندې درمل تجویزېږي.

○ Propranolol له ۲۰ څخه تر ۴۰ میلی گرامه ورځنۍ معمولي دوزونه ورځ کی دوه ځلې (۸۰ تر ۲۴۰ میلی

گرامه ورځنۍ اعظمي دوز) (ولسوالی د روغتون تر کچې شتون لري)

○ Amitriptyline ۱۰ نه تر ۱۵۰ میلی گرامه (په جامع روغتیايي مرکزونو او د ولسوالیو په روغتونونو کې شتون لري).

○ Imipramine ۱۰ نه تر ۱۵۰ میلی گرامه. (په هغو روغتیايي مرکزونو کې چې بنسټیز روغتیايي خدمتونه وړاندې

کوي، شتون نلري)

۱۷.۵ زیری (Jaundice)

تشریح

زیري هغه حالت دی چې په هغه کې پوستکی، ورغوي او سترګې زیر رنگ غوره کوي. دا حالت د عضویت په نسجونو

کې د بیلیروبین د راټولیدو په پایله کې د هغه په تولید کې د زیاتیدو له امله (لکه هیمو لایسز) یا د هغه د اطراح کېدو د

پروسې د کموالي له امله (د ځګر او صفراوي ناروغی) پېښېږي. تر هغه وخته چې د بیلیروبین کچه په هر ډیسي لیتر کې

له درې ملي گرامو څخه زیات نشي زیری له کلینیکي پلوه د پېژندنې وړ نه وي، د بیلیروبین نورماله کچه په هر ډیسي

لیتر کې ۱.۲ میلی گرامه وي. په نویو پیدا شویو ماشومانو کې خفیف زیری کولای شي چې د زیریدو وروسته له ۵-۲

ورځو د نورو لاملونو له ردولو سره په فزیولوژیکه توګه رامنځته شي. د زیري نورټول ډولونه په نویو پیدا شویو ماشومانو

کې د Kernicterus (په مغز کې د بیلیروبین د کچې لوړیدل) د اختلاط د مخنیوي په موخه باید ولېږل شي، ولی چې

دا اختلاط د عصبي اختلاطاتو یا مېنې لامل کېدای شی. د زیري ټول ډولونه که په ماشومانو کې وي یا په لویانو کې

باید د تېستونو د تر سره کولو او د هغو د ممکنه لاملونو درملنې په موخه لکه د څگر التهاب، د صفراوي لارو انسداد او ناروغي، هیمولایز یا شدید انتانات، ولیرل شي.

تشخیص

- فزیولوژیک زېړی له ۵۰ سلنې څخه زیات په نورماله نویو پیدا شویو ماشومانو کې او له ۸۰ سلنې څخه زیات له وخت څخه په مخکې نویو پیدا شویو ماشومانو کې رامنځته کیږي. د فزیولوژیک او خفیف زېړي د تشخیص لپاره باید لاندې شواهد وپلټل شي.
- دا حالت له زیږون څخه وروسته له ۵-۲ ورځو کې څرگندیږي او د ۱۴ ورځو له تیریدو وروسته په داسې حال کې چې ډیر خفیف دی، له منځه ځي.
- د ګوتې په وسیله د نوي پیدا شوي ماشوم د وچلې یا تندې د برخې په جلد کې ورو فشار وارد کړئ او د ګوتې له لرې کولو وروسته به په ساحه کې ستاسو د ګوتې نښه د سپین رنگ پرځای په زېړ رنگ څرګند شي.
- غیر نورماله یا غیر فزیولوژیک زېړي په نویو پیدا شویو ماشومانو کې د لاندې ځانګړتیاو په وسیله څرګندیږي.
- له زیږیدو وروسته د ۲۴ ساعتونو په ترڅ کې یا د ژوند له ۱۳ ورځې وروسته زېړی پیدا کیږي.
- زېړی له دوه اونیو څخه زیات دوام کوي.
- په پوستکي او سترګو کې ژور زېړوالی پیدا کیږي.
- زېړ زېړی د لاسونو او پڼو په ورغویو کې ښه څرګندیږي.
- د نویو پیدا شویو ماشومانو اختلاج یا بې نظمي د مغز په داخل کې د بیلروبین د داخلیدو څرګندوی وي.
- د انتان او د خطر د علایمو شواهد یا دواړه کېدای شي شتون ولري.
- احتیاط: له نویو پیدا شویو ماشومانو پرته زېړی په لویانو او نورو ماشومانو کې غیر نورماله دی.

درملنه

له درملو پرته درملنه

د نور په وسیله درملنه (فوتوتراپی) د نوي ماشومتوب په زېړي کې (فزیولوژیک زېړی) یا د ونې بدلول (په شدیدو زېړيو کې) کولای شي چې ګټور وي. په شونې وخت کې باید ناروغ د تشخیص او درملنې لپاره ولیرل شي. د مور د شېدو په وسیله نورماله تغذیې ته باید د ماشومانو لپاره دوام ورکړل شي.

د درملو په وسیله درملنه

- د ماشومتوب په دوره کې پر انتان د شکمنېدو په صورت کې انټي بیوټیک توصیه کړئ.
- د سیسېس په شان بې درملنه وکړئ (۱۵.۶ څپر کې "Sepsis")
- وي لیږئ.
- د خارښ لپاره Chlorpheniramine په هغه صورت کې توصیه کړئ چې تشخیص معلوم وي او کوم مضاد استطبابت شتون ونلري.
- ماشومان: د الف په مل پانه کې د الف ۷ جدول ته د معیاري دوز لپاره مراجعه وشي.
- لویان: څلور میلی ګرامه هر اته ساعته وروسته

لیږدول

- د ټولو لویانو او ماشومانو لپاره د تشخیص او درملنې ټاکل.
- ټول هغه ماشومان چې د غیر فزیولوژیک زېړي شواهد ولري.
- هغه ماشومان چې د فزیولوژیک زېړي شواهد ولري، که چېرې شوني وي د بیلروبین د سوبې د ارزونې او د درملنې د ټاکنې لپاره.

مخنیوی

- له خطر څخه د ډکرو امیندواریو او له زیږون څخه د مخکې څارنو په وسیله د ماشومانو د اختلاطاتو پیژندنه (۹.۱) څپرکي "امیندواري او له زیږون څخه مخکې څارنی" دې وکتل شي او د روغتونیزو اساسي خدمتونو د وړاندې کولو په مرکزونو کې زیږون.
- د نوي پيدا شوي ماشوم پر وخت د لیږلو په وسیله د نویو پيدا شویو ماشومانو د شدیدو زیږیدو له اختلاطاتو څخه مخنیوی.
- د نوي ماشومتوب د زیږي د لاملونو او سیسېس د علایمو د پیدا کولو لپاره پلټنه.
- د الکولو له خنبلو څخه ډډه کول چې په لویانو کې د ځگر د التهاب یا سیروز په وسیله د زیږي د پیدا کېدو لوی لامل دی.

ناروغ ته لارښونې

- هغه نوي پيدا شوی ماشومان چې په کور کې درملنه کیږي په هغو کې دې شدت او اختلاطات له نږدې څخه وڅارل شي.
- د مور د شېدو په وسیله له تغذیې څخه ملاتړ په ځانګړې توګه له وخت څخه په مخکې نویو پيدا شویو ماشومانو کې چې د زیږي د ودې له ډیر خطر او د زیږي له اختلاطاتو سره مخ دي.

۱۷.۶ د سینې درد (Chest Pain)

تشریح

- د سینې درد (یا د سینې نا آراموالی) یو معموله عرض دی چې د زړه او رګونو، د سرو، د پلوراد مري، د معدې او کولمو (هضمي) یا اسکېټي عضلې تشوښاتو، د پوستکي ناروغیو، یا د اضطراب په پایله کې پېښیږي. کېدای شي د تیز یا تیره، مبهم، سوزیدونکی یا د فشار د احساس په بڼه توضیح شي.
- د سینې له نا آراموالي څخه د شکایت کوونکي ناروغ په ارزونه کې باید لاندې څیزونه شامل وي.
- د چټکو اهتماماتو د خونديتوب برنامه و ارزوئ.
- تشخیص معین کړئ.

تشخیص

د سینې د درد د لامل د پیژندلو لپاره ۱۷.۶ جدول ته دې مراجعه وشي.

۱۷.۶ جدول. د سینې د حاد نا اراموالي د معمولو لاملونو وصفی کلینیکي څرگند یدنې

حالات	کیفیت	موقعیت	مل څرگندېدنې
Angina pectoris (۶.۴ څپرکی دې وکتل شي)	فشار، زړه تنګوالی، د ټینګ نیولی او د دروندوالي احساس، سوی چې له دوو څخه تر لسو دقیقو دوام کوي.	د قص یا د سینې د هلوکي تر شا، غالباً غاړې، ژامې، اوږو او مټو ته خپرېږي. زیاتره کبې لوري ته	د فزیکي کار، د سړی هوا سره په مخامخ کېدو او د روحي فشار په وسيله منځته راځي. د استراحت او Nitroglycerine اخیستو په وسیله آرامېږي.
د زړه د عضلې حاده احتشا (۵.۶ څپرکی دې وکتل شي)	د Angina په شان مګر له ډیر شدت سره چې غالباً له ۳۰ دقیقو څخه زیات دوام کوي.	Angina ته ورته	د استراحت او Nitroglycerine اخیستو په وسیله نه آرامېږي. کېدای شي د زړه له عدم کفایي یا اریتمیا د شواهدو سره مل وي.
سینه بغل (۳.۳) څپرکی دې وکتل شي)	د سینې د قفس تیز درد چې له ساه اخیستلو سره شدت پیدا کوي.	یو لوري ته، زیاتره موضعي.	تنفسي ستونزه یا Dyspnea توخی ته تنفسي رالونه
نموتوراکس	ناڅاپي حملې، چې څو ساعته دوام کوي.	د سینې په اړخ کې، هغه خوا کې چې نموتوراکس رامنځته شوی وي.	ستونزمن تنفس یا Dyspnea د تنفسي اوازونو کموالی.
مري یا معدې معایې (۲.۲ څپرکی "د پټیک ټپ ناروغي دې وکتل شي")	سوزېدونکی	د اپی گسټریک ناحیه؛ تر قص لاندې	د خوړو او انټي اسید له اخیستلو سره آرامېږي.
د صفرا د کڅوړې ناروغي (۱۶.۲.۲) څپرکی دې وکتل شي)	سوزېدونکی، فشار ورکوونکی	د اپی گسټریک ناحیه د ښي لوري پورتنۍ څلورمه برخه، تر قص لاندې.	کېدای شي له خوړو په ځانګړې توګه د غوړو خوړو څخه وروسته.
اسکلېتي عضلې ناروغي	درد	بدلېدونکی	د موقعیت له بدلولو یا موضعي فشار په وسیله د معاینې پرمهال زیاتېږي.
د هر پس زوستر- پوسټی ناروغي.	تیز او سوزېدونکی	د پوستکي له پاسه خپرېږي. یا په معینه درماتوم کی خپرېدنه	پر نا ارامه ناحیې د ویزیکلې اندفاعاتو موجودیت

درملنه

له درملو پرته درملنه

- د ټولنو څخه زیات د اهمیت وړ مسئله د سینې د درد د ژوند گواښونکی لاملونو لکه صدري خناق، د زړه د عضلې احتشا یا نموتوراکس له منځه وړل دي. په هغه صورت کې چې له دې تشخیصونو څخه پر یوه یې شکمن وي، ناروغ عاجلو لیرلو ته اړتیا لري.
- پرته له دې، د سینې د درد درملنه د ناروغیو د لامل پر بنسټ تر سره کیږي.

د درملو په وسیله درملنه

- په هغه صورت کې چې په صدري خناق یا د زړه د عضلې پر احتشا شکمن یاست Acetylsalicylic acid (له ۸۱ څخه تر ۳۲۵ ملي گرامو) روغتون ته له لیرلو مخکې توصیه کړئ. ناروغ د Nitroglycerine په وسیله د درملنې او ارزونې لپاره روغتون ته لیرلو ته اړتیا لري.
- په هغه صورت کې چې د سینې په خناق یا د زړه د عضلې په احتشا شکمن یاست او د ناروغ د وینې فشار له ۱۰۰/۱۶۰ څخه لوړ وي د Captopril یو ټابلیټ (۲۵ میلی گرامه) له لیرلو څخه مخکې د شتون په صورت کې د خولې له لارې ناروغ ته تجویز کړئ.
- په هغه صورت کې چې د مري په التهاب یا په پیټیک ټپ په ناروغی شکمن یاست له انټي اسید څخه ګټه واخلي: Aluminum Hydroxide + Magnesium Hydroxide، له ۴-۲ ټابلیټونو د ژولو وړ د خولې له لارې.

لیردول

- د صدري خناق، د میوکارد د احتشا، نموتوراکس، یا د شدید سینه بغل ټولې پېښې عاجلې لیردونې ته اړتیا لري.
- په هغه صورت کې چې د زړه د عضلې په احتشا شکمن یاست ناروغ د امکان په صورت کې د هغه ترانسپورټ په وسیله چې اکسیجن ولري ولیرئ.
- په هغه صورت کې چې د انټي اسید د درملنې په وسیله د مري د التهاب پېښې یا د پیټیک ټپ پېښې ښې نشي ناروغ د ډیرو معایناتو لپاره ولیرئ.

مخنیوی

زیاتره د سینې درد د مري د ریفلکس یا تشوشاتو په پایله کې پیدا کیږي له دې امله د ترخو (مساله لرونکی) او غوړو خوړو له اخیستلو څخه ډډه کول مرسته کولای شي.

ناروغ ته لارښوونې

- هغه ناروغان چې خفیف اعراض لري باید وهڅول شي چې د هغو فعالیتونو د مخنیې په اړه چې د درد د راپیدا کېدو لامل کیږي، معلومات ورکړي ځکه د تشخیص لپاره اهمیت لري. د مثال په توګه آیا اعراض د فشار، د خوړو د اخیستلو یا ټوخی په وسیله شدیدېږي؟
- هغه ناروغان چې خفیف او کم اعراض لري کولای شو هغوی د انټي اسید په ورکولو سره و ازمایو چې ایا ګټور دي. د ټولو پېښو ناروغان باید د بیا ارزونې لپاره مراجعه وکړي.

۱۷.۷ قبضیت (Constipation)

تشریح

قبضیت د تغوط په فعل کې له ځنډ یا ستونزو څخه عبارت دی. د تغوط تکرار په اونۍ کې له درې ځله کم په هر عمر کې چې وي، غیر نورماله دی. په ماشومانو کې زیاتره قبضیت وظیفوي (غیر عضوي) وي. په ځینو پېښو کې، عضوي قبضیتونه (د مقعد تضیق، د "Hirschprung diseases" هایپوټایروډیزم، دماغی فلج یا د ځینو درملو لکه نارکوتیکونو

څخه وي.

يادښت: په لويانو کې د قبضيت پر نويو حملو بايد شکمن شو چې کېدای شي د کولون سرطان يوه نښه وي.

تشخيص

- د ناروغ مخينه چې لاندې څيزونه په کې شامل دي، واخلئ:
 - کورنۍ مخينه، روحي حالت، په ښوونځۍ کې کړنې او درمل.
 - د عمر له مخې د اعراضو پيل (لکه نوي پيدا شوي ماشومان چې تر ۴۸ ساعتونو له زيږيدو وروسته ونشي کولای ميکونيم طرحه کړي کېدای شي چې د هر شپږونگ ناروغي ولري).
- يوه مقعدي او عجاني معاينه د عجان د احساس د ارزونې، د مقعدي عضلاتو د تون يا خواکمنتيا، د ريکتم د اندازې او د مقعد د خلاصيدو او بنديدو په موخه تر سره کړئ.

درملنه

له درملو پرته درملنه

- ناروغانو ته بايد د ساده قبضيتونو د سليم خاصيت څخه ډاډ ورکړل شي او ماشومانو ته بايد د نورماله تغوط عادت ورکړل شي، لاندې څيزونه دې توصيه شي.
- د زياتو مايعاتو اخيستل (لږ تر لږه په ورځ کې له شپږ څخه تر اتو گيلاسو)
 - له فايبر څخه بډايه خوراکي رژيم، کافي سيوس لرونکي وړه، ميوه جات او سبزيجات.
 - د ټټي د منظم تللو لپاره د مناسب عادت او سلوک تغيرات راوستل. ماشومان بايد د ټټي تللو ته پرته له ځنډ يا چټکۍ په منظمه بڼه وهڅول شي.
- يادونه: له اندازې څخه د زياتو شېدو څښل کېدای شي قبضيت زيات کړي.

د درملو په وسيله درملنه

په هغه صورت کې چې له درملو پرته اهتمامات بريالي نه وي د خولې له لارې درمل د يوې اونۍ لپاره تر ازمائښت لاندې ونيسئ، لاندې درمل توصيه کړئ.

- د منرال غوړي (Mineral oil)

- يا -

- Magnesium Hydroxide

- پنځه کلن يا له هغه کوچني ماشومان: له ۵-۱۵ ميلي ليتره په ورځ کې يوځل د خولې له لارې.
 - له ۶-۱۲ کلونو ماشومانو: له ۱۵ - ۳۰ ميلي ليتره د خولې له لارې.
 - له ۱۳-۱۸ کلونو ماشومانو: د ډولو وې شپږ ټا بليټونه په ورځ کې يوځل.
 - لويان: د ډولو وې له ۸-۶ ټابليټونو په ورځ کې يوځل.
- احتياط: شېدو ورکونکو او اميندواره ميندو ته بايد د Magnesium Hydroxide له ورکولو څخه ډډه وشي.

- يا -

- Lactulose (د سهار په جاي کې له ۱۵ - ۳۰ ميلي ليتره)

- يا -

- Bisacodyl ټابليټ (له ۵ - ۱۰ ميلي گرامه د شپې پرمهال او د خواب سره سم تنظيم شي) د لويانو او ماشومانو لپاره چې له شپږ کلونو څخه لوی دي (بايد په عامه توگه له شپږ کلونو څخه د کوچنيو ماشومانو لپاره ډډه وشي) په هغه صورت کې چې له استراحت څخه مخکې واخيستل شي د قبضيت د رفع کېدو توقع له ۱۲-۸ ساعتونو پورې کيږي.
- Saline له امالي، د منرال د غوړو له امالي او Suppository glycerin څخه د کلکو شويو غايطه موادو لپاره په مقعد کې د هغې تر شپږې تخلصې پورې گټه واخلئ.

لېږدول

- هغه ناروغان چې د درملنې پر وړاندې خواب نه ورکوي د ډیرو معایناتو لپاره ډې ولیرل شي.
- هغه نوي پیدا شوي ماشومان چې د غایطه موادو په تولید کې یې وسه پاتې شي باید ولیرل شي.

ناروغ ته لارښوونې

- له فابیر څخه د بډایه خوراکي رژیم څخه ځنډ واخلي.
- له کافي مایعاتو څخه ځنډ واخلي.

۱۷.۸ زړه بدوالی او کانګې (Nausea and Vomiting)

تشرېح

زړه بدوالی د کانګو یو مبهم او ناغوښتونکی احساس دی. زړه بدوالی زیاتره د کانګو په وسیله تعقیبېږي چې د خولې له لارې د معدې د محتویاتو د خالي کېدو لامل کیږي. کانګې کېدای شي یوازې وي یا له نورو شدیدو ناروغیو سره مل وي. له هغه ناروغ سره چې کانګې کوي د چلند په تګلاره کې د لاملونو او مل ناروغیو پیژندل او د دېهاېدریشن چټکه درملنه په ځانګړې توګه له پنځو کلونو څخه په کوچنیو ماشومانو کې شامل دي.

تشخیص

- د ناروغ د طبي مخینې او د هغه د ناروغیا ترمنځ یوه لړۍ یا سلسله رامنځته کړئ. د دېهاېدریشن کچه و ارزوئ (۲.۱) څپرکی، دېهاېدریشن او نس ناستی ډې وکتل شي. مل اعراض او علایم وپېژنئ:
- د ناروغ د تېې د لرلو په صورت کې لاندې انتانات وګورئ:
 - د سحایا التهاب - د غاړې شخ والی، د فانتا نل وتل (په شپږو خوړونکو کې)
 - د معدې او کولمو التهابات (ګاستروانتریت)
 - سینه بغل - پوڅی، رالونه (یعنې کرکل)
 - د بولي لارو انتانات - د ټول ستونزه، په فلا نکونویا په اړخونو کې درد
 - هیپاتیت - د څګر غټ والی، حساس څګر، زېړی.
 - د پریټون تخریشات - بطني حساسیت، ګارډینګ او Rebound، د کولمو د اوزونو کموالی (لکه اپنډیسیت، د صفرا د کڅوړې التهاب، د پانقرانس د غدې التهاب).
- په هغه صورت کې چې ناروغ د مرکزي عصبي سیستم د اختلالاتو یا د قحف د داخل د فشار د لوړیدو حکایت کوي باید د سحایا التهاب، دماغي ملاریا، میګرن، سرګرځېدلو یا د داخلي غوړ التهاب، د سر تړلي ترضیضات یا تومورونو ته پاملرنه وشي.
- د قبضیت په شتون کې د کولمو انسداد وګورئ، د بطن پراخوالي یا توسع او د کولمو د حرکت د آوازونو لوړیدلو ته پاملرنه وکړئ.
- د نس ناستی د شتون په صورت کې د کولمو معدې پرازیتونه یا سیستمیک انتانات وګورئ.
- سیستمیک یا استقلابي اختلالات کولای شي چې د امیندواری، اسیدوز یا د بایټي کیتواسیدوز یا یوریمیا نېټې څرګند کړي.
- هغه پېښې چې له وینې راتلې سره وي (هیماتیمیز یا د خولې له لارې د وینې راتلل) د معدې التهاب (Gastritis) د معدې او مري د مخاطي طبقې ټپونه یا څیریدل په پام کې ولرئ.
- د زیان رسونکو توکو تیرول لکه د درملو ډولونه، الکول، مخدره مواد، د زهرو ډولونه یا د خوراکي توکو توکسینونه کولای شي چې له زړه بدوالی کانګو سره مل وي.

درملنه

درملنه باید د لاملونو پر بنسټ تر سره شي؛ پورته ذکر شوې ناروغی د لاملونو د تشخیص لپاره وګورئ.

له درملو پرته درملنه

- په هغو ناروغانو کې چې د پړيتوان التهاب، د کولمو انسداد يا شديدې ناروغۍ لري او لږولو ته اړتيا لري د خوراک خوړلو څخه ډډه کول.
- هغه وخت چې ناروغ د خوراک لپاره په ازماينېتي توګه چمتو شو له کم کچې څخه په تکراري توګه او د مايع لرونکو خوړو لکه (د خښلو پاکي اوبه، بنبروا، چای، يا سوپ) او وچ خواړه لکه (ږوږی، وريژې او سوډا کرکرز) څخه دې پيل وشي

د درملو په وسيله درملنه

- د ديهایدريشن درملنه وکړئ او د ناروغ قابليت د خولې د مايعاتو د اخيستلو لپاره ځواکمن کړئ.
 - د هغو کسانو لپاره چې د خولې له لارې د اخيستلو زغم لري له او آراس څخه ګټه واخلي (۲.۱ څپرکي "اسهالات او ديهایدريشن" د الف مل پاڼه وګورئ).
 - د ورید د داخل مايعات په لاندې څيزونو کې ورکړئ.
 - هغه ناروغ چې د خولې له لارې د مايعاتو د اخيستلو وړتيا نلري، د شعور کموالی لري، يا د جراحي عمل لپاره يو شوني حالت لري.
 - هغه ناروغ چې ديهایدريشن و لري. له Ringer lactate محلول (Hartmann's solution) څخه ګټه واخلي د هغه د نشتون په صورت کې د Normal saline (۹، ۰، ۰، ۰ سلنه) محلول څخه ګټه واخلي (۲.۱ څپرکي "اسهالات او ديهایدريشن" د ديهایدريشن د شدت د اټکلولو پر بنسټ د ج او ب برنامه وکتل شي)
 - ناروغ ديهایدريشن نلري مګر د خولې له لارې مايعات نشي اخيستلی.
 - د مايعاتو د تجويز يوه مناسبه اندازه په پام کې ونیسئ: ساتندويه يا ميتېټاناس+ د کانګو او نس ناستي د ضايع کونکو مايعاتو معاوضه.
 - د کانګو ضد درمل څخه ګټه واخلي: Metoclopramide
 - احتياط: بايد په ياد ولرئ چې د کانګو، درملنه د هغه د لامل پر بنسټ تر سره کړئ.
 - ماشومان: له ۰.۱ تر ۰.۲ ميلي ګرامه د بدن د وزن پر هر کيلو ګرام عضلي زرق يا
 - له ۰.۱ تر ۰.۲ ميلي ګرامه د بدن د وزن پر هر کيلو ګرام د خولې له لارې هر اته ساعته وروسته د کانګو تر درېدو پورې (اعظمي دوز يی ۱۰ ميلي ګرامه پر دوز دی)
 - لویان: ۱۰ ميلي ګرامه عضلي زرق يا
 - لس ميلي ګرامه د خولې له لارې هر اته ساعته وروسته د کانګو تر درېدو پورې.

ليږدول

- ليږل په لاندې حالاتو کې استعباب لري:
 - ناروغ يوه ممکنه جراحي ستونزه لري لکه د کولمو انسداد، د پړيتوان التهاب يا په کانګو کې وینه لري.
 - منځنۍ او شديده د يهايدريشن په ځانګړې توګه له پنځو کلونو څخه په کوچنيو ماشومانو کې (د IMCI فليپ چارټر دې وکتل شي)
 - ناروغ د شديدو ناروغيو يا شديدو انتاناتو شواهد ولري لکه شاک، سپټيسميا، سينه بغل، د سحاي التهاب، د مرکزي عصبي سيستم اختلالات، زيری، اسيدوز (دبايټيک يا نور استقلابي اختلالات) يا د امېدواری اختلاطات.
 - اعراض له يوې اونۍ څخه زيات دوام وکړي.
 - هغه کوچنی ماشوم چې فوراني کانګې ولري.
 - که تا سو نور پېچلی يا واضح سببونه تشخيص کړي چې په لوړه کچه درملنې ته اړتيا لري.
 - اعراض د پيل شوې درملنې پر وړاندې مقاومت کوي يا شديد شوي وي.

ناروغ ته لارښونې

- ناروغ ته ډاډ ورکول چې د کانګو زیاتره پېښې خپله ښې کیږي
- ناروغ ته سپارښتنه وکړئ چې د خپل وضعیت د ښه کېدو وروسته خپل خواږه ورو ورو زیات کړي.
- ناروغ ته سپارښتنه وکړئ په هغه صورت کې چې کانګې یې دوامداره شوی یا د دیهایدریشن نوي اعراض او علایم پیدا شول ژر تر ژره د ۴۸ ساعتونو په موده کې دې کلینیک ته مراجعه وکړي.

اعراض او علایم

اتلسم څپرکی د زېږون ترمنځ د واټن ورکولو لپاره کورني تنظيم FAMILY PLANNING FOR BIRTH SPACING

۱۸.۱ د کورني تنظيم د تگلارو د کارولو لپاره چمتو والی (Preparing to Use a Family Planning Method)

تشرېح

د زېږون ترمنځ د واټن لپاره کورني تنظيم مېرمنې او خاوند ته اجازه ورکوي خو په هغه وخت کې ماشوم ولری چې امیندواری، زېږون او شېدې ورکول د مور او ماشوم لپاره ډیر کم خطر ولري. په همدې توګه د زېږون ترمنځ واټن باید لږ تر لږه درې کاله وي خو د مور او ماشوم لپاره د غیر اړینو ګواښونو مخنیوی وشي.

درملنه

د مېرمنې او خاوند لپاره د کورني تنظيم له مشورې ورکولو څخه په موخه کې د کورني تنظيم د تگلارو په اړه د هغوی تصمیم نیول شامل دي چې نه یوازې موثره او مصونه دی بلکې د دوی د پاره د منلو وړ هم دی (موجودې تگلارې په ۱۸.۱ الف جدول کې طرحه شوي دي).

■ د کورني تنظيم په موخه لومړی ګام د مېرمنې او خاوند د اړتیاو ارزونه ده. د مېرمنې او خاوند خبرو ته د کورني تنظيم په هکله د هغوی د لېوالتیا په اړه غور کېږي. د مېرمنې او مېړه له لوري د کورني تنظيم د موجوده تگلارو په اغېزمنتوب له پوهېدو څخه ځان ډاډه کړي.

۱۸.۱ الف جدول. د کورني تنظيم موجودې تگلارې او د هغوی اغېز

تگلاره	اغېز لړل	څپرکي ته مراجعه
- د داخل رحمی اله (IUDs) - دایمی تگلارې	ډیر زیات اغېز لري	۱۸.۲.۵ - په دې معیاري درملنې لارښود کې نه ده ځای پر ځای شوې
- زړي تگلارې - د شېدو ورکولو او د مياشتني عادت نه راتللو تگلاره (LAM) - له امیندواری څخه د مخنیوي فمي ترکیب (COC) - په یوازې توګه Progestron ټابلیټونه (POP)	ډیر اغېز لري	۴.۲.۱۸ ۶.۲.۱۸ ۲.۲.۱۸ ۳.۲.۱۸
- Condom - د امیندواری کیدو د پاره د پوهاوی کړنلاره (FAMs)	اغېزمن دی. که هر ځل په سمه توګه وکارول شي	۱۸.۲.۱ ۷.۲.۱۸
- د قطع کولو تگلاره - د سپرم له منځه وړونکي درمل	لږ اغېز لري	۱۸.۲.۸ ۹.۱۸.۲

د مېرمنې د امیندواړه کېدو د وضعیت پېژندنه
د کورني تنظيم لپاره په مشوره ورکولو کې راتلونکي ګام د موجوده امیندواری ردول دي. د ۱۸.۱ ب جدول د مناسبې پوښتنې پوښتل په مناسب لوري له تاسو سره مرسته کوي. له لومړۍ ګڼې پوښتنې څخه پیل او د نه ځواب د تر لاسه کولو په صورت کې راتلونکو پوښتنو ته دوام ورکړئ خو د هو ځواب تر لاسه کړئ. که چېرې مېرمنې ستاسو ټولو پوښتنو ته منفي ځواب ورکړي د هغې په امیندواړه کېدو ګومان وکړئ. که چېرې تاسو یو مثبت ځواب «هو» تر لاسه کړي، د امیندواری د اعراضو او علایمو د ردولو د روښانتیا لپاره د ۱۸.۱ ج جدول ته مراجعه وکړئ.

۱۸.۱ ب جدول. د امیندواری ردول

پوښتنه	هو	نه
۱ آیا تاسو شپږ میاشتي مخکې ماشوم درلود او یا په بشپړه توګه یا څه ناڅه خپلې شېدې مو هغه ته ورکولې، او آیا په خپله میاشتي دوره کې مو وینه راتله نه لرله؟		
۲ آیا د خپل وروستي میاشتي عادت له مودې څخه یا د خپل ماشوم د زیږون له مودې څخه مو په بشپړه توګه له جنسي مجامعت څخه ډډه کړې ده؟		
۳ آیا له یوې تیرې میاشتي څخه په کمه موده کې مو کوم نوی پیدا شوی ماشوم درلود؟		
۴ آیا ستاسو تیر میاشتي عادت د تېرو اوو ورځو په ترڅ کې پیل شوی وو (په هغه صورت کې چې د رحم د ننه د آلې د تگلارو څخه د ګټې اخیستنې غوښتنه لري د ۱۲ مخکینو ورځو په ترڅ کې دې د وینې راتلنې پوښتنه وشي)؟		
۵ آیا د تېرو اوو ورځو په ترڅ کې مو کوم سقط درلود (په هغه صورت کې چې د رحم دننه د آلې د تگلارو څخه د ګټې اخیستنې غوښتنه لري د ۱۲ مخکینو ورځو په ترڅ کې دې د وینې راتلنې پوښتنه وشي)؟		
۶ آیا د امیندواری د مخنیوي له تگلارو څخه مو په بریالۍ او سمه توګه استفاده کړې ده.		

۱۸.۱ ج جدول د امیندواری اعراض او علایم

له مېرمنې څخه د لاندې څیزونو د احساسولو په اړه پوښتنې وکړئ	
زړه بدوالی په ځانګړې توګه د سهار لخوا	د ټول د دفعاتو زیاتوالی
د تیو حساسیت	د بوي پر وړاندې د حساسیت زیاتوالی
له نورماله حد څخه زیات ستومانتیا	په نامعلومه توګه د سلوک بدلون
کانګې	د وزن زیاتیدل

لږ تر لږه د ۱۸.۱ ب په جدول کې د یوه مثبت ځواب په تر لاسه کولو یا د ۱۸.۱ ج په جدول کې د امیندواری د اعراضو او علایمو په نشتوالي سره به په روښانه توګه تاسو د مېرمنې د امیندواړه کېدو په نشتوالي، ډاډه شئ. تاسو کولای شئ

د (۱۸.۱ د) جدول او ۱۸.۲ څپرکی د تعقیبولو په وسیله ازواجو ته د هغوفامیلی پلاټینګ تگلارو په اړه چې هغوی یې خپله غوښتنه لري، توصیه وکړئ.

که چېرې امیندواري رد نشي او په همدې حالت کې د امیندواري پستونه شتون ولري نو د ادرار د امیندواري یو ټسټ (Urine Pregnancy Test) تر سره کړئ. په هغه صورت کې چې د ټسټ پایله منفي وي کولای شئ چې د ۱۰،۱۸ د جدول او ۲،۱۸ څپرکي پروسې ته دوام ورکړئ او ازواجو ته د هغو فامیلی پلاټینګ تگلارو په اړه چې هغوی یې په خپله غوښتنه لري، توصیه وکړئ.

په هغه صورت کې چې د امیندواري پستونه شتون ونلري او په همدې حال کې ستا سو یوه ښځینه همکاره د لمنې له لارې معنا یې (Bimanual Pelvic Examination) تر سره کولی شي دا معنا یې تر سره کړئ او لاندې ټکي وپاکی.

- د تیرې میاشتي د وروستۍ وینې راتلنې نېټه
 - په را تلونکي کې د رحم د پرتله کولو اندازه
- تر هغه وخته چې په بشپړه توګه مو د امیندواري په نه شتون باور نه وي راغلي د ۱۸.۱ د جدول او ۱۸.۲ څپرکي ته مراجعه وکړئ.

- ازواجو ته توصیه وکړئ چې تر راتلونکې مراجعې یوازینې تگلاره له کاندېم څخه استفاده ده. که چېرې له کاندېم څخه د ګټې اخیستنې تگلاره هغوی ته د منلو وړ نه ده یا اهمیت نلري (لکه پر هغه نه پاندي) کولای شي له مجامعت څخه ډډه وکړي.

- ازواجو ته توصیه وکړئ له دې دواړو څخه هر یو چې مخکې وي یا له څلورو اوونو څخه وروسته یا هر وخت چې مېرمنې خپله میاشتنۍ وینه راتلنه ولیده، مراجعه وکړي. هغه وخت چې ازواجو بیا مراجعه وکړه:

○ په هغه صورت کې چې خپله میاشتنۍ وینه راتلنه وګوري کولای شي چې د ۱۸.۱ د جدول او ۱۸.۲ څپرکي پروسې ته دوام ورکړي او ازواجو ته د هغو تگلارو په اړه چې هغوی خپله یې غوښتنه لري، توصیه وکړي.

○ په هغه صورت کې چې مېرمن میاشتنۍ وینه راتلنه ونلري بیا د لمنې له لارې معاینه تر سره کړي:

- په هغه صورت کې چې رحم له مخکیني حالت څخه لوی شوی وي کېدای شي چې مېرمن امیندواره شوې وي، هغې ته توصیه وکړئ چې له زیږون څخه مخکې خپلې څارنې په منظمه توګه تر سره کړي. (۹.۱ څپرکی «امیندواري او له زیږون څخه مخکې څارنې» دې ولیدل شي

- په هغه صورت کې چې تاسو د رحم په اندازه کې کوم بدلون ونه لید او د امیندواري اعراض او علایم شتون ونلري او که چېرې ازواجو د امیندواري د مخنیوي له یوې تگلارې څخه په بریالۍ توګه استفاده کړې وي د امیندواري نشوالۍ په پام کې ونیسئ، او د امیندواري د مخنیوي هغه تگلاره چې د ازواجو له لوري غوره کیږي هغې ته دوام ورکړئ (کولای شئ چې د ۱۸.۱ ج جدول او ۱۸.۲ څپرکي کې پروسې ته دوام ورکړئ) د کورني تنظیم د تجویز لپاره د ورځنېو پستونو او معایناتو تر سره کول

۱۸.۱ د جدول د وړاندې شویو پروسیجرونو درجه بندۍ کوی، مګر تل اړینې نه وي. د کچې ټاکل یا درجه بندۍ په لاندې توګه دي:

- الف = د خوندي او اغیزمنې ګټې لپاره لازمه او اړینه. په هغه صورت کې چې ټسټ اجرا نشي یا مراجعه کوونکي د هغه په تر سره کولو کې پاتې راشي د کورني تنظیم یوه متبادله تگلاره باید وکارول شي.
- ب = تر یوې ډیرې اندازې په خوندي او اغیزمنه ګټه کې ونډه لري. په هغه صورت کې چې ټسټ پاتې راشي یا ناکامه شۍ د کورني تنظیم د نوری تگلارې په پام کې ونیول شي. د ټسټ د نه ترسره کولو خطر دې د کورني تنظیم د لاسرسي وړ تگلارود کارولو د ګټو پر وړاندې اندازه شي.
- ج = نه شي کولای چې په هیڅ حد کې د خوندي او اغیزمنې ګټې لپاره ونډه ولري.

۱۸.۱ د جدول د کورني تنظيم د تگلارو د تجویزولو لپاره د ورځني ټسټونو او معایناتو اندازه اخیستل

د سپرم له منځه وړونکي درمل	کانډم	داخل رحمی الیه (IUDs)	په یوازې توګه پروجسټرون ټابلیټونه (POP)	زړقي تګلاري	له امیندواری څخه د مخنیوي قلمي تزکیب (COC)	ورځني معاینات
ج	ج	ج	ج	ج	ج	د خدمتونو د وړاندې کوونکي (ښځینه) له لوري د ټي معاینه
ج	ج	ج	-	-	a	د وینې د فشار خپرل
ج	ج	ج	ج	ج	ج	د رحم د غاړې د سرطان خپرونکي ټسټونه
ج	ج	ج	ج	ج	ج	د هیموګلوبین ټسټ
ج	ج	ج	ج	ج	ج	د لمنې له لارې معاینات (د ښځینه ډاکټرۍ په وسیله) (Pelvic/genital examination)
ج	ج	۱	ج	ج	ج	ورځني لابراتواري ټسټونه
ج	ج	۱	ج	ج	ج	د جنسي اړیکې له لارې د لیږدېدونکو انتانونو (STI) د خطر ارزونه (مخینه او فزیکي معاینات)
ج	ج	ب	ج	ج	ج	د انسان د معافیتي سیستم د کمولو / STI خپرل (لابراتواري)

a - د امکاناتو د نشتوالي او د تګلارې د غوره کولو په صورت کې طریقه باید رد نشي.

۱۸.۲ په افغانستان کې د موجوده کورني تنظيم د تگلارو انتخاب
(Family Planning Options Available in Afghanistan)

۱۸.۲.۱ کانډم (نارینه) (Male Condoms)

تشریح

زیاتره کانډمونه د لاتیکس په نوم له توکو څخه جوړ شوي چې د المونیمي پوښونو په داخل کې چې ښویدونکي (لوبریکانت) توکي لري، شتون لري. دا د یو خنډ د رامنځته کېدو لامل ګرځي چې په مهبل کې د سپرم د داخلېدو مخنیوی کوي او په دې توګه له امیندواری څخه مخنیوی کیږي. همدا راز د قضیب او د مني (Semen) د موجود اتان

له خپرېدو او په مهبل کې د شته انتان بل همبستر ته د خپرېدو څخه مخنيوی کوي.

موثریت

کانډم لومړۍ د هغه سم کارول په هره جنسي اړیکه کې د هغه د غوره اغیز لرلو لپاره او دوهم د مېرمنې او خاوند دوه اړخیزه همکاري ته اړتیا لري. له هغه څخه د استفادې له کولو سره سره په لومړي کال کې نږدې ۱۵ سلنه مېرمنې کېدای شي چې امیندواره شي. د جماع په هر عمل کې د سمې کارونې په صورت کې، نږدې د دوه سلنه مېرمنو د امیندواره کېدو احتمال شتون لري. کانډم یوازینې تگلاره ده چې هم د امیندواره کېدو د مخنیوي لپاره کارول کیږي او په همدې حال کې د جنسي اړیکې د انتاناتو د اچ آی وی په شمول د خپرېدو مخنیوی کوي.

جانبی عوارض

د هغه جانبي عوارض په روښانه توګه ډیر کم دي سره له دې چې هغه کسان چې د لاتیکس د موادو پر وړاندې حساسیت لري باید وې نه کاروي. برسېره پردې ځینې نارینه کانډم د خپلو جنسي احساساتو پر وړاندې مزاحم بولي.

۱۸.۲.۲ د حمل ضد د خوړلو ترکیبي ټابلیتونه (COC)

تشریح

د امیندوارۍ ضد د خوړو ترکیبي ټابلیتونه د کورني تنظيم هغه مدرنه تگلاره ده چې معمولاً ډیره کارول کیږي. یو ټابلیټ باید هره ورځ واخیستل شي. د امیندوارۍ ضد د خوړو ترکیبي ټابلیتونه په ۲۸ دانه یي بستو کې شتون لري: ۲۱ دانې یې په یو رنګ چې د Estrogen او Progestin کم دوز لري (لکه هغه چې په نورماله توګه په بدن کې شتون لري) او ۷ دانې یې په بل رنګ چې د Ferrous sulfate لري.

موثریت

د امیندوارۍ ضد د خوړو د ترکیبي ټابلیتونو موثریت د هغو له ګټه اخیستونکو سره تړاو لري، معمولاً هغه مېرمنې چې په لومړي کال کې له هغو څخه استفاده کوي نږدې اته سلنه یې امیندواره کیږي چې لامل یې په بنسټیزه توګه د هغوی هیرو ل یا د خوړو یې اهمیت ګڼل دي. د امیندواره کېدو خطر په لومړي کال کې د منظمې ګټې په صورت کې له یو سلنې څخه کمیږي (په یو ځانګړي وخت کې هره ورځ استفاده کول). د امیندوارۍ ضد د خوړلو ترکیبي ټابلیتونه د مقاربتې ناروغیو مخنیوی نشي کولای.

جانبی عوارض

د امیندوارۍ ضد د خوړو د ترکیبي ټابلیتونو د استفادې لپاره مشوره ورکول په ځانګړې توګه د مېرمنو د وینې راتلنې د بدلونونو په هکله اړین دي. جانبي عوارض یې معمول دي مګر ټولې مېرمنې له دې عوارضو څخه شکایت نه کوي او د لومړیو میاشتو د استعمال څخه وروسته به دا جانبي عوارض لږ یا د منځه ولاړ شي.

ټولو مراجعینو ته دې توصیه وشي خو د امیندوارۍ ضد د خوړلو له ټابلیتونو څخه استفاده یې اهمیت نه وي بولي. په جانبي عوارضو کې کېدای شي لاندې څیزونه شامل وي.

- د وینې راتلنې په صفحه کې بدلونونه (لکه د وینې د اندازې کمېدل، نامنظمېدل، نه پرله پسې والی یا د منځه تلل) دا عوارض معمول دي مګر د زیان رسونې لامل نه کیږي.
- د سر درد
- ګڼګسوالی
- زړه بدوالی
- د تیو حساسیت
- په وزن کې بدلون

- د روانی وضعیت بدلون
- خوناځی یا acne (کېدای شي چې ښې شي يا شديدي شي مگر زیاتره وخت ښې کيږي)
- د وينې د فشار څو درجې لوړېدل (په ملي متر ستون سیماب). په هغه صورت کې چې لامل يې د امیندواری ضد د خوړلو له ترکیبي ټابلیټونو څخه استفاده وي، د هغو له بندولو سره کميږي.
- ځانگړې کتنې
- کوم کسان باید استفاده و نه کړي.
- لاندی میرمنی چې د COC میتود څخه غواړی استفاده و کړی نور میتودونه ورته پیشنهاد کيږی:
- هغه مېرمنې چې په بشپړه توگه شېدې ورکوي: له زیږون څخه وروسته له شپږ میاشتو مخکې.
- هغه میندې چې شېدې نه ورکوي مگر د درې مخکې اونیو په ترڅ کې ماشوم پیدا شوی وي: د امیندواری ضد د خوړلو ترکیبي ټابلیټونه توصیه کړی او یا دونه وکړی چې له زیږون څخه درې اونی وروسته ترې گټه واخلي.
- ۳۵ کلن عمر یا تر هغه زیات او په منظمه توگه د سگړې ځکول.
- زېږی یا د ځگر شېدې ناروغی یا هغه کسان چې د امیندواری ضد د خوړو ترکیبي ټابلیټونه څخه د استفادې په صورت کې هغوی ته زېږی پیدا شوی وي.
- د وينې تائید شوی لوړ فشار (له ۹۰/۱۴۰ ملي متر ستون سیماب څخه لوړ)
- له ۲۰ کلونو څخه د شکرې د ناروغی زیاته مخینه یا د شکرې د ناروغی له امله په غږو کې تخریبونه.
- د صفرا د کڅوړې د ناروغیو شته والی یا د هغه تداوي شوې ناروغی.
- مغزي سکنه، د زړه حملې، د ژورو وریدونو ترمبوز.
- د تي سرطانونه یا د هغوی مخینه
- په هر عمر کې له میگرن د (aura) سره او له ۳۵ کلونو څخه په لوړ عمر کې له اورا پرته
- د Barbiturite، Carbamazepine، Phenytoin، Topiramate یا Rifampicin اخیستل ځکه دا درمل د امیندواری ضد خوړلو د ترکیبي ټابلیټونو موثریت کمی.

سمه گټه اخیستنه

یوه واکمنه غیر امیندواړه مېرمن کولای شي چې د میاشتې له هر وخت څخه یې پیل کړي مگر په ځانگړو پېښو کې (لکه د میاشتنی عادت د وينې راتلنې په وروستیو پنځو ورځو کې) میرمنې او خاوند ته سپارښتنه کيږي څو د لنډ وخت لپاره له یوې بلې (Back up) تگلارې څخه گټه واخلي (کانډم غوره گڼل کيږي).

په ټولو واقعاتو کې

- د ټابلیټ د بېستې په اړه رڼا واچوئ چې له کومه ځایه باید پیل شي او په کوم ځای کې پای ته ورسېږي او د پخوانی بېستې په پای ته رسیدو کې د نوې بېستې څخه د گټې په اړه یادونه.
- په یوه ورځ کې د یو ټابلیټ د گټې اخیستنې په اړه رڼا اچول او د درمل د اخیستلو لپاره په هره ورځ کې د یو غوره وخت ځانگړي کول.
- د راتلونکې بېستې پیل: د لومړۍ بېستې د ۲۸ ټابلیټونو د پای ته رسولو او د نوې بېستې د پیلولو په اړه رڼا اچول.
- د یوه یا له یوه څخه د زیاتو ټابلیټونو د هېرولو په اړه رڼا واچوئ او د یوې بلې (Back up) تگلارې په تصمیم نیولو کې د هغې سره له مرسته وکړئ.

هیر شوی ټابلیټونه:

- سره له دې چې مېرمن او خاوند کېدای شي هیڅ پوښتنه ونکړي مگر لاندې څیزونه روښانه کړئ.
- که چېرې مېرمن غیرهورموني ټابلیټ هېره کړي کومه ستونزه نه ده، هغه کولای شي چې ژر تر ژره هېر شوي ټابلیټونه واخلي او دوام ورکړي.
- که چېرې یوه یا دوه ټابلیټونه هېر شوي وي یا یو یا دوه ورځې په راتلونکې دوره کې نا وخته پیل کړي ستونزه

نشته، هغه کولای شي د ټابلیټونو اخیستلو ته دوام ورکړي د غوره کولو په صورت کې په خپله کولای شي دوه ټابلیټ په یوه ورځ کې واخلي.

- که چېرې درې یا د زیات ټابلیټونو یې هېر شوي وي یا د ټابلیټونو اخیستل په راتلونکې دوره کې درې ورځې یا تر هغه زیاتې وځنډېږي، هغه باید:
 - راتلونکې ټابلیټ ژر تر ژره پیل وکړي او په معموله توګه دوام ورکړي.
 - د یوې بلې (Back up) له تګلارې څخه دې اوه ورځې ګټه واخلي.
- په هغه صورت کې چې د هورمون لرونکو ټابلیټونو له اخیستلو دوه ساعته وروسته هغې ته کانګې پیدا کیږي باید راتلونکې ټابلیټ واخلي او دوام ورکړي.
- په هغه صورت کې چې کانګې یا د نس ناستي لرل له دوه ورځو زیات وي باید د درې یا زیاتو ټابلیټونو د پاتې راتلو لپاره له لارښوونو څخه ګټه واخلي.

تجویز:

د هغو دورو شمېر چې د یوې مېرمنې لپاره ۱ سانه وي (منځنۍ حد شپږ میاشتې) تجویز کړئ. تاسو کولای شئ چې له درې میاشتې دورې څخه یې پیل کړئ او بیا د شپږو میاشتو لپاره توصیه وکړئ.

۱۸.۲.۳ په یوازې توګه پروجستین ټابلیټونه (Progestin Only Pill)

تشریح

په یوازې توګه Progestin ټابلیټونه (POP) چې د کوچنیو ټابلیټونو په نوم هم یادېږي په ۲۸ دانه یې بستو کې برابر شوي چې د Progestin د ټیټ دوز لرونکي دي. معموله بڼه یې چې په افغانستان کې ډیره کارونه لري ۰.۰۳ میلی ګرامه Levonorgestrel لري. هغه مېرمنې چې شېدې ورکوي کولای شي چې له زیږون شپږ اونی وروسته له هغه څخه ګټه واخلي. هغه مېرمنې چې سګرټ ځکوي یا په میګرن اخته دي هم له دې ټابلیټونو څخه استفاده کولای شي.

موثریت

له دې امله چې په معموله توګه کارول کیږي درې سلنه مېرمنې د ګټې اخیستنې په لومړي کال کېدای شي چې امیندواري شي او لامل یې د درمل هیریدل یا بې اهمیت ګڼل دي. د درملو د منظمې اخیستنې په وسیله د امیندواري کېدو خطر یو سلنې ته کمیږي (هره ورځ په یوه وخت کې). POP نشي کولای په مقاربتې ناروغیو د اخته کېدو مخنیوی وکړي.

جانبی عوارض

- د ونې راتلې په صفحه کې بدلونونه (لکه د ونې د اندازې کمېدل، نامنظمېدل، نه پرله پسې والی او دوامداره وینه نه راتلنه).
- سر درد
- ګڼګسوالی
- زړه بدوالی
- د تیو حساسیت
- په وزن کې بدلون
- دروانی وضعیت بدلون
- بطني دردونه

ځانګړې کتنې

لاندېنو میرمنو ته چې غواړي د POP له میتود څخه ګټه واخلي، د نورو میتودونو وړاندیز وکړئ.

- شېدې ورکونکې مېرمنې: له زيرون څخه وروسته له شپږ اونيو مخکې.
- هغه ميندې چې شېدې نه ورکوي مگر د درې مخکې اونيو په ترڅ کې ماشوم پيدا شوی وي: په يوازې توگه پروجسټن ټايليتونه (POP) توصيه کړئ او يا دونه ورته وکړئ چې له زيرون څخه درې اونۍ وروسته ترې ګټه واخلي.
- زيرې يا د څگر شديدي ناروغۍ يا دواړه.
- په پښو يا سيرو کې د ژورو وريدونو د ترمبوز شتوالی چې تر اوسه تر درملنې لاندې د وينې د علقه کېدو له ضد درمل سره نه دي نيول شوي.
- د تي سرطانونه يا د هغوی مخينه
- د باربيټورانو Barbiturite، کاربامازيپين Carbamazepine، فينيتوين Phenytoin، توپراميت Topiramate يا ريفامپيسين Rifampicin اخيستل ځکه دا ټايلېټ په يوازې توگه د پروجسټن د ټايليتونو (POP) د موثریت د کميدو لامل کيږي.

سمه ګټه اخيستنه

يوه واکمنه غير اميندواره مېرمن کولای شي چې د مياشتې له هر وخت څخه يې پيل کړي مګر په ځانګړو پېښو کې د لنډ وخت لپاره له يوې بلې (Back up) تګلارې څخه ګټه واخلي.

په ټولو واقعاتو کې

- د يو کال د ګټې اخيستنې لپاره ټايليتونه تجويزيدلای شي.
- په يوه ورځ کې د يو ټايلېټ د کارولو په اړه وضاحت ورکول په هره ورځ کې د يو غوره ټاکلي وخت ځانګړي کول. له هغې سره د درمل د اخيستلو لپاره د غوره وخت په اړه مرسته کول او هغې ته يادونه چې څو ساعته څنډ کولای شي د اميندواره کېدو خطر رامنځته کړي.
- د راتلونکې بستې د پيل او د لومړۍ بستې د ۲۸ ټايليتونو د پای ته رسولو او د نوې بستې د پيلولو په اړه رڼا اچول.
- د يوه يا له يوه څخه د زياتو ټايليتونو د هېرولو په اړه رڼا واچوئ او د يوې بلې (Back up) تګلارې په تصميم نيولو کې د هغې سره مرسته وکړئ.

هیر شوی ټايليتونه:

- سره له دې چې مېرمن او خاوند کېدای شي هيڅ پوښتنه ونکړي مګر لاندې څيزونه روښانه کړئ.
- په هغه صورت کې چې مېرمن له درې ساعته څنډ سره د يو ټايلېټ واخلي يا او يا يو ټايلېټ هیر کړی بايد ژر تر ژره د هماغې ورځې دوز واخلي او نورو ټايليتونو اخيستلو ته د برنامې سره سم دوام ورکړي (آن که چېرې په يوه وخت او په يوه ورځ کې د دوه ټايليتونو اخيستلو ته هم اړتيا وي).
- په هغه صورت کې چې منظم مياشتنی عادت لري د دوه ورځو لپاره له يوې بلې (Back up) تګلارې څخه ګټه واخلي، که چېرې هغه په پنځو وروستيو ورځو کې جنسي اړيکه ولري د اميندواړۍ ضد عاجل ټايليتونه دې په پام کې ونیول شي.

تجويز

د هغو دورو شمېر چې د يوې مېرمنې لپاره ۱ سا نه وي (تر ۱۲ مياشتو) تجويز کړئ.

۱۸.۲.۴ په يوازې توگه پروجسټن زرقیات Progestin Only Injectables

تشریح

د پروجسټين يوازيني زرقیات چې په افغانستان کې مروج دي Depot medroxyprogesterone acetate (DMPA) ۱۵۰ ميلي ګرامه دي چې د عضلي زرق په بڼه هر درې مياشتې وروسته تجويزيږي. د هغه په ترکيب کې Estrogen

نشته او کېدای شي د شېدو ورکولو په ترڅ کې هغو مېرمنو ته چې د Estrogen لرونکو نورو تگلارو څخه ګټه نشي اخيستی وکارول شي.

موثریت

سره له دې چې د ګټې اخيستنې د لومړي کال په ترڅ کې په نورماله توګه کارول کيږي درې سلنه مېرمنې لا هم امیندواره کيږي ځکه چې هغوی خپل زړقيات په منظمه توګه نه اخلي. په خپل وخت د زړق اخيستلو په صورت کې د امیندواره کېدو خطر یو سلنې ته ټيټيږي. DMPA نشي کولای چې په مقاربتې ناروغیو د اخته کېدو مخنیوی وکړي.

جانبي عوارض

له DMPA څخه په ګټې اخيستنې د میاشتنې عادت په صفحه کې بدلونونو کې لاندې څیزونه شاملېدای شي.

- په درې لومړیو میاشتو کې
 - نامنظمې وینې راتلنې
 - دوامداره وینې راتلنې
- په یو کال کې
 - په میاشتنې عادت کې د وینې راتلنې نشتوالی
 - په پرله پسې توګه د وینې نه راتلل
 - نامنظمه وینه راتلنه
- د وزن زیاتوالی
- سر درد
- ګڼګسوالی
- نفخ او باد اود بطن نا ارامتیا
- د رواني وضعیت بدلونونه
- د جنسي غریضې کمېدل (لېبدو)
- ځینې وخت د هډوکو د کثافت کموالی

ځانګړې ګټې

کوم کسان باید استفاده و نه کړي.

- له نورو تگلارو څخه د هغو مېرمنو لپاره چې له لاندې څیزونو سره مخ دي ګټه واخيستل شي.
- شېدې ورکونکې میندې: له زیږون څخه وروسته له شپږ اونیو مخکې.
- هغه میندې چې شېدې نه ورکوي مګر د درې مخکې اونیو په ترڅ کې ماشوم پیدا شوی وي: DMPA توصیه کړئ او یادونه وکړئ چې له زیږون څخه درې اونی وروسته یې ترې ګټه واخلي.
- د وینې لوړ فشار (چې سیستولیک فشار له ۱۶۰ ملي متر ستون سیماب څخه لوړ او دیاستولیک فشار ۱۰۰ ملي متر ستون سیماب)
- زېږی او د ځګر شديدې ناروغی یا دواړه
- له ۲۰ کلونو څخه د شکرې د ناروغی زیاته مخینه یا د شکرې د ناروغی له امله په غړو کې تخریبات.
- مغزي سکنه، د زړه حملې، په پښو یا سږو کې د ژورو وریدونو ترمبوز.
- د تي سرطانونه یا د هغوی مخینه
- نامنظمه مهبلي وینه راتلنه چې لامل یې نورې ناروغی وي له څېړنې او درملنې وروسته یې بیا و ارزوئ.

سمه ګټه اخيستنه

یوه واکمنه غیر امیندواره مېرمن کولای شي چې هر وخت یې پیل کړي، ښه وخت د هغه د زړق لپاره د حیض له

پېښېدو څخه د اوو ورځو په ترڅ کې دی مګر په ځانګړو پېښو کې د لنډ وخت لپاره له يوې بلې (Back up) تګلارې څخه ګټه واخلي.

۱۸.۲.۵ داخل رحمی آلہ يا IUD

تشرېح

داخل رحمی آلہ د T توري ته ورته آلہ ده چې په بازو کې يو مسي سيم لري او په رحم کې له داخلولو وروسته د سپرم په حرکتونو کې د مداخلې او د امبریو د ګرس کېدو د مخنیوی په وسیله د امیندواره کېدو خنډ ګرځي.

موثریت

داخل رحمی آلہ له امیندواری څخه د مخنیوي لپاره ډیره اغېزمنه او اوږد مهاله تګلاره ده (موثریت یی ۹۹.۲ سلنه)، سره له دې چې موثریت یې د هغه د تطبیقونکي سره تړاو لري. دا د بېي له پلوه ګټوره ده او کېدای شي د شېدې وړکونکو میندو له لوري وکارول شي. داخل رحمی آلہ نشي کولای چې د انسان د معافیتي سیستم کمزورونکی وایرس / د معافیتي سیستم کمزورونکی کسبي سندروم (HIV/AIDS) په شمول په مقایرېتي ناروغیو د اخته کېدو مخنیوی وکړي.

جانبی عوارض

جانبی عوارض یې په میاشتي عادت کې د کرمیونو او د وینې راتلنې زیاتېدل دي. شدید اختلالات لکه تشب ډیر کم دي په هغه صورت کې چې داخلول یې په سمه توګه تطبیق شوي وي.

څه وخت و کارول شي

د هغه د داخلولو لپاره غوره وخت له حیض څخه وروسته لومړۍ ۱۲ ورځې دي په دې وخت کې د رحم غاړه خلاصه وي او په رحم کې د لوپ داخلول په اسانۍ تر سره کیږي.

۱۸.۲.۶ د شېدو ورکولو پرمهال د امینوریا تګلاره (Lactational Amenorrhea Method)

تشرېح

د شېدو ورکولو پرمهال د امینوریا تګلاره د کورني تنظيم یو لنډ مهاله تګلاره ده چې بنسټ یې د شېدې ورکولو طبیعي اغیز د امیندواره کېدلو پر قابلیت (Fertility) دی او هغه وخت اغیزمنه ده چې ماشوم په بشپړه توګه (له متممو توکو پرته) یا څه نا څه په بشپړه توګه (ځینې وخت د متممه توکو توصیه) غالباً د ورځی او شپې له لوري او له زېږون څخه وروسته تر شپږو میاشتو شېدې وځوري.

موثریت

د شېدو ورکولو د مهال امینوریا د تګلارې موثریت د ماشوم لپاره په بشپړه توګه د مور له لوري د شپې او ورځې له شېدو ورکولو سره تړاو لري. سره له دې چې معمولاً کارول کیږي بیا هم دوه سلنه میرمنې چې له دې تګلارې څخه استفاده کوي له زېږون وروسته په شپږو میاشتو کې امیندواره کیږي. د شېدو ورکولو د مهال د امینوریا د تګلارې د سم تطبیق په صورت کې د امیندواره کېدو خطر یوې سلنې ته راټیټیږي. د شېدو ورکولو د مهال د امینوریا تګلاره د مقایرېتي ناروغیو د مخنیوي لامل نه کیږي.

جانبی عوارض

له شېدو ورکولو پرته کومه جانبی عارضه نلري.

خانګړې کتنې

کوم کسان بايد استفاده و نه کړي:

له لاندې څيزونو سره مېرمنې چې غواړي د شېدو ورکولو د مهال د امينورې له تگلارې څخه ګټه واخلي بايد هغوی ته د نورو تگلارو سپارښتنه وکړي.

• هغه مېرمنې چې:

○ له زېږون څخه وروسته خپل مياشتنی عادت ولري.

○ له شېدو پرته نور خواړه پرماشوم چې له شېږو مياشتو څخه کوچنی دی، خوري.

○ له شېږو مياشتو څخه لوی ماشوم ولري.

احتياط: دې ډول مېرمنو ته د کورني تنظيم د نورو تگلارو سپارښتنه وکړي مګر ميرمن د هغې ماشوم ته د ماشوم د روغتيا ساتنې په خاطر تر دوه کلنۍ شېدو ورکولو ته وهڅوي.

• هغه مېرمنې چې له درملو لکه Reserpine, Ergotamine, د استقلال ضد درمل يا انټي ميتابوليټونه، Cyclosporine، د کورنيکوسټروئيډ لوړ دوزونه، Cromocriptine، د راډيو اکتيف درمل، Lithium او ځينې انټي کواګولانتونو څخه استفاده کوي.

• هغه مېرمنې چې نوی پيدا شوی ماشوم يې نيمګړتياوې لري چې د هغوی د شېدو خوړلو خنډ کيږي لکه د ماشوم ډير کوچنی والی يا له وخت څخه مخکې پيدا شوی ماشوم، چې د نوي پيدا شوي ماشوم جدی څارنې ته اړتيا ولري، د خوراک په نورماله هضمولو کې کمزورتيا يا په خوله، وری يا تالو کې ځينې ولادي نيمګړتياوې.

سمه ګټه اخيستنه

تل معاینه وکړي چې:

• ماشوم له شېږو مياشتو څخه کوچنی دی.

• ميرمن ماشوم ته په خاصه توګه خپلې شېدې ورکوي.

• ميرمن له زېږون څخه وروسته مياشتنی وينه راتلنه ونلري.

دا تگلاره کولای شي چې په سمه توګه کار وکړي په هغه صورت کې چې پورتنۍ درې شاخصونه په پام کې نيول شوي وي. په هغه صورت کې چې يو يې رښتینی نه وي، له بلې تگلارې څخه دې ګټه واخيستل شي او موږ بايد خپل ماشوم ته د هغه د روغتيا لپاره تر دوه کلنۍ شېدو ورکولو ته وهڅول شي. هغه مېرمنې چې دا تگلاره کاروي بايد تعقيب شي چې د شېدو ورکولو د مهال د امينوريا د تگلارې د بشپړيدو په صورت کې دې بايد په بله تگلاره بدله شي.

۱۸.۲.۷ د اميندواره کيدلو پر قابليت د پوهاوې کړنلارې Fertility Awareness Methods

تشرېح

د اميندواره کيدو پر قابليت د پوهاوي کړنلاره د کورني تنظيم يوه تگلاره ده چې د هغه پر بنسټ مېرمنې ته زده کړه ورکول کيږي چې د مياشتني عادت په دوره کې د اميندواړۍ کيدو وخت وپېژني او په دې دوره کې له جنسي اړيکې څخه پرهيز وکړي او يا د ممانعت له تگلارې څخه ګټه واخلي. په دې ځای کې بېلابېلې لارې دي چې ميرمن د خپلې اميندواړۍ د دورې په اړه پوهيږي او کېدای شي په مشترکه توګه وکارول شي. د عامې روغتيا وزارت په افغانستان کې د معياري ورځو د تگلارې وړاندیز کوي.

موثریت

سره له دې چې په لومړي کال کې معمولاً کارول کيږي د پريودېک دوره يی پرهيز له تگلارې څخه په ګټې اخيستې ۲۵ سلنه مېرمنې اميندواره کيږي. له معياري ورځو څخه د سمې ګټې اخيستې او بريالۍ ګټې اخيستې په صورت کې په لومړي کال کې پنځه سلنه مېرمنې اميندواره کيږي.

جانبی عوارض
شتون نلري.

ځانگړي کتنې.

کوم کسان باید استفاده و نه کړي:

- ټولې میرمنې کولای شي له دې تگلارې څخه کټه واخلې مگر تاسو باید د موثریت د کموالی او د امیندواره کېدو د خطر زیاتوالی په لاندې پېښو کې په پام کې ولری.
- په هغه صورت کې چې د میرمنې میاشتنۍ دوره فقط پیل شوې وي یا د هغه تکرار کم شوی وي یا دا چې د زوښت له امله په بشپړه توگه دریدلی وي چې په دې صورت کې د امیندواره کېدو د وخت پیدا کول ستونزمن وي.
- په هغه صورت کې چې میرمن نامنظمه وینه راتلنه ولري په دې حالت کې د امیندواره کېدو د وخت پیدا کول ستونزمن دي. که چېرې د میاشتنۍ عادت دوه دورې له ۳۰ ورځو څخه زیات دوام وکړي یا له ۲۶ ورځو څخه کمې وي دا تگلاره د ډاډ وړ نه ده.
- هغه میرمنې چې په دې وروستیو کې یې ماشوم پیدا شوی وي یا شېدې ورکوي باید دا تگلاره له ځنډ سره پیل کړي څو دا چې د میاشتنۍ عادت درې دورې یې په نامنظمه توگه پیل شي. د دې میرمنو لپاره په همدې حال کې د نورو تگلارو سپارښتنه وکړئ (د شېدو ورکولو د مهال امینوریا یا ځنډ کوونکې تگلاره).
- هغه میرمنې چې په وروستیو کې نوی پیدا شوی ماشوم له لاسه ورکړی وي یا سقط ولري د راتلونکې میاشتنۍ تر وینې راتلنې پورې دې دا میتود وځنډوي.
- هغه میرمنې چې د روانی وضعیت د بدلون ټابلټونه، ځانگړي انټي بیوتیکونه یا غیرسټروئیدی د التهاب ضد درمل (NSAIDs) اخلي باید پر خپل میاشتنۍ عادت د درملو ځانگړې اغیزې معاینه کړي.
- په هغه صورت کې چې میرمن یا خاوند یې د امیندواره کیدلو پر دورې نه پوهیږي غوره وړاندیز له نورو تگلارو څخه کټه اخیستل دي.

سمه کټه اخیستننه

- د مېرمن او خاوند لپاره له جزیاتو سره مشوره ورکول او لارښوونې اړینې دي.
- باید ډاډ تر لاسه شي چې د میرمنې میاشتنۍ دوره له ۲۶ ورځو څخه کمه او له ۳۲ ورځو څخه زیاته نه وي.
- باید دواړه مېرمن او خاوند «د امیندوارۍ د دورې» په اصطلاح پوه شي او د دې تگلارې په اړه موافقه وکړي.
- تل د کانډم وړاندیز وکړئ او هغه د بدیلې تگلارې په توگه وړاندې کړئ او د هغه کارول شرحه کړئ.
- په ډیرې پاملرنې سره خپلو مراجعینو ته د لاندې پروسو په اړه لارښونه وکړئ:
- باید د میاشتنۍ عادت د دورې لومړۍ ورځ یادداشت کړئ او د هغې نیټه ثبت کړئ.
- د میاشتنۍ عادت تر اتمې ورځې شمار وکړئ.
- د اتمې ورځې له پیل څخه تر ۱۹ ورځې له جنسي اړیکې څخه ډډه وکړئ.
- په هغه صورت کې چې جنسي اړیکه د مخنیوي وړ نه وي له کانډم څخه گټه واخلئ.
- له شلمې ورځې څخه د میاشتنۍ عادت د راتلونکې دورې تر اتمې ورځې جنسي اړیکه په بشپړه توگه د امیندواره کېدو له پلوه خوندي ده.
- د امیندوارۍ د دورې د سم تعقیب لپاره په هره میاشت کې له میرمنې سره مرسته وکړئ څو په کومه بڼه کولای شي چې دا وخت یادداشت کړي.

۱۸.۲.۸ د قطع کولو یا د بېرته اخیستنې تگلاره یا عزل (Coitus Interruptus)

تعریف

Coitus interruptus د کورني تنظيم یوه تگلاره ده چې په هغه کې نارینه له انزالیدو څخه مخکې خپل قضیب په

بشپړه توګه د ميرمنې له مهبل څخه باسي او په دې توګه د اميندواړه کولو لپاره د سپرم له داخلېدو څخه مخنيوی کوي.

موثریت

موثریت يې په بشپړه توګه د نکلارې له کاروونکي سره تړاو لري. په منځنۍ توګه د کارولو په لومړي کال کې ۲۶ سلنه ميرمنو حمل اخيستی دی. او هغه وخت چې په سمه توګه په هر مقاربت کې په پام کې نيول شوی دی ۴ سلنه ميرمنې اميندواړه شوې دي. د هغو نکلارو له جملې څخه چې ډير کم اغيز لري په پام کې نيول شوی دی.

جانبی عوارض

شتون نلري.

ځانګړي کتنې

کوم کسان بايد استفاده و نه کړي:
هر خاوند او مېرمن يې کارولی شي. هغه خاوند او مېرمن چې د هغه له ګټې اخيستنې څخه ډاډه نه دي نورې نکلارې ورته وړاندیز کړي.

سمه ګټه اخيستنه

- له ازواجو دواړو ښځه او خاوند سره مشوره وکړي.
- د موضوع له اهميت او د هغوی په وسيله د قطع کولو له بشپړې پوهېدنې څخه ځان ډاډه کړي.
- کانډم د Back up د نکلارې په توګه وړاندې کړی او د هغه د ګټې اخيستنې په اړه لارښوونه وکړي. د مراجعینو په وسيله د کانډم له سمې ګټې اخيستنې څخه ډاډ تر لاسه کړي.
- په هغه صورت کې چې له انزال څخه مخکې قضيې بهر نشي له اميندواړۍ څخه د مخنيوي د عاجلو نکلارو په اړه مشوره ورکړي.

۱۸.۲.۹ د سپرم وژونکي (Spermicides)

تشرېح

د سپرم له منځه وړونکي د سپرم وژونکي توکي دي چې له جنسي اړیکې څخه مخکې د رحم غاړې ته نږدې د مهبل په داخل کې ځای پر ځای کيږي.

موثریت

د سپرم له منځه وړونکي يواځې نکلاره ده چې ډيره کمه کارول کيږي. سره له دې چې په معموله توګه په لومړي کال کې له هغې څخه ګټه اخلي، ۲۹ سلنه ميرمنې اميندواړه کيږي. د سمې ګټې اخيستنې په صورت کې په هر ځل جنسي اړیکه کې کېدای شي ۱۸ سلنه ميرمنې اميندواړه شي. د سپرم وژونکي د جنسي اړیکې د ناروغیو پر وړاندې کوم مخنيوی نه رامنځته کوي.

جانبی عوارض

- د قضيې يا مهبل پر شاوخوا ممکنه تخريشونه.
- کېدای شي په اچ آی وي د متن کېدو خطر زیات کړي.

ځانګړي کتنې

کوم کسان بايد استفاده و نه کړي:

- هغه ميرمنې چې د اچ آی وي د اتنان له لوړ خطر سره مخ وي.
- هغه ميرمنې چې کېدای شي په اچ آی وي يا اېلېز اخته وي.

سمه گټه اخيستننه

- د هغه کارونه هر وخت له جنسي اړيکې څخه يو ساعت مخکې تجويز کړئ.
- ميرمنې ته سپارښتنه وکړئ چې خپل مهبل له مقاربت څخه وروسته و نه مينځي.

نولسم څپرکی معافیت IMMUNIZATION

تشریح

د ماشومتوب د دورې د مخنيوي وړ ناروغيو پر ضد د مبارزې لپاره د نړیوالو هڅو یوه برخه ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په فعاله توګه د واکسیناسیون په پراخه برنامه کې ونډه اخیستې ده. په افغانستان کې د واکسیناسیون د پراخې برنامې موخه له لاندې انتاني ناروغيو څخه له پنځو کلونو د ټولو کوچنیو ماشومانو ساتنه ده.

- نړۍ رنځ
- د یفتړۍ
- توره ټوخله
- تیتانوس
- هپاتیت B
- د B ډول هیموفیلوس انفلونزا
- شری
- پولیو

دا د روغتیايي کارکوونکو دنده ده خو:

- په روغتیايي مرکز کې تر موخې لاندې ګروپونو د واکسینولو ملاتړ وکړي.
- له یو کال څخه د ټولو کوچنیو ماشومانو له بشپړ واکسینېدو څخه د کتلوي معافیت د برنامې سره سم ملاتړ وکړي.
- د امیندواری د عمر په میړمنو کې د TT د بشپړ واکسین له اخیستلو څخه ملاتړ وکړي.
- د شري د واکسین تقویتی دوز د دوه کلنو ماشومانو لپاره رواج کړي.
- د پولیو د بشپړې له منځه وړلو په پراخ کمپاین کې ونډه واخلي.
- د کتلوي معافیت د واکسینونو د ساتنې د کنټرول په موخه د تودوخې له مناسبې درجې څخه ډاډ تر لاسه کړي.
- د لیرو پرتو او د سختو لارو د سیمو د نفوس د ګروپ لپاره په دې سیمو کې له واکسینولو څخه ملاتړ وکړي.
- په بشپړه توګه خپله ونډه د واکسیناسیون په ملي ورځو کې چې د ولایت د عامې روغتیا د ټیم له لوري تنظیمیږي تر سره کړي.

اهتیمات

- له دوه کلونو څخه ټول کوچني ماشومان باید د کتلوي معافیت په برنامه کې شامل شي.
- د امیندواری د عمر ټولې میړمنې باید په بشپړه توګه د TT (تیتانوس) واکسینونه په بشپړه توګه واخلي.

له دوه کلونو څخه کوچني ماشومان

زیاتره والدین په عملي توګه خپل ماشومان په ټاکلي عمر کې د هغوی د واکسینونو د تطبیق لپاره د کتلوي معافیت د برنامې د وړاندیزونو سره سم نه راولي. له همدې امله ټول ماشومان چې د هر لامل په موخه کلینیک ته مراجعه کوي د واکسین د اخیستو له پلوه باید چک شي (یعنې د هغه د واکسین د کارت پوښتنه وکړئ) او ژر تر ژره مخکې له دې چې ماشوم روغتیايي مرکز پرېږدي د هغه واکسینونه بشپړ کړئ (په هغه صورت کې چې تطبیق شوي نه وي). ۱۹ الف جدول وګورئ.

۱۹ الف جدول. د واکسيناسيون د پراخ پروگرام سره سم د ماشومتوب د دورې واکسينونو د تطبيقولو مهالوېش

عمر	واکسين	څه ډول بايد تطبيق شي
زېږون (ژر تر ژره)	BCG	د جلد په داخل کې زرق
زېږون (له زېږون څخه تر ۱۴ راتلونکو ورځو)	OPV 0	د خولې له لارې څاڅکي
په شپږ اونيو کې (يوه نيمه مياشت يا ۴۵ ورځې)	Pentavalent 1 OPV 1	عضلي زرق د خولې له لارې څاڅکي
په لس اونيو کې (دوه نيمې مياشتې يا ۷۳ ورځې)	Pentavalent 2 OPV 2	عضلي زرق د خولې له لارې څاڅکي
په ۱۴ اونيو کې (درې نيمې مياشتې يا ۸۸ ورځې)	Pentavalent 3 OPV 3	عضلي زرق د خولې له لارې څاڅکي
په نهه مياشتني کې (۲۷۰ ورځې)	Measles1- OPV 4	تر جلد لاندې زرق د خولې له لارې څاڅکي
په ۱۸ مياشتني کې (يونيم کلنۍ کې)	Measles - 2	تر جلد لاندې زرق

يادښت: د BCG واکسين د نري رنځ پر وړاندې او OPV د پوليو پر وړاندې ورکوي. Penatvalent چې پنځه واکسينونه په کې شامل دي (دفتري، توره پوځله، هياتيت B، تيتانوس او انفلونزا B)

له ۱۵ څخه تر ۴۵ کلنۍ ميرمنې

هره ميرمن چې له دې عمر سره کلينيک ته راځي بايد پوښتنه ترې وشي چې د TT څو واکسينونه يې څه وخت اخيستي دي. د هغې د واکسين کارت د شتون په صورت کې چک کړئ. په هغه صورت کې چې د هغې د واکسين وخت وي هغه تطبيق او د راتلونکي واکسين په اړه ورته يادونه وکړئ (۱۹ ب جدول دې وکتل شي)

۱۹ ب جدول. د اميندواړۍ د عمر د ميرمنو لپاره د تيتانوس د واکسينونو مهال وېش

څه وخت بايد واکسين شي	واکسين
له ۱۵ کلنۍ وروسته ژر تر ژره	TT لومړۍ
له لومړي TT واکسين څخه لږ تر لږه څلور اونۍ وروسته	TT دويم
له دويم TT واکسين څخه لږ تر لږه شپږ مياشتې وروسته	TT دريم
له دريم TT واکسين څخه لږ تر لږه يو کال وروسته	TT څلورم
له څلورم TT واکسين څخه لږ تر لږه يو کال وروسته	TT پنځم

- بادبنت: د امیندواری د عمر د میرمنو له لوري د TT لیر تر لږه د دوه واکسینونو له اخیستلو څخه ډاډ تر لاسه کړئ. که چېرې میرمن ډاډمنه نوي نو ډاډ تر لاسه کړئ تر څو میرمن د TT واکسین دوه دورې (لیر تر لږه څلور اونۍ فاصله ولری) مخکې له زیږون تطبیق کړي. که چېرې هغې خپل دوه یا زیات واکسینونه اخیستي وي د TT د یو دوز واکسین له زیږون څخه دوه میاشتې وړاندې سپارښتنه وکړئ. که چېرې هغه داسې سند لرونکي شواهد ولري چې هغې پنځه واکسینونه تر لاسه کړي او د ورستي پړاو یې له لسو کالو لږ موده وتلې وي نو هغه نورو واکسینو ته اړتیا نلري.
- څنگه باید واکسین وکړو
- په ویال کې موجوده محتوا د ستنې په وسیله سورنج ته داخل کړئ.
 - د بي سي جي او شري د واکسینونو لپاره له محلل څخه ګټه واخلي. له مخلوط شوی واکسین څخه له شپږو ساعتونو وروسته ګټه مه اخلی.
 - د DPT او هیپاټیت B څخه د هیموفیلوس انفلونزا د واکسینونود نري کولو لپاره کار واخلي (Hib).

مخنیوی

د روغتیايي خدمتونو وړاندې کوونکی دې په هره کتنه کې د امیدواری د عمر د میرمنو او ماشومانو د واکسین د تطبیق وضعیت چک کړي.

ناروغ ته لارښوونې

- له دوه کلنو څخه کوچنیو ماشومانو په اړوند باید ډاډ تر لاسه شي چې:
 - د ماشوم مور یا د هغه پالونکی باید د ماشوم د واکسین کارت وساتي او په راتلونکو لیډنو کې له ځان سره راوړي.
 - د ماشوم مور یا پالونکی باید د راتلونکي واکسین په اړه ستاسو خبرې تکرار کړي (آن که ماشوم ناروغ هم وي).
 - د ماشوم مور یا پالونکی باید د هر واکسین پر اړتیا وپوهیږي.
 - د ماشوم مور یا پالونکی باید وپوهیږي چې کمزوري او ناروغ ماشومان هم باید واکسین شي.
 - د جاني عوارضو نورمال والی باید په احتیاط تشریح شي چې کېدای شي په هغه کې شامل وي:
 - د زړق په ساحه کې ځینې موضعی سور رنگه ځایونه، شخوالی، درد او پړسوب.
 - په ټیټه درجه تبه، ضعفیت، د عضلاتو درد، د سر درد یا د اشتها له لاسه ورکول.
- د ماشوم مور یا پالونکی ته دې و ویل شي چې د هر غبرګون یا د نورماله جاني عارضې د دوام په صورت کې دې ماشوم روغتیايي مرکز ته راولي.

شلم څېړنې د اچ آی وی انتان او ایدز HIV INFECTION AND AIDS

تشریح

د انسان د معافیتي سیستم کمزورونکي وایرس (HIV) انتان د کوربه کس په لمفوسیتونو کې له داخلېدو او د معافیت د سیستم له پرمختلونکي تخریبولو څخه وروسته د هغو ناروغیو لامل کیږي خو دا چې کس له انتاناتو سره د مقابلي توان له لاسه ورکړي چې بالاخره د انتان د ډیر شدید حالت لامل کیږي چې د معافیتي سیستم کمزورونکي کسبي سندروم (AIDS) څخه عبارت وي.

- وایرس د عضویت د منتو مایعاتو په وسیله له ککړېدو سره لیرېږي.
- کولای شي د جنسي اړیکې له لارې د متن کس د عضویت له مایعاتو سره د تماس په وسیله (یعنې مني یا د مهبل مخاطي مایعات) ولیردول شي.
- دوینی او نورو مایعاتو دوه اړخیزه ککړېدنه له یو متن کس څخه د تماس په وسیله پېښېدای شي:
- له یوې ستنې څخه شریکه گټه (د نشه یي توکو روږدي) یا له غیر تعقیم شویو ستنو څخه راپیدا شوي ټپونه یا د وینې محصولات (روغتیايي کارکوونکي)
- له ککړو سامان آلاتو (غیر تعقیم شویو) څخه گټه اخیسته (دودیزه درملنه).
- د زېړون په ترڅ کې د پلاستیک له لارې یا د مور د شېدو له لارې له مور څخه ماشوم ته لیریدل.
- مطالعاتو ښودلې چې د اچ آی وی انتان د ټولنیزو تماسونو په وسیله لکه غیر ورکول، مچو کول، د خوړو یا اوبو یا د میاشي د چپچلولو له لارې نه لیرېږي.
- په ځینو بېلگو کې؛ د اچ آی وی د انتان لیریدنه کېدای شي چې د ځینو مناسبو گامونو او وقایو درملنو په وسیله د هغو کسانو لپاره چې له هغه سره مخ دي، محدود شي (لکه روغتیايي کارکوونکي چې له هغوی سره مخ دي، له مثبت اچ آی وی لرونکي میندو څخه نوي پیدا شوي ماشومان).
- یو کس چې د اچ آی وی په انتان متن کیږي کولای شي چې د کلونو لپاره روغ پاتې شي مگر د نورو کسانو د ککړولو لامل کېدای شي.
- اچ آی وی کولای شي چې د مناسبې درملنې په وسیله د ناروغ د ژوند په اوږدولو کې بدلون راولي (د کلونو لپاره د ناروغ د ژوند د زیاتولو لامل کیږي).

تشخیص

- د کلینیکي درجه بندي او د پېښې د تعریف (څلور درجې) تعدیل د نړیوال روغتیايي سازمان په وسیله دوام لری چې د شدت، د اعراضو د شمیر او مثبتو تائید شویو معایناتو پر بنسټ ده.
- تشخیص د کلینیکي شکمنېدو او د سیرولوژیکو ټسټونو په وسیله کیږي.
- دواطلبانه مشوره ورکول او معاینات باید په یو پېژندل شوي مرکز کې تر سره شي.
- هغه کلینیکي علایم چې کولای شي د اچ آی وی (یا نور لاملونه لکه سرطان یا خوار ځواکي) په وسیله د معافیت د سیستم اغیزمنیدل منعکس کړی په معموله توگه په لاندې ډول دي.
- عمده علایم

- د وزن کمېدل (له لس سلنې څخه زیات) یا د ودې بیرته پاتې کېدل (په ماشومانو کې).
- مزمن نس ناستی (له یوې میاشتې زیات)
- دوامداره تبه (په ثابته یا نوساني توگه له یوې میاشتې څخه زیات)
- د فرصت غوښتونکو انتاناتو پر فعالیتونو شواهد (هغه انتانات چې په عادي حالت کې نشي کولای د ناروغی لامل شي مگر د عضویت د معافیت د سیستم د تخریبولو او د دې انتاناتو پر وړاندې د مقابلي د توان د لا سه ورکولو په وسیله پتوجن کیږي لکه نری رنځ، ملاریا، باکتریايي سینه بغل، Herpes zoster، ستافیلوکوک

د پوستکي ناروغی او سپټیسیمیا)

▪ فرعي علايم

- دوامداره ټوخی (له یوې میاشتي زیاته)
 - د عمومي خارش سره جلدي التهابات
 - د Herpes zoster یا Herpes simplex انتاناتو تکرار
 - د خولي او ستوني د ناحیو کانډیډازونه
 - د نامعلوم لامل په وسیله د لمفوي عقدو عمومي پریوالی.
 - په پرله پسې توګه معمول انتانات (د منځني غوړ التهاب، Pharyngitis) په هغو ماشومانو کې چې مور نی تایید شوی HIV و لری
- یادښت: د ناروغ په سیرولوژیکو معایناتو کې د بدلونونو لپاره شپږو میاشتو ته اړتیا ده خو دا بدلونونه ولیدل شي (د ناروغی د Window period پړاو)

اهتمامات

په HIV شکمن ناروغان باید د دواطلبانه مشورې او د درملنې مرکز ته د پاملرنې او تېسټ لپاره ولیرل شي.

مخنیوی

د ټولنې په کچه د معلوماتو او زده کړې برابرول ددی لپاره چې د پوهاوی کچه لوړه او تور لګول (Stigma) کم شي. د HIV د انتان د مثبت HIV لرونکي کس د عضویت د مایعاتو سره د مخ کېدو د محدودیت په وسیله په لاندې تګلارو مخنیوی کېدای شي.

- د جنسي اړیکې خوندي کړنه رعا یت شي.
- له ککړې وینې څخه ډډه وشي
- د ستنې له مشترکې ګټې اخیستنې څخه (په زرقي مخدره توکو رورودو کې) ډډه وشي.
- له ټپونو یا د مخاطي غشا د تماس څخه د عضویت له مایعاتو سره ډډه وشي (روغتیايي کارکوونکي)
- له عمومي احتیاط څخه لاندې څیزونو ته په پاملرنې سره په ټولو وختونو کې استفاده وشي.
- له دستکشو، د سترګو له ساتونکو او د لاسونو د ښه وینځلو د کړنلارې څخه استفاده.
- له مخ کېدو څخه وروسته د پړوتوکول سره سم وقایوي درملنه که موجوده وی.
- ماشوم ته له مور څخه د انتان د لیریدو مخنیوی دې وشي.
- ټولې میندې او امیندوارې ښځې د HIV د خطرونو له پلوه تشخیص او ارزوی.
- ټولې میندې او امیندواره ښځې چې مثبت HIV لري تر درملنې لاندې دې ونيول شي.
- د مصنوعي شېدو په وسیله د تغذیې استطابات د HIV په انتان د اخته مور د شېدو ورکولو په پرتله وڅیړئ.

ناروغ ته لارښوې

- د منتو کسانو او تر خطر لاندې کسانو لپاره وقایوي تګلارې په پام کې ونیسئ.
- عمده او فرعي علايم وګورئ او د ناروغی شدت د مشورې لپاره معلوم کړئ.

الف مل پانه. د درملو دوز او رژیمونه (Medicines Dosages and Regimens)

الف ۱ جدول. وزن، ونه او جنس

عمر	وزن په کیلو گرام	قد په سانتي متر
پر خپل وخت نوی پیدا شوی ماشوم	۳،۵	۵۱
یو میاشتنی	۴،۳	۵۵
دوه میاشتنی	۵،۴	۵۸
درې میاشتنی	۶،۱	۶۱
څلور میاشتنی	۶،۷	۶۳
شپږ ماشتني	۷،۶	۶۷
یو کلن	۹	۷۵
درې کلن	۱۴	۹۶
پنځه کلن	۱۸	۱۰۹
اوه کلن	۲۳	۱۲۲
لس کلن	۳۲	۱۳۸
۱۲ کلن	۳۹	۱۴۹
څوارلس کلن (نارینه)	۴۹	۱۶۳
څوارلس کلنه (ښځینه)	۵۰	۱۵۹
کاهل (نارینه)	۶۸	۱۷۶
کاهل (ښځینه)	۵۸	۱۶۴

منبع: نړیوال روغتيايي سازمان - لویه بریتانیا - د ودی چارټ ۲۰۰۹ او لویه بریتانیا معیاری چارټونه ۱۹۹۰

الف ۲ جدول. Aminophylline

تر لس کلنو ماشومان

- د خولې له لارې: د بدن پر هر کیلو گرام وزن شپږ میلی گرامه هر دوز اته ساعته وروسته.
- وریدي زرق: تر ممکنه بریده د بدن د وزن له مخې سم دوز محاسبه کړئ (ماشوم وزن کړئ) له لاندې دوزونو څخه د ماشوم د نه وزن کولو په صورت کې توصیه وکړئ. Loading dose: د ورید له لارې له پنځه څخه تر شپږ میلی گرامه د بدن د وزن پر هر کیلو گرام (اعظمي دوز ۳۰۰ میلی گرامه)؛ په ورو توگه له ۲۰ څخه تر ۶۰ دقیقو چې د بدن پر هر کیلو گرام د پنځه میلی گرامه وریدي زرق له تعقیبي دوز سره په هرو شپږو ساعتونو کې یا د بدن پر هر

کيلو گرام د ۰.۹ ميلی گرامه انفيوژن په بڼه په هر ساعت کې دوام ورکول کيږي.
احتياط: دوز د عمر له مخې مه وړکړئ. د امکان تر بريده سم دوز د بدن د وزن له مخې محاسبه کړئ.

لوبان (او له لسو کلونو څخه لوی ماشومان)

- د خولې له لارې: لومړنی دوز ۶.۳ ميلی گرامه د بدن د وزن پر هر کيلو گرام يو ځل د خولې له لارې چې له تعقیبې دوز سره له ۶-۴ ميلی گرامو د بدن د وزن پر هر کيلو گرام هر دوز هر اته ساعته وروسته هره ورځ (ورځني اعظمي دوز يې په يوه ورځ کې ۱۱۲۵ ميلی گرامه دی). د زړه احتقانی عدمې کفایې سره ناروغان ۲.۵ ميلی گرامه د بدن د وزن پر هر کيلو گرام هر اته ساعته وروسته (اعظمي دوز يې ۵۰۰ ميلی گرامه په ورځ کې).
- وريدي زرق: Loading dose د بدن پر هر کيلو گرام وزن شپږ ميلی گرامه له ۱۰۰ څخه تر ۲۰۰ ميلی ليتره په وريدي مایع کې يوځل له هر ۲۰ دقيقو څخه تر ۳۰ دقيقو چې له تعقیبې دوز ۰.۷ ميلی گرامه د بدن د وزن پر هر کيلو گرام تر ۰.۹ ميلی گرامه د بدن د وزن پر هر کيلو گرام په هر ساعت کې د وريدي انفيوژن په بڼه دوام مومي. د زړه د احتقانی عدمې کفایې لرونکي ناروغان: ۰.۲۵ ميلی گرامه د بدن د وزن پر هر کيلو گرام د وريدي انفيوژن په بڼه په هر ساعت کې دوام مومي.

احتياط: له پورته ذکر شويو دوزونو څخه يوازې د هغو ناروغانو لپاره چې د تيرو ۲۴ ساعتونو په ترڅ کې Aminophylline يا Theophylline نه وي اخيستی، استفاده وشي.

د بدن د وزن له مخې دوز		وزن (عمر)
په ۱۰ ميلی ليتره کې ۲۵۰ ميلی گرامه ويال	۱۰۰ ميلی گرامه ټابليټ	
يو ميلی ليتره	۱/۴	نوي پيدا شوي ماشومان او له درې مياشتو څخه کوچني له شپږ څخه کم تر درې کيلو گرامه
۱.۵ ميلی ليتره	۱/۲	درې مياشتني څخه تر له يو کلنۍ څخه کم عمر پورې. له شپږ څخه تر له لسو کيلو کم
۲.۵ ميلی ليتره	۳/۴	له يو کلنۍ څخه تر له درې کلنۍ څخه کم عمر پورې. لس څخه تر له ۱۵ کيلو څخه کم
۳.۵ ميلی ليتره	1	له درې څخه تر له پنځو کلونو څخه کم. ۱۵ څخه تر ۲۰ کيلو څخه کم.
۵ ميلی ليتره	1 1/۲	له پنځه څخه تر لس کلنو. له ۲۰ څخه تر ۲۹ کيلو.
له ۱۰-۱۵ ميلی ليتره	2-3	لوبان او له لسو کلونو څخه لوی ماشومان له ۲۹ کيلو څخه زيات

الف ۳ جدول. Amoxicillin

تر ۱۰ کلنۍ ماشومان: د خولې له لارې: د بدن د وزن په هر کيلو گرام ۱۵ ميلی گرامه هر دوز هر اته ساعته وروسته هره ورځ (د سينه بغل لپاره د بدن د وزن دوز پر هر کيلو گرام ۲۵ ميلی گرامه هر ۱۲ ساعته وروسته هره ورځ)
لوبان: (او له ۱۰ کلنۍ څخه لوی ماشومان): ۲۵۰ ميلی گرامه هر دوز هر اته ساعته وروسته هره ورځ په شديدو انتاناتو کې دوز دوه چنده کيږي. په سينه بغل کې د خولې له لارې ۵۰۰ ميلی گرامه تر يو گرام هر اته ساعته وروسته.

يادونه: د Penicillin سره د الرژی يا حساسيت په صورت کې له Erythromycin څخه ګټه واخلي د معیاري دوز لپاره ۱۲ الف جدول و ګورئ.

د بدن د وزن د هر کيلو ګرام سره سم دوز				وزن (عمر)
په پنځه ميلی ليتره کې ۱۲۵ ميلی ګرامه شربت	په سینه بغل کې ۲۵۰ ميلی ګرامه ټابليت	په سینه بغل کې ۱۲۵ ميلی ګرامه شربت	۲۵۰ ميلی ګرامه ټابليت	
۵ ميلی ليتره	۱/۲ ټابليت	۲.۵ ميلی ليتره	۱/۴ ټابليت	نوي پيدا شوي ماشومان او له درې مياشتو څخه کوچني - له شپږ څخه کم تر درې کيلو ګرامه
۱۰ ميلی ليتره	۱ ټابليت	۵ ميلی ليتره	۱/۲ ټابليت	درې مياشتني څخه تر له يو کلنۍ څخه کم عمر پورې، له شپږ څخه تر له لسو کيلو کم
۱۵ ميلی ليتره	۱.۵ ټابليت	۷.۵ ميلی ليتره	۳/۴ ټابليت	له يو کلنۍ څخه تر له درې کلنۍ څخه کم عمر پورې، لس څخه تر له ۱۵ کيلو څخه کم
-	۲ ټابليت	۱۰ ميلی ليتره	۱ ټابليت	له درې څخه تر له پنځو کلونو څخه کم، ۱۵ څخه تر ۲۰ کيلو څخه کم.
-	۲.۵ ټابليت	-	۱.۵ ټابليت	له پنځه څخه تر لس کلنو، له ۲۰ څخه تر ۲۹ کيلو.
-	له ۲ څخه تر ۴ ټابليت	-	۱.۵ ټابليت	لويان او له لسو کلونو څخه لوی ماشومان له ۲۹ کيلو څخه زيات

الف ۴ جدول. Ampicillin

تر پنځه کلنۍ ماشومان: وریدي عضلي زرق: د بدن د وزن په هر کيلو ګرام ۵۰ ميلی ګرامه هر دوز شپږ ساعته وروسته هره ورځ
لويان (او له پنځو کلونو څخه لوی ماشومان): ۵۰۰ ميلی ګرامه هر دوز هر شپږ ساعته وروسته؛ په شديدو انتانونو کې د اورگانيزم د حساسيت له مخې دوه دوه چنده کيرئ، د عضلي زرق يا د ورو وریدي زرق يا د وریدي انفيوزن له لارې. يادښت: د Penicillin پر وړاندې د الرژی يا حساسيت له امله له Erythromycin څخه ګټه واخلي. د معیاري دوز لپاره د الف ۱۲ جدول ته مراجعه وکړئ.

دوز د بدن د هر كيلو گرام د وزن سره سم

وزن (عمر)	۵۰۰ ميلي گرامه ويال په مخلوطه بڼه له ۴.۵ ميلي ليتره مقطرو اوبو سره چې ۱۰۰ ميلي گرامه په يو ملي ليتر کې له هغه څخه تر لاسه کيږي.
له ۳-۴ كيلو گرامه څخه کم (نوي پيدا شوي ماشوم تر دوه مياشتني څخه کم)	۱.۵ ميلي ليتره = ۱۵۰ ميلي گرامه
له ۴ څخه تر له شپږو كيلو گرامو څخه کم (له دوه مياشتو څخه تر څلورو مياشتو څخه کم)	۲ ميلي ليتره = ۲۰۰ ميلي گرامه
له شپږو څخه تر له اتو كيلو گرامو څخه کم (له څلور څخه تر نهو مياشتو څخه کم)	۳ ميلي ليتره = ۳۰۰ ميلي گرامه
له اتو څخه تر له لسو كيلو گرامو څخه کم (له نهو مياشتو څخه تر له ۱۲ مياشتو څخه کم)	۴ ميلي ليتره = ۴۰۰ ميلي گرامه
له لسو څخه تر له ۱۴ كيلو گرامو څخه کم (له ۱۲ مياشتو څخه تر درې کلونو څخه کم)	۵ ميلي ليتره = ۵۰۰ ميلي گرامه
له ۱۴ څخه تر ۱۹ كيلو گرامه (له درې څخه تر پنځو کلونو)	۷ ميلي ليتره = ۷۰۰ ميلي گرامه
له ۱۹ كيلو گرامو څخه زيات (لويان او له پنځو کلونو څخه لوی ماشومان)	۵ ميلي ليتره = ۵۰۰ ميلي گرامه (تر ۱۰ ميلي ليتره = يو گرام په شديدو انتانونو کې)

الف ۵ جدول. Chloramphenicol

تر لس کلنۍ ماشومان: د خولې له لارې: د بدن پر هر كيلو گرام وزن ۲۵ ميلي گرامه هر دوا اته ساعته وروسته (اعظمي دوز يې يو گرام) د سحيا د التهاب لپاره د وريدي زرق له لارې: د بدن د وزن پر هر كيلو گرام ۲۵ ميلي گرامه هر شپږ ساعته وروسته (اعظمي دوز يې يو گرام).

لويان (او له لس کلونو څخه لوی ماشومان): ۱۲.۵ څخه تر ۲۵ ميلي گرامه د بدن د وزن پر هر كيلو گرام هر شپږ ساعته وروسته (اعظمي دوز يې تر څلورو گرامو په يوه ورځ کې) د خولې له لارې يا د دوريد د داخل د زرق له لارې. احتياط: له وخت څخه په مخکې پيدا شويو ماشومانو کې بايد د هغه له ورکولو څخه ډډه وشي.

وٽال يو ڪوگرام ۾ مضموله ڀت ۾ ۹.۲ ميلي ليٽر ۾ مضمولو اڏو ڪي جي ڀت ڪوگرام ۾ ۱۰ ملي ليٽر ۾ ۱۰ مضموله تر لاسه ڪيري او د سحيا ۾ التهاب ڪي توصيه ڪيري.	ڪيڇول ۲۵۰ ميلي ڪوگرامه	شربت ۱۲۵ ميلي ڪوگرام ۾ پنجه ميلي ليٽر (Palmite)	وزن (صم)
۰.۷۵ - ۱.۲۵ ميلي ليٽر	-	۳ - ۵ ميلي ليٽر	نري پيدا شوي ماشوم او له دري مياشيو خشفه ڪوچي له دري خشفه تر شيزو ڪيلو ڪوگرامو خشفه ڪم
۱.۵ - ۲.۲۵ ميلي ليٽر	-	۶ - ۹ ميلي ليٽر	دري مياشيني خشفه تر له يو ڪلني خشفه ڪم صمره پوزي، له شيزو خشفه تر له لس ڪيلو ڪوگرام خشفه ڪم
۲.۵ - ۳.۵ ميلي ليٽر	۱	۱۰ - ۱۴ ميلي ليٽر	له يو ڪلني خشفه تر له دري ڪلني خشفه ڪم صمر پوزي، لس خشفه تر له ۱۵ ڪيلو ڪوگرام خشفه ڪم
۳.۷۵ - ۴.۷۵ ميلي ليٽر	۱.۵	۱۵ - ۱۹ ميلي ليٽر	له دري خشفه تر له پنڇي ڪلنو خشفه ڪم، ۱۵ خشفه تر ۲۰ ڪيلو ڪوگرام خشفه ڪم.
۵ - ۷.۲۵ ميلي ليٽر	۲	-	له پنجه خشفه تر لس ڪلنو، له ۲۰ خشفه تر ۲۹ ڪيلو ڪوگرام.
۵ - ۱۰ ميلي ليٽر	۲	-	لوپان او له لسو ڪلنو خشفه لوي ماشومان له ۲۹ ڪيلو ڪوگرام خشفه زبات

الف ۶ جدول: Chloroquine

تر لس کلتو ماشومانو: د خولې له لارې په ورځ کې یوځل د درې ورځو لپاره: ۱۰ میلی گرامه د بدن د وزن پر هر کیلو گرام په لومړۍ او دویمه ورځ او ۲.۵ میلی گرامه د بدن د وزن پر هر کیلو گرام په دریمه ورځ.

لویان (او له لس کلنۍ څخه لوی ماشومان): لس میلی گرامه د بدن د وزن پر هر کیلو گرام چې له پنځه میلی گرامه د بدن د وزن پر هر کیلو گرام سره هر ۸-۹ ساعته وروسته په لومړي ورځ کې تعقیبېږي. بیا ۵ میلی گرامه د بدن د وزن پر هر کیلو گرام په دویمه او درېیمه ورځ کې یا لس میلی گرامه د بدن د وزن پر هر کیلو گرام یوځل په لومړۍ او دویمه ورځ کې چې له پنځه میلی گرامه د بدن د وزن پر هر کیلو گرام په درېیمه ورځ کې توصیه کیږي (څلور ټابلټه ۱۵۰ میلی گرامه په لومړۍ او دویمه ورځ او دوه ټابلټه په درېیمه ورځ. څرنګه چې په لاندې جدول کې ښودل شوي دي)

دوز د بدن د وزن سره سم (عمر)						
۱۵۰ میلی گرامه ټابلټونه			په پنځه میلی لیتره کې ۵۰ میلی گرامه base شربت			وزن (عمر)
لومړۍ ورځ	دویمه ورځ	درېیمه ورځ	لومړۍ ورځ	دویمه ورځ	درېیمه ورځ	
-	-	-	۵ ملی لیتره	۵ میلی لیتره	۲.۵ میلی لیتره	نوی پیدا شوی ماشوم او له درې میاشتو څخه کوچنی له درې څخه تر شپږو کیلو گرامو څخه کم
۰.۵	۰.۵	۰.۵	۷.۵ میلی لیتره	۷.۵ میلی لیتره	۵ میلی لیتره	درې میاشتني څخه تر له یو کلنۍ څخه کم عمر پورې. له شپږ څخه تر له لس کیلو څخه کم
۱	۱	۰.۵	۱۵ میلی لیتره	۱۵ میلی لیتره	۱۰ میلی لیتره	له یو کلنۍ څخه تر له درې کلنۍ څخه کم عمر پورې. لس څخه تر له ۱۵ کیلو گرامو څخه کم
۱.۵	۱.۵	۱	-	-	-	له درې څخه تر له پنځو کلونو څخه کم. ۱۵ څخه تر ۲۰ کیلو گرامو څخه کم.
۱.۵	۱.۵	۱	-	-	-	له پنځه څخه تر لس کلنو. له ۲۰ څخه تر ۲۹ کیلو گرامو.
۴	۴	۲	-	-	-	لویان او له لسو کلونو څخه لوی ماشومان له ۲۹ کیلو څخه زیات

الف جدول. Chlorphenamine (chlorpheniramine)

تر ۱۲ کلنو ماشومانو: په الرژیکو غبرگونونو، انافلکسی (په مل بڼه)، د عضلې یا ورید د داخل یا د پوستکي لاندې په بڼه: ۰.۲۵ میلی گرامه د بدن د وزن پر هر کیلو گرام یو ځل (کېدای شي چې په ۲۴ ساعتونو کې تر څلور ځله له اعظمي دوز ۰.۴ میلی لیټرو څخه له یو کلن څخه کوچني ماشومانو ته وکارول شي). د خولې له لارې څخه د الرژیکو اعراضو د بڼه کولو لپاره:

- ماشومان له دوه کلن څخه تر شپږ کلن: یو ملي گرام دوز له هر ۶-۴ ساعته وروسته په یوه ورځ کې (اعظمي دوز شپږ میلی گرامه په ورځ کې).
- ماشومان له ۱۲-۶ کلنۍ: دوز دوه میلی گرامه هر ۶-۴ ساعته وروسته په یوه ورځ کې (اعظمي دوز په ورځ کې ۱۲ میلی گرامه).

لویان (او له ۱۲ کلنۍ څخه لوی ماشومان): په الرژیک انافلکسی غبرگونونو کې واحد دوز له ۱۰ - ۲۰ میلی گرامه، د اړتیا په صورت کې تکراري (اعظمي دوز یې په ۲۴ ساعتونو کې ۴۰ میلی گرامه) د حساسیت د اعراضو د بڼه کولو لپاره: د خولې له لارې څلور میلی گرامه پر دوز هر ۶-۴ ساعتونو (اعظمي دوز په ورځ کې ۲۴ میلی گرامه) احتیاط: له وخت څخه مخکې پیدا شویو ماشومانو او له پوی میاشتی څخه کوچنیو ته دې توصیه نشي.

دوز د بدن د وزن سره سم		
وزن (عمر)	لس میلی گرامه امپول په یو ملي لیتر کې د عضلې په داخل کې، د ورید په داخل کې یا تر جلد لاندې، د الرژیک په غبرگونونو کې	ټابلېټ: څلور میلی گرامه (د خولې له لارې) د حساسیت د عرضې بڼه کېدلو لپاره
له دوه څخه تر له دریو میاشتو څخه کم (څلور څخه تر له شپږ کیلو گرامو څخه کم)	۰.۱ میلی لیتره	-
له دریو میاشتو څخه تر یو کال څخه کم (له ۶ څخه تر له لس کیلو گرامو څخه کم)	۰.۲ میلی لیتره	-
له یو کال څخه تر درې کلونو څخه کم (له ۱۰ څخه تر له ۱۵ کیلو گرامو څخه کم)	۰.۳ میلی لیتره	۰.۲۵
له درې څخه تر له پنځو کلونو څخه کم (له ۱۵ څخه تر له ۲۰ کیلو گرامو څخه کم)	۰.۵ میلی لیتره	۰.۲۵
له پنځه څخه تر ۱۲ کلونو (له ۲۰ څخه تر له ۲۹ کیلو گرامه)	۰.۶ میلی لیتر	۰.۵
لویان او له ۱۲ کلنۍ څخه لوی ماشومان (له ۲۹ کیلو گرامو څخه زیات)	۱ ملي لیتر	۱

الف ۸ جدول. Co-trimoxazole

تر لس کلنو ماشومانو: د خولې له لارې: څلور میلی گرامه Trimethoprim د بدن د وزن پر هر کیلو گرام + ۲۰ میلی گرامه Sulfamethoxazole د بدن د هر کیلو گرام پر وزن، په هر دوز هر ۱۲ ساعته وروسته.

لویان (او له لس کلنۍ څخه لوی ماشومان): د خولې له لارې د کاهلاتو دوه ټابلیټه ۴۸۰ میلی گرامه هر ۱۲ ساعته وروسته.

احتیاط: که چېرې ماشوم له یو میاشتنۍ څخه کوچنی وي نیم ټابلیټ یا ۱.۲۵ میلی لیتره شربت هر ۱۲ ساعته وروسته هره ورځ ورته توصیه کړئ. زیرې لرونکي او له وخت څخه مخکې پیدا شوي ماشومان باید Co-trimoxazole وانهخلي.

یادښت: TMP Trimethoprim, SMX Sulfamethoxazole

د بدن د وزن سره سم دوز

د ماشومانو پاملنه (۲۰ میلی گرامه TMP + ۱۰۰ میلی گرامه SMX)	وزن (عمر)	د ماشومانو پاملنه (۲۰ میلی گرامه TMP + ۱۰۰ میلی گرامه SMX)	شربت (۴۰ میلی گرامه TMP + ۲۰۰ میلی گرامه SMX په پنځه میلی لیټره کې) (د چای څښلو معمول له فائده ډډې پنځه میلی لیټره محلول گنجایش لری)	د لویانو پاملنه (۸۰ میلی گرامه TMP + ۴۰۰ میلی گرامه SMX)
نوی پیدا شوی ماشوم او له یوې میاشتي څخه کوچنی (له درې څخه تر له څلور کیلو ګرامو څخه کم)	۰.۵	۱	۱.۲۵ میلی لیټره	-
نوی پیدا شوی ماشوم تر له درې میاشتو څخه کم (درې څخه تر له شپږ کیلو ګرامو څخه کم)	۱	۲	۲ میلی لیټره	۰.۲۵
له دریو میاشتو څخه تر یو کال څخه کم (له ۶ څخه تر له لس کیلو ګرامو څخه کم)	۲	۳	۳.۵ میلی لیټره	۰.۵
له یو کال څخه تر درې کلونو څخه کم (له ۱۰ څخه تر له ۱۵ کیلو ګرامو څخه کم)	۳	۴	۶ میلی لیټره	۱
له درې څخه تر له پنځو کلونو څخه کم (له ۱۵ څخه تر له ۲۰ کیلو ګرامو څخه کم)	۴	-	۸.۵ میلی لیټره	۱
له پنځه څخه تر لسو کلونو څخه (له ۲۰ څخه تر له ۲۹ کیلو ګرامو څخه)	-	-	-	۱
لویان او له لس کلنې څخه لوی ماشومان (له ۲۹ کیلو ګرامو څخه زیات)	-	-	-	۲

جدول الف ۹. Diazepam

تر لس کلتو ماشومانو: د اختلاج په صورت، مقعدي: ۰.۵ میلی گرامه د بدن د وزن پر هر کیلو گرام پر هر دوز یا د ورید په داخل کې ورو زرق: له ۰.۲ څخه تر ۰.۳ میلی گرامه د بدن د وزن پر هر کیلو گرام پر هر دوز. د ارامولو لپاره له پروسېجر څخه مخکې: له ۰.۱ څخه تر ۰.۲ میلی گرامه د بدن د وزن پر هر کیلو گرام پر هر دوز د ورید په داخل کې.

لویان (او له لسو کلونو څخه لوی ماشومان): اختلاج، مقعدي: ۰.۲ میلی گرامه د بدن د وزن پر هر کیلو گرام یا له ۵-۱۰ میلی گرامه لومړنۍ دوز په ورید یا عضلي کې ورو زرق چې کېدای شي له حملو څخه لس دقیقې وروسته دوام ورکړل شي که چېرې اختلاج ادامه پیدا کړي. اضطراب، د خوړلي له لارې: دوه میلی گرامه هر دوز هر اته ساعته وروسته (د زړو او کمزورو کسانو لپاره د لویانو نیم دوز).

د بدن د وزن سره سم دوز		
وزن (عمر)	لس میلی گرامه امپولونه په هر دوه ملي لیټرو کې، مقعدي تطبیق	لس میلی گرامه امپولونه هر دوه ملي لیټرو کې، ورو وریدی یا عضلي تطبیق
نوی پیدا شوی ماشوم تر له درې میاشتو څخه کم (درې څخه تر له شپږ کیلو گرامو څخه کم)	۰.۴ میلی لیټره	۰.۲۵ میلی لیټره
له دریو میاشتو څخه تر یو کال څخه کم (له ۶ څخه تر له لس کیلو گرامو څخه کم)	۰.۷۵ میلی لیټره	۰.۴ میلی لیټره
له یو کال څخه تر درې کلونو څخه کم (له ۱۰ څخه تر له ۱۵ کیلو گرامو څخه کم)	۱.۲ میلی لیټره	۰.۶ میلی لیټره
له درې څخه تر له پنځو کلونو څخه کم (له ۱۵ څخه تر له ۲۰ کیلو گرامو څخه کم)	۱.۷ میلی لیټره	۰.۷۵ میلی لیټره
له پنځه څخه تر لسو کلونو څخه (له ۲۰ څخه تر له ۲۹ کیلو گرام)	۲.۵ میلی لیټره	۱.۲۵ میلی لیټره
لویان او له لس کلنۍ څخه لوی ماشومان (له ۲۹ کیلو گرامو څخه زیات)	۱۰ میلی لیټره	له ۱ څخه تر ۲ میلی لیټره

الف ۱۰. Doxycycline جدول

یوازې د لویانو او له اتو کلونو څخه لویو ماشومانو ته: د خوړلي له لارې: یو ۱۰۰ میلی گرامه ټابلیټ هر ۱۲ ساعته وروسته له ۱۰-۷ ورځو.

احتیاط: د امینوداره، شېدې وړکونکو میندو او له اتو کلونو څخه کوچنیو ماشومانو ته باید توصیه نشي.

عمر	کپسول یا ټابلیټ: ۱۰۰ میلی گرامه (Hydrochloride)
لویان او له اتو کلونو څخه لوی ماشومان	۱۰۰ میلی گرامه دوه ځله په ورځ کې له ۱۰-۷ ورځو

الف ١١ جدول. (Adrenaline) Epinephrine

تر ١٨ كلني ماشومان: د انافلكتيك په غبرگونونو كې د پوستكي لاندې يا عضلي: ٠.٠١ ميلي گرامه د بدن د وزن پر هر كيلو گرام پر هر دوز (اعظمي دوز يې ٠.٤ ميلي ليتره) د Epinephrine د ١:١٠٠٠ له محلولونو څخه د (٠.١ سلنه ويال په يو ميلي ليتره كې). كېدای شي له ١٠ دقيقو څخه وروسته په الرژيكو غبرگونونو كې چې اعراض يې ښه والي ونه مومي، تكرر شي يا له ٣-٥ دقيقو وروسته په انافلكتيكو شاكونو كې (په هغه صورت كې چې نبض له ١٤٠ څخه كم وي) بل بديل يې په شاك كې د وريد په داخل كې په ورو توگه زرق دی چې د هغه له ١:١٠٠٠٠ محلول څخه له ٠.١ ملي ليتره د بدن د وزن پر هر كيلو گرام گټه اخيستل كيږي.

په لويانو (او له ١٨ كلونو څخه په لويو ځوانانو كې): تر جلد لاندې يا د عضلې په داخل كې ٠.٥ ميلي ليتره زرق د ١:١٠٠٠٠ محلولونه څخه. كولای شي چې له هر ١٥-١٠ دقيقې وروسته تكرر شي. په شاك كې پنځه ميلي ليتره دوز چې له ١:١٠٠٠٠ محلول كې برابر شوي دي د وريد په داخل كې په ورو توگه زرقيدلای شي.

د بدن د وزن سره سم دوز		
انافلكتيك شاك: ورو وريدي زرق د هغه د ١:١٠٠٠٠ محلول څخه (يو ملي گرام = لس ميلي ليتره) د ١:١٠٠٠٠ محلول د جوړولو لپاره د ٠.١ سلنه ويالونو يو ملي ليتره د ٩ ميلي ليتره Normal Saline يا پنځه سلنه Glucose سره زياتوو (وريدي زرق بايد له ٥ تر ١٠ دقيقو په ترڅ كې ورکړل شي).	٠.١ سلنه په يو ميلي ليتره كې ويال الرژيكو غبرگونونو لپاره د عضلې په داخل يا تر جلد لاندې د هغه د ١:١٠٠٠ محلول څخه (يو ملي گرام = يو ملي ليتره)	وزن (عمر)
٠.١ ميلي ليتره د بدن د وزن پر هر كيلو گرام	٠.٠٥ ميلي ليتره	له شپږ مياشتو څخه كوچنی (له درې څخه تر اته كيلو گرامو څخه كم)
٠.١ ميلي ليتره د بدن د وزن پر هر كيلو گرام	٠.١٢ ميلي گرامه = ٠.١٢ ميلي ليتره	له شپږ مياشتو څخه تر شپږ كلونو (له اتو څخه تر له ٢٠ كيلو گرامو څخه كم)
٠.١ ميلي ليتره د بدن د وزن پر هر كيلو گرام	٠.٢٥ ميلي گرامه = ٠.٢٥ ميلي ليتره	له ١٢-٦ كلونو (له ٢٠ څخه تر له ٣٩ كيلو گرامو څخه كم)
٠.١ ميلي ليتره د بدن د وزن پر هر كيلو گرام (اعظمي دوز يې پنځه ميلي ليتره)	٠.٣٠ ميلي گرامه = ٠.٣٠ ميلي ليتره	له ١٢-١٨ كلونو (له ٣٩ څخه تر له ٥٥ كيلو گرامو څخه كم)
٥ ميلي ليتره	٠.٥ ميلي گرامه = ٠.٥ ميلي ليتره	له ١٨ كلونو څخه لوی او لويان (له ٥٥ كيلو گرامو څخه زيات)

الف ۱۲ جدول. Erythromycin Ethylsuccinate

تر ۱۲ کلن ماشومان: د خولې له لارې: ۷.۵-۱۲.۵ میلی گرامه د بدن د وزن پر هر کیلو گرام پر هر دوزهر شپږ ساعته وروسته هره ورځ. په شدیدو انتاناتو کې دوز دوه برابره کېدای شي (اعظمي دوز یې په یوه ورځ کې څلور گرامه دی).

لویان (او له ۱۲ کلونو څخه لوی ماشومان): ۴۰۰ میلی گرامه Erythromycin Ethylsuccinate (یو ټابلیټ ۴۰۰ میلی گرامه) یا Stearate Erythromycin base (یو ټابلیټ ۲۵۰ میلی گرامه) هر شپږ ساعته وروسته په معمول دوز هره ورځ. دوز د انتان د شدت له مخې په ورځ کې تر څلورو گرامو زیاتولی شو.

یادښت: یو ۴۰۰ میلی گرامه Erythromycin Ethylsuccinate ټابلیټ مساوی ده له یو ۲۵۰ میلی گرامه Stearate Erythromycin base ټابلیټ سره.

احتیاط: باید یوځای له Theophylline (Aminophylline) سره توصیه نشي ځکه د جدی خطرناکو غبرگونونو (Adverse reactions) لامل کیږي.

د بدن د وزن سره سم دوز			
۲۵۰ میلی گرامه تایلېټ Stearate یا Erythromycin base	۴۰۰ میلی گرامه تایلېټ Erythromycin Ethylsuccinate	۱۲۵ میلی گرامه شربت په پنځه میلی لیټره کې (Base) لیټره کې	وزن (صفر)
-	-	۱/۲ تر ۲ میلی لیټره= ۱/۴ تر ۱/۲ د چای څښلو کاشنه	نورۍ پیدا شوې ماشوم او له ۲ میاشتو څخه کوچنی (له ۳ څخه تر له ۴ کیلو گرامو کم)
۱/۴ تایلېټ	۱/۴ تایلېټ	۲ میلی لیټره= ۱/۲ د چای څښلو کاشنه	له ۲ میاشتو څخه تر او له ۴ میاشتو څخه کوچنی (له ۴ څخه تر له ۶ کیلو گرامو کم)
۱/۴ تایلېټ	۱/۴ تایلېټ	۴ میلی لیټره= ۲/۴ د چای څښلو کاشنه	له ۴ میاشتو څخه تر او له ۲ کلونو څخه کوچنی (له ۶ څخه تر له ۱۱ کیلو گرامو کم)
۱/۲ تایلېټ	۱/۲ تایلېټ	۸ میلی لیټر = یوه نیمه د چای څښلو کاشنه	له ۲ کلونو څخه تر او له ۷ کلونو څخه کوچنی (له ۱۲ څخه تر له ۲۳ کیلو گرامو کم)
۳/۴ تایلېټ	۳/۴ تایلېټ	-	له ۷ کلونو څخه تر او له ۱۲ کلونو څخه کوچنی (له ۲۳ څخه تر له ۴۵ کیلو گرامو کم)
۱ تایلېټ	۱ تایلېټ	-	لویان او له ۱۲ کلونو څخه لوی ماشومان له ۴۵ کیلو گرامو څخه زیات

الف ۱۳ جدول. Gentamicin

تر لس کلنو ماشومان: عضلي يا وريدي زرق: د بدن د وزن پر هر کيلو گرام پر هر دوز ۳.۷۵ ميلي گرامه هر ۱۲ ساعته وروسته. په شديدو انتاناتو کې لومړنی ورو وريدي يا عضلي Loading دوز له ليرلو مخکې: اوه ميلي گرامه د بدن د وزن پر هر کيلو گرام.

لويان (او له لس کلنو څخه لوی ماشومان): له يو څخه تر ۱.۷ ميلي گرامه د بدن د وزن پر هر کيلو گرام پر هر دوز هر اته ساعته وروسته عضلي زرق يا ورو وريدي زرق (لږ تر لږه په درې دقيقو کې) يا له وريدي انفیوژن سره. په شديدو انتاناتو کې لومړنی Loading دوز: ۵ ميلي گرامه د بدن پر هر کيلو گرام وزن د ورځی يو ځل عضلي يا د وريدي زرق.

د بدن د وزن سره سم دوز

د بدن د وزن سره سم دوز		
۸۰ میلی کرامه Gentamicin وېال (۲ ملي لېتره وېال چې په هر ملي لېتر کې په وېال (۲ ملي لېتره وېال چې په هر ملي لېتر کې ۴۰ میلی کرامه شتون لري) پرته له رقيقولو څخه	۱۰ میلی کرامه جنتاميسين وېال (۲ ملي لېتره وېال چې په هر ملي لېتر کې ۱۰ میلی کرامه شتون لري) د ۲ میلی لېتره مقطر اوږو په زياتولو سره په ۲۰ میلی کرامه وېال کې = ۱۰ میلی کرامه په هر ملي لېتر کې.	وزن (صبر)
	۸۰ میلی کرامه Gentamicin وېال (۲ ملي لېتره وېال چې په هر ملي لېتر کې ۴۰ میلی کرامه شتون لري) د ۶ میلی لېتره مقطر اوږو په زياتولو سره په ۸۰ میلی کرامه وېال کې = ۱۰ میلی کرامه په هر ملي لېتر کې.	
-	۱ میلی لېتره = ۱۰ میلی کرامه	نوی پيدا شوی ماشوم او له ۲ مياشتو څخه کوچنی (له ۳ څخه تر له ۴ کيلو کرامو څخه کم)
-	۱۵ میلی لېتره = ۱۵ میلی کرامه	له دوه څخه تر له ۴ مياشتو څخه کوچنی (له ۴ څخه تر له ۶ کيلو کرامو څخه کم)
-	۲۲۵ میلی لېتره = ۲۲۵ میلی کرامه	له ۴ څخه تر له ۹ مياشتو څخه کوچنی (له ۶ څخه تر له ۸ کيلو کرامو څخه کم)
-	۳ میلی لېتره = ۳۰ میلی کرامه	له ۹ څخه تر له ۱۲ مياشتو څخه کوچنی (له ۸ څخه تر له ۱۰ کيلو کرامو څخه کم)
-	۳۷۵ میلی لېتره = ۳۷۵ میلی کرامه	له ۱ کال څخه تر له ۳ کلونو څخه کوچنی (له ۱۰ څخه تر له ۱۴ کيلو کرامو څخه کم)
۱.۲۵ میلی لېتره = ۵۰ میلی کرامه	۵ میلی لېتره = ۵۰ میلی کرامه	له ۳ کلونو څخه تر له ۵ کلونو څخه کوچنی (له ۱۴ څخه تر له ۱۹ کيلو کرامو)
۲ میلی لېتره = ۸۰ میلی کرامه	-	له ۵ کلونو څخه تر له ۱۰ کلونو څخه کوچنی (له ۲۰ څخه تر ۲۹ کيلو کرامه)
۲ میلی لېتره = ۸۰ میلی کرامه	-	لویان او له ۱۲ کلونو څخه لوی ماشومان (له ۲۹ کيلو کرامو څخه زيات)

الف ۱۴ جدول: Metronidazole

تر لس کلنو ماشومان: د خولې له لارې: ۷.۵ میلی گرامه د بدن د وزن پر هر کیلو گرام هر اته ساعته وروسته د اوو ورځو لپاره. (د جاردیازس د درملنې لپاره د درملو دوز د بدن پر هر کیلو گرام پنځه میلی گرامه پر دوز هر اته ساعته وروسته له پنځو څخه تر لس ورځو لپاره، د امیب د درملنې لپاره د بدن د وزن پر هر کیلو گرام لس میلی گرامه پردوز هر اته ساعته وروسته له اوو څخه تر لس ورځو)

لویان (او له لسو کلونو څخه لوی ماشومان): برید کونکي (فعال) امیبازس، د خولې له لارې: له ۵۰۰ څخه تر ۷۵۰ میلی گرامه هر اته ساعته وروسته له پنځو څخه تر لس ورځو، جاردیازس د خولې له لارې: ۴۰۰ میلی گرامه هر اته ساعته وروسته له پنځو څخه تر اوو ورځو. په شدیدو انتانونو کې: ۷.۵ میلی گرامه د بدن وزن پر هر کیلو گرام د ورید د داخل د زرق له لارې هر شپږ یا اته ساعته وروسته له لسو څخه تر څوارلس ورځو.

د بدن د وزن سره سم دوز			
وزن (عمر)	۲۰۰ میلی گرامه ټابلیټ	۴۰۰ میلی گرامه ټابلیټ	محلول ۲۰۰ میلی گرامه په هر پنځو میلی لیټرو کې.
نوی پیدا شوی ماشوم او له ۳ میاشتو څخه کوچنی (له ۳ څخه تر له ۶ کیلو گرامو څخه کم)	۱/۴ ټابلیټ	-	۱ تر ۱.۵ میلی لیټره
له دری څخه تر له یو کال څخه څخه کوچنی (له ۶ څخه تر له ۱۰ کیلو گرامو څخه کم)	۱/۴ ټابلیټ	-	۱.۵ تر ۲.۵ میلی لیټره
له یو کال څخه تر له دری کالو څخه کوچنی (له ۱۰ څخه تر له ۱۵ کیلو گرامو څخه کم)	۱/۲ ټابلیټ	۱/۴ ټابلیټ	۲.۵ تر ۴ میلی لیټره
له ۳ څخه تر له ۵ کالو څخه کوچنی (له ۱۵ څخه تر له ۲۰ کیلو گرامو څخه کم)	۱ ټابلیټ	۱/۲ ټابلیټ	۵ میلی لیټره
له ۵ کال څخه تر له ۱۰ کلونو (له ۲۰ څخه تر له ۲۹ کیلو گرامو)	۱ ټابلیټ	۱/۲ ټابلیټ	-
کاهلان او ماشومان چې له ۱۰ کلونو څخه لوی وی او وزن یی له ۲۹ کیلو گرامو څخه زیات وی	-	۱ ټابلیټ	-

الف ۱۵ جدول. (Acetaminophen) Paracetamol

نوی پیدا شوی ماشوم او له ۱ میاشتی څخه کوچنی: د خولې له لارې له ۱۰-۱۵ میلی گرامه د بدن د وزن پر هر کیلو گرام هر دوز له ۸-۶ ساعتونو وروسته د اړتیا سره سم.

له یوې میاشتې څخه لوی ماشومان تر لس کلنو: د خولې له لارې له ۱۵-۱۰ میلی گرامه د بدن د وزن پر هر کیلو گرام هر دوز له ۶-۴ ساعته وروسته.

لویان (او له لس کلونو څخه لوی ماشومان): له ۵۰۰ ملي گرامو څخه تر یو گرام له ۸-۶ ساعتونو څخه وروسته (اعظمي دوز یې په ورځ کې څلور گرامه)

احتیاط: ماشومانو ته د Reyes syndrome د رامنځته کېدو له امله Aspirin توصیه نه کړی.

د بدن د وزن سره سم دوز			
وزن (عمر)	۱۲۰ میلی گرامه په پنځه میلی لیتره کې شربت (د چای څښلو یوه کاشغه د پنځه ملي لیټرو سره برابره ده	۱۰۰ میلی گرامه تأبلیټ	۵۰۰ میلی گرامه تأبلیټ
نوی پیدا شوی ماشوم او له ۱ میاشتی څخه کوچنی (له ۳ څخه تر له ۴ کیلو گرامو څخه کم)	۱/۴ تر ۱/۲	۱/۲	-
له دوه څخه تر ۳ میاشتو (له ۴ څخه تر له ۶ کیلو گرامو څخه کم)	۱/۲	۱	۱/۴
له ۳ میاشتو څخه تر یو کال څخه کوچنی (له ۶ څخه تر له ۱۰ کیلو گرامو څخه کم)	۱	۱	۱/۴
له یو څخه تر له ۳ کالو څخه کوچنی (له ۱۰ څخه تر له ۱۵ کیلو گرامو څخه کم)	۱ ۱/۴	۱	۱/۴
له ۳ کال څخه تر له ۵ کلونو څخه کوچنی (له ۱۵ څخه تر له ۲۰ کیلو گرامو څخه کم)	۱ ۱/۲ تر ۲	۱ ۱/۲ تر ۲	۱/۲
له ۵ کلونو څخه تر له ۱۰ کلونو څخه کوچنی (له ۲۰ څخه تر له ۲۹ کیلو گرامو څخه کم)	-	۲ تر ۳	۱/۲
لویان او تر لسو کلونو څخه لوی ماشومان (له ۳۰ کیلو گرامو څخه زیات)	-	-	۱

یادداشت: د Penicillin پر وړاندې د حساسیت یا الرژۍ په صورت کې له Erythromycin څخه ګټه واخلي. د معیاري دوز لپاره الف ۱۲ جدول ته مراجعه وکړئ.

د بدن د وزن سره سم دوز			
وزن (صم)	د خپلې له لارې د محلول لپاره	پروټین ۲۵۰ میلی ګرامه په هر پنځه میلی لیټر کې (د پروټین د مالګې په شکل)	۵۰۰ میلی ګرامه تاښت (د پروټین د مالګې په شکل)
۶-۱۰ کیلو ګرامه (تر یو کلن ماشومان)	۶۲.۵ میلی ګرامه = ۱.۲۵ میلی لیټره	۱۲۵ میلی ګرامه = ۲.۵ میلی لیټره	۱۲۵ میلی ګرامه = ۱/۲ تاښت
۱-۵ کیلو ګرامه (له ۱-۵ کلن ماشومان)	۲۰-۱۰ کیلو ګرامه (له ۱-۵ کلن ماشومان)	۲۵۰ میلی ګرامه (له ۶-۱۲ کلن ماشومان)	۲۵۰ میلی ګرامه = ۱ تاښت
۱۲-۲۰ کیلو ګرامه (له ۶-۱۲ کلن ماشومان)	۲۴ کیلو ګرامه (له ۱۲ کلن زيات کاهلان او له ۱۲ کلنو څخه لوی ماشومان)	-	۱ تر ۲ تاښت

الف ١٧ جدول. Salbutamol

تر ١٠ كلنو ماشومان: د خولې له لارې له ٠.١-٠.٤ ميلي گرامه د بدن د وزن پر هر كيلو گرام هر دوز هر شپږ ساعته وروسته د حادو اعراضو په ترڅ كې.

لويان (او له لسو كلونو څخه لوی ماشومان): د خولې له لارې له ٢-٤ ميلي گرامه هر ٨-٦ ساعته وروسته. د برانشونود حاد تقیض د ښه كېدلو دپاره د ايروزول د انشاق سره له ٠.١ څخه تر ٠.٢ ملي گرام (له یو نه تر دوه پفه) هر ٨-٦ ساعته وروسته د حادو اعراضو په ترڅ كې. د تمرین پواسطه د برانشونو د تقیض د مخنیوی لپاره ٠.٢ ميلي گرامه ايروزول د انشاق په وسيله (دوه پفه) په ورځ كې له ٣-٤ ځله.

احتیاط: د خولې له لارې له Salbutamol څخه یوازې له شپږ میاشتني څخه د لویو ماشومانو لپاره گټه واخلي.

د بدن د وزن سره سم دوز						
وزن (عمر)	شربت دوه میلی ګرامه په پنځه میلی لیتره کې	تألیف دوه میلی ګرامه	تألیف څلور میلی ګرامه	اناشي ایروزل د Spacer په وسیله: هر ډوز ۰.۱ ملي ګرام	نېولایز محلول (د برانښونو د توسع لپاره ژر عمل کونکی) پنځه میلی ګرامه په هر ملي لیتر محلول کې	
له ۴ څخه تر له ۷ کیلو ګرامو څخه کم (له ۲ څخه تر ۶ میاشتو کم)	له ۷ څخه تر له ۱۰ کیلو ګرامو څخه کم (له ۶ میاشتو څخه تر یو کال)	هیڅ	هیڅ	هیڅ	۰.۲۵ میلی لیتره Salbutamol ۲ میلی لیتره مقطرې اوبه	جمع
له ۱۰ څخه تر له ۱۹ کیلو ګرامو څخه کم (له ۱ څخه تر ۵ کالو کم)	له ۱۰ څخه تر له ۱۹ کیلو ګرامو څخه کم (له ۱ څخه تر ۵ کالو کم)	۱	۱/۲	-	۰.۵ میلی لیتره Salbutamol ۲ میلی لیتره مقطرې اوبه	جمع
له ۲۰ څخه تر له ۲۹ کیلو ګرامو څخه کم (له ۵ څخه تر ۱۰ کالو څخه کم)	له ۲۰ څخه تر له ۲۹ کیلو ګرامو څخه کم (له ۵ څخه تر ۱۰ کالو څخه کم)	۱	۱/۲	Puff ۱	۰.۵ میلی لیتره Salbutamol ۲ میلی لیتره مقطرې اوبه	جمع
له ۲۹ کیلو ګرامو څخه زیات (کاهلان او له لسو کالونو څخه لوی ماشومان)	-	۲ تر ۱	۱	Puffs ۲ تر ۱	۰.۵ تر یو میلی لیتره Salbutamol ۲ میلی لیتره مقطرې اوبه	جمع

ب مل پانه: د نوي پيدا شوي ماشوم بيا احيا (Newborn Resuscitation)

له لاندې تگلارو څخه په گټې اخيستې د زېرون د يوې دقيقې په ترڅ کې د هغه نوي پيدا شوي ماشوم لپاره چې تنفس نه کوي يا په سختې سا کاږي، د بيا احيا کړنې پيل کړئ. له انتان څخه د مخنيوي په موخه عمومي پاملرنې په پام کې ونيسئ.

۱. نوي پيدا شوی ماشوم تود وساتئ.
 - نوم د پنښ په وسيله ونیسئ او د اړتیا په صورت کې يې پرې کړئ.
 - نوي پيدا شوی ماشوم يوې وچې، پاکې او تودې سطحې ته وليردوئ.
 - مور ته د نوي پيدا شوي ماشوم د تنفسي ستونزو په اړه معلومات ورکړئ او زياته کړئ چې تاسو د نوي پيدا شوي ماشوم د تنفس لپاره خپلې هڅې کاروئ.
 - ماشوم په يو ټوکر کې تاو کړئ او د شونتيا په صورت کې د يوې شعاع لرونکې بخارۍ لاندې کيردئ.
۲. تنفسي لارې خلاصې وساتئ.
 - سر ته يو څه د بسط وضعيت ورکړئ.
 - لومړۍ د نوي پيدا شوي ماشوم خوله او پوزه سکشن کړئ.
 - د سکشن ټوب د ماشوم له شونډې څخه د پنځه سانتي مترو په اندازه د هغه په خوله کې داخل کړئ او د ويستلو پرمهال يې کش کړئ.
 - د سکشن ټوب د درې سانتي مترو په اندازه د پوزې د سړمو له بهرنیو څنډو څخه پوزې ته داخل کړئ او د ويستلو پرمهال يې تر هغه وخته سکشن کړئ چې کوم مخاط پاتې نشي.
 - د اړتيا په صورت کې سکشن تکرارولی شئ مګر د هرو ۲۰ ثانيو په موده کې بايد له دوه ځله څخه زيات نه وي.
۳. که چېرې بيا هم ماشوم تنفس نشي کولای له مصنوعي تهوې څخه کار واخلي.
 - تنفسي ماسک ته داسې وضعيت ورکړئ چې د ماشوم خوله، پوزه او زنه وپوښي.
 - ماسک کلک کړئ.
 - تنفسي کڅوړې ته چې د ماسک سره نښتې ده د دوه گوټو يا د ټول لاس په وسيله (د کڅوړې اندازې ته په پاملرنې) له دوه څخه تر درې ځله فشار ورکړئ.
 - د سينې پورته کېدل وګورئ. په هغه صورت کې چې سينه پورته نشي:
 - سر ته بيا وضعيت ورکړئ.
 - د تنفسي ماسک ټول ځايونه چک کړئ.
 - تنفسي کڅوړې ته د مکمل لاس په وسيله ډير فشار ورکړئ.
 - که چېرې د ماسک ساحې سمې وې او سينه پورته شوه تنفسي کڅوړې ته په هره دقيقه کې ۴۰ ځله فشار ورکړئ خو چې ماشوم ژړا پيل کړي او په خپله تنفس وکړي.
۴. که چېرې ماشوم تنفس يا ژړا پيل کړه تهوې ودرئ
 - د سينې ښکته نوتل يا Chest indrawing وګورئ.
 - په هره دقيقه کې تنفس وشمېرئ
 - که چېرې په هره دقيقه کې د تنفس شمېر له ۳۰ څخه زيات وو او کومه شديده نوتنه په سينه کې شتون ونلري.
 - مصنوعي تهوې بيا مه تطبیقوئ.
 - ماشوم د مور له جلد سره په تماس کې کړئ، او د نوي پيدا شوي ماشوم بنسټيزو څارنو ته دوام ورکړئ (۹.۱۰ څپرکۍ، د نوي پيدا شوي ماشوم څارنې دې وکتل شي)

- د ماشوم تنفس او تودوخه په هر ۱۵ دقیقو کې و کتل شي
 - مور ته دی وویل شي چې ماشوم دی ښه کیږي
- احتیاط: ماشوم یوازې مه پریرئ.

۵. که چېرې په یوه دقیقه کې د تنفس شمېر له ۳۰ څخه کم وي او یا شدید د سینې نوتنه شتون ولري:

- مصنوعي تهوېې ته دوام ورکړئ.
- د ماشوم د عاجلو لیږلو لپاره ترتیبات ونیسئ.
- مور ته د هغه څه په اړه چې څه پېښ شوي، تاسو څه کوئ او ولې یی کوی معلومات ورکړئ.
- د لیږدولو په ترڅ کې تهوېې ته دوام ورکړئ.
- پېښه د لیږلو او د زیږون په فورمې کې ثبت کړئ.

۶. په هغه صورت کې چې ماشوم له ۲۰ دقیقو تهوېی څخه وروسته هم تنفس نشوای کولای:

- تهویه بنده کړئ، ځکه ماشوم مړ شوی.
- مور ته توضیحات ورکړئ او مرستندویه څارنې پیل کړئ.
- پېښه ثبت کړئ.

ج مل پانه. پارتوگراف او د زېږون یادښت (Partograph and Delivery Note)

د پارتوگراف او د زېږون د یادښت فورمی په لاندې ویب سایټ کې شتون لري: www.moph.gov.af

Partograph and Delivery Note

Name	Gravida	Para	Hospital number
Date of admission	Time of admission	Ruptured membranes	hours
200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 Fetal heart rate 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Amniotic fluid Moulding 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Cervix (cm) [Plot X] 4 3 2 1 0 Descent of head [Plot 0] Hours Time 5 4 3 2 1 Contractions per 10 mins Oxytocin U/L drops /min Drugs given and IV fluids 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 Pulse and BP Temp °C Urine protein acetone volume			

Let's make pregnancy and delivery safe in Afghanistan.

راځی امیندواري او زیږیدنې په افغانستان کې خوندي کړو.

د زېږېدنې يادښت: ولادي وارد

شخصي معلومات د ناروغ نوم: _____ د ناروغ عمر: _____ د امیندواری موده: _____ د زېږېدو لاری چک کړئ، په هغه صورت کې چې سیزارین شوی وي د هغو توضیحات په لاندې تشو ځایونو کې ولیکنئ مهبلي (نورمال) بریج (د پښو اعتلان) د واکيوم په وسیله زیږون د فورسپس د سیزارین عملیات د سیزارین استطبایات _____
عجان روغ (نورمال)؟ هو نه ایپیسیتومی (Episiotomy) خبریدل؟ هو نه
درېم پړاو فعال پلان؟ هو نه د لاس په وسیله د پلاستتا ویستل؟ هو نه د پلاستتا د زیږون وخت: _____ بشپړ؟ هو نه نابشپړ؟ هو نه
د ضایع شوې وینې اندازه (د ضایع شوې وینې له اندازې څخه کمې یا دایره تاوه کړئ) خفیف (له ۲۵۰ ملی لیټرو څخه کم) منځنی (۲۵۰ څخه تر ۵۰۰ میلی لیټره) ډیر (له ۵۰۰ میلی لیټرو څخه زیات)

د زېږون يادښت: له زېږون څخه ورسته بېړنۍ کتنې

وخت (له زېږېدو وروسته)	د وینې فشار	نبض	د رحم وضعیت	مهبلي وینه راتلنه (خفیفه، منځنۍ، ډېره)	يادښت:
					• په هغه صورت کې چې نبض په یوه دقیقه کې له ۱۱۰ څخه زیات او د وینې فشار له ۹۰/۶۰ څخه کم وي شاک په پام کې ونیسئ او لاندې اهتمامات تر لاس لاندې ونیسئ.
					• په هغه صورت کې چې مټانه نرمه او وینه راتلنه منځنۍ یا ډېره وي له زېږون څخه وروسته وینې راتلنې لپاره د (PPH) معاینات تر سره کړئ.

د زیرېږدو یادښت: د نوي پیدا شوي ماشوم په اړه معلومات

ج مل پاته

د نوي پیدا شوي ماشوم وزن: _____ له ۲.۵ کیلو گرامو څخه کم وزن؟ هو نه جنس: _____ هلک نجلۍ حالت/ وضعیت (د APGAR معاینه): 0۵ ----- ۱0 مرستې ته اړتیا لري؟ هو نه نورماله تنفس؟ هو نه د نه په صورت کې د ماشوم د بیا احیا په اړه توضیحات ورکړئ: ۶ ----- مړ زیږون؟ هو نه د هو په صورت کې، نوی یا پخوانی عمومي وضعیت (یو ځل معاینه وکړئ، اختلالات او خرابې بڼې په تشو ځایونو کې توضیح کړئ) روغتیا زیر والی یا غیر شعوري حالت اختلالات یا د غړو خرابې بڼې توضیحات: _____
د ناروغ د رخصتولو پړاوونه مور آیا رحم په سمه توګه تقبض کړی؟ هو نه خومره وینه یې ضایع کړې ده؟ نورمال ډېره؟ د ډیر په صورت کې مو کوم اقدامات وکړل؟ نوی پیدا شوی ماشوم د مور د شېدو په وسیله تغذیه؟ بڼه خراب
لاسلېک _____

I. Afghanistan MoPH Guidelines

Expanded Program of Immunization. 2006. EPI Guideline. Kabul: MoPH.
 Integrated Management of Childhood Illness Department.
 2009. Assess and Classify the Sick Child Age 2 Months to 5 Years. Kabul: MoPH.
 Mental Health Department. 2008. Introduction Mental disorders in BPHS. Kabul: MoPH.
 Ministry of Public Health. 2010. A Basic Package of Health Services for Afghanistan – 1389/2010. Kabul: MoPH
 National HIV/AIDS Control Program. 2006. Sexually Transmitted Disease and Other Sexual Route Disorders. Kabul: MoPH.
 National HIV/AIDS Control Program. 2008. National Clinical Protocol on Anti-Retroviral Therapy (ART). Kabul: MoPH.
 National Malaria and Leishmania Control Program. 2009.
 Guideline for Control and Prevention of Cutaneous Leishmaniasis in Afghanistan. Kabul: MoPH.
 National Malaria and Leishmania Control Program. 2009.
 National Malaria Treatment Guideline. Kabul: MoPH.
 National Standards for Reproductive Health Services and Reproductive Health Task Force. 2003. Newborn Care Standards. Kabul: Department of Women and Reproductive Health, MoPH.
 National Tuberculosis Control Program. 2009. TB
 National Treatment Guideline. Kabul: MoPH.
 Public Nutrition Department. 2006. Standard Operational Guideline on Management of Severe Malnutrition. Kabul: MoPH.
 Reproductive Health Task Force. 2003. Family Planning for Birth Spacing. Kabul: Department of Women and Reproductive Health, MoPH.
 Salam, Ahmad Shah. 2009. Clinical Procedures for Primary Eye Care: An Essential Training Guide for Physicians.
 Kabul: National Eye Care Coordination Office, MoPH.

II. WHO Guidelines

Connolly, M.A. (ed.). 2005. Communicable Disease Control in Emergencies: A Field Manual. (WHO Library Cataloguing-in-Publication Data, NLM classification: WA 110.) Geneva: WHO.
 Cook, John, et al. 1991. Surgery at the District Hospital: Obstetrics, Gynecology, Orthopaedic and Traumatology. (WHO Library Cataloguing-in-Publication Data, NLM classification: WO 100.) Geneva: WHO.
 Global Task Force on Cholera Control. 2004. Cholera Outbreak: Assessing the Outbreak Response and Improving Preparedness. Geneva: WHO.
 United Nations Children's Fund, United Nations University, and WHO. 2001. Iron Deficiency Anaemia Assessment, Prevention, and Control: A Guide for Program

Managers. Geneva: WHO.

WHO. 2003. Malaria Control in Complex Emergencies. (WHO Library Cataloguing-in-Publication Data, NLM classification: WC 765.) Geneva: WHO.

WHO. 2003. Surgical Care at the District Hospital. (WHO Library Cataloguing-in-Publication Data, NLM classification: WO 39.) Geneva: WHO.

WHO. 2005. Pocket Book of Hospital Care for Children:

Guidelines for the Management of Common Illnesses with Limited Resources. (WHO Library Cataloguing-in-Publication Data, NLM classification: WS 29.) Geneva: WHO.

WHO. 2006. Guideline for the Treatment of Malaria.

(WHO Library Cataloguing-in-Publication Data, NLM classification: WC 770.) Geneva: WHO.

WHO. 2006. Pregnancy, Childbirth, Postpartum and Newborn Care: A Guide for Essential Practice.

Integrated Management of Pregnancy and Childbirth. (WHO Library Cataloguing-in-Publication Data, NLM classification: WQ 170.) Geneva: WHO.

WHO. 2007. Managing Complications in Pregnancy and Childbirth: A Guide for Midwives and Doctors.

Integrated Management of Pregnancy and Childbirth.

(WHO Library Cataloguing-in-Publication Data, NLM classification: WQ 240.) Geneva: WHO.

WHO. 2009. Pharmacological Treatment of Mental disorders in Primary Health Care. (WHO Library Cataloguing-in-Publication Data, NLM classification: QV 77.2.) Geneva: WHO.

WHO in collaboration with the World Heart Federation and the World Stroke Organization. 2011.

Cardiovascular Disease Prevention and Control (WHO Library Cataloguing-in-Publication Data, NLM classification: WG 120.) Geneva: WHO.

III. Additional References

Brunicaudi, F. Charles et al. 2010. Schwartz Principles of Surgery (9th ed.). New York: McGraw Hill Medical.

DeCherney, Alan, et al. 2006. Current Diagnosis and Treatment Obstetrics and Gynecology (10th ed.). New York: McGraw Hill Medical.

Desenclos J.C, et Al. 2007. Clinical Guideline: Diagnosis and Treatment Manual for Curative Programs in Hospitals and Dispensaries: guidance for prescribing (7th revised ed.). Paris: Médecins Sans Frontières.

Doherty, Gerard M. 2005. Current Surgery Diagnosis and Treatment (12th ed.). New York: McGraw Hill Medical.

Ghai, O.P. 2008. Essential Pediatrics with Corrections 2005. Delhi: CBS Publishers and Distributors Heymann, David L. 2004. Control of Communicable Diseases Manual, An Official Report of the American Public Health Association (18th ed.). Washington, D.C.: APHA.

Kanski, Jack J. 2007. Clinical Ophthalmology: A Systemic Approach (6th ed.). Oxford:

Butterworth-Heinemann.

Kliegman, Robert M., Jenson, Hal B., et al. 2007. Nelson Textbook of Pediatrics (18th ed.). Philadelphia: Saunders.

Lalwani, Anil K. 2008. Current Diagnosis & Treatment of Otolaryngology -Head & Neck Surgery (2nd ed.). New York: McGraw Hill
 Longo, Dan L., Fausi, Anthony S. et al. 2012. Harrison's Principles of Internal Medicine (18th ed.). New York: McGraw Hill.
 McPhee, Stephen J. et al. 2010. Current Medical Diagnosis and Treatment (49th ed.). New York: McGraw Hill.

Mitchell, LAura, and Mitchell, David A. 2009. Oxford Handbook of Clinical Dentistry (5th ed.). Oxford: Oxford University Press.

Reddy, Shantipriya. 2008. Essentials of Clinical Periodontology and Periodontics (2nd ed.). India: Jaypee Brothers Pub.

Scully, Crispian. 2004. Oral and Maxillo-Facial Medicine (The Basis of Diagnosis and Treatment) (2nd ed.). NY, NY: Elsevier.

Shafer, William G. 1983. Textbook of Oral Pathology (4th ed.). Philadelphia: Saunders.

Sikri, Vimal K. 2005. Textbook of Operative Dentistry (1sted.). New Delhi: CBS Publishers and Distributors.

Townsend, Courtney M. et al. 2008. Sabiston Textbook of Surgery (The Biological Basis of Modern Surgical Practice) (18th ed.). Philadelphia: Saunders.

Wood, Norman K., and Goaz, Paul W. 2007. Differential Diagnosis of Oral and Maxillofacial Lesions (5th ed.). New Delhi, India: Elsevier.

همل پانه: د افغانستان د عامې روغتيا وزارت په وسيله د لومړنيو روغتيايي څارنو د معياري درملنې پر ملي لارښود (NSTG-PL) د بيا نظر د کړنلارو تطبيق

الف. عموميات

د لومړنيو روغتيايي څارنو د پاره د معياري درملنې ملي لارښود (NSTG-PL) يو ځواکمن سند دی او له درنو لوستونکو څخه د هغه د نوي کولو په موخه د کړنلارو د کارولو د ښه کولو لپاره د هر ډول وړاندیزونو لپاره غوښتنه کوو خو له لاندې مل پاتې څخه گټه واخلي.

پر "لومړنيو روغتيايي څارنو د پاره د معياري درملنې ملي لارښود" د نوي نظر غوښتنې يوازې هغه وخت شوني دي چې غوښتونکي د نظر وړ هرې ناروغۍ لپاره په بشپړه توگه فورمه ډکه کړي. د هرې ناروغۍ لپاره چې تر نوي نظر لاندې نيول کيږي بايد يوه جلا فورمه ډکه شي په لومړنۍ کچه د معياري درملنې په لارښود کې د شامليدو په موخه د ناروغيو لپاره غوښتنه هغه وخت په روښانه توگه شامليږي چې د روغتيايي بنسټيزو خدمتونو د ټولگي له لارې راجع شوي وي. په لنډه توگه، په لومړنۍ کچه د معياري درملنې په لارښود کې د يوې ناروغۍ له شاملولو مخکې د اړتيا وړ معلومات د لاندې څيزونو سره تر کتنې لاندې نيول کيږي:

۱. له غوښتونکي د اړيکو جزئيات بايد بشپړ وي.
۲. ناروغي په روښانه توگه تشرېح شوي وي.
۳. د لومړنيو روغتيايي څارنو د پاره د معياري درملنې د ملي لارښود يا د روغتيايي بنسټيزو خدمتونو د ټولگې لپاره روښانه ماخذ شتون ولري.
۴. هغه موجوده برخه چه نوی نظر ته اړتيا لری بايد له جزئياتو سره ذکر شوی وي.
۵. پر غوښتل شوې ناروغۍ نوی نظر بايد په جزئياتو ليکل شوی وي.
۶. د نوي نظر له غوښتنې څخه د ملاتړ لپاره دې کافي شواهد برابر شي.

ب. د تسليمولو او څيړلو پروسه
غوښتنليکونه کېدای شي د پوستې يا د برېښنالیک له لارې د معياري درملنې د ملي لارښود د سکرتریت په پته وسپارل شي. د عامې روغتيا وزارت

د فارمسي د چارو عمومي رياست
د معياري درملنې د ملي لارښود کاري گروپ

کابل افغانستان
برېښنالیک: rafi_rahmani2003@yahoo.com

موبایل: ۰۰۹۳ ۷۹۹۳ ۳۰۳۰۸

يا
برېښنالیک: zsididui@msh.org

موبایل: ۰۰۹۳ ۷۹۷۳ ۳۶۹۴۰۸

غوښتنليکونه له لاندې څيزونو څخه د ډاډ لپاره د عامې روغتيا وزارت د فارمسي چارو په عمومي رياست کې د معياري درملنې د ملي لارښود د سکرتریت له لوري کتل کيږي.

۱. د غوښتونکي د اړيکو جزئيات بشپړ دی
۲. په روښانه توگه د ناروغۍ تشرېح
۳. په لومړنۍ کچه د معياري درملنې د ملي لارښود يا د روغتيايي بنسټيزو خدمتونو د ټولگې لپاره د ماخذ روښانتيا.
۴. هغه موجوده برخه چې بدلون ته اړتيا لري بايد په روښانه توگه بيان شوي وي.

۵. پر غوښتل شوي ناروغۍ نوي نظر بايد په جزئياتو ليکل شوی وي.
۶. د نوي نظر لپاره له غوښتنې څخه د ملاتړ لپاره دې کافي شواهد برابر شي.
د معياري درملنې د لارښود سکرتریت نابشپړ غوښتنلیکونه بیرته غوښتونکي ته بشپړولو د پاره استوي او د بشپړو رسېدلو غوښتنو لپاره د معياري درملنې د لارښود د کاري گروپ په وسیله د کتنې په موخه مهالوېش برابروي.
د معياري درملنې د لارښود کاري گروپ غوښتنلیکونه گوري او د نوي نظر لاندې ناروغیو د منلو یا نه منلو په اړه تصمیم نیسي. بیا غوښتونکي د سکرتریت له لارې د هغو دلیلونو سره چې د معياري درملنې د لارښود د کاري گروپ له لوري هغوی ته وړاندې شوي، خبریږي. ټول کتل شوي غوښتنلیکونه په دوسیه کې اېښودل کیږي او د معياري درملنې د لارښود په سکرتریت کې ساتل کیږي. منل شوي نوي نظرونه د معياري درملنې د لارښود په راتلونکو ټوکونو کې په پام کې نیول کیږي او په هغو کې شاملیږي.

ج. دغوښتنې په فورمه کې د آمارو د عناصرو مشرح تشریحات

د لیږلو د غوښتنلیک په فورمه کې پنځه برخې شاملې دي.

لومړۍ برخه: هغه ناروغۍ چې بدلون پکې راځي

الف. د ناروغی نوم: د هغې ناروغی نوم چې باید بدلون پکې شي، په هغه صورت کې چې ناروغی د معياري درملنې په لارښود کې راغلی وي، د هغه دقیق نوم لکه څرنګه چې په لومړنۍ کچه د معياري درملنې په لارښود کې شتون لري ذکر شي.

ب. د هغو ناروغیو ماخذ چې باید بدلون پکې شي: په لومړنۍ کچه د معياري درملنې په لارښود کې د موجودې ناروغی د برخې یا څپرکي شمېره ښیي. په هغه صورت کې چې په لومړنۍ کچه د معياري درملنې په لارښود کې ناروغی شتون ونلري د برخې شمېره چې د نوي کېدو وړ ناروغی په هغه کې ځای پر ځای شي، وښایست.
ج. د روغتیايي بنسټیزو خدمتونو د ټولګې ماخذ: په هغه حالاتو کې چې غوښتنه د یوې نوې ناروغی د شاملولو لپاره وي د روغتیايي بنسټیزو خدمتونو په ټولګه کې هغه موجود عنصر یا برخه چې له ناروغی سره تړاو لري، وښایست.
د. د استولو نېټه: نېټه باید په ذکر شوي فورم کې د لمریز کال له مخې ولیکل شي.

دویمه برخه: د غوښتونکي جزئيات

دا برخه د غوښتونکي او د معیاري درملنې د لارښود د تصمیم نیولو د پروسې ترمنځ یوه حیاتي اړیکه لري.

الف عنوان: ښاغلی، آغلی، ډاکټر، پروفیسور یا نور عنوانونه.

ب. نوم: د غوښتونکي بشپړ نوم. لنډ نشي (مثلا محمد باید م یا سید باید د انگلیسي د اس په توري و نه لیکل شي).

ج. د پلار نوم: د غوښتونکي د پلار بشپړ نوم. لنډ نشي (مثلا محمد باید م یا سید باید د انگلیسي د اس په توري و نه لیکل شي).

د. پوسټي پته: بشپړه پته هغه ځای چې غوښتونکي ته لیکونه د غوښتنلیک په باره کې باید واستول شي: د کور نمبر، د سړک نوم، کلي یا ناحیه، ښار او ولایت. شخصي یا رسمی پتي دواړه د منلو وړ دي.
ه. تېلېفون: د تېلېفون شمېره چې له هغې لارې له غوښتونکي سره اړیکه ونیول شي.
و. برېښنالیک: چې له هغې لارې د غوښتنلیک په اړه برېښنالیک کیدای شي چې واستول شي.
ز. د روغتیايي مرکز د پېژندنې شمېره: د عامې روغتیا د وزارت د روغتیايي مرکز د کود شمېره چې غوښتونکي په هغه کې کار کوي، د امکان په صورت کې باید ولیکل شي. که چېرې غوښتونکي له راجسټر پرته په یوه شخصي معاینه خانه کې کار کوي د دې معاینه خانې نوم باید ولیکل شي. که چېرې هېڅ نوم شتون ونلري باید NA ولیکل شي.

دریمه برخه: د لومړنیو روغتیايي څارنو د پاره د معياري درملنې د اوسني ملي لارښود معلومات

د نظر وړ ناروغۍ باندې د نوي نظر لپاره هغه متن چې باید په لومړنیو روغتیايي څارنو د پاره د معياري درملنې په اوسني

ملي لارښود يا NSTG PL کې بدلون پکې شي، وليکئ. په هغه صورت کې چې يوه اوږده برخه بدلون ته اړتيا ولري، برخه، صفحه، پراگراف او کرښې نښه کړئ.

څلورمه برخه: غوښتنل شوی بدلون

د نظر وړ ناروغۍ باندې د نوي نظر لپاره چې بايد په NSTG _ PL کې بدلون پکې شي په جزئياتو يې وليکئ. په هغه صورت کې چې د اوږدو برخو وړاندیز کيږي يوه صفحه يا صفحې مل کړئ او په فورمه کې د هرې اضافي صفحې شمېره وليکئ.

الف. د اړتيا په صورت کې د هغو صفحو شمېر چې مل دي: په کوم ځای کې چې شونې وي د مل صفحو شمېر وليکئ. ب. شواهد: د وړاندې شوې ناروغۍ په اړه دې د ماخذ سايت وليکل شي (د خپرونې سم ماخذ، د ويب سايت صفحه)

پنځمه برخه: يوازې د معياري درملنې د ملي لارښود د کاري گروپ د استفادې لپاره

دا برخه د دې موخې دپاره ده چې ډاډه کړي چې غوښتنليکونه سمه پروسه تعقيبوي. د پړاوونو يا تصميمونو نېټه په دقيقه توگه ليکل کيږي. دا برخه د دواړو لورو لپاره د چټکې کتنې لپاره د هغوی د غوښتنې د برخليک په اړه وخت ورکوي. الف. د غوښتنې شمېره: د پرله پسې شمېرې له تر لاسه کولو سره غوښتنه ليکل کيږي چې لاندې خيزونه په کې شامل دي.

■ د فورمې شمېره

■ د استولو پرمهال د لمریز کال څلور عدده نېټه

■ په لمریزه نېټه د استولو پرله پسې شمېره

ب. د اخيستلو نېټه: هغه نېټه چې غوښتنليک تر لاسه کيږي.

ج. د کتنې نېټه: هغه نېټه چې د ناروغۍ د بدلون غوښتنليک د معياري درملنې د ملي لارښود د کاري گروپ په وسيله لوستل کيږي.

د. د معياري درملنې د ملي لارښود د کاري گروپ تصميم: د غوښتنل شوي تصميم څخه د دايرې تاوول.


ه. د تصميم نيولو دليلونه: د غوښتنې د منلو يا نه منلو لپاره د دليلونو لنډيز.

و. د معياري درملنې د ملي لارښود د سکرترت لاسليک: د معياري درملنې د لارښود سکرترت بشپړه فورمه لاسليکوي او نېټه پکې ليکي.

ز. د معياري درملنې د لارښود د بورډ د رئيس لاسليک: د معياري درملنې د لارښود د بورډ رئيس فورمه د خپل لاسليک او نېټې په وسيله بشپړوي.

غوښتنونکي ته د نهايي تصميم په اړه په تحريري توگه معلومات ورکول کيږي.

ه ۱ بنه د بدلون د پروسې لټدیز وړاندې کوي.



د معیاري درملنې د لارښود د نوي کولو غوښتنلیک، د فورمې شمېره:			
دویمه برخه: د غوښتونکي جزئیات		لومړۍ برخه - هغه ناروغۍ چې باید بدلون پکې شي	
نوم:	صوډان:	د ناروغۍ نوم	
د پلار نوم			
پوسټي پته		په لومړنۍ کچه د معیاري درملنې د ملي لارښود ماخذ	
تېلېفون:		د بنسټیز روغتیايي خدمتونو د ټولګې ماخذ	
د روغتیايي مرکز د پیژندلنې شمېره او نوم		د سپارلو نېټه	
دریمه برخه: په لومړنۍ کچه د معیاري درملنې د اوسني ملي لارښود د معلومات:			
خلورمه برخه: د بدلون وړاندیز			
منځ			
شواهد:			
د غوښتنې شمېره: /...../		پنځمه برخه: یوازې د معیاري درملنې د ملي لارښود د کاري ګروپ د ګډې لپاره	
د معیاري درملنې د لارښود د کاري ګروپ تصمیم منل / ردول		د کتلو نېټه:	د رسېدو نېټه:
د تصمیم نیولو دلیلونه:			
د معیاري درملنې د لارښود د بورډ د رئیس لاسلیک:		د معیاري درملنې د لارښود د سکرتر لاسلیک:	

35, 36, 37, 38
Oxytocin, 114, 117, 122, 123, 126

P

Paracetamol (acetaminophen)
Penicillin benzyl (Penicillin G),
192
Penicillin benzyl procaine, 172
Penicillin G (Penicillin benzyl), 192
Penicillin V, 70, 87, 194, 336
Pentavalent vaccine, 314
Permethrin, 181
Phenoxymethylpenicillin
(Penicillin V), 70, 336
Phytomenadione (Vitamin K), 130
Povidone-iodine (Betadine®),
255
Pralidoxime, 277
Prednisolone, 48, 50, 59
Primaquine, 203, 204, 206
Progesterin, 303, 305, 306
Propranolol, 51, 290
Pyrazinamide (Z), xx, 213, 214
Pyridoxine (Vitamin B6), 107

Q

Quinine, 204, 205

R

Ranitidine, 45, 254
RH (Rifampicin and Isoniazid), 213,
215
RHE (Rifampicin, Isoniazid, and
Ethambutol), 213, 214
RHZ (Rifampicin, Isoniazid, and
Pyrazinamide), 215
RHZE (Rifampicin, Isoniazid,
Pyrazinamide, and Ethambutol),
213, 214
Rifampicin (R), xx, 213, 214, 225, 304,
306
Ringer's lactate, 237

S

Salbutamol, 47, 48, 49, 50, 54, 55,
58, 120, 189, 262, 337, 338
Salicylic acid, 173
Saline solution, 237
Sodium chloride (NaCl), xx, 52, 67,
112, 117
Spermicides, 331
SRHZE (streptomycin, rifampicin,
isoniazid, pyrazinamide, and
ethambutol), 213
Streptomycin (S), xx, 213
Sulfadoxine-Pyrimethamine, 203,
204, 205
Sulfamethoxazole + Trimethoprim
(Co-trimoxazole), 244
Sulfamylon® (Mafenide acetate), 255

T

Tramadol, 117
TT (tetanus toxoid), xx, 107, 108, 116,
118, 194, 254, 313, 314, 315

V

Vitamin A, 153
Vomiting, 296

Z

Zinc, 36, 37, 39, 41, 44

Erythromycin, 30, 31, 49, 54, 57, 59, 62, 64, 65, 67, 70, 87, 88, 117, 120, 127, 135, 159, 160, 172, 175, 185, 187, 189, 191, 194, 198, 209, 218, 224, 229, 230, 235, 236, 243, 244, 270, 283, 321, 330, 331, 336

Estradiol, 140

Estrogen, 140, 303, 306, 307,

Ethambutol (E), xix, 213, 214

F

Fansidar®

(SulfadoxinePyrimethamine), 192

Ferrous sulfate, 107, 110, 117, 222, 303

Fluoxetine, 102

Folic acid, 107, 110, 117, 147, 148

Furazolidone, 43

Furosemide, 82, 85, 86, 231

G

Gentamicin, 48, 49, 54, 64, 97, 98, 117, 131, 159, 160, 185, 187, 197, 198, 225, 235, 236, 237, 260, 283, 332, 333

Gentian violet, 31, 62, 173, 176, 180, 197

Glucose, 253, 329

H

Haemophilus influenzae type b (Hib) vaccine, xix, 315

Haloperidol, 103

Hartmann's solution, 297

Hepatitis B vaccine, 206

Hydrochlorothiazide, 81, 82, 85

I

Ibuprofen, 134, 137, 185, 254, 290

Imipramine, 274

Immunoglobulin (anti-D), 115

INH (chemoprophylaxis), 204

Insulin, 54, 94, 97, 165, 167, 168, 169, 282

Intrauterine devices (IUDs), xx, 299, 302

Isoniazid (H), xix, 213, 214

Isosorbide dinitrate, 89, 91

L

Lactulose, 295

Levonorgestrel, 305

Lidocaine, 247, 269

Lindane, 179, 181

M

Mafenide acetate (Sulfamylon®), 255

Magnesium hydroxide, 294, 295

Magnesium sulfate, 112

Measles vaccine, 314

Mebendazole, 108, 110, 148, 152, 222

Medroxyprogesterone acetate

(DMPA), xix, 306, 307

Methionine, 277

Methyldopa, 112

Metoclopramide, 297

Metronidazole, 30, 31, 41, 42, 43, 117, 127, 142, 193, 238, 266, 270, 334,

Morphine, 91, 231, 238

N

NaCl (sodium chloride), xx, 52, 67, 112, 117

Neomycin, 62

Niclosamide, 223

Nifedipine, 84, 120

Nitrofurantoin, 161

Nitroglycerine, 88, 89, 90, 91, 231, 293, 294

Nystatin, 31, 134, 173

O

OPV, xx, 130, 195, 314

ORS (oral rehydration solution), xx, 34

Drugs Index**A**

Acetaminophen. See Paracetamol
 AcetylSalicylic acid (Aspirin), 88, 137, 277, 294
 Activated Charcoal, 274, 276, 277, 278
 Adrenaline (Epinephrine), 247, 266, 329
 Albendazole, 222
 Aluminum hydroxide plus Magnesium hydroxide, 294
 Aminophylline, 48, 49, 50, 59, 267, 319, 320, 330
 Amitriptyline, 102, 290
 Amlodipine, 83, 247
 Amoxicillin, 54, 55, 56, 57, 64, 120, 127, 161, 209, 224, 243, 244, 283, 320
 Amoxicillin/clavulanate, 243
 Ampicillin, 48, 49, 54, 56, 64, 97, 117, 120, 131, 159, 160, 185, 187, 197, 198, 235, 236, 237, 265, 283, 321
 Angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitors, xix, 51, 83, 85, 86
 Anti-D Rh immunoglobulin, 219, 241
 Anti-inflammatory medicines, xx
 Artemether, 204
 Artesunate, 203, 204, 205
 Aspirin (AcetylSalicylic acid), 45, 88, 89, 91, 137, 217, 231, 277, 282, 287, 290, 294, 335,
 Atenolol, 51, 82, 83, 89
 Azithromycin, 76

B

Bacille Calmette-Guérin (BCG), 130, 314
 Beclomethasone, 50
 Benzathine benzyl penicillin, 87
 Benzoic acid, 173
 Betadine® (Povidone-iodine), 255
 Betamethasone Cream, 62

Bisacodyl, 295

C

Caffeine, 290
 Calamine lotion, 246
 Captopril, 51, 83, 84, 86, 232, 294
 Ceftriaxone, 159, 160, 185, 230
 Chloramphenicol, 62, 176, 209, 322
 Chlorhexidine plus cetrimide solution, 219
 Chlorhexidine solution, 219
 Chloroquine, 201, 202, 203, 204, 206, 324
 Chlorphenamine, 187, 325
 (Chlorpheniramine), 67, 71, 74, 248, 254, 291
 Chlorpromazine, 103
 Ciprofloxacin, 41, 142, 161, 176, 210, 230, 243
 Clindamycin, 204, 205, 243
 Cloxacillin, 62, 135, 172, 175, 176, 218
 Codeine, 52
 Combined oral contraception (COC), xix, 299, 302, 303, 304
 Co-trimoxazole (sulfamethoxazole + Trimethoprim), 41, 49, 55, 57, 59, 64, 145, 161, 225, 230, 243, 244, 282, 283, 326

D

Dextrose solution, 259
 Diazepam, 54, 92, 94, 97, 102, 282, 328
 Doxycycline, 58, 59, 136, 194, 212, 213, 217
 DPT (Diphtheria, pertussis, and tetanus), xix, 190, 315

E

Epinephrine (adrenaline), 246, 247, 266, 329
 Ergometrine, 116, 117, 126, 139
 Ergotamine tartrate, 290

cardiogenic, 261, 262, 265
hypovolemic, 261
neurogenic, 261, 262, 266
obstructive, 261
Septic, 114, 262, 265
Signs and symptoms, 281
Sinusitis, 66
Skin conditions, 171
Snake bites, 249
Sore throat, 68
Spermicides, 311
Spider bites, 247
Status asthmaticus, 50
 wasp and bee stings, 245
STIs. See Sexually transmitted
 infections, xx, 141, 142, 143, 302
Stridor, xxvi, 47, 48, 51
Stroke, xxvi, 288
Sycosis, v, 175, 176
Sydenham's chorea, 86
Syphilis, 227, 228

T

Tachypnea, 84
TB. Tuberculosis, xx, 185, 210
Tetanus, 191
Thrush (oral Candidiasis), 29, 31
Tinea capitis (scalp ringworm), 173
Tinea cruris, 172
Tinea pedis, 172
Tonsillitis, 69
Trauma, 124, 255
Tuberculosis (TB), xx, 210
 Meningitis, 95, 217, 208, 289
 pulmonary, 231
Tympenic membrane, xxvii

U

Under-nutrition, 150
Ureteric colic, 240
Urethral meatus, xxvii
Urethritis, 160
Urinary tract conditions, 159

Urinary tract infections, 159
Urticaria, 177
Uveitis, xxvii

V

Vacuum exTraction, xxvii, 108
Vaginal bleeding, 138
 postmenopausal, 139
Vaginitis, xxvii
Viral Pharyngitis, 69
Volvulus, 238
Vomiting, 296
Vulva, xxvii

W

Wasp and bee stings, 245
Wheezing, xxvii,
 chronic, 65, 79
WHO. See World Health
Organization (WHO), xx, 106, 146,
 148, 344, 345
World Health Organization (WHO), xx,
 106, 148, 344, 345
Expanded Programme on
Immunization (EPI), xix, 98, 132, 313
guidelines, 344

X

Xerophthalmia, xxvii

O

Obstetrics, 105, 345
 Obstructive pulmonary disease,
 chronic, xix, 58
 Oliguria, 190
 Ophthalmia neonatorum, 129, 131
 Oral Candidiasis (thrush), 29
 Oral conditions, 29
 Oral contraceptives. See Combined
 oral contraception (COC)
 Orchitis, 226
 Osteomyelitis, 186
 Osteoporosis, 140
 Otitis, xxiv
 Otitis externa, xxiv, 61
 Furuncular (Ear Boils), 61, 62
 Otitis media, xxv

P

Pancreatitis, xxv, 198, 226
 Paralytic ileus, 238
 Parasitic diseases, 189
 Pediculosis, 178
 Pelvic/genital examination, 302
 Pepsin, xxv
 Peptic ulcer disease, xx, 44
 Pericardial tamponade, xxv
 Perinatal period, xxv
 Periodontitis, 29, 30
 Peritonitis, 236
 Pertussis (whooping cough), 189
 Pesticides, 276
 Petechia, 286
 Pharyngitis, 190, 229, 318
 Phonophobia, xxv
 Photophobia, xxv
 PID. Pelvic inflammatory
 disease, xx, 141, 142, 143, 229
 Plasmodium falciparum (PF), xx, 199,
 203
 Plasmodium vivax (PV), xx, 199, 201
 Pneumonia, 52, 53, 54, 55, 56, 278
 differential diagnosis of, 346

Poisoning, 270, 271
 Poliomyelitis, 194
 Polyhydramnios, 108
 Postmenopausal bleeding, xx, 139
 Postnatal period, xxv
 Postpartum hemorrhage (PPH), xx,
 122, 124, 125, 127, 139, 342
 Pre-eclampsia, xxv
 postpartum hemorrhage, xx, 122,
 124, 125, 127, 342
 preterm Labor, 119
 Primipara, xxv
 Prodromal syndrome, xxv
 Progestin-only injectables, 306
 Progestin-only pill, 305
 Pruritus, xxvi
 Pulmonary disease, chronic
 obstructive, xix, 58
 Pulmonary edema, 231
 Pus, 240
 Pyelonephritis, 159

R

Rabies, 218, 240, 245
 Reye's syndrome, 282, 287, 290
 Rheumatic fever, 86
 Arthritis, 183
 Rhinitis, 70, 190
 Rhonchi, 49, 50
 Rickets, 156
 Ringworm, 172, 173
 Roundworm (ascariasis), 221, 222

S

Salpingitis, xxvi
 Scabies, 180
 Scalp ringworm (Tinea capitis), 172,
 173
 Sepsis, xxiv, 31, 198, 265, 291
 Sexually transmitted infections
 (STIs), 227, 142, 143
 Shock, 261
 Anaphylactic, 261, 262, 266

227, 229
Human bites, 240
Hydrophobia, 219
Hymenolepis nana, 222
Hyperglycemia, 168
Hypertension, 79
 gestational, 165
 systemic, 79
Hypertension emergency, 83
Hypertensive crisis, 96, 232
Hypogastrium, 119
Hypoglycemia, 207, 258, 281, 283

I

Expanded Programme on
Immunization (EPI), xix, 98, 132, 344
Impetigo, 171
 napkin (diaper) rash, 173, 174
Infections, 227
 sexually transmitted, 227
 urinary tract, 159
Infertility, 143
Injectables, progestin-only, 306
Insulin, 54, 94, 97, 165, 167, 168, 169,
 282
Insulinoma, 258
Intrauterine devices (IUDs), xx, 299,
 302
Iritis, xxiii, 73, 74, 75
Ischemia, 234
 cardiac, 84
 IUDs (intrauterine devices), 299,
 302

J

Jaundice, 290

K

Keratitis, xxiii, 228
Kernig's sign, xxiii, 96
Ketoacidosis, 169
Kwashiorkor, 150

L

Labor, 119
Lactational amenorrhea method
(LAM), xx, 299
Leishmaniasis, 220
Lethargy, xxiv
Lice, 178
 Lymphangitis, xxiv

M

Malaria, 199
Malnutrition, 150
 kwashiorkor, 150
 marasmic, 150
Marasmo-Kwashiorkor, 150
Mastitis, xxiv, 133, 135
Mastoiditis, xxiv, 286
Measles, 195, 314
Meningitis, 95, 217, 218, 289
Micronutrient, xxiv, 157
Migraine, 289
Ministry of Public Health (MoPH)
 guidelines, 344
Morbidity rate, xxiv
Mortality rate, xxiv
Multipara, xxiv
Mumps, 143, 226
Musculoskeletal conditions, 183
Mycobacterium tuberculosis, 210
Myocardial infarction, xxiv
 acute, 66
Myocarditis, 190

N

Napkin (diaper) rash, 172, 173
Nasogastric tube, 35, 36
National Standard Treatment
Guidelines for Primary Level
(NSTG-PL), xx
Nausea and vomiting, 296
Neurogenic shock, 262, 266
 tetanus, 191
New born Care, 127, 128

(COC), xix, 299, 302, 303, 304
 Compromised immunity, xxi
 Constipation, 294
 COPD. Chronic obstructive
 pulmonary disease, xix, 58
 Cough, 283
 family planning, xix, 299, 302, 344
 Cracked nipples, 133
 Craniotables, 157
 Cystitis, xxii, 160

D

Dehydration, 33, 287
 Dental caries, 29
 gestational, 165
 Diaper (napkin) rash, 172
 Diarrhea, 33
 chronic, 58, 65, 79
 persistent, 39, 40
 Digestive system conditions, 33
 Diphtheria, 190
 Dislocation, 268
 Dysentery, 40, 41, 42
 Dyslipidemia, xxii
 Dysmenorrhea, 136
 Dyspnea, xxii, 84, 284, 293

E

Ear, nose, and throat conditions, 61
 Eclampsia, xxii
 Ectopic pregnancy, xxii, 118
 ruptured, 239
 Edema, 231
 Emergencies, 231, 344
 Encephalitis, 95, 217, 218, 226, 283
 Endocrine system disorders, 165
 Entamoeba histolytica, 42
 Enteric (typhoid) fever, 208
 wasp and bee stings, 245
 EPI (Expanded Programme on
 Immunization), xix, 98, 132, 344
 Epilepsy, 93
 Episiotomy, 342

Epithelialization, xxii
 Erythema marginatum, 86
 Expanded Programme on
 Immunization (EPI), xix, 98, 132,
 344
 eye injuries, 255

F

Family Planning, 299, 344
 Fallopian tubes, xxii
 fertility awareness methods
 (FAMs), xix, 299, 309
 lactational amenorrhea method
 (LAM), xx, 299, 308
 Nasogastric tube, 35, 36
 Fever, 285
 typhoid (enteric), 208
 Febrile convulsion, 281
 Flu, 51

G

Gestational diabetes, 165
 Giardiasis, 43
 Gingivitis, 29
 Glaucoma, 76
 Glomerulonephritis, 228
 Gonorrhea, 228
 Guarding, 236, 288
 Guidelines (Afghanistan MoPH), 344
 Guidelines (WHO), 344

H

Haemophilus influenzae type b, xix
 Headache, 288
 migraine, 289
 Helminthic infestations, 189
 Hemorrhage, 113
 postpartum, xxv
 Hepatitis, xxiii, 206
 Herpes simplex virus, 318, 327
 Herpes zoster, 317, 318
 Hirschprung disease, 294
 HPV (human papilloma virus), xix,

INDEX

A

- Abortion, 114
- AcetylSalicylic acid (Aspirin), 88, 173, 277, 294
- Acquired immunodeficiency, xix, 308, 317, 344
- Acute abdominal pain, 232
- Acute appendicitis, 237
- Acute Cholecystitis, 237
- Acute myocardial infarction, 231
- Adnexa, xxi, 115
- AIDS (acquired immunodeficiency syndrome), xix, 308, 317, 344
- Allergic rhinitis, 70
- Amebic dysentery, 42
- Anaphylactic shock, 261, 262, 266
- Anemia, 109, 145
 - in pregnancy, 109, 345
 - severe, 198, 204, 344
- Angina pectoris, xxi, 88, 293
- Antenatal care, 105, 106, 108, 109, 110, 132
- Antepartum hemorrhage, xix, 113
- Anterior chamber, xxi
- Anthrax, 223
- Anxiety, 99
- Appendicitis, 237
- Arthralgia, xxi, 183
- Arthritis, 183
 - Septic, 114, 261, 262, 265
- TB, xx, 185, 212
- Ascites, xxi, 207
- Aspirin (AcetylSalicylic acid), 45, 88, 89, 91, 137, 217, 231, 277, 282, 287, 290, 335
- Asthma, 47
 - severe, 54
- Autoimmune (rheumatoid), 207
 - Arthritis, 183

B

- Bacillary dysentery, 41
- Bacterial Tonsillitis, 69
- Basic Package of Health Services (BPHS), xvii, 97, 100, 166, 167, 179, 181, 204, 272
- Bee stings, 245
- Birth spacing, 299, 344
- Bites
 - human bites, 240
 - insect bites and stings, 245
 - snake bites, 249
- Blood conditions, 145
 - anemia, 145
 - thalassemia, 149
- Booster dose, xxi
- Bowel (intestine) obstruction, 238
- Breast abscess, 135, 136
- Breathing, 54
 - fast, 211
- Breech presentation, xxi
- Bronchiectasis, xxi
 - asthmatic, 50
 - chronic, 65, 79
- Brucellosis, 224

C

- Candidiasis (Candida infection), 172
 - oral, 29
- Cardiac failure, 84
- Cardiogenic shock, 262, 265
 - signs and symptoms of, 281
- Cellulitis, 29, 30, 31, 286
- Chest indrawing, 47, 128, 339
- Chest pain, 292
- Cholecystitis, acute, 237
- Cholera, 44
- Choriocarcinoma, 138
- Chronic obstructive pulmonary disease, xix, 58
- Cold, common, 55
- Colic, ureteric, 240
- Combined oral contraception

